



Ex Libris Georgi Massimiani
~~Disce~~ Med. Doctoris -
a' villafranca
5747:

CLARISSIMI VIRI THOMÆ
WILLIS,

MEDICINÆ DOCTORIS,
Naturalis Philosophiæ Professoris Oxoniensis,


NEC NON

INCLYTI MEDICORUM COLLEGIJ
Londinensis & Societatis Regiæ Socij;

OPERA OMNIA:

TOMUS PRIOR.

CUM ELENCHIS RERUM ET INDICIBUS
necessariis, ut & multis Figuris æneis.




LUGDUNI.

Sumptibus JOANNIS ANTONIJ HUGUETAN, & Soc.

M. DC. LXXXI.

CUM SUPERIORUM PERMISSU.





REVERENDISSIMO
IN CHRISTO PATRI,
AC D. DOMINO
GILBERTO,
EPISCOPO
LONDINENSI,
& Sacelli Regij Decano.



USPECTÆ fidei prolem (ILLUS-
TRISSIME PRÆSUL) non uno in-
dicio agnoscit Aquila; diem quip-
pe pertulisse , parentem minùs
eloquitur , nisi & solares irretorto
oculo conspexerit radios: & qui-
dem licèt properatus hic foetus
noster, sive cœcitatissuæ ope, sive
creperæ istius lucis , in qua versabatur , beneficio, in pu-
blicum prodire sustinuerit; nondum tamen indolis suæ
experimenta satis idonea videtur dedisse ; usque dum
ad

EPISTOLA DEDICATORIA.

ad Claritatem Vestram, ceu ad *Phæbi* jubar, aciem intenderit.

Nimirum Meditationes istæ semel, & deinceps editæ, jam tandem, cùm Sacrum Tuum nomen paginis suis prætexunt, in lucem primùm prodiisse gloriantur. Æquum certè erat, ut idem *Mecænas*, qui me è tenebris meis, ad propria metalla damnatum, à fuligine, & pædore, quibus obvolvebar, in apricum evocavit, etiam lucubrationibus meis & ornatum, & splendorem fœnerari non detrectaret; Scripti simul, & Scriptoris Editor juxtà atque Author.

Per *Te* imprimis stetit (*Vir Amplissime*) quòd *Sid-leiani* Professoris munus mihi in hac celeberrima *Academia* promptissimis suffragiis concreditum fuerat; quantumcunque enim me mea mediocritas oneraret, sententiæ Vestræ pondus vicissim sublevabat.

Abunde mihi sum conscius quàm impar, & præsidiis omnibus destitutus, veniam ad provinciam istam pro Argumenti, pro *Academia*, pro *Mecænatis* mei dignitate ornandam, at sub tantis Auspiciis nihil desperandum esse cogito. Instabo itaque operi, & si quid in Naturæ scrutinio feliciùs paulò excogitatum à me prodeat usquam, non id ingenio, aut (quod unicum fortasse rectiùs ambirem) industriæ meæ, sed *Patroni* influentiis acceptum ferri velim: illi nimirum se, & sua omnia dedicat, consecrâtque

Humillimus, & aternùm addictissimus

THOMAS VVILLIS.

REVE



REVERENDISSIMO
IN CHRISTO PATRI,
ET DOMINO, D.
GILBERTO,
PROVIDENTIA DIVINA,

Archiepiscopo Cantuariensi, totius Angliæ Primate, &
Metropolitano; & Augustissimo Principi CAROLO II.
M. Britanniaë, Franciaë & Hiberniaë Regi,
à secretioribus Consiliis.



TA legibus constitutum est, (AMPLISSIME PRÆSUL) ut quicquid fundi cujuscumque solo superstrui contigerit, accessorij jure id ipsum consequatur. Cum itaque isti, quod nuper moliebar operi, de sensitivæ animæ natura & muniis, nec non de affectibus cerebri, & nervosi generis, variisque qui in iisdem versantur morbis, humani capitis anatomen, pro fundamento collocassem; syntagmate hoc Clementiæ vestræ dicato, omnino necesse erat, ut qualiscunque postmodum basi isti inniteretur moles, vestra protinus audiat, dici-que gestiat; atque ita quidem in vitio proficimus, & olim deliquisse, culpæ subsequenter non gradus tantum, sed quod majus est, etiam autoramentum existit, ut tandem amisso delicti nomine officio fungi potius quàm peccare videamur.

Interea tamen, neque hæc in qua versor causa aut à vestris rationibus aliena, aut ab Ecclesiæ rebus, quibus felicissime præsides, abhorrere dicenda est; Nam & qui hic subinde occurrunt Epileptici sese in aquam aut ignem præcipitantes, & illi quibus membra

spasmodis contracta varieque distorta, tum etiam quibus integra corpora modo ut se erigere nequirent incurvata, modo quasi dæmonis afflatu saltibus stupendis, aliisque miris gesticulationibus agitata fuerunt; Hi inquam, & plures alij, quos hic passim describo, ægrotantes ab istis non multum differre videntur, quos in Evangelio à Christo Domino curatos legimus; ipsisque etiamnum curandis, utpote qui tam contumaces & rebelles sunt, adstantem sibi Numinis opem supra omnes Pharmacie vires Medicus utut peritissimus semper implorare debet. Itaque & jure optimo νόσος ab antiquis ἰερεὺς dictæ theoria, & reliqua etiam pathologia nostra, quatenus τὸ Θεῖον quoddam in se continet, morbosque non minus precibus & jejuniis quam medicamentis sanandos explicat, sacrorum arbitro nuncupari & proinde sanctitatis vestræ auspiciis muniri præoptaverint.

Poro novum non est ut per nosocomium ad Ecclesiam sit aditus; siquidem ista fere methodo Salvatorem nostrum fuisse usum constat, qui à corporis restituti valetudine animæ salutem initium sumere plerumque voluit. Et profecto cum stupida melancholicorum deliria, caninæ rabies, aliaque à cerebro non satis sano orta, quosdam & à sanctorum communione, & ab hominum societate pepulerint; si hæc artis nostræ ope profligata essent, non desperandum foret quin morbis una & erroribus valedicentes, rectius non tantum valerent, sed & saperent homines.

Quod superest δεξιότροπον opt. maxim. supplex veneror, ut quam pacem Reipublicæ feliciter restituit, Ecclesiæ suæ reddat, miserrum oculis caliginem submoveat, animis furorem tollat, & in tanti beneficii pignus, simul & cumulum, Clementiam vestram, ingens reformatæ pietatis decus & columen, salvam & sospitem diutissime conservet, quod animitus precatur,

*Clementia vestra humillimus cultor, Client
addictissimus*

THOMAS VVILLIS.



LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY



ÆTATIS SVÆ, 45.



A U T H O R I, In illius Diatribas Medico- Philosophicas,

CARMEN GRATULATORIUM.



*ABSTRUSAS rerum causas, quo semine litem,
Quo pacem natura paret, quis corpora motus
Urgeat, indornitos undis quid misceat ignes,
Qui nexus elementa ligent, felicior etas
Conspexit tandem; cunctisque ignota priorum
Abdita laxantur vasti penetralia mundi.*

*Progenies cœli, terræ defossa metalla
Visceribus, quamvis Phœbo ostentata parenti
Indiga lucis erant; radios obscura premebat
Umbra, & lucenti splendor quæsitus in auro est.
Lumina præstrinxit ferrum, ignotumque latebat
E damnis notum nimis; & simul agmina fudit,
Ingeniumque unâ victor superaverat ensis.
Sic olim curas, vanæque indaginis artes
Elusit natura parens; sic limine jussit
Sistere, & extremo defigere cortice lumen.
At nobis tentare adyta, atque in-visere rerum
Ultima concessit, mundique arcana tueri:
Nec nota est magis ipsa sibi, quis montibus altis
Regnet amor, quæ flamma leves in marmora succos*

Excoquit,

Excoquit, unde novi tellus connixa metalli
Cæca rudimenta, & duri primordia fœtus
Fœcundo fovet amplexu: cur vere tepenti
Pandit opes terra, & nati vo fulgurat ostro.
Qui zephyri molles pregnant semina Veste
Inspirent: nebularum arcu, cœlique relictis
Sedibus, in nostris Iris quæ gestiat undi.
Cur fluviis immersa Ceres, commixtaque Nymphis
Intumeat: quæ bella movet, quas concitat iras
Fervidus, inque cadis celebraverit Orgia Bacchus.
Sicania quis desertis fornacibus Ætnæ
Vulcanus molles per corpora suscitât ignes.
Quin etiam humanos agitet quis Spiritus artus:
Vnde hinc purpureus venas, hinc lacteus imber
Irrigat: in fontes quæ causa recidere jussit
Sanguinis assiduo remeantia flumina motu.
Qui cœci in venis ignes, quæ viscere flamma
Deliteat, febremque ciet: quid misceat æstu
Frigora, diversa cœant quo fœdere Zone.
Quæ pestem stygio Furiarum emittit hiatu,
Grassarique jubet, ventosque armare veneno.
Quis sit fatidicus renes qui perluit humor,
Qualis odor matulæ, quem nec fastidiit olim
Balsama cui vieta pelvis spiravit Idames.
Cuncta patent: nec cui furtivos impius ignes
Intulit, artifici melius sua cognita proles.
Artis circuinus mundum, indignataque Gades
Transiit extremos, veteremque scientia Thulen.

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas!
Naturæ Phœboque sacer! cui Delphica laurus

Amplecti

*Amplecti frontem , radiataque tempora gestit.
Flammæ illi parcent , quem sacris artibus Hermes
Imbuit , & doctos tenebri qui vindicat ignes.
Illum nulla dies rapiet , qui lumina Phœbi
Donavit radiis , lucisque fuga verat umbras.
Non illum afflato Pestis violare veneno
Audeat , aut tacita Febris torrere favilla,
Qui morbis vitam , & letho donaverit ævum.*

PHILIPPUS FELL, *Med.*
Stud. Oxon.





SERIES OPERUM

D O M I N I D.

THOMÆ VVILLIS,

Hac Editione Typis pro-
deuntium.

TOMI PRIORIS.

- I. De Fermentatione.
- II. De Febris.
- III. De Urinis.
- IV. Cerebri Anatome.
- V. Nervorum descriptio, & usus.
- VI. De Morbis Convulsivis.
- VII. De Scorbuto.
- VIII. De Affectionibus Hystericis, & Hypochondriacis.
- IX. De Sanguinis incallescencia.
- X. De Motu Musculari.

TOMI POSTERIORIS.

- I. De Anima Brutorum Exercitationes duæ.
- II. Pharmaceutice Rationalis, & de Medicamentorum operationibus in humano corpore, &c.



ELENCHUS RERUM QUÆ IN TRACTATU DE FERMENTATIONE CONTINENTUR.

C A P U T I.

De principiis rerum naturalium.

Pag. 1

Fermentationis vocabulum unde desumitur. p. 1. corpora ad fermentescendum apta heterogeneis constant particulis. ibid. secus quæ minus fermentescunt. ibid. Principia rerum naturalium triplicis generis. p. 2. scil. Peripateticorum quatuor elementa, Epicureorum corpora *Atmoeidea*, Chymicorum Spiritus, Sal, Sulphur, Aqua, & Terra. ibid. & p. 3

C A P. II. Principiorum Chymicorum descriptio, eorumque proprietates, & affectiones. P. 3

Spiritus quid sint, & quibus subiectis insunt. ibid. triplex eorum status, scil. depressionis, exaltationis, & defectionis. p. 4. cum Spiritus destillantur, cur vapores in strias concrecant. ibid. Sulphur, quid sit. ibid. eius particula in subiectis sunt fixæ, aut solutæ. p. 5. hæ sunt in triplici statu; aut enim sunt depressæ, & aliis obvolutæ, aut ad exaltationem evectæ, aut fugitivæ & ad eruptionem paratæ, ibid. triplex earum discessus, & eruptionis modus, scil. 1. Lenis, sensim & sine tumultu procedens. 2. Citatior, cum fœtore, & dispositione ad putredinem. 3. Rapidissimus, cum disperditione subiecti, aut incendio. p. 5. Sal quid sit. p. 6. in subiectis aut est fixus, aut solutus. ibid. Soluti triplex genus; fusionis, volatilisationis, fluoris. ibid. Sal fixitatem rebus inducit, inflammationi resistit. p. 7. Aqua & Terra quid mixto conferunt. ibid. Aqua est Spiritus & Sulphuris vehiculum, rebus debitam consistentiam elargitur. ibid.

ELENCHUS RERUM.

ibid. Terra spatiola à ceteris relictæ explet, durationem, & molem rebus conciliat. p. 8. principiorum coniugationes quadam: Spiritus & Sulphur facile coherent, tamen utraque, licet inflammabilia, idem non sunt. ibid. Sal & Sulphur bene conveniunt. p. 9. Sulphur inter Spiritum & Salcm quasi distrahitur. ibid. Sal strictissime unitur Terra. p. 10. unde principia hæc pura, aut impura aliisque velut cognominibus appellantur. ibid. huiusmodi principia rerum analysis tum naturalis, tum violenta planè exhibet. ibid. non sunt ignis producta. ibid. corpora quadam in hæc principia discinduntur, & ex iis una commissis coalescunt. p. 11.

C A P. III. Fermentatio quid sit, eius divisio quoad subjecta, quomodo in mineralibus se habet. p. 11

Fermentatio quid sit, ibid. cernitur vel in naturalibus, quæ sunt mineralia, vegetabilia; vel in operibus artis. p. 12. in mineralibus fermentationis motus obscurior. ibid. eorum generatio dicitur propriè congelatio, aut coagulatio; vitrificationi comparantur, ibid. Meteora à fermentatione minerali dependent. p. 13. Fontium acidulorum, & thermarum origo. ibid.

C A P. IV. De fermentatione quatenus in vegetabilibus observatur. p. 13

*Fermentatio in vegetabilibus conspicua est; in iis principiorum varia con-
temperatio. ibid. Plantarum germinatio quæ fiat. p. 14. Earum vegeta-
tio, maturitas, & declinatio juxta anni tropas expenduntur. ibid. & seq.*

C A P. V. De fermentationis observandis circa animalia. p. 16

*Animalia principiis fermentativis constant, ipsaque fermenta in variis locis recondita habent, scilicet in corde, in quo sanguis velut accenditur. ibid. in ventriculo, cuius ope chylus elaboratur. ibid. eius anomalie, quibus ingesta aut acescunt, aut in bilem vertuntur. p. 17. in cerebro, ibid. in va-
sis seminalibus, p. 18. in liene. ibid. in cysti fellea. p. 19. Morbi, eorumque
curationes à fermentis dependent. ibid. totus mundus particulis fermenta-
tivis plenus est. p. 20.*

C A P. VI. De fermentatione quatenus in artificialibus peragitur. p. 20

*De quibus considerare oportet hæc tria. ibid. 1. Quæ sunt magis fermentes-
cibilia. 2. Quomodo fermentationis motus promovetur, aut sistitur.
3. Quotuplex sit fermentationis finis & effectus. p. 21. Ad fermentatio-
nem perfectivam requiritur, ut particulae sint disjunctæ, ut sint hetero-
geneæ, ut sint extra cruditatis & maturationis statum. ibid. Fermentatio
promove-*

ELENCHUS RERUM.

promovetur adiectione fermenti, ibid. per debitam aëris ambientis conditionem, & corporis fermentescentis repositionem. p.22. fermentationis latè sumpta finis & effectus sunt triplicis generis. 1. Partium ejusdem corporis exaltatio, & resolutio. 2. Partium alterius corporis dissolutio, & precipitatio. 3. Partium modò ejusdem, modò diversorum corporum coagulatio, & congelatio. ibid. & seq.

CAP. VII. De fermentatione quatenus in corporum exaltatione spectatur. P.23

Fermentatio adhibetur, quâ exaltantur particula vel spiritiosa, vel salina. ibid. Prius optimè cernitur in panificio, brasii, cervisia, vini, aliorumque preparationibus, ibid. Massa farinacea cum variis fermentis subactio, & intumescencia ratio. ibid. Brasii preparatio. p.24. cervisia compositio & fermentatio. p.25. coacescentia ejus à salis fluore, velut in aceto. p.26. cervisia coctio, per se, & cum floribus lupuli. ibid. amara cervisiam praeservant, quatenus Salis fluorem impediunt. ibid. vinorum fermentatio. ibid. vinum αἶγλας, sive mustum, quid sit. p.27. Vinorum fermentatio & defecatio quo ritu succedunt, & quibus modis adjuvantur. ibid. eorum effervescentia immodica unde cientur, & quomodo compesci solent. ibid. vini Tartarus è quibus constat, ibid. vinum rancidum, decolor, & mucilaginosum qua ratione emendantur. p.28. depauperatum quibus remediis sustentatur, ibid. quare mustum utribus inclusum impetuosè effervescat. p.29. Pomaceum quâ paretur ut ab acore praeservetur. ibid. de corporibus, quorum partes salina exaltantur, cujusmodi sunt acetum, hydromel, jussculum avenaceum acidiusculum. p.30. fermentatio ad totam artem coquinariam, & dieticam extenditur. P.31

CAP. VIII. De fermentationis motu prout in corporum interitu, putrefactione, & corruptione observatur. P.31

Principia corporum naturalium à cruditate ad maturationem, indèque ad dissolutionem rei cujusvis festinant, ibid. Vegetabilium declinatio, & interitus. p.32. Animalia accretionis, & durationis praefinitos habent terminos. ibid. cum vita interiit, caro corruptionem subit. ibid. quomodo vermiculi aceto vappescente generantur. p.33. Carnes quo pacto à putredine vendicantur. ibid. Mineralia minùs putredini obnoxia, secus compositiora, & aquosa. p.34. res inter corrumpendum fiunt aut mucida, aut rancida, aut acescunt, aut in vappam degenerant. ibid. Corruptio quid sit: cum, vel etiam sine fœtore, putredinem, aut marcorem inducit. ibid. De mucore. p.35.

qua ratione tum vasa inanita, tum corpora humidiora à ventilatione prohibita situm, & vitium contrahunt. ibid. In quo muciditas consistit. p. 36. ejus cum empyreumate similitudo. ibid.

C A P. I X. De fermentationis motu, quatenus in corporum dissolutione observatur. P. 37.

Duo magna solventia naturalia, aqua, & ignis; artificialia quamplurima. ibid. aqua menstruum acuitur Spiritu, Sale, aut Sulphure. ibid. cur aqua nonnulla saponem dissolvunt, alia verò minimè. p. 38. quo ritu solventia spirituosæ, Salina, & Sulphurea parantur, & qua corpora dissolvunt. ibid. & seq. De solutione metallorum, item de auri, & argenti mensuris appropriatis. p. 40. Mineralia pleraque à mensuris suis non dissolvuntur in partes elementares, sed tantum integrales. p. 41. de menstruo universali. p. 42. Preparatio chalybis, sulphuris, aliorumque mineralium, quâ pulveres eorum sint in quovis liquore facile solubiles. ibid. & seq.

C A P. X. De natura ignis, obiter de calore, & luce. P. 43

Ignis solummodo producit, & sustinetur in corporibus sulphuris. ibid. ejus ratio formalis. p. 44. Ignis candens, flamma, & fumus, quomodo ab invicem differunt. ibid. quot modis ignis accenditur & qua singulorum sit ratio. ibid. De calore, & ad usus humanos varia ignis applicatione. p. 45. de luce. p. 47. de sulphure. p. 48. de salnitro. p. 49. de pulvere pyrio. ibid. de auro fulminante. p. 50. de calce viva. p. 52. ejus analysis, ibid. unde calor, aquâ ipsi affusâ. ibid. empyreumata in subjectis calcinatis diu manent. ibid. Cur aqua stygia mineralibus commissa, calorem, & fumum excitant. p. 53.

C A P. X I. De fermentationis motu, quatenus in corporum præcipitatione observatur.

Præcipitatio celebratur vel in naturalibus, vel in artis operibus. ibid. quomodo ex lacte ejusque floribus præcipitatis conficiuntur caseus & butyrum. p. 55. lactis coagulatio à proprii salis fluore imprimis dependet, ibid. Præcipitatio sanguinis & urinae. ibid. præcipitatio in artificialibus dissolutiones sequitur. ibid. variè distinguitur pro diversitate menstrui solventis, materia dissoluta, & præcipitantis infusi. ibid. præcipitatio solutionum mineralium. p. 56. in quibus aut tantum menstrui pori constringuntur, aut soluti particula mole, & pondere augentur. ibid. præcipitatio particularum minutissimarum, in qua nihil subsidit, sed tantum color, odor aut consistentia liquoris alterantur. p. 57. & seq.

ELENCHUS RERUM.

C A P. XII. De fermentationis motu quatenus in corporum coagulatione, & congelatione observatur. p.58

Coagulatio, & congelatio à principio salino potissimum dependent. ibid. utriusque vocabuli significatio, & ratio formalis assignatur. p.59. crystallisatio salium quomodo peragitur. ibid. unde salium determinata figura. p.60. De vitrificatione. ibid. de laterum & fictilium coctione. p.61. Salium diversi generis congelatio, indeque producta diversi generis precipitata, & sublimata. ibid. Conglaciatio artificialis. p.62.



ELENCHUS RERUM

Quæ in Tractatu de FEBRIBUS continentur.

C A P U T I.

Anatome sanguinis, ejus resolutio in quinque principia, comparatio cum vino, & lacte.

Febrilis fermentationis species, ibid. liquor fermentescens præcipue est sanguis; dein aliquatenus succus nervosus, chymus, & serum. ibid. & seq. sanguinis compositio ex quatuor humoribus expenditur. p.64. ejus analysis in quinque Chymicorum principia. p.65. & seq. eorum affectiones recensentur. p.66. 67. Sanguis comparatur vino generoso quoad utriusque effervescentiam, tum naturalem, tum præternaturalem. p.67. etiam juxta cruditatis, maturationis, & defectionis tempora. p.68. sanguis confertur lacti quoad consistentiam, & coagulationem. p.69. sanguinis depravati partes quomodo à statu naturali desciscunt. p.70. succi nervosi motus, & circulatio. p.71.

C A P. II. De sanguinis motu, & effervescentiis. p.71

Sanguinis motus, seu effervescentia duplex; naturalis, & præternaturalis. ibid. naturalis dependet tum à partium sanguinis heterogeneitate, tum à variis fermentis, quorum præcipuum in corde statuitur. ibid. & seq. sanguinis in corde seu fermentatio, seu accensio, quo ritu peragitur. p.72. plurimum dependet ab ipsius sanguinis crasi in vasis. p.73. sanguinis ac-

tensi in corde, ac deflagrati in vasis recrementa duplicia; tenuia, seu fuliginosa; & crassa, seu terrestria. p.74. sanguinis effervescencia præternaturalis confertur immodica turgescencia vinorum. ibid. & seq. huius duplex causa; scilic. rei non miscibilis confusio & spirituum, aut partis sulphureæ efferatio. p.75. his aliquando accedit ipsius sanguinis coagulatio quadam. p.76.

CAP. III. De Febris intermittentibus.

p.76

*Febris definitio, & divisio. ibid. effervescencia in febre intermittente fit propter rei non miscibilis confusionem. ibid. & seq. istud immiscibile est succus nutritius propter sanguinis dyscrasiam inter assimilandum depravatus. p.77. huius congestio quo ritu paroxysmos concitet. p.78. Unde frigoris, & rigoris sensus, astu, & sudore succedentibus. p.80. quæ sit intermissionis, & statarum periodorum causa in quotidiana, tertiana, & quartana. ibid. & seq. febres intermittentes à sanguinis dyscrasia oriundas arguunt pulsus, urina, & alia symptomata. p.81. etiam causa *αἰτιολογία*, præsertim aura, & anni conditio. p.82. idem constat è februm harum curatione, & crisi. p.83. remedia Empirica, & interdum vomitoria, quo pacto paroxysmos tollunt. ibid. & seq. februm intermittentium anomalie. p.85. & seq.*

CAP. IV. De Februm intermittentium speciebus, & primò de Tertiana.

*Febris tertiana est notha, & exquisita, ibid. eius ratio formalis, item causa *αἰτιολογία*, & evidentes. ibid. & seq. huius consequentia, & in alias febres mutatio. p.88. symptomata quæ pro morbi huius crisis habentur, scil. erysipelas in labiis, icterus, & phlegmon. p.89. circa curationem tres primariae intentiones. p.90. vomitoria in hoc morbo haud semper necessaria. p.91. curationis exemplar in juvene. p.92. methodus in Tertiana inveterata, cum viribus dejectis. p.93.*

CAP. V. De Febre quotidiana.

p.93

Febris quotidiana non duplex tertiana est, licet ei sæpenumero succedat, ibid. oritur à crasi sanguinis magis laesa, quo plus succi nutritii pervertitur, p.94. eius curatio Dogmatica, & Empirica. ibid. Exemplum curationis in fœmina cachectica. p.95.

CAP. VI. De Febre quartana.

p.95

Quartana typus, & causa procatacetica. ibid. eius ratio formalis fundatur

ELENCHUS RERUM.

tur in sanguinis dyscrasia atrabiliaria. p. 96. cur huius duratio longior, & cura difficilior. ibid. quare in Autumno potissimum increbrescit. p. 97. quartana Epidemica. ibid. eius curatio salivatione, aliisque modis tentata. p. 98. De cortice Peruviana. p. 100.

C A P. VII. De Febribus continuis.

p. 102

Effervescentia sanguinis in febre continua tres sunt causa, 1. scil. spirituum excandescentia, unde synochus simplex, seu Ephemera: 2. Sulphuris, seu oleosa cruoris partis inflammatio, unde putrida: 3. Miasmatis venenati, seu maligni contagium, à quo febres malignae oriuntur. ibid. & seq. effervescentia sanguinis in Febre continua ut differat ab altera intermittentium. p. 103. & seq.

C A P. VIII. De Febre Ephemera.

p. 104

Huius descriptio, causa, & symptomata. ibid. intentiones curativae tres. p. 105 curationis exemplum. p. 106.

C A P. IX. De Febre putrida.

p. 106

Oritur à parte sanguinis Sulphurea nimis exalta. ibid. eius descriptio. p. 107. causa procatartica, & evidentes. p. 108. ejus quatuor describuntur tempora. ibid. Initium, à primo sanguinis fervore usque dum totus incendium conceperit. p. 109. incrementum, à quo totus cruor deflagrat, & recrementa adusta congerit. ibid. status, quando sanguis deflagratus, & maceria adusta satur crisin molitur. p. 110. ubi de natura criseos. ibid. & seqq. declinatio statum excipit, atque fit cum diacrisi in melius, aut pejus. p. 111. 112. huius varii casus, eorumque rationes expenduntur. p. 113. & seq.

C A P. X. De symptomatis, & signis in Febre putrida praecipue notabilibus.

p. 115

In Febre putrida symptomata praecipue respiciunt vel coctionis viscera, vel humores in vasis confluos, vel habitum corporis. ibid. & seq. symptomata particulatim considerantur. Cujusmodi sunt calor immodicus in toto accersitus. p. 116. lassitudo spontanea. p. 117. praecordiorum aestus, setis lingua, & faucium ardor. ibid. Cancer albus, seu materia crustacea oris cavitatem oblinens. p. 118. capitis dolor, vigilia, delirium. p. 119. motus convulsivi. ibid. syncope, cardialgia. p. 120. vomitus & nausea ibid. diarrhaea, & dysenteria. p. 121. observatio pulsus quanti sit momenti circa prognosticon ritè faciendum. & circa medendi methodum. p. 122. inspectio urinarum quantum valet. p. 123. & seq.

CAP.

CAP. XI. De Synocho putrida.

p. 124

Febris putrida, vel symptomatica, vel essentialis, ibid. Pleuritis angina, &c. sunt febris producta, & effectus non causa. p. 125. Febris istius affectibus coniuncta est synochus simplex saepius quam putrida. ibid. De febre lenta p. 126. de hectica. ibid. febris essentialis dividitur in putridam (qualis supra describitur) & in causum, item in quotidianam, tertianam, & quartanam. ibid & seq. paroxysmorum ratio in febris continuis. p. 127. intentiones curativae circa has febres, quales adhiberi debent. p. 128. in febris declinatione quid agendum à crisi perfecta. p. 129. quid ab imperfecta. p. 130. quid à nulla, aut mala, ibid. Recensentur varia historiae febre putrida, & nonnulla pleuritide affectorum. ibid. & seqq.

CAP. XII. De Febre maligna, seu Pestilentiali, in genere.

p. 140.

Morbi pestilentes à miasmate venenato dependent. ibid. venenum quid sit, ibid. subiecta ejus passiva immediata in homine sunt spiritus animales, & liquor sanguinis. ibid. Labes expressa modò est distincta, modò ab alterutro in alterum communicata. p. 141. spiritus animales à veneno aut stupore, aut distractione urgentur. ibid. & seq. sanguis à veneno aut funditur nimis, aut coagulatur. p. 143. quale venenum sit in peste. p. 144. eius origo, & communicatio, ibid. & seq. de natura contagij. p. 146.

CAP. XIII. De Peste.

p. 147.

Pestis descriptio, & differentia. ibid. eius prænunciij, & praesentis signa p. 148. de carbunculo, bubone, exanthemate, Ecthyma, & pustulis malignis. p. 149 & seq. huius morbi prognosis. p. 150. & seq. huius prophylaxis publica, & privata in quibus consistit. p. 151. curatio generalis, & specialis. ibid. & seq. varia remedium genera, & medendi methodus in peste usurpanda. p. 152. 153. Medici cujusdam insignis circa hunc morbum praxis. p. 154 155.

CAP. XIV. De Febribus Pestilentialibus, ac malignis in specie, aliisque Epidemicis.

Huiusmodi Febres quomodo inter se, & à peste differunt, ibid. utriusque descriptio, & ratio formalis. p. 156. & seq. non rarò epidemica grassantes symptomate quodam communi signantur. p. 158. earum cause, signa, & curatio. ibid. & seq. Febres Epidemica quandoque sunt intermittentium censu. ibid. puerperarum febres saepè sunt malignae. p. 159. Febris pestilentis 1643. circa Oxonium grassantis descriptio. p. 160. Febris maligna historia, seu exempla quadam. ibid. & seq.

CAP. XV.

CAP. XV. De variolis & morbillis.

p. 165

Variola sunt affectus homini ferè omni, soli, & semel proprius. ibid. variolarum causa αεγνυμδίν, ibid. evidens. p. 166. conjuncta, p. 167. qualis alteratio ab hoc morbo cruori inducitur. ibid. morbi processus describitur. p. 168. variolarum diagnosi. ibid. quare dolor in capite, & lumbis, in hoc morbo adeo infestus. ibid. morbi huius prognosis. p. 169. curatio in tria tempora distinguitur. p. 170. de morbillis. p. 172. historia quaedam variores variolis affectorum. p. 173. & seq.

CAP. XVI. De puerperarum Febribus.

p. 175

Puerperarum febres sunt valde periculosa, & meritò dicuntur maligna, ibid. parturientium apparatus ad morbos acutos. ibid. & seq. febrium istarum tres sunt species, lactea. p. 178. 179. putrida, sive maligna. p. 180. 181. symptomatrica. p. 186. earum historia minus vulgares. p. 188. & seqq.

CAP. XVII. De Febribus Epidemicis.

p. 194

Febris Epidemicæ circa Autumnum An. 1657. increbescens descriptio, ibid. huius morbi hypotyposis. ibid. ad intermittentium censum refertur. p. 195. huius causa αεγνυμδίν fuit anni intemperies calidissima, diathesin sanguinis valde biliosam inducens. ibid. & seq. ejus causa evidens, & conjuncta, ferè qualis intermittentis Tertiana communis. p. 196. 197. ab hoc verò aliquatenus discrepans, Morbus novus appellatur. p. 197. symptomata huic à ceteris peculiaria sunt. Primò, quod sæpè sudore, ac rigore careat, æstum verò habeat intensissimum, ibid. Secundò, quod accessio minimè in ἀποσείων desinat, ibid. Tertio, quod febris hæc passim in alios contagio propagetur. p. 198. Quartò quod interdum diarrhœa, ac aliquando dysenteria stipetur. ibid. huius prognosticon generale non pestem, sed febrem quartanam imminere indicat. ibid. particulare respicit signa in morbi decursu salutaria, aut periculosa. p. 199. indicationes Therapeuticae sunt quatuor, scil. sanguinis reductio; secundò succi nutritii procuranda assimilatio; tertio fermentorum in sanguine, & visceribus restitutio; quartò symptomatum præcipuè urgentium medicatio. p. 199. & seq.

Febris catarrhalis 1658. medio vere Epidemicæ descriptio.

p. 201

Tussis molesta cum intemperie febrili eo tempore quamplurimos incescit, p. 202. morbi huius causa, non subita Aëris alteratio; sed præcedens to-

ELENCHUS RERUM.

tius ferè anni inordinatio. ibid. præcipuè autem quod tunc verno tempore sanguis turgescens, propter ~~stagnationem~~ impeditam, in spatio coarctaretur. p. 203. huius morbi symptomata recensentur, ibid. & seq. eius prognosis privata & communis. p. 204. eius methodus Therapeutica quas indicationes suggerit. ibid.

Febris Epidemicæ sub initium autumnii 1658. exortæ descriptio. pag. 205.

Hæc febris, sicut priores, ab anni intemperie originem duxit, ibid. Eius decursus, & symptomatum syndrome. ibid & seqq. Causa ~~æpylem~~ statuitur tempestatis prægressæ insignis anomalia. p. 208. membrifus apparatus inde contractus in duobus consistebat, scil. in sanguinis dyscrasia, & pororum constitutione indebita. ibid. morbi typus erat varius, ibid. malæ capitis affectiones, huius symptoma pathognomonicum. ibid. & seq. paroxysmi sæpe frigore carent, raro in sudorem finiuntur. p. 209. hoc morbo affecti statim viribus exsolvantur. ibid. in villis, & pagis minoribus potissimum increbuit, ibid. huius prognosticon duplex, generale, & particulare. p. 210. intentiones Therapeutica tres; scilicet Primò, sanguinis, & liquoris nervosi citæ reductio. Secundò, agrotantium circa paroxysmos recta tractatio. Tertiò, symptomatum maximè urgentium curatio. p. 211. 212. 213.



ELENCHUS RERUM

Quæ in Dissertatione de URINIS continentur.

C A P U T I.

De Urinæ Elementis, & præcipuis accidentibus. p. 216.

*V*rina analysis Spagyrica. ibid. eius quinque principia, scil. Sal, Sulphur, Spiritus, Aqua, & Terra. ibid & seq. Eius accidentia, scilicet quantitas, & color, consistentia, & contenta. p. 217.

C A P. II. De quantitate, & colore in Urinis sanorum. p. 218.

Quæ sit Urinae quantitas, respectu habito ad liquida assumpta. ibid. Color citrinus.

ELENCHUS RERUM.

citrinus à sale, ac Sulphure dissolutis, ac sero concoctis, p. 219. Earum dissolutio partim in visceribus, & partim in vasis perficitur. ibid. Cur à potu pleniori Urina limpida statim mingitur, p. 220. probabile est chyli portionem immediate à ventriculo, & intestinis cruoris transfundi. ibid.

CAP. III. De consistentia, & contentis Urinæ sanorum. p. 221.

Hypostaseos filamenta sunt particula nutrimenti, quod solidis partibus adponi debuerat. ibid. quæ sit bona, & mala hypostasis. p. 222. consistentia urinae qualis cervisia depurata. ibid.

CAP. IV. De quantitate, & colore in urinis ægrotantium. p. 223.

Urinae quantitas debito minor ob varias causas: præcipuè propter sanguinis dyscrasiam. ibid. urina profusio interdum à Sale nimis evecto, & fluorem passo, p. 224. unde urinae color aqueus. p. 225. albus. p. 226. de urina flammea, crocea, & rubicunda. p. 227. rubedo aut liquori interest, aut contentis debetur. p. 228. quare urina rubescit, tum in febre, tum in scorbuto, aut phthisi, p. 228. 229. etiam aliquando in morbis arthriticis: p. 229. de urina viridi, & nigra. p. 230. colorum, necnon diaphaneitatis, & opacitatis in urinis causa. ibid. cur urina clara ab aëre turbantur. p. 231.

CAP. V. De contentis in urinis ægrotantium. p. 231.

Ea sunt vel universalia, vel particularia: contenta prioris generis sunt vel naturalia, quæ hypostasim constituunt; vel præternaturalia, succi nutritii degeneris, vel sanguinis deflagrati incrementa, ibid. contenta variis modis subsidunt. p. 232. sedimenta diversi coloris. ibid. & seq. unde cremor urinis innatus, & crystalli vasis lateribus affixi. p. 233. arenulae quomodo generantur. p. 234. de calculis. p. 235. quandoque inter vesicæ tunicas accrescunt. ibid. mictionis sanguinea, & purulenta exempla rariora, ibid. Contenta farinacea. p. 236.

CAP. VI. De iudiciis circa urinas ægrotantium ferendis. p. 237.

Cuiusmodi affectus ab urinis innotescunt. ibid. urinis ægrotantium aliquid naturale deest, p. 238. quid præternaturale additur, ibid. aut simul utrumque contingit, ibid. & seq. Quis sit præcipuus & proprius usus in morbis chronicis, & acutis. p. 240.

CAP. VII. De urinarum examine, & variis probationum modis. p. 240.

Apparatus circa urinae inspectionem. p. 241. urinarum color, & odor sæpe

ELENCHUS RERUM.

ab assumptis alterantur. ibid. unde odor violaceus à terebinthina, & aromatis assumptis. p. 242. unde fœtidus à radicibus Asparagi, Allii, &c. ibid. urinarum evaporatio, destillatio, & precipitatio, quomodo institui debent. p. 243. earundem putrefactio. ibid.



ELENCHUS RERUM

Quæ in CEREBRI ANATOMIE continentur.

C A P U T I.

Cerebri diffecandi methodus sive Administratio Anatomica proponitur. p. 248

Cerebri compages, velut plura Tabera simul compacta habens, prius explicari ac evolvi debet, quàm in partes scindatur. ibid. pro notitia ejus, capita cuiuscumque generis diffecare, adeoque Anatomiam comparatam instituere oportet. p. 249. Capitis diffectio proponitur, ibid. Dua meninges cum earum vasis primò observentur. p. 250. Cerebri prora elevata, & compages reclinata, nervi & vasa sequentia notentur, ac ordine secentur. ibid. scil. processus mamillares, nervi optici, infundibulum, arteria carotides, nervi oculorum motorii; Par quartum, par quintum, par sextum, nervi auditorii, par vagum sive octavum, par novum, par decimum, arteria vertebrales, & vena jugulares, ibid. & seq. dein cerebri compages calvaria exempta inspiciatur; in cuius parte superiore cerebrum ita propriè dictum & cerebellum apparent; in basi ejus, medulla oblongata; quæ omnia Pia meninx investit, p. 252. Arteria hanc meningem obducentes describuntur. ibid. Propagines venosæ, à sinubus in piam matrem dimissæ arteriis occurrunt, cumque iis variè implicantur, p. 253. Pia meninx cerebri anfractus omnes colligat, eorumque hiatus intimè obducit, ibid. In cerebri Anatome, à limbo ejus posteriore incipiendum est, qui membranarum nexu soluto, à partibus contiguis separetur, & antrosum elevetur, ut inane spatium pro ventriculis habitum detegatur. p. 254. & medulla crura & fornix apparent, ibid. Sub hac cerebri positione, quicquid extra aut intus habet, conspicitur, ibid. Extra, ejus anfractus, duo hemisphæria item duplex substantia, sc. corticalis & medullaris, cernitur, p. 255.

intus

ELENCHUS RERUM.

intus corpus callosum & fornix trilaterus occurrunt. ibid. Cerebri limbo à lateribus secto, ejusque compages ulterius reclinata, tota inferior superficies evolvi, ac velut in planum proijci potest, ibid. Crurum medulla oblongata apices, quibus cerebrum alligatur, sunt corpora striata, p. 256. Duæ figura, quibus cerebri tum humani, tum ovini basis representatur explicantur. ibid & seq.

CAP. II. Medullæ oblongatæ & cæteræ posteriores ἡ ὑπεράνω partes recensentur, earumque dissectio traditur. p. 258

Corpora striata cum eorum processu transversario describuntur, ibid. Nervorum opticorum Thalami, eorumque processus medullares. ibid. Prominentia orbiculares, nates & testes dictæ. p. 259. istæ non sunt cerebri & cerebelli crura. ibid. posteriores, sive testes, tantum sunt priorum epiphyses. p. 260. à quibus etiam per processus medullares transitus in cerebellum ducit, ibid. nates in vitulo, ove, & equo majores sunt quàm in homine & cane, ibid. Glandula pinealis, p. 261. Ventriculus prominentiis orbicularibus subiectus, è cujus utroque foramine apertura declivis versus infundibulum patescit. ibid. Plexus Choroeides. ibid. Infundibulum, & glandula pituitaria, & glandula pone infundibulum consita describuntur. p. 262.

CAP. III. Cerebelli & processuum eius, necnon posticæ medullæ oblongatæ regionis descriptio. p. 262

Cerebelli figura, gyri, & anfractus, ibid. & seq. ejus processus vermiciformes velut gemini poli, ac circelli, tanquam paralleli in sphaera sunt, p. 263. Cerebellum in cunctis animalibus similis conformationis existit, secus ac cerebrum, ibid. Plexus choroeides cum glandularum acervo in postica cerebelli parte, ibid. Cerebellum per duos velut pedunculos medulla oblongata insistit, inter quos cavitas, sive ventriculus quartus interjacet. ibid. in utroque cerebelli pedunculo tres sunt processus medullares, ibid. Protuberantia annularis è medio cerebelli processu oritur. p. 264. maior est in homine, item ubi prominentia orbiculares sunt minores, ibid. in cerebello per medium secto prædicti processus cernuntur, & medutullium eius instar arboris apparet. ibid. In medulla oblongata basi duo corpora pyramidalia existunt; item 6. posteriora nervorum Paria ab illa oriuntur, ibid. Arteriarum vertebraliū descriptio. p. 265. quæ item plenius explicantur in capite ultimo. Duæ figura, quibus cerebri tum humani, tum ovini compages cranio-exempta representatur, explicantur, ibid. & seq.

CAP. IV. Calvariae sepositae partes & contenta quaedam explicantur. p. 267.

Vasa sanguifera os cuneiforme pertransseuntia describuntur. ibid. Glandula pituitaria cunctis animalibus inest; eadem in sella sua aut fixior, aut laxior est; in quibusdam animalibus major, in aliis minor est. ibid. eius respectus ad rete mirabile, ubi adest, ibid. & seq. Ad glandula pituitaria latus Arteria carotis protenditur. p. 268. hac arteria in cunctis animalibus obliquè ascendit, p. 269. eius situs in equo peculiaris, ibid. in plerisque quadrupedibus rete mirabile adiunctum habet. ibid. Arteriae utriusque lateris in omnibus mutuò communicant, ibid. & seq. communicationis istius ratio, ne sanguis debito plus aut minus cerebro convehatur. p. 270. Sinus laterales, priusquam in venas jugulares cedunt, specum amplum, & rotundum adiunctum habent. ibid. Duæ figurae explicantur, quibus cranii tum humani, tum vitulini bases representantur. p. 271.

CAP. V. Volucrum & Piscium Cerebra describuntur. p. 272.

Cerebra hominum & quadrupedum similia, ac velut symbola existunt, ita & volucrum ac piscium, ibid. In volucribus Dura meninx quatuor sinus habet; ibid. Pia meninx valde tenuis vasis paucioribus insignitur, ibid. In cerebro anfractus, corpus callosum, fornix, & corpora striata desunt; at eorum vices ab aliis corporibus supplentur. p. 273. Duæ cavitates membranis striatis obiectæ, ibid. in his cerebri figura, respectu eius in homine, inversa est, ibid. In medulla oblongata duæ protuberantiae insignes cum cavitate subiecta adsunt. p. 274. à prominentiis excavatis rima ad infundibulum ducit, ibid. his arteriae carotides, item processus mamillares & os cribrosum adsunt, ibid. Cerebelli conformatio eadem in his ac in aliis animalibus. p. 275. Piscium cerebra istis volucrum similia, ibid. olfactus organo instruuntur. ibid.

CAP. VI. De Cerebri ejusque partium muniis; ubi imprimis de Cranii & Duræ meningis usibus differitur. p. 276.

Cranium cunctis animalibus & claustrum & muniminis loco est, ibid. quare sulcis & inequalitatibus præditum est, ibid. & seqq. eius figura in quadrupedibus depressa, in hominibus spherica; unde in his basis eius horizonti parallela, in illis horizontem cum recto angulo secat. p. 277. Dura meninx & Cranium, & ἐγκέφαλον respicit, ibid. vasa eius sunt arteriae, & sinus, sive receptacula, aut canales venosi. p. 278. harum usus est sanguinem recipere, & versus cor reducere. ibid. Sinus calorem, velut à Balneo maria,

E L E N C H U S R E R U M.

maxia, pro spirituum exstillatione requisitum suppeditant. ibid. hac membrana motu & sensu pradiata est. p. 279. Videtur quod fibra & chorda ligamentosa in cavitatibus sinuum reperta, sanguinis motum aut corripiunt, aut sistunt. ibid. Dura meningis usus omnes recensentur. p. 280

C A P. V I I. De Meninge tenuiore, sive *Pia matre*, de protensione ejus, necnon de vasorum plexibus eidem ubique intertextis. p. 280.

Pia meninx universas & ἐγκράλας partes intimè investiens, eas interstinguit. ibid. eadem vasa sanguifera sustentat, ac in partes omnes exporrigit, p. 281. vasa ejus, scilicet arteria & vena, sibi mutuò occurrunt. ibid. arteria cum arteriis inosculantur. ibid. in quos usus ita instituitur. p. 282. è quibus arteriis, si tres obstruantur, sanguis unico aditu ad partes omnes feratur. ibid. Observatio Anatomica, ubi cum arteria carotis ossea facta obstruebatur, vertebralis solito major evaserat; ibid. & seq. Arteria venis ubique occurrentes, plexus admirandos constituunt, p. 283. ista vasorum complicationes velut canaliculi serpentine sunt, pro spirituum destillatione. ibid.

C A P. V I I I. Ostenditur quo discrimine Arteriæ in variis animalibus cranium pertranseunt; item quæ sit cuiusque ratio, & in quem usum rete mirabile constituitur. pag. 284.

Arteriæ carotidis conformatio in homine, ac in quem finem. ibid. ejusdem figura in equo, p. 285. quare in plerisque ceteris animalibus Arteria carotis rete mirabile adjunctum habet. p. 286. Arteria vertebralis descriptio & usus. p. 287. Figura duæ. ibid. & seq.

C A P. I X. Ostenditur quo apparatu, & in quibus & ἐγκράλας locis spiritus animales progignuntur, item *Piæ matris* usus & alia accidentia subduntur. p. 288.

*Sanguis materia est è qua spiritus animales destillantur. p. 289. iste semper in debita tum qualitate, tum quantitate suppeditatur. ibid. ostenditur quo ritu spiritus animales è sanguine proliciuntur. ibid. Spiritus tantum in Cerebro & Cerebello destillantur. p. 290. Sanguis medullari Caudici suffusus, succum nutritium & calorem suppeditat. ibid. & seq. *Pia mater* motu quodam ac sensu pradiata est. p. 290. & seq.*

C A P. X Cerebri ità propriè dicti descriptio, ejusque partium explicatio & usus. p. 292.

Cerebrum & cerebellum partes sunt principes, & non medulla oblongata appendices

ELENCHUS RERUM.

pendices. ibid. Circa cerebrum ita propriè dictum qua sunt consideranda. p. 293. qua ratione facultates animales intra cerebrum exercentur. ibid. ob quos fines cerebrum in duo hemispharia, quorum utrumque in duos lobos, atque hi in plures gyros dividuntur. ibid. & seq. Spiritus animales in cerebri substantia corticali generantur, inque medullari exercentur. p. 294. 295. Quis sit corporis callosi usus. p. 296. De Fornicis usu. ibid. Figura cerebrum ovinum evolutum exhibens explicatur. p. 297.

C A P. XI. Ostenditur quali spirituum animalium motu ac tendentia facultatum animalium exercitia intra cerebri confinia peraguntur, item quis sit ventriculorum ejus usus. p. 298

Anima brutorum duae partes, scil. vitalis & sensitiva. ibid. partis sensitivæ actiones & passionēs, sive motus & sensus, aut transeuntes, aut immanentes sunt. p. 299. utraque species & modi fiendi ostenduntur. ibid. De cerebri ventriculis, an isti spirituum officina, vel materia excrementitia receptacula sint. p. 300.

C A P. XII. Inquiritur utrum humores serosi intra cerebri vacuitatem congesti, per glandulam pituitariam, ac os cribriforme foras amendantur, necne. p. 301

Ostenditur quo ritu serosus humor in cerebri ventriculos deponitur, scilicet exudatione è corpore calloso, & exstillatione è glandulis & vasis plexus choroeideos. ibid. quoad exitum eorum supponendum est, in corpore vivente humores ductus secretos & exiguos permeare. p. 302. ostenditur quò humores in glandulam pituitariam per infundibulum delati feruntur. ibid. & seq. item asseritur, humores in processus mamillares delapsos, os cribriforme trajicere. p. 304.

C A P. XIII. Medullæ oblongatæ, ejusque partium quarundam actiones & usus explicantur. p. 305

Medulla oblongata figura & usus generales designantur. ibid. & seq. ejusdem apices, scilicet corpora striata, primi sensorii loco esse videntur. p. 306. 307. in volucribus membrana striata illorum vices præstant. p. 308. processuum mamillarum usus. ibid. nervorum opticorum origo, unio, & sejunctio, unà cum vasis sanguiferis ad eos spectantibus, explicantur. p. 309. infundibuli & glandula pituitaria usus iterum inculcantur. ibid. & seq. Figura medullam oblongatam in capite ovino à corporibus aliis divisam exhibens, explicatur. p. 310.

ELENCHUS RERUM.

C A P. X I V. De Glandulæ pinealis & plexus choroeidei usibus ; item de prominentiis orbicularibus , quæ vulgo nates & testes appellantur , aliisque partibus quæ illarum appendices esse videntur. p. 311

Glandula pinealis cunctis animalibus adest , ibid. ei plexus choroeides semper appenditur , ibid. ejusdem munus est , non animam continere , sed humores serosos excipere , ibid. plexus choroeidei duplex usus , nempe serositates excipere , & calorem partibus vicinis sufficere. p. 312. prominentiarum orbicularium , sive natum & testium usus designatur ; scilicet passionum impetus , & instinctuum naturalium exigentias ultra citraque deferre. p. 313. & seq. Ventriculi prominentiis illis subjecti usus ostenditur. ibid.

C A P. X V. De Cerebelli , eiusque partium & processuum quorundam usibus. p. 317

Peculiare regiminis genus ad cerebellum pertinet. ibid. circa officium ejus quot sunt considerata , ibid. eius usus in genere est , spiritus animales pro functionis involuntariæ usibus suppeditare. p. 318. & seq. Cerebelli partes & accidentia explicantur ; & primò de Vasis sanguiferis , p. 319. Spiritus è sanguine in corticalem ejus substantiam instillantur , p. 320. qui exinde in tractus medullares , & dein versus bina ejus medutullia scaturiunt , ibid. quis trium in utroque medutullio processuum medullarium usus sit , ostenditur. ibid.

C A P. X V I. De spirituum in cerebello productorum propter functionis involuntariæ actus , varia diatæxi & exercitio diversimodo. p. 321.

Cerebellum altera primaria anima sensitiva radix. ibid. Spiritus quoad impendia & refectiones secus habent in cerebello ac in cerebro , ibid. cujusmodi motus ac sensus ad spiritus cerebelli incolas pertinent , p. 322. sensus ejus aut privata est , aut cerebro communicatur , ibid. motus ejus vel ordinarius , vel extraordinarius. ibid. & seq. hic iterum duplex , propter impulsus à cerebro , aut à præcordiis immixtus , p. 323.

C A P. X V I I. De nervis qui spirituum copias à cerebello accipientes easdem functionis involuntariæ actibus impendunt. p. 324

Quatuor nervorum coniugationes spirituum penum tantum à cerebello accipiunt , ibid. quomodo nervi parvi quinti & sexti spiritus à cerebello acceptos functioni involuntariæ impendunt , ibid. & seq. pariter habet de nervis auditoriis , p. 326. inde fit , ut vox prolata soni auditæ sit echo. ibid. quare homines quidam aures musicas habent , atque alii

ELENCHUS RERUM.

hac facultate destituuntur. p. 327. quare musica cordis mœrori succurrit. p. 328. nervi auditorii secus in quadrupedibus oriuntur ac in homine. ibid. Paris vagi nervi, etiam à cerebello pendentes, actus serè tantum involuntarios exequuntur. p. 329.

C A P. X V I I I. De utriusque cerebelli Appendicis nempe anterioris, quæ prominentiæ orbiculares sunt, & posterioris, scil. protuberantiæ annularis, relatione, sive mutuo respectu; item de medullæ oblongatæ portione residua in medullam spinalem continuata. 330

Ubi prominentia natiformes sunt majores, protuberantia annularis minor est, & è contra. ibid. eius respectus ratio inquiritur. ibid. & seq. protuberantia annularis spirituum, qui passionibus impendi debent, condus est. p. 331. prominentia orbiculares instinctuum naturalium officina sunt. ibid. hinc ratio prædicti respectus patet, quia cum affectio alterutra, scil. passiones, vel instinctus, præpollet, altera minor est. ibid. & seq. nervi Paris noni peculiari ritu in homine è protuberantia quadam oriuntur, p. 333. corpora pyramidalia à processu annulari producta, cui usui inserviunt, p. 334. medulla oblongata & spinalis eadem compages sunt, ibid. spinalis medulla, secus ac alii ductus, major est ubi plura habet emissaria. ibid. & seq.

C A P. X I X. De systemate nervoso in genere ubi partibus eius (quæ sunt nervi & fibræ) designatis, totius œconomiae animalis prospectus exhibetur. p. 335

Nερρολογίας pensum, difficile licet, utile ac jucundum est, ibid. Systemata nervosum quid. p. 336. eius partes primariae sunt nervi, secundariae sunt fibræ, ibid. spiritus intra nervos sunt veluti aquarum rivi, in reliquo nervoso genere velut aquarum paludes & lacus, p. 337. alias radiis lucis & particulis luminosis comparantur, ibid. nervi sunt caudicis medullaris productiones. ibid. nervi omnes ab origine ad metam sunt ductus singulares, ibid. eorum compages non ampla cavitate prædita, sed tantum Cυστήρις existit. p. 338. intra spatiola eorum spiritus animales scaturiunt, atque humorem quendam secum traducunt, ibid. spirituum & succi nervosi motus qualis sit, ibid. fibræ ad motum localem & sensum requiruntur aequè ac nervi, p. 339. fibrarum natura & origo describuntur, ibid. duplex humor in partes nervosas suggeritur, sc. ab ἐνκεφάλῳ, & ab arteriis, p. 340. humor arteriosus alteri accedens, spiritui vim elasticam, sive explosionis virtutem confert, ibid. spirituum diataxis in toto systemate animali, p. 341. è quibus ita dispositis anima sensitiva hypostasis conflatur. p. 342.

C A P. X X. De liquore nervoso, & utrum iste, an humor sanguineus, sit nutritius. p. 342

Sanguis materiam glutinosam pro nutritione idoneam in se continet. p. 343. præter ipsum, humorem in nervoso genere scatere ostenditur, ibid. humoris nervosi scaturigines & effluxus, p. 344. subsidia & supplementa quæ ipsi aliunde adveniunt, ibid. quid humor nervosus in transitu agit? p. 345. cuinam usui idem intra secundarias systematis nervosi partes delatus inservit, ibid. hic in causa est, quod nutritio ritè peragi aut perverti solet, ibid. morbi causa & curationes ab humoris nervosi alteratione procedunt, ibid. & seq. nutritionis forma à succo nervoso, & materies ab arterioso dependent, p. 347. & seq. ostenditur qua ratione spirituum explosio ab humore arterioso procedit, p. 348. argumenta contra sanguinis potentiam nutritivam allata solvuntur, p. 349.



NERVORUM DESCRIPTIO ET USUS.

C A P. X X I. Quatuor priora nervorum Paria intra cranium oriunda describuntur. p. 350

Varia nervorum distinctio .ibid. processus mamillares sunt nervi, qui parte molliori, aliaque duriori constant; ac in quos usus, ibid. & seq. quare intra Cranium cavi sunt, ac aqua limpida impleti, p. 351. fibra & filamenta per os cribrosum in nares protensa. p. 352. Obiecta odoris in variis animalibus organa diversimodè afficiunt, ibid. Nervus opticus fibrarum nervearum fasciculus est, ibid. & seq. unde puncta nigricantia in affectibus ophthalmicis, p. 353. quare nervi optici vasis sanguiferis stipantur, ibid. Visus, uti & Olfactus, fibrarum ope peragitur, ibid. Par tertium, sive nervi oculorum motorii, eorum motibus spontaneis inserviunt, ibid. & p. 354. Quarta nervorum conjugatio, sive nervi pathetici, ibid.

C A P. X X I I. Nervorum paria quintum, sextum, ac septimum explicantur. p. 355

Quinta nervorum conjugatio & sensus & motus exercitia præstat, ibid. huius caudex plurimum nervorum fasciculus est, ibid. huius descriptio. ibid.

ELENCHUS RERUM.

& seqq. nervi eius actionibus potissimum involuntariis ac patheticis inserviunt, p. 356. propter huius ramos, vultus rubore suffunditur, p. 357. item labiorum oscula, praecordia & genitalia afficiunt, ibid. item visus & olfactus gustui lenocinia praestant, ibid. Nervus sexta coniugationis oculis motus quosdam patheticos praestat, p. 358. septima coniugationis nervus binos processus, habet. ibid. eorum usus describuntur, ibid. & seq. Figura nervorum paris quinti & sexti ramificationes exhibens, explicatur, p. 359. alia figura nervos omnes in oculi musculos distributos exhibens explicatur, p. 360.

C A P. X X I I I. Octavi nervorum Paris descriptio. p. 361

Nervo Paris octavi, sive vagi, provincia debito amplior vulgo attribuitur, ibid. eius origo multis fibris constat, cui nervus à medulla spinali accedit, ibid. eius plexus ganglioformis à Fallopio Corpus olivare dictus, ibid. eiusdem plexus usus, ibid. duo plexus ganglioformes, pro investigandis Paris vagi & intercostalis nervis, quasi lapides terminales sunt, p. 362. plexus inferior Paris vagi, ibid. à quo nervi cardiaci, p. 363. nervi recurrentes describuntur, ibid. duo plexus Cardiaci, ibid. nervi pneumonici, p. 364. stomachici. ibid.

C A P. X X I V. Nervorum octavi Paris in superiori Capite descriptio, actiones, & usus explicantur. p. 364.

Quare hic nervus cum fibris numerosis oritur, p. 188. ut nervi omnes ad quaelibet viscera distincti & singulares pergant, ibid. huius Paris nervi functioni involuntaria potissimum inserviunt. p. 365. quare in violenta passione lingua vocem affectus indicem emittit, ibid. quare in ira aut fastu intumescunt colla. p. 366. inter viscera quævis unde sympathia, & actionum consensus, ibid. vox gravis & acuta quomodo eduntur. ibid. quibus usibus nervi Cardiaci inserviunt, p. 367. unde cordis tremor procedit, ibid. Plexum cardiacorum usus, ibid. cur pauciores nervi Cordi quàm alii visceribus constituuntur, p. 368. quia scil. Cor est musculus, ideoque copias subsidiarias à sanguine recipit, ibid. utrum cordis pulsus à spirituum per nervos influxu necessario dependeat, ibid. & seq. Nervi cardiaci passionibus inserviunt. p. 369. Nervorum recurrentium usus, p. 370. circa arterias reflectuntur, ut sanguis superius corripitur, ibid. cur vocis intentio & oburgatio, iratis superveniunt, ibid. & seq. quare risus & cantus cor afficiunt, p. 371. Nervorum pneumonicorum usus, ibid. ipsi pulmones primi in motu sunt, p. 372. nervi pneumonici vasa sanguifera circumligantes, passiones in praecordiis efficiunt, ibid.

propter

ELENCHUS RERUM.

propter branchia iisdem constricta , affectus asthmatici saepe oriuntur , p. 373. ratio consensus inter pulmones & ventriculum, ibid. & seq. Nervorum stomachicorum usus & artificium, ibid.

C A P. X X V. Nervi intercostalis descriptio.

p 374

Nervus intercostalis perperam pro ramo Paris vagi sumitur , quin oritur à nervis paris quinti & sexti , ibid. ejus plexus Glanglioformis , p. 375. ejus plexus cervicalis homini proprius , ibid. ejus plexus intercostalis, sive Thoracicus , ibid. ejus plexus mesenterici numero septem, ibid. & seq. in sinistro latere plexus primus stomachicus , qui & Lienaris est , p. 376. plexus secundus Renalis , ibid. in medio omnium plexus mesenterii maximus. ibid. plexus abdominis infimus , p. 377. plexus alius minor in vicinia eius constitutus , ibid. Nervi intercostalis extremitas. ibid.

C A P. X X V I. Nervorum Paris intercostalis, qui in priore capite describuntur , quoad eorum munera & usus , explicatio , ac imprimis eorum ramificatio superior expenditur.

p 378

Nervi intercostalis natales mutuatiitii , ibid. propter talem originem , inter praecordia & partes faciei mirus consensus & συμπαγής, prout cernitur in sternutatione & risu , p. 379. in quem usum tot nervi vertebrales ejus plexibus & trunco accedunt , ibid. quare à plexu ejus glanglioformi nervus in sphincterem gulae , ibid. unde in affectibus hystericis & hypochondriacis praefocationis sensus in gutture. ibid. plexus cervicalis , qui homini proprius est , internuncii loco est inter Cor & cerebrum , p. 380. propter hunc potissimum homines & bruta differunt, ibid. quare plexus iste in fatuo quodam perexiguus erat ; in Cercopitheco ejus vestigia quaedam , p. 381. propter huius plexus cum diaphragmatis nervo communicationem homo fit animal risibile , ibid. in quem usum hinc propagines in nervum recurrentem & tracheam mittuntur. p. 382. huius rami Cardiaci , Cerebri & Cordis sensa ultra citraque gerunt, ibid. Plexus Thoracici usus , ibid. in quem usum Nervus intercostalis arteriam axillarem , atque alter nervus arteriam vertebralem stringunt. ibid.

C A P. X X V I I. Nervi intercostalis ramificatio inferior , ad partes & viscera imi ventris pertinens , explicatur.

p. 383

Inquiritur in quem usum plexus mesenterici constituuntur , ibid. Nervi mesenterici plexus , & propagines ab iis missae spirituum animalium canales , condi & emissaria sunt , p. 384. Spiritus isti & motum &

ELENCHUS RERUM.

sensum perficiunt, ibid. *quomodo motus ab iis peractus à motu musculorum differt*, ibid. & seq. *circa hæc vasa nervea, cuiusque officium, & cum aliis nervis communicatio considerari debent*, p. 381. *cur vomitus in affectibus tum lienosis, tum colicis, tum nephriticis passim exoritur*, ibid. *quis plexus stomachici usus*, ibid. *Lienosis officium, eiusque nervorum usus ostenditur*. p. 386. *Lien malè affectus tum alias partes in consensum trahit, tum ipse illarum culpas luit*, ibid. & seq. *Plexus renalis usus*. p. 387. *Arteriis hepatica truncus nervorum reticulo quodam obducitur, & in quem usum*, p. 388. *Nervorum plexus hepatici officia, & cum aliis nervis communicationes explicantur*, ibid. & seq. *plexus qui mesenterii maximus est, usus, ejusque cum aliis nervis communicationes exponuntur*, p. 389. *hic plexus in passione hysterica affectus, uteri ascensum mentitur*, ibid. & seq. *huius vitio quodque affectio colica exoritur*. p. 390. *Plexus abdominis infimus in quos usus constituitur*. p. 391. *Plexus alter minimus huic vicinus*, ibid. *duo plexus in pelvi consiti singulis excretionibus prospiciunt*, p. 392. *Nervi in penem missi*, p. 393. *ad testes unicus tantum parvulus defertur*, ibid. *materia humoris genitalis ab arteriis suppeditatur*. ibid.

CAP. XXVIII. De Nervo Spinali ad par vagum accessorio; item de nervo Diaphragmatis. P. 394

Nervi Spinalis origo & distributio, ibid. *in cunctis animalibus reperitur*, ibid. *cervi & brachiorum motibus patheticis & extemporaneis inservit*, p. 395. *ad Par vagum accedit, ut ab eo functionis involuntaria reseram accipiat*, ibid. *Nervi Diaphragmatis origo & distributio*, ibid. *cum diaphragma sit musculus, nervus eius spirituum penum & motus ob-eundi instinctum confert*, ibid. *Diaphragmatis motus naturalis & anomalus*, p. 396. *propter peculiarem huius nervi cum nervo intercostali communicationem, homines soli vident, & maxime ad sternutandum apti sunt*, ibid. *Sternutationis ratio, & fiendi modus*, ibid. *Cur diaphragmatis nervus semper à nervis brachialibus procedat*, p. 397.

CAP. XXIX De ratione discriminis quod nervos Paris vagi ac intercostalis in homine, ac in brutis animalibus intercedit; item de reliquis nervorum Paribus, tum intra cranium, tum è medulla spinali oriundis; etiam nonnihil de vasis sanguiferis, quæ ad spinalem medullam pertinent.

In Brutis plures nervi cardiaci è Pari vago oriuntur quàm in Homine, ibid. *in illis nervus intercostalis sine plexu cervicali, à plexu ganglioformi*
ad

ELENCHUS RERUM.

ad thoracem ferè singularis defertur, ibid. in quibusdam brutis nervus intercostalis per colli descensum eadem vagina cum Pari vago includitur, ibid. in his nervus diaphragmatis inferius oritur, & quare. p. 399. Paris noni descriptio & usus, ibid. Paris decimi descriptio & usus, p. 400. describitur quoritu nervi vertebrales è medulla spinali procedunt, ibid. nervi brachiales & crurales quomodo oriuntur, & inter se per processus transversos communicant, ibid. & seq. vasa sanguifera ad spinam pertinentia multa admiranda continent, p. 401. eorum descriptio per embryonum dissectiones, & liquorum tinctorum injectiones acquiritur, ibid. & seq. vasa hac triplicis sunt generis, sc. arteria, sinus, & vena, p. 402. arteriarum spinalium descriptio, ibid. arteria spinalis è vertebralium concursu descendit, cum primo aspectu ascendere videretur, ibid. Plexus arteriosus usus, p. 403. Sinus vertebralis descriptio, ibid. & seq. eius usus, ibid. Venarum vertebralium descriptio, p. 404. earum usus, ibid. & seq. Tabula systematis nervosi divisionem superiorem in homine exhibens, explicatur, p. 405. Tabula eadem exhibens in brutis animalibus explicatur, p. 409. Tabula systematis nervosi divisionem inferiorem, quæ & homini & brutis communis est, ostendens, explicatur, p. 410. Tabula spinalis medullæ imaginem representans explicatur, p. 413. Tabula vasa omnia sanguifera quæ ad spinam pertinent, referens explicatur, ibid. & seq. Conclusio, p. 415.



ELENCHUS RERUM

Quæ in Tractatu de MORBIS CONVULSIVIS
continentur.

C A P U T I.

De spasmis, sive convulsivis in genere.

p. 437

Quoritu motus regularis peragitur, ibid. Eius duplex principium. p. 438. Duplex item musculi motus à spirituum explosione dependet. ibid. Spasmi non fiunt ab inanitione aut repletionem. p. 440. Eorum dua species propter duplicem causam, scil. irritationem, & copulam explosivam præternaturalem. p. 401. Copula explosiva spasmodica à cerebro

ELENCHUS RERUM.

cerebro cum succo nervoso ut plurimum descendit. p. 442. Aliquando à nervorum extremitatibus suscipitur. p. 443. Particula spasmodica intra cerebrum admittuntur, tum sanguinis, tum cerebri vitio. ibid. & seqq. Intra caput admissa, quos affectus producant. p. 444. In nervosum genus delapsa, quæ symptomata inferunt. p. 445. In pueris in nervos proximos, ad oris ac faciei partes sæpius incurrunt, secus ac in adultis, ibid. Motus convulsivi in spirituum explosione consistunt. ibid. Spiritus explosiones ineunt ob plenitudinem, aut irritationem. p. 446. Convulsiones sunt vel periodicae, vel continuæ. ibid. Earum causæ evidentes. ibid. Insultus spasmodici à mera irritatione producti, variis in locis, variisque ex rebus contingunt. p. 447. Illos inferunt venena, qualitatum tangibilium excessus, varia sanguinis & succi nervosi recrementa, humores præternaturales, lumbrici, calculi, ibid. Loca affecta sunt vel systematis nervosi principia, vel extremitates, vel medii nervorum processus, ac præcipuè eorum plexus. p. 448. & seq. Spasmodorum differentia recensentur. p. 449. Respectu scil. originis, materia morbifica vel in nervorum principia, vel in eorum extremitates irrepente. ibid. Respectu causarum, quod à causa evidenti, solitaria, aut procatartica dependent. ibid. Quoad extensionem, quod universales sint, aut particulares. ibid. Universales vel primarii, vel secundarii. ibid. Secundum insultus durationem, in quantum continui, aut intermittentes sint. p. 450.

C A P. II. De Epilepsia.

P. 450

Epilepsie descriptio, eiusque phenomenon census. ibid. & seq. Morbi subjectum sive sedes inquiritur. p. 452. Hoc neque meningas, nec cerebri medullium esse. p. 453. Sed spiritus animales intra cerebri medullium consitos. ibid. & seq. Paroxysmus epilepticus à spirituum animalium cerebri incolarum subita explosione concitatur. p. 454. Causa morbi conjuncta, non aqua in cerebri ventriculis congesta, non humor viscidus. ibid. Sed copula heterogenea spiritibus affixa. ibid.

C A P. III. Epilepsie differentia, & symptomatum quorundam rationes explicantur; necnon ejus methodus therapeutica adumbratur.

P. 455

Epilepsia differentia à subjecto, scil. cerebro, quod vel primario & idiopatheticè, vel secundario & per consensum afficitur. ibid. Illius, quæ per consensum excitari dicitur, ratio. ibid. Spiritus cerebri incolæ ad explosionem irritati epilepticos insultus inducunt. ibid. Preliminaria symptomata extra cerebrum observata, causæ evidenti, vel signi rationem habent. ibid. & seq. Morbi comitalis propter varias circumstantias differentia.

ELENCHUS RERUM.

rentia. p. 456. Cur epileptici cum impetu prosternuntur. ibid. Unde spuma ex ore effluit. p. 457. Quare pectora contundunt. ibid. Morbi prognosis. ibid. Difficillima curationis existit; tum quia cerebrum inficitur, tum quia singulis paroxysmis plurimum debilitatur. p. 458. Nonnunquam sponte sua, interdum remediorum ope sanatur. ibid. Circa pubertatem morbus aliquando solvitur, in quantum eo tempore duplex alteratio corporis contingit. ibid. Non raro in mortem terminatur, vel in alium morbum commutatur. ibid. Epilepsia Therapeusis. p. 459. Indicationes sunt vel curatoria, vel prophylactica. ibid. Specificorum virtus explicatur. p. 460. Historia aliquot epilepsia affectuum. p. 461. ibid. & seq. Methodus therapeutica in morbo comitiali observanda. p. 462. 463. & 464.

C A P. I V. De cæteris convulsionum speciebus, ac imprimis de motibus convulsivis puerorum. p. 465

Multiplices spasmodum idea. p. 466. Infantes circa duo potissimum tempora convulsionibus præcipuè obnoxii, sc. intra primum à partu mensem, & circa dentium eruptiones. ibid. Propter duplicem item causam, tum quia cerebrum obtinent debilius, tum ob mala ab utero contracta. p. 467. Cause evidentes in puerulis motus convulsivos inducentes. ibid. Quo ritu insultus epileptici in illis præcauentur. p. 468. Quamobrem febris & convulsiones dentitioni superveniunt. p. 469. Atrocitatis doloris dentium ratio. ibid. & seq. Infantum à spasmodis præservatio. p. 470. Methodus medendi nutricibus adhibenda. p. 471. Puerorum convulsionibus laborantium curatio. ibid. Quomodo tractandi, qui propter dentitionem dolorificam in spasmos incidunt. p. 472. Eorum, qui ob alias causas convulsivi evadunt, medicatio. ibid. Propter lumbricos aut acres humores. ibid.

C A P. V. De morbis convulsivis adultiorum, propter originem nervosam præcipuè affectam, oriundis. p. 473

Spasmodum adultioribus accidentium tres species, secundum multiplicem causam morbificam sedem, in quantum hæc vel nervorum principia, aut extremitates, vel medios processus occupat. ibid. Convulsiones à nervorum origine affecta oriunda explicantur & distinguuntur; tum juxta varios nervos affectos, tum juxta eorundem nervorum varia loca affecta. ibid. & seq. Quo ritu materies spasmodica in nervos defertur. p. 474. Historie quadam rariores huiusmodi convulsionibus affectuum. ibid. & seqq. Affectio hysterica amula in viro. p. 481. Sanguis emissus statim congelatus. p. 483. Paroxysmus inchoatus à molis cuiusdam ab imo ventre ascensu. p. 481. Ascensus hic molis, à spiritibus intra plexus mesentericos in explosiones adactis processit. ibid. Paroxysmo convulsivo juxta nervorum origines
incipiens

ELENCHUS RERUM:

incipiente, spiritus extimè degentes explosiones interdum primò ineunt.
 p.482. *Quod duplici de causa contingit, ibid. In affectibus convulsivis*
subitanea sanguinis congelationis ratio assignatur. p.483. A paroxysmo
producitur. ibid. Methodus therapeutica in curandis hujusmodi convul-
sionibus. ibid. & seqq. Medicamenta in temperamento calidiori. p.484.
In frigidiori. ibid.

C A P. V I. De motibus convulsivis, quorum causa circa nervorum
 extremitates, aut intra plexus nerveos subsistit. p.486

Affectiones spasmodicae non semper à capitis vitio procedunt. ibid. Sed inter-
dum à pharmacis ventriculi tunicas vellicantibus, à lumbricis, à lapide
ureteri infixo. ibid. Nonnunquam propter noxam nervorum apicibus il-
latam incipiunt. ibid. Vel ob irritationem, vel ob copulam explosivam
accidunt. ibid. Historia & exempla illustriora spasmodum à nervorum
extremitatibus oriundorum p.487. De spasmodis plexus nerveos præcipuè
occupantibus. p.490. Circa mesenterii plexus in passionibus vulgo dictis
hystericis, ibid. Intra plexus nerveos lienares, & stomachicos, in inflatio-
nibus lienis, ac ventriculi. ibid. Ad plexus cardiacos in cordis tremori-
bus & insultibus. ibid. Intra pneumonicos, aut cervicales, in asthmatis
paroxysmis. ibid. Praefocationis sensus in gutture propter materiam spas-
modicam intra plexus ganglioformes aggestam, & explosam excitatur.
 pag. 491.

C A P. V I I. De moribus convulsivis à liquore corpora nervosa irri-
 gante, totosque eorum processus in spasmos irritante, oriun-
 dis. p.491.

Spasmi universales per totum genus nervosum aberrantes, ad tria præcipuè
capita referuntur, ibid. A tribus causarum generibus potissimùm depen-
dent, ibid. Scil. vel à venenis aut veneficiis, à febre maligna, aut malè
judicata, vel à liquore nervoso propter affectionem scorbuticam, aut aliàs
vitiosam degenerante. p.493. Spasmi à venenis. ibid. Venena spasmos
inducunt multiplicia, à vegetabilium classe petita, à cane rabido, à
tarantula. ibid. Quo ritu affectiones spasmodicas inducunt. p.493. Sym-
ptomata, quæ tarantule morsui succedunt, explicantur. ibid. In eorum
sedatione musica efficacia. ibid. Unde musica demorsos in saltationem ex-
citat. ibid. Choreæ & Viti descriptio. p.494. Symptomata explicantur.
ibid. Spasmi universales à veneficio. ibid. Non omnes à diaboli prestigiis
excitantur, sed ut plurimum à causis naturalibus incipiunt, ac desinunt
ibid. Quod robur supra humanum aliquando exeri videmus, à copula ex-
plivâ immeniori dependet. ibid. & seqq.

ELENCHUS RERUM.

C A P. V I I I. De spasmodis universalibus, qui in febribus malignis, male
judicatis, & quibusdam anomalis excitari solent. p. 495

*Symptomatum febribus supervenientium census, ac Ætiologia. ibid. Morbi
convulsivi & maligni Hassia, Vvestphalia, & in locis vicinis olim epide-
mici ex Greg. Horstio descriptio. p. 496. Symptomatum rationes expli-
cantur. ibid.*

Febris Epidemicæ cerebro & nervoso generi potissimum infestæ, an-
no 1661. increbescens descriptio. p. 497

*Causa procatartica; qualis anni constitutio præcessit, ibid. Symptomata re-
censentur. ibid. Inter illa, debilitas magna, spirituum languor, fun-
ctionis animalis torpedio, esculentorum fastidium, ad motum ineptitudo,
vertigo, aurium tinnitus, cerebri tumultus, tussis immanis, febris lenta
ac velut hectica, atrophia. ibid. & seq. Circa morbi incrementum sym-
ptomata ingravescebant, hinc aperta phrenesis, altus stupor, ἀναισθησία,
loquela defectus, involuntarium excrementorum profluvium, scotomia,
motus convulsivi, alvi fluxus fætidus & decolor, urina intense rubicun-
da, tussis molesta cum sputo copioso ac crasso, tumores in glandulis cervi-
calibus, ulcera cava, maculae exiguae & petechiales. p. 498. Febris hæc
contagiosa erat, p. 499. Curatio ejus difficilis. ibid. Symptomatum ratio-
nes assignantur. ibid. Qualem sanguini & liquori nervoso diathesin ma-
lam anni constitutio impresserat. p. 500. Cur in pueros, feminas, & vi-
ros phlegmaticos præcipuè desavebat, p. 501. Atrophia febrili huic su-
pervenientis ratio. ibid. Succi nervosi vitio contigit. ibid. Vnde febris
hæc difficulter curari solebat. ibid. Tussis immanis & glandularum tumo-
res, à materia morbifica in illas partes deposita. p. 502. Ægrotantium hi-
storia & exempla. ibid. & seq. Morbi diagnosi è dissecto cadavere in-
vestigata. p. 504. 505. Methodus Therapeutica, p. 506. 507. Morbi,
febris intermittens typum referentis, atque in succo nervoso radicati,
historia oppidò rara. p. 506. Tinctura Antimonii vis egregia in nimio uri-
nae profluvio. ibid.*

C A P. I X. De spasmodis universalibus, qui propter succi nervosi dia-
thesin scorbuticam excitari solent. p. 509

*Convulsionum universalium duæ species, scil. discreta vel connexa. ibid.
Discreta, seu intercisa natura explicatur. p. 510. Et spasmo & paralyse
complicantur. ibid. Spiritus animales in hoc affectu particulis tum explo-
sivis, tum narcoticis, tum etiam aliquatenus irritivis imbuuntur. p. 511.*

ELENCHUS RERUM.

Hujusmodi intercisa convulsionis exemplam illustrius. ibid. & seq. Symptomatum præcipuè urgentium rationes explicantur. p. 512. 513. Observationibus anatomicis confirmantur. p. 514. Affectionis convulsivæ continuæ natura & fiendi modus. p. 516. Exemplus & historis insignioribus illustratur, unâ cum methodo therapeutica in illis casibus observata. ibid. & seq.

C A P. X. De passionibus, quæ vulgo dicuntur hystericae. p. 529

In passionibus hystericis uterus falso accusatur. ibid. Earum descriptio. ibid. Symptomatum causæ inquiruntur. ibid. Nec ab uteri ascensu, neque à vaporibus exinde elevatis procedunt. ibid. D. D. Highmori opinio examinatur. p. 530. Affectio dicta uterina, convulsivæ est, à cerebro & nervoso genere affectu potissimum dependet. p. 531. A spirituum animalium explosionibus producitur. ibid. Materia morbifica sæpe nervorum principia occupat. p. 532. Dein in totos eorum ductus disponitur. ibid. Symptomatum hystericorum rationes explicantur. ibid. & seq. Eorum distinctio instituitur, prout materies morbifica has aut illos plexus nerveos occupat. p. 533. 534. Copula explosiva circa nervorum principium spiritibus accrescens, à sanguine suffunditur. p. 534. Duplici de causa accretio hæc contingit. ibid. Passiones dictæ hystericae, aliquando à causa morbifica extra cerebrum delitescere produciuntur. p. 535. Hæ duplici modo accidunt, vel ob solutionem continui, vel ob succi nervosi obstructionem. ibid. Convulsio à glandulis inguinalibus compressis. p. 536. Objectiones contra nostram hypothesein proponuntur & solvuntur. ibid. Cur sæmina crebrius, quàm viri, affectibus his convulsivis tentantur. ibid. Vnde remedia circa abdomen applicata levamen conferre solent. p. 537. Quamobrem suavia paroxysmum accersunt, fœtida eundem abigunt. ibid. Hypostasis nostra anatomicis observationibus confirmatur. p. 538. & seq. Medendi methodus instituitur, remedia antispasmodica indicantur, sed cum uterum respicientibus aliquando complicanda. p. 542. Indicatio curatoria. ibid. Præservatoria, quæ tres præcipuè intentiones complectitur. p. 543. 544. Uteri dislocatio in puerperis mox à partu. p. 545.

C A P. XI. De affectibus vulgo dictis hypochondriacis, quos ostenditur maxima ex parte esse convulsivos, obiter item de medicamentis chalybeatis. p. 545

Affectus hypochondriaci descriptio. p. 546. Ad genus nervosum spectat. ibid. In ejus causas inquiritur. ibid. D. D. Highmori hypothesis ventilatur. ibid. Quali officio lien defungitur. p. 548. Non ut ventriculi calorem foveat, conditus. ibid. & seq. Sanguinem in fermentum evehit.

p. 549

ELENCHUS RERUM.

p. 549. *Viscus hoc triplici vasorum genere instruitur, scil. arteriis & venis, ac insuper insignioribus nervorum plexibus, fibrisque nerveis.* p. 550. *Per arterias in lienem delatus sanguis digestionem in succum fermentativum exaltatur.* ibid. *Hic per venas sanguini communicatus, asperitatem & vigorem illi conciliat* ibid. *Cruoris interventu cerebrum & genus nervosum inspirat.* ibid. *Succus lienaris insuper ad cerebrum deferitur per nervos.* ibid. *Hic spiritus animales exacuit.* ibid. *Lienis influentia in producendis passionibus hypochondriacis.* p. 551. *Liene obstructo sanguis in arteria celiacæ ramos regurguat, unde ventriculo, omento, mesenterio male affectis, dolores, spasmi, flatus, pulsatio subitus ventriculum contingunt.* ibid. *Quo ritu lien sanguinem in fermentum evehendum pervertit.* ibid. *A sanguine lienis culpâ depravato, labes cerebro & nervoso generi imprimitur.* ibid. *Succus lienaris degener factus, cerebro per nervos expeditius suffunditur.* p. 552. *Historia & exempla rariora passione dicta hypochondriaca affectorum.* p. 553. & seq. *Methodus therapeutica instituitur, qua quatuor indicationes respicit, scil. curationis impedimenta removenda sunt.* p. 554 555. *Lienis vitia emendanda.* p. 555. *Sanguinis dyscrasia lienis vitio contracta tollenda.* p. 556. *Cerebri & nervosi generis, necnon humoris irrigui, ac spirituum enormitates abolenda.* ibid. *Medicamentorum chalybeatorum preparationes, & effectus explicantur.* p. 557. *Limatura.* ibid. *Calcinatio cum sulphure.* p. 558. *Preparatio cum aceto.* ibid. *Ferri rubigo.* p. 559. *Preparatio nostra.* ibid. *Vitriolum Martis.* ibid. *Sal martis.* ibid. *Crocus Martis astringens.* pag. 560.

CA P. XII. De tussi ac asthmate convulsivis. p. 561

Tussis merè convulsiva exemplum. ibid. *Pueros ut plurimum, rarò adultiores infestat.* ibid. *A materia spasmodica nervos pneumonicos subeunte excitatur.* ibid. *Asthma quandoque pulmonum vitio accidit.* p. 562. *Interdum merè convulsivum à nervis solummodo affectis procedit.* p. 563. *Historiis, & exemplis confirmatur.* ibid. & seqq. *Tussis convulsiva curatio.* p. 565. *Asthmatis spasmodici medicatio.* ibid.



ELENCHUS RERUM

Quæ in Tractatu de SCORBUTO continentur.

CAPUT I.

Scorbuti descriptio, ejus causa interna, & proxima potissimum in sanguine; dein aliquatenus in liquore nervoso radicata. p. 567



N veteri medicina rara scorbuti mentio. ibid. Præcipuorum symptomatum census instituitur. ibid. & seq. Cause evidentes, quæ morbum inducunt, æris insalubritas & sanguinis crasis vitiosa. p. 568. Non raro per contagium excitatur, quandoque hereditarius existit. ibid. Miasma scorbuticum vel in sanguine, vel in succo nervoso aut simul in utrisque continetur. p. 569. Sanguinis & vinorum dyscrasie comparantur. ibid. Vti vinum, ita sanguis ob duas præcipuè causas agrotare solet. ibid. Scil. propter aliquid extraneum & non rite miscibile huic aut isti confusum, vel quoniam liquoris crasis pervertitur. ibid. Vinum & sanguis ob multas causas à recta temperie desciscunt. ibid. Cum maturitatem non attingunt, unde vinum in vappam degenerat, sanguis crudus fit. p. 570. Quandoque pars sulphurea nimium exaltatur, hinc vina immodicè ebulliunt, sanguis febrilem intemperiem contrahit. ibid. Interdum pars salina in fluorem evehitur, liquor inde in acetum transit, melancholia inducitur. ibid. Nonnunquam spiritu depresso particula sulphurea & salina simul combinata exaltantur, hinc vina rancida aut pendula evadunt. ibid. Vina rancida fiunt propter sulphuris cum sale combinati prædominium. ibid. & seq. Pendula, ob sale evectum & fluore potitum, sulphuris minori licet copia, intime adunitum. p. 571. Sanguinis dyscrasia, pariter ac vini duplex, nempe sulphureo salina, ac salino sulphurea. ibid. Vtraque scorbuti parens. ibid. In scorbutica sanguinis ranciditate, sulphure prædominio potito, sanguis nimium ebullit. ibid. Remedia temperata conveniunt. ibid. In mucilaginosa ejus constitutione, sale prædominante, vini instar penduli, crassior evadit, ibid. Quo ritu labes scorbutica liquori nervoso imprimitur. ibid. Labes hac in tribus potissimum consistit. p. 572. Vid. quod liquor pauperior evadit, quod à crasi spirituosâ salina versus acetosâ degenerat, quod particulis heterogeneis refertur. ibid.

ELENCHUS RERUM.

C A P. II. De scorbuti causis remotioribus, à quibus nimirum massæ sanguinæ, & per consequens liquori nervoso labes affigitur. p. 572.

*In causas dyscrasie sanguinis scorbutica, tum sulphureo salina, tum salino sulphurea inquiritur. ibid. Aliorum sententia de origine scorbuti recensentur. p. 573. Non semper lienis aut primarum viarum vitio contrahitur, p. 574. De variis occasionibus & procataxeos modis, à quibus scorbutus originem suam ducere videtur. ibid. Quam ob rationem aer insalubris scorbutum parit. ibid. Quare febribus diuturnis, & aliis morbis supervenit p. 576. Quomodo hæreditaria contrahitur. p. 576. Vnde per contagium serpit. ibid. Quomodo viscerum primarum viarum culpa imprimi-
tur. ibid. Quare tristitia & studia immodica scorbutum inducunt. p. 577. Labes scorbutica è sanguine in cerebrum & genus nervosum derivatur. pag. 578.*

C A P. III. De scorbuti differentiis, item de morbi hujus signis, symptomatis, causis, imprimisque de illis, quæ propter labem sanguini impressam oriuntur. p. 578

Scorbuti distinctio juxta duplicem causæ regionem, scil. quod in sanguine vel liquore nervoso potiores radices egerit. ibid. Secundum duplicem sanguinis affecti labem, quæ vel sulphureo salina, vel salino sulphurea, unde scorbutus iisdem nominibus insigniatur. p. 579. Quoad morbi originem, quatenus vel per contagium, vel per internam procatarxin oritur. ibid. Iuxta morbi statum, in quantum inchoatus vel perfectus fuerit. ibid. Signa & symptomata, eorum variæ distinctiones. ibid. & seq. Oriuntur vel propter labem sanguini præcipuè affixam, vel propter succi nervosi vitia, vel propter utriusque humoris enormis facti eongressus. ibid. Symptomata propter sanguinis dyscrasiam scorbuticam recensentur unà cum illorum fiendi modis & rationibus. p. 580. Cujusmodi sunt lassitudo spontanea, respiratio difficilis. ibid. & seq. Pectoris angustia. p. 582. Pulsus inordinatus. p. 583. Passiones cordis, febres vagæ. ibid. Sudores nocturni, urinæ lixivialis. ibid. Sputatio copiosa, gingivarum sanguinolentia & putrefactio, dentium erosio, vacillatio, aut casus, oris fætor. p. 584. Macule & exanthemata varia. p. 585. Alvi fluxus, vomitus, nausea, cardialgia, rugitus, dysenteria, crebræ hæmorrhagia, p. 586.

C A P. IV. Symptomata & accidentia, quæ in scorbuto, propter labem cerebro & nervoso generi impressam, exoriri solent. p. 587

Passillanimitas, & totius corporis languor, melancholia. ibid. Paralysis. ibid. Dolores. p. 588. Horum variæ species, alii leviores & cito transeuntes; alii

ELENCHUS RERUM.

alii graviores & difficulter mobiles. ibid. & seq. Posteriores vel fixi, vel vagi. ibid. Dolores fixiores in variis partibus excitantur, scil. in ventre. ibid. In variis abdominis partibus. p. 590. In lumbis & dorso. ibid. In pectore & pleura, in capite. ibid. In cruribus. ibid. Vertigo scorbutica. p. 591. Somnolentia & torpor, vigilia. p. 592.

C A P. V. De scorbuti symptomatis, quæ propter conjunctas sanguinis & succi nervosi dyscrasias oriuntur. P. 593

De hoc censu atrophica scorbutica, arthritis vaga. ibid. Rheumatismus. p. 594. Quoritu differunt morbi per se excitati & scorbuto supervenientes. ibid. & seq.

C A P. VI. Scorbuti prognostica. P. 595

Plures pro desperatis habiti convaluerunt, ibid. Scorbutus ab intemperie sanguinis sulphureo salina agrius curatur, quàm qui à salino sulphurea, p. 596. Febris diuturnis, aliisque morbis chronicis superveniens difficilius curationis habetur. ibid. Morbus adhuc recens non rarò sanationem perfectam admittit; radices altiores agens, vix unquam extirpatur. ibid. Remedia non unius generis adhibenda, sed sæpius mutanda. p. 597. Scorbutus ingravesceus tandem hydropem vel phthisin inducit. ibid.

C A P. VII. De scorbuti curatione. P. 597

Indicatio triplex, præservatoria, curatoria & vitalis. ibid. Indicatio præservatoria absolvitur cathartici & per vomitum & per secessum. ibid. & seq. Phlebotomia. p. 600. Digestivis. p. 601. Specificis, quorum varia extant species. p. 602. Electuaria, confectioes. ibid. & seq. Pulveres, pilule, Tabule, decocta. ibid. & seq. Infusiones. p. 604. Succis, syrups. p. 605. Aquæ destillata. p. 606. Vina & cerevisia. ibid. & seq.

C A P. VIII. De medicamentis cujusque prædictarum formularum generis, scorbutum in constitutione calidioris, & sanguinis dyscrasia sulphureo salina excitatum respicientibus. p. 607

In dyscrasia sanguinis sulphureo salina remedia acra & sale volatili prædita multum nocent. ibid. In his casibus medicamenta temperata indicantur. ibid. Horum formulæ variæ, scil. electuaria. p. 608. Confectioes, pulveres, pilule, tabule. ibid. Decocta, infusiones. p. 609. Succis expressi, syrups, aquæ destillata. ibid. & seq. Vina & cerevisia. p. 610.

ELENCHUS RERUM.

C A P. I X. De scorbuti curatione , quâ ipsi morbo & symptomatis præcipuè urgentibus occurritur. p.611

De curandis difficili respiratione & paroxysmis asthmaticis, ibid. De ventriculi affectibus scorbuto accidere solitis , p.612. De dolore ventris & colica scorbutica. ibid. De diarrhæa & affectibus dysentericis, p.613. De Vertigine, ac leipothymia, aliisque affectibus eidem in affectione scorbutica adiungi solitis. ibid. De hamorrhagiis. p. 614. De vitiis oris, propter scorbutum oriundis. p.615. De doloribus crurâ ac alios interdum artus , noctu potissimum infestare solitis. p.616. de arthritide vaga scorbutica. p.617. De affectibus convulsivis & paralyticis , scorbuto supervenire solitis, p.618. De atrophia, item de febre scorbutica, quæ sæpe illius aut causa est, aut effectus. ibid. & seq. De rheumatismo. p.619. De hydrope. p.620. De crepitu ossium. p.621.

C A P. X. De indicatione vitali , qua includuntur medicamenta cardiaca, opiata & diæta, sive victus ratio in scorbuto requisita. p.622

Cardiacorum formula, p.623. Opiatorum insignis usus. ibid. Opii preparata in forma liquida. p.624. Regimen diaticum. ibid. Præcipuè circa aërem & habitaculi situm , cibum ac potum , atque corporis motum & quietem versatur. ibid. & seq.

C A P. X I. Scorbuticorum historiæ quædam & casus. rariores. p. 625. & seqq.



ELENCHUS MATERIÆ

De Affectibus Hystericis , & Hypochondriacis.

Quærenditur affectus , qui dicuntur hystericis , à pulmonibus sanguine flatulento ad rigiditatem infarctis , oriri non posse. p.635. Imprimis , quia sanguis nunquam ita turgescit , ut cor , & pulmones penitus infarctat. Hoc constat tum ratione , tum ex partium fabricâ & usu. p.636. & seq. Secundò quia dyspnæa , & præfocatio , aliique pulmonum affectus , non sunt morbi hystericæ propriae passionēs. p. 638. 639. Tertiò quia pulmones , etsi gravissimè laborantes , non possunt in aliis partibus reliqua morbi hystericæ symptomata excitare , p. 639. 640. Hoc duæ historia impuberum à polypo cordis obeuntium confirmant. p. 640. Contra

ū primam

ELENCHUS MATERIÆ.

primam adversarii responsionem ostenditur, sanguinem nunquam immodicè in pulmonibus ebullire, quin pariter in toto corpore effervescat. p. 641. Picà & malacià affectas, non sanguinem copiosum, aut nimis elasticum anhelas fieri, sed è contrà, ibid. Cordis anxietas, & palpitatio, non ad sanguinem, sed ad genus nervosum pertinent. p. 642. Septi motus explicatur, ipsumque in convulsionibus interdum superius contrahi manifestò declaratur. p. 643. Motum muscularem non solummodò attractionē esse ad partem immobilem, p. 644. Nec ad alterutrum muscoli extremum, sed ab utroque. p. 645. Membranarum motus tum naturalis, tum convulsivus explicatur. ibid & seqq. Phlebotomia non omnibus hystericis prodest, p. 648. Convulsiones non semper ab irritatione solitariè excitari. p. 649. Succinervi existentia ideo requiritur, quia spiritus animales sunt maximè subtiles. ibid. Recitantur duo casus hystericarū, latratu velut canino affectarum. ib. & p. 650. Altera historia mulieris in quā motus convulsivi, è lumbis in Abdomen translati, symptomata quasi hystericæ exitabant, p. 651. Observatione crebra vulgari constat, viscera abdominis spasmodicè affecta inflari & extumescere. ibid & seq. Passionem hypochondriacam ventriculo iniquè imputari. p. 652. Non esse lienis officium, ut foku ventriculum calefaciat. p. 653. Ejus colorem non à sanguine puro coagulato, ibid. Manus ejus fermentativum vindicatur. p. 654. Pulsationem subtus ventriculum esse affectum arteria cæliaca, propter lienem obstructum, p. 655. Aciditatem haud solummodò in ventriculo progigni, nec inde tantum sanguini aliisque humoribus communicari. p. 656. Aciditatem à salis fluore provenire, & salem ex elementis quibus naturalia constant, unum esse, contra objectiones adversarii experimentis evincitur. p. 657. ibid. & seq.

ELENCHUS MATERIÆ

Exercitationis de Accensione Sanguinis.

IN quibusdam morbis spiritus animales aut ipsam animam immediatius quam humores, aut corpora solida affici. p. 660. Animam corpoream duabus constare partibus, scilicet flammea in sanguine & lucida seu spirituosam in cerebro, & nervoso genere radicatis. ibid. Ostenditur sanguinem animatum esse. ibid. Animationem istam, seu vitam ab incendio eius pendere. p. 661. Ad hoc probandum primò declaratur, sanguinem in perfectioribus animalibus propter æconomiam ejus, actu incalescere debere. ibid. Liquida, è quorum censu est sanguis, tribus tantum modis actu incalescunt, scilicet

ELENCHUS MATERIÆ.

scilicet primò, à calido admoto: secundò, à salinis aut sulphureis quæ diversa indolis sunt, commissis: tertio, ab accensione, pag. 662. Alii calefactionis modi, scilicet fermentatio, putrefactio, & attritio ad crassiora tantum, aut solida, & non omnino ad liquida pertinent, ibid. & seq. Sanguis non aestuat à calido admoto, p. 663. Nec à salium aut sulphuris congressu & lucta, ibid. Accendi videtur, quia propria ignis flammæque passionēs, soli præterea sanguinis vitæ competunt, p. 664. Ad flammæ subsistentiam primò requiritur pabulum nitrosum, quod variis experimentis probatur, ibid. Eiusdem pabuli nitrosi accessus, etiam ad sanguinis vitam sustinendam necessarius, ibid. & seq. Secundum flammæ sustinendæ requisitum, est pabuli sulphurei constans supplementum, quod etiam à sanguine exigitur, p. 666. Tertio, flammæ accensa eventilationem desiderat, pariter etiam sanguinis vitæ, p. 667. Ignis, aut flammæ vulgaris, vel ab alio igne succenditur, vel ab intestino particularum motu producitur; pariter quod sanguinis flammam vitalem in viviparis, & oviparis habet. ibid. & seq. Pulmonum coloris in recens natis mutatio, item sanguinis venosi, & arteriosi diversæ tincturæ, sanguinis incendium quodammodo declarant, p. 668. Quantum cor præstat ad sanguinis accensionem diversimodè alterandam, & quæ sint flammæ vitalis differentiæ, p. 669. Quo ritu lampadis oleum disponatur, ad imitandam sanguinis intra cor, & vasa ejus accensionem, p. 670. Ostenditur sanguinem particulas ad accendendum aptas in se continere, ibid. Flammæ vitalis secus ac vulgaris, non apparet, quia formæ ejus formæ alteri superiori, scilicet animæ corporeæ subordinata est, p. 671. & seq.

ELENCHUS MATERIÆ

Exercitationis de Motu Musculari.

A Nima corporeæ parti lucida duæ insunt facultates, motiva, & sensitiva, utraque tum exterior, tum interior, p. 673. Quomodo motus, & sensus differunt, ibid. In omni motu tria consideranda, scilicet actionis origo, instinctus, impetus motivus, ibid. Motus origo, sive principium fit in cerebro, aut cerebello, ibid. Motus designati instinctu deferatur per nervos, unum, aut plures, p. 674. Impetus motivus perficitur

ELENCHUS MATERIÆ.

per musculos, aut membranas, ibid. Motus muscularis sive localis tractione perficitur, sed non uti à veteribus traditum fuit, ibid. D. Stenon primus musculi fabricam rectè tradidit, p. 675. Musculi descriptio cuius partes sunt tendines, & fibrae carnea, ibid. Aut simplex, aut compositus est: in utroque singulis carniū ventribus bini destinantur tendines, p. 676. Ad musculum etiam spectant membrana, fibrilla membranacea quae fibras carneas decussant, item arteria, vena, ac nervi, ibid. Musculorum figura à Stenone descripta, quando in ipsis musculis conspiciantur, p. 677. Musculi actio per vivisectionem optimè detegitur: in quibus advertere est, fibras carneas tantum contrahi, tendinibus immotis: Illas verò ab utroque fine versus medium adduci, adeoque abbreviatas intumescere, p. 678. Varia experimenta Anatomica quibus fibrarum carnearum motus observentur, ibid. & p. 679. Musculi omnes in contractionum & relaxationum vices sponte sua quodammodo sunt proclives. Humores quibus musculus imbuuntur, sunt liquor nervosus, sanguis, & latex è sanguine in fibras carneas instillatus, p. 679. Ex musculi phænomenis quàm difficile sit functionis motiva Aetiologiam condere. p. 680. Motus localis est actio composita, cuius virtus robustior in fine, quàm in principio, aut viâ, ibid. Quibus modis virtus motiva in mechanicis augeri solet, & qualem cum his analogiam impetus motivus in musculo auctus habeat, p. 681. Facile constat particulas elasticas intra musculum recondi, p. 682. Tales intra fibras carneas plus agitantur, intra tendinosas verò uberius aggeruntur, ibid. Particula istæ, sive spiritus animales, dum musculus contrahitur, è tendinibus in carnes proflire, dumque relaxatur, ab his in illos recedere videntur, p. 683. Spiritus intra tendines quieti, fibras carneas, quatenus ibidem cum alio humore, nempe sanguineo collunctorantur, inflant, ac intumefaciunt. ibid. Dum musculus contrahitur, fibras carneas abbreviatas intumescere, à toto liq. patet, p. 684. Cuius indolis spiritus animales, cuius item latex sanguineus videntur esse, ibid. Musculi tum simplicis, tum compositi conformationes planè indicant, spiritus ab utroque tendine, utrosque carniū fines incurrere, & ab his in illos recedere, ibid. & seq. Meri spiritus animales, sine copula altera sanguinea vim motivam exequi nequeunt, p. 685. Spirituum motorum copia subsidiaria per nervos ad musculum delata, à fibris membranaceis, non carneis excipi, perque illas ad tendines seu promptuaria conveyi videntur, p. 686. Quomodo motus muscularis obeundi, aut sistendi instinctus, per nervum musculo imprimatur,

ELENCHUS MATERIÆ.

mitur, ibid. Ad hoc munus quid fibrilla membranacea conferunt, ibid. & seq. Motus convulsivos ob vitium non tantum in nervis, sed in musculis latens, interdum oriri, p. 688. Spasmodum à musculis oriendorum binæ sunt species, nempe aut breves & crebri sunt subsultus, aut permanentes, uti τέναν & affectio dicta Cramp, ibid. Vtriusque causæ & fiendi modi explicantur, p. 689. Casus notabilis posterioris affectus naturam illustrans, p. 690. Obiectiones contra myologiam prædictam solvantur, p. 691. & seq. Figura musculos quosdam ad vivum representantes explicantur, p. 693. 694.





Regii Procuratoris Consensus.

PRO Rege assentio, ut liceat HUGONI DENOÜALLY Typographo Lugdunensi typis mandare Tractatus varios D. D. *Thoma Vvillis*, qui sunt *de Fermentatione, de Febribus, de Urinis, Cerebri Anatome, cui accessit Nervorum descriptio & usus, de Morbis convulsivis & Scorbuto, de Affectionibus hystericis & hypochondriacis Pathologia spasmodica vindicata, de Anima Brutorum, Pharmaceutice Rationalis, sive de Medicamentorum operationibus in humano corpore, &c.* Concessis impetranti inhibitionibus consuetis per triennium duraturis. Datum Lugduni 10. Julii anni 1675.

VAGINAY.

Permissio.

Fiat juxta Conclusiones Procuratoris Regii. Anno & die supradictis.

DESEVE.

Prædictus HUGO DENOÜALLY jura sua pro editione supradictorum Operum cessit JOANNI-ANTONIO HUGUETAN, Bibliopolæ Lugdunensi, pacto inter eos inito die 11. Septembr. anni 1675.

Registratum in libro Communitatis Bibliopolarum Lugdunensium, juxta sententiam in Presidiali Curia Lugdunensi latam die 12. Januarii 1675.

Signatum CELLIER.

AMICO



AMICO LECTORI,

P R Æ F A T I O.



E Fermentatione dicturo idem accidit mihi, quod celebri olim historico Imperii *Romani* commentarium pertextenti: scilicet dum res istius solum gentis, velut brevi in tabella, depingere conabatur, necesse habuit *non unius populi, sed generis humani facta* recensere: pariter, cum ipse pauca tantum de Fermentorum energia & operandi modis meditarer; in tractatum hunc velut *Supra* quadam tumefactum, totius naturæ penus, & dos omnis tantum non irrepserit. Disquisitionem istam aggressus me ad pistrinam derusum, & solummodo ad panificum, & cervisia-riorum furnos relegatum esse putaram; nec ultra istos limites, nisi fortè raptim, aut petita prius venia procedere licere: postquam vero rem penitus intueri cœperam, provinciam longè amplissimam nactus videbar; quippe præter isthæc Artis, plurima Naturæ opera, & effectus, fermentationi non modo similes, sed ipsosmet fuisse planè constabat. Cum enim pro solvendis phænomenis, quæ circa massæ farinacæ intumescientiam, necnon vini, aliorumque liquorum effervescentias occurrunt, varias rationum syllogas, & hypotheses contexuissem; comperi tandem primogenias istas particulas, quarum orgasmo vulgaria ista præparata fermentescunt, in quibus præterea mistis, motuum, & alterationum causas extitisse; quare si longè à proposito nostro aberrasse, & nimis copiosam materiæ messem hic congestisse cuiquam videar, si venia dignus; quia prorsus eodem ratiocinationis filo, & conjunctissima rerum affinitate, ad varia, & diversimoda hæc concreta ducebar. Quod si notiones inusitatas, & ferè tantum in Chymicorum officinis auditas, me perperam ad vulgi opera prostituere quispiam obiiciat, dico hæc principia, quæ apporto, motus naturalium automatos revera perficere; etiam captui vulgari eosdem facillimè repræsentare, & tantum non oculis, imo manibus
ipsis

ipsis admove: huiusmodi substantiarum quas refero particulas rebus inesse, rudes, & imperiti licet homines, vel sensuum ope percipere possunt: insuper Sulphuris, Salis, Spiritus, & reliquorum nomina familiarius nota sunt, quàm Materia, & Forma, aut quatuor Peripateticorum principia. Quod ad methodum nostram, & Philosophandi modum spectat, nemo mihi vitio vertat, si non ad amissim hic omnia, & juxta Analytices regulas descripserim: quoniam in hoc Opere sine duce aut viatore loca tantum devia, & velut solitudinem nullis calcata vestigiis peragere contigit, ubi non iter tantum, sed & viam facio; quocunque igitur deflexero, apud æquos conatus nostri æstimatores errasse vix dicar, qui semitam non habuerim, cui insistendum fuerat; nec orbitam agnoscam, quam transisse deprehendar.





DE FERMENTATIONE,

S I V E

De motu corporum naturalium INORGANICO.

CAPUT PRIMUM.

De principiis rerum naturalium.



IN vulgari Philosophia, ubi res naturales inanibus Formarum & Qualitatum figmentis explicantur, *Fermentationis* vocabulo nihil occurrit rarius: inter saniores vero (præsertim è neotericis,) qui Materiam & Motum præcipue in corporibus spectant, nullum ferè usitatus. Dicitur autem *Fermentatio* à *fervescentia*, ut sit fermentum quasi *fervimentum*. Celebratur vox maximè in panificio; in musti, cerevisiæ, & liquorum potulentorum defæcationibus: deinde applicatur etiam aliis, quæ simili ritu solent turgescere: ut tandem significet quamcunque effervescentiam, seu turgescenciam, quæ in corpore naturali, à particulis istius corporis varie agitatæ concitatur.

Corpora ad fermentescendum apta, sunt diversæ consistentiæ & habitudinis, scilicet tenuia aut crassa, liquida aut solida, animata aut inanimata, naturalia aut artificialia; in quibus tamen omnibus reperitur partium aut particularum heterogeneitas: nimirum insunt substantiæ quædam summè agiles, & semper avolare nitentes: adsunt etiam aliæ crassæ, terrestres, magis fixæ, quæ particulas subtiles irretiunt, & implexu suo inter avolandum detinent; à gemelli hujus foetus in eodem utero lucta & contranitentia, fermentationis motus præcipuè dependet: è contra autem quæ minus fer-

mentescunt, particulis consimilibus, eiusdem figuræ & conformationis ut plurimum constant; quæ quidem inter se consociatæ, sine tumultu aut turgescencia quietæ jacent atque alta fruuntur pace. Si mustum, aut cerevisia novella in utribus stricti orificii reponantur, impetuose adeo effervescent, ut sæpe vasa dissilitio periclitentur. Sin eorundem liquores seorsim exstillatos & segrege factos incluseris, nihil inde motus aut orgasmi sequitur. Quare aquæ destillatæ, spiritus ardentes, olea, sales herbarum fixi, & quamplurima à Chymicis simpliciora præparata, sine quavis alteratione aut fermentatione diutissime perstant: particulæ forsan quædam evaporant, reliquæ autem non tumultuantur. Interim vegetabilium aut animalium succus & sanguis, necnon liquores quivis concreti & è pluribus compositi cito fermentescunt, & exinde varias mutationum vices subeunt. Spiritus vini phialæ strictim inclusus, nulla effervescentiæ signa prodit; sin vero Spiritui huic parum olei Terebinthinæ adjiciatur, particulæ liquoris adeo exiliunt, ut hinc vitrum Hermetice obsignatum effractum viderim. Aqua quævis herbarum stillatitia, si modo simplex in vitro servetur, diu incorrupta perstat, sin eidem saccharum aut syrupum adjicias, brevi acescit, & corrumpitur. Quare ut corporum fermentatio rite explicetur, inquirere oportet, qualis & cujus naturæ sint istæ particulæ, siue substantiæ è quibus mixta componuntur, & è quibus invicem commissis & mutuo colluctantibus, motus plerique naturales dependent.

Circa principia rerum naturalium licet plures & diversæ sint Philosophorum sententiæ, tamen tres insigniter præ cæteris fidem & assensum meruere. *Principem* locum obtinet celebris illa Peripateticorum Quadriga, quæ Solis *τετράπικρον* æmula, per fictitium primæ materiæ cælum citato passu rapitur, & vastum illud inane perpetua reciprocatione metitur. Aiunt nimirum ex *Aqua, Aëre, Igne, & Terra* omnia constitui; & ex diversa horum metathesi, generationum & corruptionum, necnon alterationum quarumcunque vicissitudines oriri. In *secundis* consistit proximumque locum sibi vendicat *Democriti & Epicuri* sententia, quæ nunc denuo in nostro hoc seculo rediviva est; statuitque effecta quævis naturalia *Atomorum* diversimode figuratorum confluxu pendere; ita ut in omni corpore sint particulæ Rotundæ, Acuminatæ, Quadratæ, Cylindracæ, Striatæ, aut aliis configurationis; & pro diversis harum *συζυγίας* Subjectum est hujus aut alius Figuræ, Operationis aut Efficaciæ. *Tertia* rerum naturalium *συνέσταται* à *Spagyria* introducitur, quæ cum analysi ab igne facta corpora quævis in *spiritus, sulphuris, salis, aquæ, & terræ* particulas resolvit, optimo jure eadem his constare affirmat. Quoniam hæc hypothesis corpora in partes sensibiles determinat, & res veluti ad vivum dissecat, nobis præ cæteris arridet. Quoad quatuor *Elementa* & primas qualitates inde deducendas, fatendum est pro explicandis naturæ phænomenis, hanc opinionem aliquatenus conducere, verum crasso adeo modo, & sine peculiari respectu ad secretiores naturæ recessus rerum apparentias solvit, ut fere sit idem dicere domum constare ex ligno & lapidibus, ac corpus ex quatuor elementis. *Altera sententia*, quæ tantum *Epicurea* Philosophiæ subtegmen est, quatenus mechanice res explicandas suscipit, & instrumenta velut artificis manu fabrefacta naturæ accommodat, ac sine recursum ad

ad occultas qualitates, Sympathiam, & cætera ignorantiae asyla difficiles aliquot scientiarum nodos & ænigmata feliciter & perquam ingeniosè extricat, laudem certè non levem meruit. At quoniam principia sua supponit potius, quam demonstrat, docetque qualis figuræ elementa ista corporum sint, non quæ ipsa fuerint, atque etiam notiones inducit valde subtiles & à sensu remotas, quæque naturæ phænomenis, quando ad particularia descenditur, non satis quadrant, hac etiam insuper habita, *tertia sententia*, quæ Chymicorum est, placuit calculum nostrum apponere, atque huic in sequenti tractatu præcipuè insistere; statuentes nimirum corpora quævis è *Spiritu, Sulphure, Sale, Aqua & Terra* constare, & pro diverso horum in mixtis motu & proportionem, rerum ortus & interitus, ac imprimis fermentationis rationes & varietates expendendas esse. Si verò objiciat aliquis principia atmoeidea, & nostra spagyrica omnino subordinari; nimirum ut hæc, licet ultimò sensibilia, in ista (conceptu tantum designanda) resolvantur: huic non multum repugno, modo ostendat conceptus istos reales esse. Lusciosus ego atque hebes, lynceis accuratiora relinquo; eatenus sapere contentus, quousque rationi sensus externi operam præstitere; procudere enim, aut somniare philosophiam me nolle lubens profiteor. Quo verò rectius procedat Oratio, ex usu erit pauca de hujusmodi principiis in genere, eorumque affectionibus præfari.

Principiorum nomine intelligo haud Entia simplicissima & omnino incomposita, sed ejusmodi tantum substantias, in quas veluti partes ultimo sensibiles res physicae resolvuntur. Harum combinatione & motu intestino corpora gignuntur & accrescunt: harum mutuo ab invicem discessu & dissolutione alterantur & intereunt. Interim quæ subjectis aggeruntur, aut ab iis decidunt particulae, sub forma *Spiritus, Sulphuris, Salis*, aut *unius* cæterorum apparent.

CAPUT II.

Chymicorum principiorum descriptio, eorumque proprietates & affectiones.

I. **S**piritus sunt substantia maximè subtilis, æthereæ, & diviniore auri particula, quos naturæ parens in sublunari hoc mundo, tanquam vitæ & animæ, motus & sensus cujusque rei instrumenta condidit; dum sui juris, semper expansi sunt, & avolare nitentes, ne tamen subjecta sua nimis cito derelinquant, modo crassioribus alligantur particulis, ut eas subigendo, subtiliando, ac variè explicando, res ad maturitatem disponant, prout in corporum vegetatione ac fermentatione observare est; modo intra spatia quædam, scilicet animantium vasa ac viscera coerciti, eadem motus sui stadia, pro vitæ, sensus, & motus obeundis muneribus, sæpius repetere coguntur. Ab horum motu corporum animatio, plantarum vegetatio, fructuum, liquorum, & aliorum præparatorum maturationes procedunt; formam & figu-

ram cujusvis rei, veluti designatione divina præfixam, determinant; mixtionis vincula præsentia sua conservant, discessu pro libitu referant: Sulphuris & salis inordinationes refrænant: in copia & exaltatione Spirituum, rei cujusvis perfectio & status; in defectu & destitutione, casus & declinationes consistunt.

Quoad subjecta quibus Spiritus insunt: *mineralia*, quia fixioris sunt naturæ, motus & vegetationis expertia, Spiritibus ferè carent, aut saltem paucioribus contenta sunt. Pro *vegetabilium* ortu & accretione, in quantitate mediocri requiruntur. In *constitutione animali*, ubi Spirituum pro sensu & motu major est usus, quantitas longe uberior reperitur. In *artis operibus*, & præcipuè in iis quæ digestionem ac fermentationem ad perfectionem ascendunt, Spirituum satis magna proportio habetur. In subjectis vero quibuscumque, dum Spiritus immersi cæteris principiis commiscentur, triplex eorum conditio, seu status in considerationem venit. Vel enim depressi & confusi particulis crassioribus adeo involvuntur ut parum emineant aut vires exerant, prout in rebus indigestis, crudis, ac immaturis cernitur, in quibus Spiritus vix sese in motum extricant, & è quibus vix destillatione proliciuntur. Vel secundo, Spiritus densa reliquorum mole evoluti, vigore pollent, particulas crassiores exagitant, ritè disponunt, crassa subtiliant, cruda digerunt, & res ad maturitatis & perfectionis *anulum* perducunt. Vel denique Spiritus summa rerum potiti luxuriant, & è corpore excursus faciunt: hinc qui residui sunt, copia & viribus sensim extenuantur, donec particulis Salium & Sulphuris potentia minores, sub eorum jugum mittantur, & paulatim è subjecto dispereant, & prorsus abigantur. E triplici hoc statu rerum *initia*, seu rudimenta, *maturitas* & exaltatio, necnon *defectus* & occasus dependent.

Quando latex *spirituosus* è liquore quovis destillatione prolicitur, observare licet quod vapor elevatus minimè in rorem, hoc est guttulas contiguas, sive madorem undique suffusum concrevit, uti in aquosis fieri solet; verum in strias & plures rivulos divisus, Alembicum lineis rectis, & tantum non meridionalibus, ab apicis centro ad circumferentiæ oram productis, omni ex parte insignitum reddit. Cujus rei causa hujusmodi videtur; nimirum quod substantia *spirituosa* cum sit valde subtilis, in liquorem non facile colligitur; neque in ascensu, quemadmodum vapores aquei, circa vasis latera ubivis defigitur: sed ultra tendit semper, & nisi cum ad ipsum capitelli fastigium perventum fuerit, neutiquam subsistit; illic vero halitus spirituosus, velut in puncto coerciti, & in retrocessum acti, in madorem coalescere incipiunt: quare ab isto apice velut fonte, per scaturigines undequaque dimanantes, Spiritus striatim versus Alembici oram descendunt. Et cum lineæ istæ prorsus disparent, signum est substantiam spirituosam penitus exstillari, & halitus tantum aqueos ascendere.

I I. *Sulphur* est principium consistentiæ paulo crassioris quam Spiritus, post ipsum maximè activum; cum enim, soluta mixti compage, Spiritus primo erumpunt, particulae sulphureæ statim subsequi nituntur; rei cujusque temperies quoad calorem, consistentiam, & amabilem texturam, à *Sulphure* imprimis dependet: hinc etiam colorum & odorum varietas; corporum puchritudo & deformitas, necnon saporum diversitas, maxima ex parte oriuntur. In sinu hujus Spiritus immediate resident, quo velut copula, durioribus

cætero

cæterorum complexibus uniuntur. Sulphuris substantia, licet minus subtilis, tamen majoris ferociæ & effrænationis est, quam sunt Spiritus: hoc enim, nisi aliorum implexu tanquam vinculis coercetur, ejusque particulæ cæterorum interjectu ab invicem detinentur, non solum deserit subjectum, sed impetuosam nimis eruptione ipsum destruit. Equidem hujus corpuscula leniter commota, digestionem & maturitatem, dulcedinem, & qualitates, plerasque perfectivas, rebus conciliant: paulo intensius exagitata, calorem, & qualitatum excessus ac inordinationes, imprimisque rancorem inducunt: impetuosius vero concita, corporum dissolutiones, imo flammam & conflagrationem inferunt.

Substantia Sulphuris nusquam sincera cernitur, imo seorsim ab aliis non consistit, quin tenues evanescit in auras: particulæ ejus, vel cum sale & terra concretæ & concatenatæ, velut immobiles figuntur, prout in metallis & lapidibus quibusdam cernitur; vel Spiritu ac aqua dilutæ, simulque cum cæteris temperatæ in motu existunt, sub qua ratione intra mixti compagem (non aliter ac prius de spiritu dictum est) in triplici sunt statu: vel enim primo corpuscula hujusmodi sale & terra obvoluta, aut humiditate aquea nimis perfusa obscurantur, adeo ut parum virtutis exerant; unde rerum temperies humida & frigida existit, qualitates sunt obtusæ, hebetes, & minoris efficaciam, ac corpora sunt minus inflammabilia, prout cernitur in fructibus immaturis, succis, crudis, & lignis viridibus. Vel *secundo* particulæ Sulphuris una cum Spiritu amicare, densius agglomerari, & cæteris principiis eminere incipiunt. Atque sic motu suo humiditatem superfluum evaporant, cruditates digerunt, rebus temperiem calidam, qualitates activas, vim vegetam & maturitatem inducunt: qualem Sulphuris exaltationem observare licet in vino & liquoribus diu fermentatis, fructibus maturis, animantium juventute, & constitutione florida. Vel *tertio* particulæ Sulphureæ in vigorem collocatæ nimis effervescent, mixtionis vincula solvunt, & avolare affectant, atque pro diverso eorum discessus ac separationis modo, corporum dissolutio variè contingit. Vel enim cum aqua & spiritu sensim & sine tumultu evaporant, ac subjecta marcida & exsiccata relinquunt, quæ cum Sulphur omnino abierit, in pulverem recidunt: Vel *secundo* in corporibus quæ Sulphure turgescunt, cum mixtio solvitur ac spiritus avolare incipiunt, derelictæ Sulphuris particulæ exagitari plurimum & effervere solent; densaque mole conclusæ propius aggregantur, & calorem quandoque & incendium (prout in fimo & fœno incalescentibus) concipiunt: hoc modo confertim & impetuosè erumpentes, tetrum odorem exspirant, ac subjecto putredinem accersunt. Est tertius eruptionis modus, quo particulæ Sulphureæ e corporibus evadunt, cum facto velut agmine sese proripiunt, & simul aggregatæ in ignem aut flammam erumpunt: quo quidem effera & indomitæ factæ, repagula quævis effringunt, & subjecti compagem prorsus destrunt: hoc ritu, vel sponte sua & propria effervescencia incendium concipiunt, ut cum fœnum madide repositum, currum rotæ, aut axis à motu excalefacta exardescunt; vel quia sulphur à sulphure accenditur: etenim hujus particulæ impetuosius commotæ, vicinas quasvis exagitant, & in similem conflagrationis motum concitant, uti inferius cum de natura ignis differemus, plenius ostendetur.

III. *Sal* paulo fixioris naturæ est, quam aut Spiritus aut Sulphur, neque adeo ad avolandum habilis; quin rebus compactionem, & soliditatem, necnon pondus & durationem largitur. Corporum dissolutiones retardat, congelationes & coagulationes promovet, putredini, corruptioni, & inflammabilitati plurimum resistit; quatenus nimirum Sulphur & spiritum nimis volatilia implexu suo figit, & in corpore detinet: quare ligna ponderosa, lapides, metalla, & quæ sale abundant, ægre accenduntur, & diutius à corruptione immunia perstant. Nec tantum individui duratio, sed & speciei propagatio à principio salis plurimum dependet: quippe mineralium accretio, terræ fertilitas, plantarum vegetatio, & imprimis crebra animalium fœtatio & progenies, à seminio salino originem ducunt: hinc Venus dicitur orta Mari, & libido salacitas appellatur. Sal etenim fusione potitus otiosa aut nimis disjuncta spiritus aut sulphuris corpuscula congregat, ac in motum suscitatur, & una cum ipsis producendis primis rerum staminibus optime inseruit.

Sal intra mixti compagem, vel est omni modo *fixum*, cum particulæ ejus Spiritu, & aqua fere destituta, verumtamen cum terra aut sulphure, aut simul utrisque constrictæ, in lapides, metalla, aut aliis generis mineralia concresecunt, qualem à natura fixitatem vitrificatio, & laterum fictilium coctio imitantur: vel est *Sal* à fixatione solutus, scilicet cum particulæ ejus cæteris principiis, ac imprimis spiritu & sulphure, commistæ, & aqua dilutæ, sese explicant, & per mixtum diffusæ una cum reliquis fermentescunt. Dum *Salis* corpuscula hoc ritu in motum vindicantur, *triplex* eorum status, seu conditio observatur, nimirum *fusionis*, *volatilisationis*, & *fluoris*.

Statum *fusionis* dico, quando salis corpuscula cæteris commista, quoad minima dissolvi, & per totam mixti compagem huc illuc diffundi & explicari incipiunt; sicut in plantarum germinatione, primis animalium conceptibus, & fermentationum initiis observare licet; hinc rudis tantum & indigesta rerum formatio, Sapor ingratus, plerumque acerbus aut austerus, oriuntur.

A primis hisce motuum rudimentis, particulæ salinæ ad vigorem & *volatilisationem* una cum spiritu ac sulphure paulatim ascendunt, qua scilicet universam corporis molem permeant, ejusque materiem varie exagitant, & versus maturitatem disponunt. Corpuscula quædam acuunt, & in motum concitant; alia figunt, stabiliunt, & in duritiem lapideam congelant. Si copia sit spiritus & sulphuris, salis particulæ velut eorum pedissequæ, iis intime uniri & associari ambiunt, ut non solum per quosvis mixti recessus una cum ipsis rapiantur, verum (subjecto destillationi exposito) etiam sal, æque ac spiritus, Alembicum ascendat. A *Salis* volatilisatione, forma atque pulchritudo, atque sapor imprimis dulcis, rebus accedunt, prout in florido animalium sanguine, fructibus maturis, etiam in saccharo, lacte, & melle experimur.

Salis fluorem appello cum particulæ salinæ quæ prius cum terra aut sulphure colligatæ, aut spiritui associatæ, adeoque ab invicem secretæ extiterunt, postea, laxato mixtionis vinculo, prorsus liberæ, & cæterorum jugo solutæ evadunt. Sic enim una confluunt, per totam subjecti compagem sese explicant, & dum spiritus & sulphur magna ex parte avolant, hæc in reliqua *dominium* exercent, & toti mixto *acorem* inducunt: ob hujusmodi salis *fluorem*, vinum, lac, sanguis, edulia prius grata & dulcia, quando corrumpi incipiunt, ingrate

ingrate acescunt; & propter hanc rationem sales quicunque, violenta ab igne destillatione *fluorem* adepti, (hoc est à terræ combinatione propulsi) acescunt: dein si idem liquor acetosus capiti mortuo insipido committatur, denuo totum falsum evadit.

Sal reliquorum (terra excepta) consortio privatus, denuo *fixus* evadit, prout observare est in Sale marino, aut herbarum incineratione facta, quorum particulae adeo cohaerent, ut ab igne intensissimo divelli nequeant. Cum distillantur vegetabilia, salinae quaedam particulae, pauciores licet, *fusionem* adeptae, una ascendunt, indeque genuinum mixti saporem aquae quaedam exstillatae retinent; animalium partes destillationi expositae *salem volatilem* exhibent: cum mineralia, aut ligna ponderosa sale referta operi Chymico subjiciuntur, liquor exstillatus *salem fluore* potitum refert, & valde acescit.

Spiritus & Sulphur mixti compagem facile referant, sibi que exitum parant; sal vero nequaquam, nisi cum spiritui associatus una cum ipso foras rapitur. Sicut spiritus & sulphur exterius admota, corpus dissolvendo aut concremando, sociis suis intus conclusis velut fores aperiunt; sic etiam liquores Salini exstillati idem faciunt. Etenim aquae Stygiae metalla potenter corroduunt, & velut flamma adjecta eadem comburere & absumere videntur.

Sal inflammabilitati resistit, quatenus implexu suo particulas sulphureas detinet, & ab eruptione prohibet. Excepto tamen quod sal nitri sulphuris accensionem auget; quod quidem per accidens contingit, quia sal iste velut androgynus, particulis etiam sulphureis in mixtione combinatis plurimum turgescit, quare cum ab alio sulphure ignito sal resolvitur, sulphur inclusum cum impetu erumpit, & (velut flatus è follibus explosus) ignem circumcirca accensum exagitat, & in corpus subjectum impetuosius adigit: interim si nitro flammam admoveas, non omnino accenditur, corpori autem sulphureo commissum ejus accensionem promovet: reliqui autem sales, particulis Sulphureis minus turgidi, aut potius destituti Sulphure commixti ejus incendium retardant, & aliquando extinguunt.

Haecenus de *principiis activis*, quae prima velut *flamina* corporum efficiunt: quae sequuntur iis *consistentiam* & *molem* imprimis largiuntur. Hinc enim liquida aut solida, exigua aut grandiora existunt. Etenim *aqua* & terra spatiola ex combinatione cæterorum vacua interjectu suo replent, & corporis lineamenta, alioqui nimis curta & contracta, ampliant ac dilatant.

I V. *Aqua* est maximè idoneum Spiritus & Sulphuris vehiculum, cujus interventu ista invicem, & cum sale consociantur; etenim cætera principia humore aqueo dissoluta, aut saltem diluta, in motu perstant, sine quo velut congelata obrigescerent.

Cum *aqua* deficit, principia activa nimis arctè coeunt, sese mutuo atterunt & *absument*; cumque hac ratione alimenti supplementum rescinditur, corpus emarcescit. Si humiditas nimis abundat, Elementa hæc ab invicem elongantur seu dissociantur nimis; quare subjectum iners & pigrum & minoris efficaciae & motui ineptum existit: Porro corpora nimis humida sunt putredini & corruptioni plurimum obnoxia, quoniam ab humiditate nimia combinatio Spiritus, sulphuris, ac salis nimis laxa efficitur, ut se mutuo non implicent, nec implexu in subjecto retineantur. Verum aqua superabundans facile eva-

porat, ac dein referata mixti compage & portis velut patefactis, Spiritus & Sulphur qua data via facile erumpunt, & subjectum quasi vapidum aut à sale acidulatum relinquunt: hinc enim vegetabilium infusiones, decocta, herbarum succi, & liquida quævis præparata, si quantitas aquæ sit cæteris principiis major, & improporcionata, cito corrumpuntur.

Aqua è re qualibet destillatione facillime prolicitur; cum enim Spiritus & Sulphur, Salis aut Terræ involucris sæpe irretiantur, & amplexus suos ægre dimittant, & calori non nisi intensiori obsequantur, ac sæpe putrefactionem præviam requirant, aqua facillime, & sæpe nullo cum negotio è corpore quovis urgetur. Sæpissime autem Spiritus ac Sulphuris laxiores quasdam particulas inter avolandum rapit, & secum foras convehit.

V. Sicut *Aqua* interjectio in liquidis, ita *Terra* in solidis spatiola inania & vacuitates à cæteris principiis relictas replet. Hæc enim principia activa à complexu nimis arcto, quo se atterant & invicem contingant, prohibet. Etiam crassitie sua nimis volatilia retinet: insuper molem & magnitudinem corporibus debitam elargitur.

Quo magis *Terra* quidpiam abundat, eo est minoris activitatis, durationis vero longioris: hinc mineralia diutissime perstant, dein proxime arbores grandiusculæ; interim ævi brevioris sunt animalia, & plantæ teneriores.

In destillationibus *Terra* vix omnino, aut non nisi in parva quantitate Alembicum ascendit: ut plurimum cum portione salis pro capite mortuo relinquitur; ideoque *Terra damnata* appellatur, quia cum cætera principia velut carcere effracto liberantur, hæc usque detinetur: præterea, *Terra* reliquorum consortio orbata, nullius est usus, nec mutationis, nec exaltationis capax.

Hæc de *Elementis* seu principiis rerum naturalium, seorsim & per se consideratis. Sequuntur eorum *conjugationes* & *affinitates* quædam explicandæ: quippe hæc cum istis satis arcte cohærent, cumque aliis ægre aut vix omnino connectuntur. Ex mutua quorundam combinatione, aliorumque discrepantia variæ affectiones oriuntur, quarum notitia fermentationis doctrinæ facem non levem præfert.

Inter *Spiritum* & *Sulphur* est cognatio quædam & partium similitudo, quæ in utroque sunt agiles & dissipatu faciles; quare Spiritus è corpore fugatus particulas sulphureas copiose secum trahit, prout cernitur in liquoribus spirituosus è re qualibet exstillatis, quorum nonnullis si aquam admisceas, Sulphure præcipitato liquor velut turbidus apparet, *Spiritus* vero absque *Sulphure*, *Aque* indiscriminatim miscetur, qui tamen ob volatilitatem suam æque facile avocatur, & destillatione secernitur.

Licet *Spiritus* & *Sulphur* sint principia valde cognata, & (quia prompti motus) utraque inflammabilia, tamen ipsummet idem non sunt, prout à quibusdam asseritur: namque *Sulphur* in corporibus spiritu penè destitutis copiose subsistit, nimirum in sulphure communi, antimonio, aliisque mineralibus; in quibus particulae ejus sunt valde fixæ, & ex sua natura fere immobiles, quod à spirituum indole immane quantum abest: illi enim in quovis mixto ubertim scatentes nunquam otiosi jacent, at semper in motu, alterationes subjecto, ubi diversantur, varias inducunt: dein si vigore polleant, facile & sine tumultu sua sponte se foras proripiunt. Atqui sulphur, licet exuberans, haud facile

facile evaporat, quin calore intenso aut igne actuali opus habet, ut ei patefiat exitus; atque demum non sine foetore aut incendio erumpit: quinimo si oleosa & pingua igne moderato distillare satagas, ea, licet valde sulphurea, liquorem tantum aquosum & minime inflammabilem exhibere solent; sin vinum generosum, quod spiritu turgescit, lenissimo balnei calore promovemus, aqua ardentissima, & in totum deflagrare apta exstillabit.

Spiritus Sali non statim conjungitur: etenim saccharum & Salia à rectificato Spiritu vini vix omnino dissolvuntur; verum à longa digestionem & circulationem quodammodo associantur, prout cernitur in Sale volatili animalium, & tincturis è Salibus herbarum aut mineralium, cum spiritu vini elicitis. Quod si Spiritus copiâ & virtute antecellant, particulas salinas sibi assumunt & volatilifant. Ideoque *Sal* animalium succo aut sanguine contentus, spiritui associatus, volatilifatur: etiam spiritus vini cum sale herbarum fixo, multis cohobis destillatus ipsum volatilem reddit, perque Alembicum transire facit. Sin vero major sit salis potentia, spiritui dominatur, ipsumque figit. Hinc sanguis ob malam victus rationem falsior factus, minus spirituosus existit. Sales fixi, atque oleum vitrioli, spiritus nimium volatiles ac effrenes fingunt, ipsumque vini spiritum coagulant.

Est autem Sulphur magis idoneum Spiritus subjectum, cujus interventu Sali & cæteris principiis facile unitur: & sicut Spiritus optime Sulphuri ac Aquæ, ita Sulphur Terræ & Sali intime cohæret.

Quoad Sulphur, præter affinitatem ejus cum Spiritu, ipsi cum sale magna intereedit necessitudo, cujus volatilisationi non parum confert. Quare in corporibus quæ *Sale* volatili abundant, etiam Sulphuris copia reperitur; uti in Succino, fuligine, cornibus, ac ossibus, necnon excrementis animalium. Ubi Sal & Sulphur in motu sunt, & à subjecto evaporant, odor valde ingratus emittitur; etenim Sulphur Sale aculeatum sensorium fortius pungit, & cum acrimonia ferit: interim sulphur cum Spiritu exhalans, & sensum leniter demulcens, odorem valde jucundum excitat.

Sulphur inter *Spiritum* & *Salem* quasi distrahitur, & simul utrisque adhæret partibus. In destillatione succini, terebinthinæ, cornu cervi & similium, pars quædam Sulphuris pariori Spiritu unita primo ascendit, & oleum flavum, seu liquorem limpidum grati odoris constituit: pars altera Sulphuris Sali conjuncta secundo propellitur, & cum foetore pessimo sub forma olei rubicundi aut nigri destillatur: pariter in circulatione sanguinis, portio Sulphuris pura & delicata Spiritui commissa, spiritui tum vitali, tum animali materiam supplet; pars altera crassior cum Sale cocta & adusta, velut excrementum quoddam à sanguine secretum, in vasa choledocha seponitur. Sicut Spiritus Sali, ita Sulphur Aquæ non facile cohæret: quare pingua & oleosa, necnon gummi, & resinæ Sulphuræ, aut summæ aquæ innatant, aut in fundum ejus subsidunt. Sulphures autem, mediante Sale, latici aquoso commiscentur, prout videmus olea Saccharo aut Sale imbuta, in aqua communi dissolvi, quæ alias separatim fluitarent.

Sulphur non ita facile, uti Spiritus, Aqua, aut Sal, destillationi obsequitur: etenim hujus particulæ plurimum viscosæ se mutuo, aliasque quibus cohærent, valde irretiunt & retinent, ut ab implexu non facile divellantur. Hinc

ex Sulphureis, alia sunt quæ non nisi forti & adurente calore in oleum foetidum, & valde Empyreumaticum urgentur; alia vero pertinacius cohærentia, à destillatione minimè resolvuntur, sed tantum in partes integrales franguntur: adeoque sub specie halitus sicci ascendunt, prout Sulphur commune, Benzoin, Camphora & similia.

Sal præter affinitatem ejus cum *Sulphure*, etiam *Terra* strictissime unitur; quare lapides, & duriora mineralia, ex Sale & Terra potissimum constant. Spiritus mineralium acidi (qui sunt tantum sales destillatione in liquorem resoluti) si capiti mortuo denuo committantur, amplexu arctissimo cohærent, ut igne violentiori opus sit, quo denuo propellantur. Etiam in vitro unio Salis & Terræ adeo strictim peragitur, ut nullo modo divortium patiatur. Sal item facillime in aqua dissolvitur; in ipso etiam aëre humidiori sponte deliquescit: hæc tamen æque facile ab invicem separantur.

Propter hujusmodi combinationes, hæc principia varias appellationes ipsis ex sua natura minus congruas sortiuntur. Etenim sulphur quatenus spiritui associatur, dicitur *purum* & *suave*; quatenus sali *impurum* & *foetidum*; quatenus sali & terræ, *crassum* & *terrestre* appellatur: quando spiritus particulas sulphureas in modica quantitate sibi asciverit, *dulcis*; cum salinas, *aëris*; quando utraque, *amarus* videtur. Sal propter variam ejus cum cæteris elementis, & imprimis cum terra mixtionem, diversimodam mentitur indolem, & multis insignitur nominibus: nam præter *fixi*, *fluidi*, & *volatilisati* titulos, ob hanc rationem *marinus*, *aluminosus*, *nitrosus*, *vitriolicus*, aut alterius generis perhibetur. A nonnullis hujusmodi conjugationes velut totidem diversa principia venditantur, sed omnino perperam; cum sint tantum mixta simpliciora, ex elementis primis conflata; & destillatione resoluta, prosapiam suam palam profitentur. Etenim sales quicunque ab igne in fluorem propulsi, liquores adinvicem maximè affines, nimirum acetosos exhibent: pari ratione spiritus, & sulphur larvas suas exuere, & speciem nativam singulis communem resumere coguntur.

Atque hæc de principiis rerum naturalium eorumque *affectionibus* & *Syzigiis* dicta sunt. Hujusmodi substantias corpori cuilibet inesse (præter Analyses corporum Spagyricè institutas) etiam ex mutationibus & effectis rerum, quæ sponte naturæ contingunt, abunde colligitur. Quando mustum in vinum maturatur, nonne præter liquorem aqueum, Spiritus, pars Sulphurea, item Sal, & terra, sunt gusti, imo oculis nostris conspicua? Etiam cujuscunque plantæ succus digestionem exaltatus, eadem exhibet sincera & veluti distincta: quod *majus* est, res flammæ subjectæ, quando concremari & ferè in nihilum redigi videntur, in hujusmodi particulas secedunt. Præter salem in cinere superstitem, fumus & flamma in fuliginem velut in meteoron concrescunt, in quo *Spiritus*, *Sulphur*, *Sal*, *Aqua* & *Terra* quodam velut mixtionis compendio simul comprehenduntur. Etenim principia activa in fuligine plus quam in alio quovis corpore inanimato abundant.

Quia vero apud nonnullos suspicio quædam inolevit principia hæc nostra præsertim salina & sulphurea maximam partem ab igne produci & nullatenus in mixtis nisi post illius interventum reperiri; libet instantiis quibusdam testatissimum facere rem plane aliter se habere. Circa prius vulgo notum est

est cinerem cujusvis plantæ semel elixiviatum si denuo calcinetur haud quicquam salis exhibere; insuper si concreta destillata liquorem valde acrem aut acidum exhalent, eorum calces minus salinæ existunt, & è contra: h. e. quando sal volatilifatus, aut fluorem adeptus, alembicum ascendat, in capite mortuo eum frustra quæsieris. Quo principii Sulphurei in vegetabilibus existentiam vindices, accipe Guajaci aut alterius ligni ponderosi scobem, illamque retortæ vitriæ inditam sensim prolicias: una cum liquore acido (qui latex salinus est) oleum nigricans (quæ pars ejus sulphurea est) in magna quantitate exhibet. Hanc in corpore destillando prius fuisse & nequaquam *ἐν χερσίν* istius productum extare, hinc constat, quia si alio procedas modo ut Sulphur ante destillandum concreto eximatur, liquor egressus oleositate sua fere privabitur. Quare si ligni hujus scobi spiritum vini affundas, menstruum hoc resinam puram, quæ ipsamet pars Sulphurea est, in magna quantitate extrahet: deinde si scobem residuum aqua communi lotum & exsiccatum in retorta (uti prius) destilles, olei tantum minutulum habebis. Quod verò magis mirandum est, & *somehow* hujusmodi veritatem etiamnum plenius confirmat, Corpora nonnulla quæ Spiritu & Sulphure (utpote maximè volatilibus) penè destituta, sale, terra, & aqua præcipuè constant, in elementa hæc, destillatione facta, segregantur: quibus denuo inter sese confusis, idem numero mixtum, & prorsus iisdem accidentibus insignitum restituetur. V. g. si Vitriolum in furno reverberii destilles, habebis phlegma fere insipidum, seu partem aquosam; deinde liquorem valde acetosum, seu salem fluore potitum, & in fundo residuam terram rubram & grate purpuream: his rite peractis, si liquores duo exstillati capiti mortuo affundantur, idem ipsum calcanthum, quale olim habuimus, eodem colore, sapore, imo & fere pondere iterum reviviscet. Pariter cum nitro, sale Marino, sale Tartari, forsan & Alumine, aliisque Mineralibus, atque eodem successu procedere possis. Ita ut concreta ea, quæ elementis fixis & stabilibus constant, velut automata mechanica, possint in partes dirimi, & rursus statim illæsa machina redintegrari. Verum de principiiis corporum naturalium satis superque dictum est. His modo præmissis rem ab initio propositam (scilicet fermentationis doctrinam) aggrediamur.

CAPUT III.

*Fermentatio quid sit. Ejus divisio quoad subjecta:
& primo de mineralibus.*

Fermentatio est motus intestinus particularum, seu principiorum cujusvis corporis, cum tendentia ad perfectionem ejusdem corporis, vel propter mutationem in aliud. Etenim particule elementares, aut sponte naturæ, aut occasionaliter in motum concitæ, se mire exagitant & exagitantur; invicem diducunt & obvolvunt: Subtiles & magis activæ sese quaquaversus explicant, & avolare nituntur: quæ tamen ab iis crassioribus implicatæ, inter avolandum detinentur. Interim

crassiores ipsæ à subtiliorum nisu & expansione subiguntur plurimum, & attenuantur: donec singulæ ad *æquilibrium* & exaltationes suas erectæ, aut debitam subjectam perfectionem conciliant, aut alterationes, mutationesque à natura designatas complent.

Fermentatio est actio, sive motus mere naturalis: quæque ipsam perficiunt sunt tantum particulæ naturaliter concretis insitæ; tamen quoad subjecta in quibus reperitur variè distingui solet. Atque *Fermentari* dicuntur, vel *res natura*, in triplici familia, *Mineralium*, *Vegetabilium*, & *Animalium*: vel *artis opera*, cum nimirum, ab externo agente activa passivis applicantur. Licet *artificialibus* & *chirotechnicis*, fermentationis vox & consideratio præcipuè debeantur: tamen non abs re fuerit, quædam de *naturalibus* præmittere, ut comparatione ab utrisque facta, hypotheseos nostræ veritas, & certitudo principiorum confirmetur. Verum hæc obiter & sicco tantum pede in hoc loco pertransibo; quia plenior eorum tractatio ad Physiologiam spectat.

Primo, quoad *mineralia*, licet in visceribus terræ fermentatio sit minus conspicua, quam in superficie; tamen facile constat particulas Elementares, seu principia fermentativa, in profundo telluris, velut utero quodam prægnanti, includi: quæ ibidem concreta & strictis amplexibus colligata, mineralium productiones constituunt: soluta autem & in telluris gremio commota, aut sursum exhalantia, meteoron apparentias faciunt.

Mineralium, imprimis duriorum generatio *congelationem* potius, quam *fermentationem* inducit: quia nimirum principia hæc in subjecto quopiam coalescentia figuntur adeo, & tanquam vinculis colligantur, ut se neutiquam movere, aut ab invicem discedere queant. Hujusmodi fixatio præcipue dependet à copia & majori proportionem Salis & Terræ (quandoque cum additione Sulphuris) quàm subest Spiritus aut aquæ. Nimirum Sal & Terra minutissimè confracta, & usque in vaporem resoluta se invicem comprehendunt, & in materiam duram, & non denuo resolubilem obrigescunt: ad eundem fere modum, quo *vitricatio*, necnon *laterum* & *fictilium coctio* peraguntur. Constat enim vitrum ex sale & terra; quæ cum ab igne valde intenso minutissimè subacta fluxorem patiuntur, se mutuo comprehendunt, adeoque strictim & intimè coeunt, ut non in perpetuum resolvantur. Vitrum est fragilius, quam aut ollæ fictiles, aut metalla: quia majorem habet salis quam terræ copiam, quæ in fictilibus & mineralibus uberior est: quorum nonnullis etiam modicum Sulphuris accedit, atque id propter sunt tenaciora & ductilia, prout observare licet in metallis: cum interea lapides, & quæ minus sulphuris continent, sunt fragilia, & ab ictu quovis in partes dissilire apta. In vitricatione pro fusione Salis & Terræ, violento igne opus est (cujus particulæ, ut vulgò dicitur, *Chymicorum pistilla sunt*:) verum intra telluris viscera, pro mineralium concretione talis ab igne fusio non requiritur: quia Sal & Sulphur in particulas simplicissimas naturaliter resoluta existunt: quæ cum terramprehendunt, in metallum, aut saxeam duritiem facile obrigescunt. Reperiuntur nonnulli fontes, qui cum sale primigenio & in minima resoluti scaturiant, corpora quæcumque immersa protinus saxea efficiunt: Etiam ab aura, seu yapore quodam supra terram lato, homines in saxa mutatos, imo totam urbem in substantiam lapideam obriguisse legimus: cujus rei fides penes sit Authores.

Meteora constant ex iisdem quibus mineralia principiis, & eodem fere utero conceptis, verumtamen à concretionem solutis, hinc inde vagis & diversimode fluitantibus: quæ vel cryptis subterraneis inclusa, ibidemque commota, varias fontium scaturigines, aut halituum calidorum ebullitiones producant: vel è terræ specubus exhalantia, & corpusculis aëriis commista, intra Atmosphæræ regionem, nubium, ventorum, aliorumque in terræ superficie aut in sublimi apparentium, diversimodam velut scenographiam inducant: in utrisque principia summe activa sunt imprimis *Sal* & *Sulphur*. *Spiritus* in Meteoris, non secus ac in mineralibus, aut deficiunt, aut in exigua tantum proportionem reperiuntur: nimirum ab his fere excluduntur ob nimis strictam subjecti compagem, quæ eorum motui spatium & commeatum non facile concedit: etiam ab istis abstinent propter laxam & omnino solutam materiæ struem; unde isti, qua valent pernecitate, facile erumpunt, & avolare affectant.

Intra telluris sinum particulæ salinæ usque in vaporem resolutæ, ac dein materia terrestri, aut aquarum dilutione subactæ, fontium & acidularum, quæ Vitrioli, Aluminis, Nitri, modo Ferri, aut Cupri indolem referunt, eruptiones faciunt. Etiam corpuscula sulphurea soluta & simul aggregata, calorem quandoque & lignes subterraneos accendunt; quorum halitibus specus ac cavernas velut ab hypocausto exalefactas, dum latices aquosi pertranseunt, inde fervorem concipiunt, & fontium calidorum scaturigines pro thermis supeditant.

Pariter in mundo hoc visibili, & æthereo, vapores, tum sulphurei, tum salini, diversi generis & naturæ, perpetim exhalant, & per totam aëris regionem diffunduntur. Hinc ventorum diversitas, caloris & frigoris vicissitudines, pluvia, nix, grando, ros & pruina, & quæ sunt hujus naturæ, originem ducunt. Circa particulares horum instantias consulatur clarissimus *Gassendus*; qui in *Philosophia sua Epicuræa*, à Sulphuris & Salium, modo nitrosi, modo Vitriolici, Aluminosi, aut Armoniaci exhalationibus, meteororum fere omnium phænomena eorumque rationes commode diducit.

C A P U T IV.

De Fermentatione, quatenus in Vegetabilibus observatur.

IN *Vegetabilibus* fermentatio adhuc apertius cernitur: dum enim germinant, accrescunt, florent, fructificant, maturantur, declinant, & intereunt, particularum, seu principiorum motus diversos, varias eorundem habitudines, & attemperationes licet observare. Hujus instituti non est singulos horum modos & processus describere. Sufficiat pro explicanda fermentationis doctrina, circa hoc subjectum instantias quasdam præcipuas annotasse.

Quotidiana experientia constat plantas quascunque *ἰγχεῖν* Spagyricæ expositas, in quinque prædicta elementa facili negotio resolvi posse: verum

in aliquibus reperitur major salis copia, in aliis Sulphuris; in quibusdam Spiritus abundant, aqua & terra in plerisque juxta molem & magnitudinem rei proportionantur. Plantæ, in quibus Sal abundat cum mediocri sulphure & exigua Spirituum quantitate, sunt ut plurimum longævæ, grandiusculæ, aut tota hyeme viridescunt; aut licet folia concidant, succum nutritium sub cortice aservant. Cujusmodi sunt quercus, fraxinus, ulmus, buxus, ligna & frutices quavis ponderosi.

In aliquibus cum mediocri Sale & Spiritu abundat sulphur; ut sunt abies, pinus, cupressus, juniperus, hederæ, olivæ, cedrus, myrtus, arbores & plantæ quævis resinosæ: quæ ut plurimum suaveolent & perpetim frondescunt, propter succum, quo nutriuntur, viscosum & minus dissipabilem. In aliis, præter Salis & Sulphuris copiam, etiam Spiritus in majori proportionem reperiuntur, uti sunt arbores frugiferæ, & præcipuè vitis, è cuius fructu succus expressus & fermentatione depuratus, Spiritu admodum turgescit. Hujus item census sunt plantæ pleræque medicæ; item quæ flosculos odoratos & elegantes producant. In quibusdam vero præ cæteris elementis, aqua & terra nimis largâ quantitate luxuriant; veluti in plantis frigidis, & quæ in uberi nimis solo crescunt.

Plantarum *germinatio*, sive ex semine, radice, trunco, aut sponte naturæ ex munda terræ matrice fiat, ad hunc modum contingit. Primum Spiritus intus conclusus à calido & humido ambiente, ac mixti compagem laxante solutus statim avolare nititur: verum à crassioribus reliquorum particulis in fuga detentus, claustra quidem sua magis expandit, & una cum cæteris, quibus stipatur principiis, in longum & latum quaquaversus protenditur: non secus ac si contracta fili bombycini fasciola, in plicas & aperturas huc & illuc diducere-tur. Interim spatiola à dilatatione spiritus relicta, & velut excavata, à materia proxima usque in vacuitates propulsa implentur. Atque ad hunc modum Spiritus architectus, cum sale & sulphure administris, sese usque protendens ad instar limacis, sibi domum, cujus incola est, cudit, & sese dilatando, ipsam dilatat; donec ultimo plantam in debitam molem & figuram à natura destinatam elaboraverit.

Advertere hic libet quod anni tempora pro vegetabilium germinatione, efflorescentia, maturitate, & occasu, magnæ sunt efficaciarum & virtutis. Tota hieme terræ uterus velut obsignatus, fere sterilis existit: etenim particulae spirituosæ quæ cæteras actuare & motuum naturalium velut choreas ducere solent, à frigore hyberno aut fugantur, aut in subjectis suis congelati figuntur. Quare hoc tempore germinatio & vegetatio admodum raræ sunt, nisi quod plantæ quædam anomalæ, quarum spiritus Sale & Sulphure copiosis stipantur, erumpere audent. Vere autem, cum à solis vicinia parum intepescunt terræ viscera, statim mira fecunditate imprægnantur, & πανταρχίας suæ effectus produnt. Nec solum terræ superficies, quin etiam aqua & aër particulis spirituosus ubique turgescunt; quæ velut emortua salis & sulphuris corpuscula resuscitant, ac in motum vindicant. Idcirco præterea quod plantæ germinant, animalium succus & sanguis vegetior, & ad luxuriandum aptior existit. Hoc tempore aves & pisces nidificant, & ova pariunt: etiam in nobis ipsis sanguinem in vasis exundare, & nimis fermentescere habilem perferimus.

Etenim

Etenim substantiâ hac æthereâ tunc omnia sunt plena, & tota naturæ moles velut fermento vivido inspirata, motuum & generationum abunde ferax est. Quinimo principia hæc nostra prius ab invicem separata & dispersa velut copulationis appetitu ducta, mutua ineunt connubia, & infinitis fere conjugis simul maritata, amplissimam rei botanicæ sationem & germinationem faciunt.

Sub initium *æstatis* (& forsan in quibusdam citius, in quibusdam tardius) cum pro statura & magnitudine cujusvis plantæ satis indultum est, jamque ad accretionis *æxulw* pervenitur, naturæ incumbit suum opus perficere, molem adhuc rudem & indigestam concoquere & maturare. Quare principia activa se crassioribus sensim extricant, & versus summities perreptant; ibidem mutuo coalitu reposita, in flores & flosculos efformantur, è quibus tamen (cùm molli & levi textura constant) spiritus & sulphur facile evaporant, ac mixti compages cito corrui. Attamen natura in perpetuitatem cujusque rei sollicita, cum individuum perennare nequit, provida est ne species omnino intereat: quare novas adhuc spiritus, salis, ac sulphuris combinationes, easque firmiores & diu mansuras instituit: Etenim è tota plantæ mole nobiliores & maxime activas particulas segregat, easque cum pauxillo terræ & aquæ simul collectas, in *semina* velut plantæ cujusvis quintas essentias efformat; interim truncus, folia, caules, & reliqua plantæ membra, principiis activis penè orbata, valde depauperantur, ac minoris efficacæ ac virtutis existunt.

Circa *autumnum* post constituta semina (velut pignora in plantæ memoriam relictâ) quæ supersunt Spirituum, Salis & Sulphuris particulæ, jam in vigore seu exaltatione collocatæ, dissolutionem & ab invicem discessum moliantur. Et primo Spiritus cum humore aqueo per fores ab æstivo sole patefactas sensim evaporant, quibuscum puriores Sulphuris partes una iter faciunt: interim sal fixus cum terra, & crassiori Sulphure relinquitur. Quare in plerisque folia hoc tempore decidunt, & quorum tenera & levis est compages, principia in totum dissipantur, atque truncus, & caules una cum radice penitus emoriuntur. In nonnullis post semina cum frondibus decidua emarcescunt caules; interim principia, quæ sequenti Vere plantam redintegrare valent, in radice asservantur.

Etiâ incumbente *hyeme*, facies rerum omnino mutatur; elementa, quæ *vere* invicem conjungi, & innubere affectarunt, nihil magis quam divortia quærunt. Spiritus à plerisque rebus aufugiunt, & æthereas in auras emigrant; interim salis & sulphuris particulæ velut torpidæ, & consopitæ jacent. Nec tantum vegetabilium, verum & plurium animalium corpora totâ hyeme velut emortua relinquuntur, donec à spiritu cum verno sole reduce iterum in vitam resuscitantur, & quasi de novo animantur. Sed levi hac de Plantarum vegetatione ratiocinatione facta, erit modo opportunum, ut ad fermentationem, quæ circa animalium partes & humores observatur, ex præstituta methodi nostræ lege transitum faciamus.

CAPUT V.

De Fermentationis observandis circa animalia.

A Nimalium corpora principiis supradictis constare adeo certum est, ut probatione non indigeat. Etenim Spiritu, Sale, & Sulphure ita copiose turgent, ut eorum particulae sensui sint obviae: quare & motu rapidiori agitantur, & praestantiores vitae sensus, & caloris functiones subjectis quibus insunt, elargiuntur. Nimii esset laboris & tædii singulos hic fermentationum modos & processus describere. Prima vitae initia à Spiritu in corde, velut punctulo quodam fermentescente ducuntur. Hujus motus non ut in vegetabilibus, lentus est & insensibilis, & tantum ab incrementis dignoscendus, sed statim rapidus & oculis conspicuus: quippe Spiritus à puncto saliente (velut à carceribus) citatus, & cruoris vehiculo potitus, celeriter excurrit; in densa mole cui includitur pro excursu suo sibi spatia excavat; cumque exsiliens penitus avolare nequeat, alia statim via in retrocessum cogitur. Cordi denuo redditus fermentescit magis; quare & excursus sui spatia ulterius protendit, inde & recursus viam aequae facile excavat; atque hoc ritu pro circumvehendo sanguine, arteriae & venae, tanquam canales aut rivuli, per omnes corporis partes cuduntur: & ex tali motus vicissitudine seu reciprocatione, vita animalium dependet: quam ut natura diutius conservet, posuit in corde fermentum cujus instinctu, seu occurso sanguis impetuose effervescent, ac velut in flammam accensus, deflagratione sua caloris effluvia quaquaversus diffundit: etenim à fermentatione, seu accensione quam sanguis in cordis sinu patitur, quamplurimae spiritus, salis, & sulphuris particulae, è laxata ejus compage erumpere nituntur: quibus admodum rarefactus, & instar aquae super ignem ebullientis citatus ac effervescent cruor, non sine tumultu & insigni turgescencia per vasa deferretur. De fermentatione sanguinis tum naturali, tum febrili, essent hic plura dicenda; nisi quod in peculiarem tractatum (ubi de febribus ageretur) hujus considerationem reservamus.

Præter hoc fermentum in cordis foco constitutum, è quo sanguinis motus & effervescentia plurimum dependent, sunt & alia diversae indolis passim in visceribus recondita, quorum ope & chylus (qui est sanguinis rudimentum,) & spiritus animalis, ejus quinta essentia, rite elaborantur. Sunt etiam alia, quae sanguini perficiendo, in alios liquores transmutando, ipsumque à materia excrementitia liberando inserviunt: singulis horum insistere, esset à methodo proposita nimis longè aberrare, & in messem alienam falcem immittere: quare tantum instantias quasdam selectas, quae fermentationis doctrinam illustrent, hoc in loco subjiciam.

Chyli in *ventriculo* coctionem, ratione *fermenti* cujusdam *acidi* fieri, vulgo receptum est: tale quoddam subesse testantur ructus acidus in eupepsia; ejus privatio in apepsia, febricitantibus, dysentericis, &c. ejus restitutio, convalescentiae signum: quibus addi potest hæc observatio. Medicamenta chalybeata ore sumpta paulo postea nidorem excitant in gula sulphureum, velut

si ova ad duritiem cocta fuerint comesta : quod omnino fieri videtur à fermento acido ventriculi , ferrum corrodente. Siquidem spiritus vitrioli limaturæ chalybis inspersus talem excitat odorem sulphureum & foetidum. Dicunt nonnulli hoc fermentum à liene stomacho inspirari ; quod tamen quo ductu fieri possit , observatione Anatomica nondum constat. Non improbabile videtur, hoc fermentum ventriculo implantari : ut si tantum chyli confecti aliquod residuum , quod plicis ventriculi infigatur , ibidemque acescens , fermenti naturam induat : non secus ac portio massæ frumentacæ fermentatæ & ad acorem servatæ, pro conficiendo pane fermentum satis idoneum evadit. Pariter hujusmodi humor acidus ex alimentis paratus , & in ventriculo diu congestus , alimentis coctionem & subactionem promovet. Acida enim, quæ sale ad fluorem evecto refertissima sunt, corporibus tum fermentandis , tum dissolvendis optime conducunt : quare hujus actione sal & sulphur , quibus esculenta abunde scatent, in ventriculo confringuntur , & in partes minutas rediguntur. Chylus hoc modo fermentatus colorem lacteum acquirit , propter particulas sulphureas una cum salinis dissolutas , & fermento acido commistas. Si enim liquori cuilibet , aut sulfure, aut sale volatili imprægnato humorem acetosum confundas , illico lactescit , uti cernitur in præparandis lacte sulphuris , aut extractis vegetabilium resinosis. Quin & spiritus cornu cervi, aut fuliginis, sale volatili plurimum refertus , si liquori acido vel aquæ simplici confundatur , colorem lacteum acquirit.

De fermento hoc in ventriculi plicis recondito notare libet , quod se variis habet modis, & diversa ratione immutat alimenta : nam licet in constitutione sana sit mediocriter acidum , & sali ad fluorem evecto vim & energiam suam præcipuè debeat , tamen non raro à laudabili hoc statu deflectit, & acoris aut nimium, aut debito minus in se continet ; in priore casu ubi sal acetosus dominatur, ingesta quælibet (partibus salinis ad fluorem evectis, reliquisque perperam subactis) statim coacescunt , uti in affectibus hypocondriacis sæpissimè contingit : ex adverso ubi principia volatilia primas obtinent (ζυμώσις præpropere instituta) chyli partes sulphureæ derepente , & quasi raptim exaltantur ; salinaque incoctæ in bilem transeunt ; quod πικρόλοις passim accidit. Qui ergo ventriculum habent posteriore modo affectum , cibis dulcioribus pinguibusve sumptis, gustu amaro & bilioso tentantur ; interim qui contrariam patiuntur diathesin , alimentis licet simplicissimis comestis , ructus nidosos atque acidus ubertim emittunt ; revera simili ritu videtur hoc evenire , ac quando massæ frumentacæ florum cervisiæ quantitas paulo uberius apponitur ; hinc enim parta insigniter amarescit : aut quando ejusmodi massæ, fermenti austeri (sive *levain*) portio debito major adjicitur ; hinc enim panis acorem ingentem contrahit.

Prout sanguis in corde & vasis appensis , chylus ventriculo ; ita spiritus animalis in *cerebro* elaboratur , cujus origo & motus admodum in occulto sunt. Nec enim liquido constat de spiritu animali , quali artificio paretur ; nec per quos canales , ictu oculi citius , ad distans feratur. Videtur autem mihi , quod cerebrum cum Calvaria superobducta , & nervis appensis , repræsentet capitellum , seu Alembicum vitreum , cum spongia imposita, quo pro spiritu Vini summe rectificando uti solemus : equidem sanguis è

cordis foro, cum effervescencia rarefactus, ad caput deferitur; non secus ac spiritus vini in cucurbita ebulliens, ac in vaporem resolutus, in alembicum elevatur; ubi, spongia per totam foraminis aperturam obducta, spiritus solum penetratiores & valde subtiles transmittit, ac in rostri decubitum deducit: interim particulas crassiores remoratur, & à transitu prohibet. Non absimili modo, sanguine in caput delato, spirituosæ, volatiles, & subtiles ejus particule à calvaria ejusque meningibus, velut ab alembico, intus coercitæ, à spongiosa cerebri substantia imbibuntur; ibidemque in majorem nobilitatem evectæ, in nervos, velut totidem rostra huic appensa, derivantur. Interim crassiores sanguinis particule ab ingressu prohibitæ, circulationi remandantur: spiritus vero summè agiles, & subtiles, minimos & vix omnino patentes cerebri & nervorum porulos subeunt, eosque mira pernecitate perreptant. Etenim pro spiritu animali talibus solummodo receptaculis & canalibus opus erat, in quibus nullæ, aut saltem exiguæ essent cavitates & foramina; secus ab eorum sequela & concomitantia non excluderetur sanguis, aut excrementitii humores. Præterea item, si spatiis nimis apertis & laxis discurrant hi spiritus, facile dissipati avolarent: quare, cum fistula opus sit pro transmittendo sanguine, aut latice seroso; spiritus vini per secretos fidium aut corii ductus satis rapide transcurrit. Nec tantum pro secernendis subtili à crasso, puro ab impuro, constrictior cerebri & nervorum compages inservit: quin & liquor iste spirituosus & subtilissimus, à sanguine velut exstillatus ulteriorem adhuc perfectionem in cerebro nanciscitur: illic enim fermento quodam inspiratur, quo adhuc magis volatilifatur, & pro obeundis motus & sensationis muneribus idoneus redditur. Quippe cerebri substantia sale volatili abunde refertur, qui pro acuendis & subtiliandis spiritibus plurimæ virtutis existit: quare spiritus fuliginis, aut cornu cervi, longe penetrantior est quam spiritus vini.

Vasa seminalia, & *partes genitales* particulis fermentativis adeo turgent, ut nihil magis. Videntur hîc spiritus, sal, & sulphur simul compacta, & summe exaltata in semen, velut in elixirem nobilissimum redigi. Activa hujusmodi principia non tantum in utero pro fœtu efformando fermentescunt; quin & vivo velut fermento, per universum corpus totam inspirant sanguinis massam, ut volatilifetur magis, & acrius effervescat. Quare in fœminis, à fermento uterino se recte habente, facies colore florido & eleganti suffunditur, calor vegetus, & copiosus existit; insuper cruoris massa nimis luxurians, quovis mense catameniorum fluxu depleri necesse habet: cum autem deficit hæc ab utero fermentatio, fiunt tum virgines, tum mulieres pallidæ, ac velut exsanguæ, anhelosæ, & ad motum quemvis ineptæ. Etiam in viris à fermento seminali caloris abundantia, vires robustæ, vox sonora, & virilis barbæ & pilorum eruptio accedunt: propter hujus defectum effœminantur viri, scilicet vox gracilis, calor debilis, & *desperatio barba* inducuntur.

Quandoquidem de fermentis agitur, quæ in corpore animali reperiuntur, erit hic opportunum inquirere, quis sit usus *lienis*, de quo à quibusdam omnia bona dicuntur; ut sit velut alterum hepar, & sanguificationi, pro visceribus ventris inferioris, inserviat: ab aliis usus vilissimi reputatur, ut sit tantum cloaca sive sentina, in quam fæculentiæ sanguinis rejiciuntur. Ratione stru-

Eturæ ejus, hujusmodi conjecturam facimus: quoniam arteriæ huic sanguinem conferunt, & venæ referunt, nec importatur aliud quidpiam, nec extra convehitur; cumque substantia ejus sanguine atro & stagnante usque repleatur, videtur quod sit veluti promptuarium pro recipienda terrestri, & limosa parte sanguinis, quæ postea in fermenti naturam exaltata, effervescentiæ gratia sanguini remandatur. Quare dum sanguis per arterias advectus lienem subit, ipsi detrahitur quiddam, scilicet particulæ limosæ & terrestres, quæ sunt cruoris velut fæx, & caput mortuum; ut hac ratione tota cruoris massa à succo melancholico, seu atra bile liberetur: quæ in liene, non secus ac flava bilis in hepate, secernitur: quare lien plerumque est atrii aut lividi coloris, propter faculentias illic depositas. Cum vero hic succus in liene repositus, non sit omnino inutilis, sed ob copiam salis fixi sit valde fermentescibilis naturæ; non statim, ubi bilis, in cloacam rejicitur, sed ulterius in liene coquitur, & exaltatus in fermentum abit, quod denuo sanguini commissum, eius motum & volatilisationem promovet. Quare ut sanguini per arterias lienem ingresso aliquid detrahitur, scilicet crudus melancholiæ succus: sic eidem per venas refluxo aliquid continuo additur, scilicet idem succus excoctus & in fermenti naturam exaltatus. Non secus ac Chymici inter destillandum, ut liquor optimus fiat, partes subtiles & spirituosas à capite mortuo destillando segregant, ac dein ipsi reaffundunt: atque hoc opus toties repetunt, donec caput mortuum crebra destillatione volatilifetur, & liquor secundum omnes suas particulas rite exaltetur. Quod hujusmodi sit lienis usus, indicium est: quia viscere hoc male affecto, sanguis aut fermentescit nimis, ut in affectibus scorbuticis & hypochondriacis: aut si lien sit obstructus, vel scirrhuso tumore obsessus, sanguis idonea fermentatione destituitur, atque hydrops, cachexia, vel tympanitis inducitur.

Prout sanguinis partem terrestrem & limosam, quæ ex terra & sale fixo imprimis constat, in liene secretam, illic in fermentum evadere asserimus: ita non improbabile videtur, quod etiam sanguinis pars adusta & velut ignea, scilicet *flava bilis*, quæ ex sale & sulphure præcipue consistit, in hepate secreta, ac inde ad intestina transmissa alicui fermentationis usui inserviat. Hæc enim chylo, è ventriculo ad intestina delapso, permista ipsum illic effervere & turgescere facit: quo & particulæ elementares minutius subigantur, ac propter rarefactionem sive intumescentiam, pars purior pro succo nutritio, in vasa lactea exprimatur.

Nec tantum ratione fermentorum *nascimur aut nutrimur*, sed & *morimur*: quilibet morbus virtute fermenti cujusdam suas excitat tragœdias. Etenim sanguinis pars sulphurea & spirituosa, nimis evecta, instar vini efferventis, immodice in vasis ebullit: & exinde febres diversi generis & naturæ accenduntur: aut interdum cruoris pars salina, nimis evecta fluorem patitur, indeque sanguis acidus, austerus, quandoque & acris factus, variis coagulationibus aptus est: è quibus scorbutus, hydrops, nephritis, lepra & morbi plerique chronici oriuntur.

Quin & *morborum curationes* fermentationis ope molimur: etenim pro tuenda aut recuperanda hominis sanitate, Medici fere idem est ac Oenopolæ officium: sanguis & humores, æque ac vina, in æquabili temperie, & fermenta-

tionis motu conservari debent. Quare cum sanguis nimis effervesceat, non secus ac vinum, è vasis depleri, ejusque fervor attemperantibus demulceri solet. Si quid extraneum aut heterogeneum ipsi confunditur, ni sponte effervesceat illud foras eliminari, pharmaca purgantia, vomitoria, diaphoretica, sanguinem & humores exagitando ac fundendo, seclusionem ejus promovere: si quando sanguis depauperatur, & minus quam par est effervesceat, cardiaca, digestiva, & imprimis chalybeata ejus vigorem & fermentationem restitunt: non secus ac vina acescentia, aut in vappam degenerantia, faci opulentiori, quo de novo turgescant, committuntur. In promptu esset intentiones curativas, necnon pharmaci cujusque effectus & operationes juxta fermentationis doctrinam explicare: verum huic rei meditationem particularem destino, cui aliquando perficiendæ (annuente Deo) seriam operam, reique medicæ (viti spero) non prorsus inutilem, impendere constitui.

Hactenus in spatioso naturæ campo digressi, *fermentatione* plena omnia conspeximus; nec tantum in partitis mineralium, vegetabilium, ac animalium provinciis, hujus motus & effecta cernimus: quin & simul universus sublunarium mundus videtur quasi una & eadem moles, particulis fermentativis per totum confita, & valde prægnans; quæ in qualibet ejus regione & angulo, tanquam in molecula sua formicæ, in perpetuo versantur motu & agitatione; huc & illuc circumvolitant; modo sursum, modo deorsum rapiuntur; sibi invicem varie occurrunt, associantur, & rursus discedunt; continua vicissitudine diversa ineunt conjugia, & patiuntur divortia, ex quibus rerum ortus, interitus, & transmutationes dependent. Nec solum in telluris gremio, at mediis in undis, horum corpuscula abunde scatent; sed imprimis per totam æris Atmosphæram, densa congerie diffunduntur. Satis est hoc in loco exempla quædam verbo annotasse: plenior eorum speculatio non est hujus instituti. Tempus est ut à *Physicis* ad *artis opera* perveniamus.

C A P U T VI.

De Fermentatione, quatenus in artificialibus peragitur.

IN operibus artis tam varius & multiplex cernitur fermentationis apparatus, ut sit omnino impossibile singulas enumerare species, aut diversas hujus instantias ad certas classes, aut distributionis capita revocare. Nos methodi sequentis filo utentes, exempla (quæ nostræ observationi constant) aliquot insignia subjiciemus, ad quorum normam alia pleraque explicari possunt.

Circa fermentationem, quæ in subjectis manu aut industria humana tractatis peragitur, *hæc tria* sunt imprimis consideranda:

Primo, Cujus naturæ & compositionis sint corpora ad fermentescendum maxime idonea, & quæ ad hoc sint minus habilia.

Secundo, Qualia sint circa fermentationem requisita: nimirum quæ motum ejus in subjecto quovis aut promovere, aut etiam inhibere solent.

Tertio,

Tertio, Quotuplex sit fermentationis motus, ejusque finis: necnon quæ sunt effecta & alterationes quæ ipsam consequuntur.

Quoad primum, ut corpora quævis (*cum tendentia ad perfectionem*) rite fermentescant, requiruntur:

Primo, Ut sit *partium laxitas & disjunctio* quædam: scilicet expandi, aut à loco in locum particulæ fermentativæ commigrare nequeunt: quare in compactis, durioribus, viscosis, nimium excoctis, ad spissitudinem aut siccitatem evaporatis, fermentatio non succedit. Quæ sunt liquida, ut vinum, cervisia, fructuum & herbarum succi, facile & cito turgescunt: proxime his, quæ molli, licet crassiori, consistentiâ sunt prædita, uti panis, esculenta pleraque, & compositiones medicamentosæ.

Secundo, Requiritur ut sit *partium heterogeneitas*, seu principiorum simul omnium *confusio*: nimirum ut particulæ aliæ alias oppugnent, & in motum exagitant. Corpora enim simpliciora, in quibus unicum, aut ut plurimum bina præpollent Elementa, cum exigua reliquorum proportionem, sunt ad fermentescendum inepta: quippe particulæ consimiles, sive elementa symbolica, torpida & quæta jacent. Inter dissimiles vero pro dominatione statim lis exoritur, & aliæ alias in motum provocant.

Tertio, Erit *tertia* conditio, ut in corpore fermentando nec sit *partium cruditas* nimia, nec *maturitas*. In priore, particulæ activæ & subtiles non facile crassioribus extricantur, neque in motum vindicantur: uti constat in succis quide fructibus immaturis exprimuntur: item in cervisia, quæ ex hordeo crudo, & non germinante paratur. In posteriori, particulæ nimis volatiles factæ, mixtionis vinculo non continentur, quin evaporant statim, & subjecta sua versus putredinem disponunt. Quare succus è fructibus horaribus aut aliis nimium maturis expressus non facile in vinum transit, quin cito corrumpitur. Atque ob hanc rationem sanguis extravasatus, lac, & urina non fermentescunt, sed putredinem brevi subeunt.

Quod erat *secundo* propositum: plures sunt modi quibus fermentatio aut *promoveatur*, aut *sistitur*. Primus & præcipuus erit, *fermenti cujusdam* corpori fermentando adjectio; cujus particulæ, cum prius sint in vigore & motu positæ, alias in massa fermentanda otiosas & torpidas exsuscitant, & in motum vindicant. Est autem fermentum duplex; vel Absolutum, quod est ejusmodi corpus, in quo particulæ activæ simul omnes in vigorem collocatæ, insigniter in motu sunt; adeoque dum subjecto fermentando committuntur, alias ibidem particulas cujusunque generis prius inertes, secum in motum rapiunt: hoc modo flores cervisiæ, ova conquassata, & similia fermentationem fere ubivis concitant. Vel est fermentum Respectivum, quod nimirum constat particulis ut plurimum unius generis, quæ in massa fermentanda aliis alterius generis occurrentes, cum ipsis effervescent, adeoque in mixto partium simul omnium turgescuntiam producant. Hoc modo particulæ salinæ fluorem adeptæ, cum aliis salinis aut fixis, aut alchalisatis, valde effervescent; uti constat cum liquores acetosi coralliis, c. cervi, conchyliatis, necnon ferro affunduntur: etiam cum spiritus vitrioli & sal Tartari invicem committuntur, magna ebullitio excitatur.

Sunt etiam *accidentia* quædam & *circumstantiæ* externæ, quæ fermentationis

motui aut ciendo aut cohibendo varie conducunt : cujusmodi sunt imprimis, *aëris ambientis conditio*, & corporis *fermentandi repositio* & *asservandi ratio*.

Aër Austrinus (in quo particulae calidae & humidae passim scatent, quae etiam corpora quævis facile subeunt, fermenti vim & vicem obtinent,) plerisque rebus insignem fermentationis motum imprimit : quare in liquoribus potulentis, non modo primum effervescentiae impetum suscitatur, sed & diu fermentatis novas turgescencias inducit. E contra, aër gelidus & *Borealis* corpora *constipat*, & plurimum *constringit* : in rebus plerisque Elementorum *fusiones & fluores impedit*, ac saepe fermentationem aut concitandam impedit, aut inceptam cohibet. Aër item æstivus, quia principia activa nimis exagitat, spiritus & partes subtiles fugat, salinas & sulphureas in fluorem exaltat, adeoque motum eorundem æquabilem pervertit, ac vel sulphure vel sale nimium evectis, ranciditatem aut acorem corporibus facile accersit, fermentationis negotiis quamminimè favet.

Vulgo increbuit opinio, quod selecta quædam anni tempora, ea nimirum in quibus vegetabilia cujusque generis florent, in succis aliisque eorundem præparatis (cum longe prius deferbuerint) fermentationis motum de novo inducant, ita ut cervisia quando hordeum, & vina quo tempore vitis efflorescit, turgescencias denuo concipiant : item ferunt panem & amyllum, quando triticum in flore est, solito citius mucida evadere : necnon maculas à succis fructuum mori, aut oxyacanthi, rubi, & similium, pannis affixas, solum eo tempore, quo fructus isti maturari solent, elui posse. Super his ingenue fatebor, me nondum observatione propria in tantum profecisse, ut in utraque parte aliquid pro certo affirmare audeam : sicco ergo pede transeo; de dubiis (ne dicam falsis) philosophari piget pudetque.

Circa corporis *fermentescantis repositionem*, hæc sunt præcipue observanda. Cum res primò fermentescere incipiunt, ne vasis nimium constrictis occludantur; neque dum incalescunt liquores, in utribus aut dolio reponantur. Etenim particulae primo turgescences, & velut rarefactæ, satis amplum desiderant spatium : quare in vasis apertis & patentibus, vini aut cervisiae fermentatio inchoatur; cum vero parum deferbuerint ejusmodi liquores, ne particulae in motu collocatae aut exagitentur nimis, aut à subjecto avolent, in cella frigida & vasis occlusis optime servantur. In præparatione aceti contrarium observamus; solet nimirum in loco calido prope hypocaustum collocari, aut etiam radiis solaribus exponi; nimirum ut spiritu vinoso depresso, pars salina in fluorem exaltetur, adeoque aciditatem liquori conciliet. Erit altera observatio, quod liquores in vasis ligneis, melius quam in vitreis aut lapideis fermentescunt. Etenim è ligno imprimis quercino, corpuscula quædam salina longâ infusione educuntur, quæ fermentationem promonent.

Quoad tertium super hac re propositum, licet proprie loquendo, fermentationis motus sit tantum principiorum una confusorum, à *cruditatis statu* versus *maturitatem erectio*, ejusque finis sit rei cujusque ad *perfectionem tendentia*: tamen usus obtinuit, ut vocabulum hoc plerisque aliis motibus rerum naturalium attribueretur, & fines alios, & effecta longe diversa includat. Cum igitur in corpore quocunque particulae fermentativæ insigniter in motu sunt, alterationes quæ exinde sequuntur, ad *tres hæc classes* quodammodo referri possunt.

Primo,

Primo, vel spectatur partium ejusdem corporis *exaltatio & perfectio*, aut eandem *resolutio & corruptio*.

Secundo, vel intenditur partium alterius corporis *dissolutio*, aut solutarum *precipitatio*.

Tertio, ab hujusmodi principiorum motu & actione, partium modò ejusdem, modò diversorum corporum, *coagulatio*, vel etiam *congelatio*, inducuntur. Restat, ut singulas hasce motuum naturalium species, & fermentationis modos breviter percurramus.

CAPUT VII.

De Fermentatione quatenus in corporum exaltatione, & tendentia ad perfectionem spectatur.

Partium *exaltatio* optimè cernitur in operibus aut rebus quibuscumque humano usui dicatis, quatenus à fermentatione majorem perfectionem & vigorem adipiscuntur: ut sunt imprimis alimenta & medicamenta. In plerisque horum particulas *spirituosas* præ cæteris evehere, adeoque saporem pergratè dulcem, aliasque qualitates blandiores mixto conciliare studemus, uti in pane, cervisia, vino, pomaceo, & multis aliis observare licebit: in quibusdam vero partem *salinam*, spiritu nonnihil depresso, exaltare molimur, uti in aceto, hydromelite, jusculis, necnon muria & garo, seu condituris quæ è sale aut liquoribus acetosis constant. Partem *sulphuream* rarò ex industria præ cæteris evehimus; hinc enim foetor & ingrata ranciditas esculentis advenire solent. Inter alimenta humanis usibus dicata, *panis*, *cervisia*, *vinum* & *pomaceum* primas obtinent: quæ fere quicquid habent virtutis, aut vigoris, fermentationi potissimum debent.

Circa *panificium* hæc sunt præcipuè observanda: farina triticea, hordeacea, aut alijs generis, cum aqua communi subacta in massam redigitur postea in clibano coquendam. Huic si nihil præterea addatur, protinus gravis, & ponderosa instar luti, viscida, saporis ingrati, & coctionis difficilis evadit: Sin fermentum, inter subigendum adhibeatur, massa protinus effervet, mole intumescit, ac postea cocta fit levis, spongiosa, εὐπερίη, & comestui grata. Si discriminis ratio inquiratur, ita se habet. Frumenti farina, spirituum, necnon salis & sulphuris proportionem mediocri imbuitur: horum vero particulae in massa cum aqua subactæ viscosa humiditate obruuntur, adeo ut se invicem non exagitant, nec in motum exerant: quare inter coquendum humiditas quædam superflua evaporat: quod reliquum est, tenax, viscidum, instar luti compressum, & ponderosum existit. Cum vero massæ farinaceæ fermentum admiscetur, particulae activæ fermenti prius in motum exertæ, consocias suas in massa farinaceaprehendunt, & secum in motum vindicant. Hoc ritu, dum aliæ alias exagitant, brevi omnes in fermentationem concitantur: hinc illinc tumultuantes totam permeant & pervadunt pastam, partes viscidas & terrenas subtiliant & attenuant, motuque suo massam attollunt, & foraminulis excavant: quæ

tamen

tamen interea, ne spongiosa nimis evadat, & quo partes excavatæ & attenuatæ exactius misceantur, longa subactione pinsatur: deinde postea, antequam cesset fermentatio, & partes excavatæ denuo subsidant, debet statim in clibano coqui. Inter coquendum humiditas superflua evaporat, & præterea quamplurimæ spiritus, & sulphuris particulæ avolant: quare massa levior & minus ponderosa existit: interim quæ in pane subsistunt, exaltatæ admodum, & ad maturitatem evectæ, consistentiam ei laudabilem, cum sapore & odore grato conciliant.

Fermentum vulgò usitatum, est vel *portio massæ fermentatæ* farinacæ, & incoctæ, quæ sale imbuta ad acorem servatur: (dicitur *levain* Gallice, quia massam attollit.) Vel *flo-is cervisiæ*; aut horum defectu, *cervisiæ faces*; aut *ova conquassata* adhibentur. In fermento farinaceo particulæ salinæ fluorem adeptæ imprimis emicant: sic etiam in cervisiæ facibus. Quare panis ab his fermentatus, fit austerus, & nonnihil acescens: interim cervisiæ flores spiritu plurimum turgidi, panem potentius fermentant, ac massæ levitatem & dulcedinem pergratam conferunt. Ova conquassata, cum spiritu & sale volatili abundant, panem adhuc ulterius fermentescere faciunt, ipsumque magis spongiosum reddunt: possent proculdubio alia fermentorum genera adhiberi; quæcumque enim vel spiritu turgescunt, aut sale in fluorem evecto abundant, in hunc usum satis idonea videntur.

Interdum massa farinacea cum materia sulphurea, prout butyro, sevo, pinguedine, aut similibus subigitur; quæ in clibano coacta, dum incalescit, levis & spongiosa videtur, (scilicet dum particulæ sulphuræ à calore in clibano contracto in motu servantur;) postea cum frigescit hæc massa, gravis, ponderosa, & valde compressa existit: scilicet calore ascititio exhalato, particulæ sulphuræ evectæ denuo subsidunt; cumque reliquorum particulæ non fuerunt in motum concitæ, ideo massa velut infermentata evadit: etenim in ejusmodi subjectis particulæ sulphuræ, quia plurimum viscosæ, reliquorum motum impediunt, nec diutius quam à calore actuali urgentur, ipsæ in motu persistunt.

Panis interdum paratur ex *farina tritici* aut *hordei germinantis*, qui sine adjecto fermento adeo nimis effervesceat, ut in massa compacta contineri nequeat, quin inter coquendum latè diffuat: cujus ratio est, quoniam in tali frumento, à germinatione ejus principia activa prius in vigore, & exaltatione sua posita sunt; quare in massa subacta, cum à calore clibani urgentur, inordinate excurrunt, & partes crassiores sibi obstantes impetunt, ac velut in præceps deturbant. De panificio dictum est satis: modo ad cervisiæ transeamus.

Cervisia paratur ex *Brasio*, seu *hordeo germinante & tosto*, quod ad hunc modum conficitur: Primo hordeum aquæ communi per tres dies ad intumescentiam infunditur, deinde (aqua effusa) super aream siccam in acervum reponitur, movendo semel, bis, aut ter in die, ne incalescat nimis, donec germinare incipiat & leves radicum surculos emittat. Postea, crebra agitatione, ab ulteriori germinatione prohibetur, & postremo, furno superimpositum ad tostionem exsiccatur; hoc modo paratum, farinam mire dulcescentem exhibet.

Hujusmodi processus hæc est ratio : Hordeum germinare permittitur ut principia ejus activa in vigorem, seu exaltationem collocentur; cum enim germinat, spiritus, sal, & sulphur prius sopita & inertia, una turgescunt, & ad vires suas statim exerendas, ceu veterno excusso, accinguntur. Reliqui apparatus hordeum ab ulteriori germinatione prohibent, ne principia ejus plurimum laxata nimis exhalent, & è subjecto avolent. Farina hordei sic parati dulcescit, quia principia activa, velut in fructu ad maturitatem perducto, in exaltatione constituta sunt; quare & liquor hac farina imprægnatus, particulis spirituosis, & fermentativis valde turgescit; cum simplex hordei decoctum vix omnino fermentescit, nec diu servatur, quin mucidum & insipidum evadit.

Cervisia autem ad hunc modum conficitur. Super farinam hordei modo supradicto parati aqua cocta funditur, & per aliquot horas macerari sinitur, ut particulis activis hordei germinantis jam in vigore positis, sufficienter imprægnari possit: liquor hic saturatus è magmate subsidente clarus educitur, & denuò coquitur, ut consistentiam nonnihil crassiorem, & diutius persistibilem nanciscatur: dein, cum parum refrixerit, fermento, aut floribus cervisiæ adjectis fermentatur, ac in dolium reponitur. Circa fermentationem ejus hæc sunt præcipuè observatu digna.

Si diutius quam par sit cum farina hordei maceratur, liquor evadit crassus, & mucilaginosus, & postea vix omnino fermentescit: hujus ratio est, quoniam principia activa in hoc opere prompti sunt motus, & una secum particulas terrestres agitant; quibus si, longiori mora, meatus & pori liquoris implentur, nimis saturati penitus obstruuntur, & velut in stomacho ad crapulam saginato contenta vix omnino fermentescunt.

Si calidus nimium, aut frigidus in dolium reponatur liquor, pariter in tempestate æstiva præfervida, aut hyemis gelida, fermentatio non ritè succedit; etenim à calore nimio particulæ ab invicem dissipantur, ne se mutuo prehendant, adeoque exagitent; à frigore nimis constipantur, & figuntur, ut vix motum ineant, nedum strenuè absolvant.

Cum cervisiæ liquor in dolio fermentescit, particulæ activæ se quaquaversus explicant: crassiores & terrestres, partim veluti in fugam actas ad fundum præcipitant: partim ipsis adhærentes, veluti captivas, ad summitatem deducunt, ibidemque in bullas continuo succrescentes excavant, & quasi in servitutem asserunt. Post debitam fermentationem tota liquoris intercapedo clara & defæcata redditur, in qua spiritus, cum mediocri sale & sulphure, luxuriant: interim in fæce subsidente aliquantulum spiritus & sulphuris, cum sale & terra copiosis, remanet. Quamdiu vero hoc in loco res fuerint, liquor defæcatus dulcis & spirituosus existit: sin diutius servatur, aut non strictim dolio includitur, spiritus magna ex parte avolant: interim ab horum defectu particulæ salinæ exaltatæ, & fluorem adeptæ totum liquorem imprægnant, ipsumque acescere faciunt; cum enim cervisia, aut etiam vinum in acetum transeunt, non ideo contingit, quia spiritibus omnino privantur (sic enim in vappam degenerarent,) sed quoniam partes Tartaræ, sive salinæ, ad fluorem evehuntur, & acore suo liquorem inficiunt, interim spiritus potentiâ minores deprimuntur, ut iis resistere nequeant. Tempestas præ-

fervida, tonitrua, bombardarum sonitus, aut insolatio sub dio, cervisiam subito coascere faciunt: etenim his modis spiritus motu suo æquabili exturbati dissipantur, ac interea partes salinæ, seu tartareæ, prius secretæ & depressæ, commoventur, ac in fluorem evehuntur.

Quod revera in *aceto* partes spirituosæ non destruantur penitus, sed tantum deprimantur, interim salinis in fluorem collocatis, liquido constare videtur; quoniam ex aceto liquor ardens & fragrantissimus, instar spiritus vini, exstillari potest ad hunc modum: Cum aceto destillato è minio, seu plumbo calcinato sal extrahatur; cuius si copiam habueris, & in retorta destillaveris, spiritus vinosus & ardens in receptaculum propellitur; cuius ratio est, quia cum aceti salinæ particulæ cum sale plumbi uniuntur, spiritus vinosi adhuc superstites denuo liberantur; & sui juris facti, è latebris illorum vi caloris urgentur: isti autem spiritus à plumbo minimè procedunt; quia si ignem vehementiorem adhibeas, sal plumbi denuo in metallum liquatur.

Verum, unde digressi sumus, ad cervisiam revertamur; cui quanta perfectio à fermentatione accedat, hoc experimento constat. Si accipias cervisiam recens confectam, nec adhuc fermentatione depuratam, ac in vesica, aut cucurbita destillandam exponas, tantum aqua vappida, spirituum & vigoris omnino expers ascendet: si cum cervisia ritè fermentata eodem modo procedas, aquam ardentem & valde spirituosam habebis. Atque hinc tollitur objectio nonnullorum, qui aquam farinâ Brasii modo imprægnatam, amplius decoqui prohibent, ne spiritus exhalent; quoniam spiritus ante fermentationem crassioribus reliquorum particulis adeò obvolvuntur, ut è concreto minimè erumpant.

Quo cervisia Brasii farinâ magis imprægnata fortior existit, eo diutius sine acescentia servatur; hujus vicem supplet, si flores lupulorum ei incoquantur, è quibus primo amarescit, postea verò gratam dulcedinem recuperat: hujus ratio est, quia pori liquoris, qui à farinæ particulis vacui sunt, cum ab istis lupulorum occupantur, fit consistentia magis compacta, & particulis fermentativis plus saturata: quare salis fluori non cito conceditur spatium. Quod vero liquor primo amarus, postea dulcescat; ideo contingit, quia partes spirituosæ & sulphureæ à Brasii farina suppletæ, propter alias à lupulo incocto admixtas, non adeo propere ad maturitatem suam perveniunt: cum vero hanc attigerint, cæteris quibuscumque facile præpollent, & toti dulcedinem impertiunt. Nec tantum lupuli flores cervisia incocti, ipsam sine acescentia diu tuentur; quin & pleraque alia amara, aut acria idem faciunt: hæc autem quatenus sale volatili pollent, salis alterius fluores impediunt, quare scobem ligni sassafras, summitates absynthii, genistæ, abietis, corticem aurantii, etiam aromata quædam in modica quantitate, solent nonnulli dolio immittere: qua ratione potus, licet in substantia tenuior, tamen longo tempore ab acore vindicatur. De præparatione *cervisie* hæctenus: cuius (uti & *panis*) consideratione diutius immorati sumus, quoniam fermentationis vocabulum his maximè debetur. Proximè ad *vina* transeamus.

Excepto animalium sanguine, nulli præterea liquores, uti *vina*, effervescent: in nullis spirituum, salis & sulphuris uberius copia, aut insignior turgescencia reperitur. Vinorum fermentatio, & fermentescentium tractatio apud

apud vinitores seu œnopolas, tanquam arcana, solum mistis sive artis suæ Adeptis edocenda habentur. Inter istos scientia quædam *ιστεμν*, seu medicinæ methodus traditur: quo ritu vinorum impuritates expurgentur, fervores attemperentur, aut etiam defectus & languores sanari poterint. Multi præterea fucationum modi secretò adhibentur, quibus vina depauperata & vappida, pro sanis & opimis venditantur. Quoad nostrum vero propositum, ut Fermentationis doctrina illustretur, circa vina præcipue spectari debent hæc tria: Primo, *Eorum defecatio* & in partes secessus. Secundo, *Immodica effervescencia*, quibus de causis cieri, & quo pacto soleat compesci. Tertio, *Eorum declinatio*, cum in deterius vergunt: & quibus remediis, ne cito in vappam aut acetum transeant, sustententur.

I. *Quoad primum.* Ut fermentatio in musto inchoetur, fermenti adjectio (uti fit in cervisia) non requiritur: etenim succus uvis expressus principiis activis adeo copiose turget, ut sponte sua statim insigniter effervescat: usitatum vero est in quibusdam regionibus, quando uvæ calcantur, iis calcem vivam inspergere, cujus, velut fermenti, stimulo liquor expressus magis turgescit, & citius depuratur. Mustum primò doliis apertis repositum, cum præ insigni effervescencia in occlusis contineri nequeat, impetuose adeo ebullit, ut non magis aqua super ignem effervens. Cum vinum aliquantulum deferbuit, vasis paulo occlusioribus reponitur, in quibus usque fermentescendo ulterius depuratur. Inter depurandum particulæ spirituosæ subtiles fæculentias crassiores exagitant, & à se quaquaversus dimittunt, ut liquoris vinosi massa fæcum mitione immunis facta, clara & defæcata reddatur. Constant *vinifæces* ex sale & sulphure, cum exiguo spiritu, & copiosa terra: quæ, dum vina effervescunt, paulatim secreta, vel se mutuo coagulando, vasis parietibus sub Tartari specie affiguntur, vel amurcæ instar ad fundum subsidunt. Interim liquor supernatans, pellucidus & valde spirituosus existit.

Vinorum *defecatio* interdum ægre succedit, ut liquor vinosus à Tartari mitione non facile liberetur: quare solent vinitores corpora quædam aut *depurantia*, aut *præcipitatoria* vinis adjicere, ut materia terrestris liquori innatans citius ad fundum subsidat. Quæ vina hoc modo clarificant, duplicis sunt generis: Aut enim partes habent viscosas, ut sunt ichthyocolla, ovorum albumina, & similia, quæ tenacitate sua fæculentiis vini adhærent, easque secum versus fundum deducunt. Aut etiam vi præcipitatoria pollent: quæ dum poros liquoris subeunt, particulas crassiores ab iis deturbant, & ad fundum reperiunt, ut sunt pulvis Alabastritis, filices calcinati, & similia.

Vina, licet primo bene defæcata fuerint, *immodicas* tamen *effervescencias* postea concipiunt, ita ut Tartarus de fundo commotus, ipsis denuo commisceatur; etiam spiritibus exsolutis, particulæ modo sulphureæ, modo salinæ nimium erectæ, vina rancida, mucilaginosa aut acetosa reddunt, ac interdum in vappam degenerare faciunt. Hæc quibus de causis fiant, & quo pacto curentur, expendamus.

Vina sæpissime fervores contrahunt, cum Tartaro seu fæce nimis opulenta saturantur: Tartarus enim, seu fæces, licet à vini liquore secreta & ad fundum vasis depressæ, cum tamen sale & sulphure copiosis constent, particulas

fermentativas usque à se demittunt, quarum afflatu vinum in æquabili fermentationis motu conservatur: & prout vina sensum maturantur, ita Sal & Sulphur, quæ in Tartaro latitant, paulatim exaltantur; donec tandem ad fluorem evecta, liquorem vinosum fæce turbida inficiunt, & immodice effervere & ebullire cogunt. Contra has nimias vinorum effervescentias necesse est ut statim à fæce isthac nimis opulenta eximantur, ac vasi alteri imponantur: quod nisi fiat, ob nimiam turgescientiam sulphure plurimum exaltato, rancida & mucilaginosa evadunt; aut spiritu exsoluto, & sale ad fluorem evecto acorem contrahunt, ac versus acetum declinant.

Nec tantum à Tartaro, seu fæce opulenta, vinum plus satis effervescit: sed à *nimia agitatione, calore immodico, aut corpore extraneo, & non miscibili*, ipsi *confuso*: his enim aliisque modis pars vini sulphurea excandescit, indeque fervorem & indebitam ebullitionem concipit, cujus sedandæ gratia, præter exantlationem ejus è vase in vas aliud, in usu est copiam lactis dolio infundere; cujus mixturâ vinorum effervescientia & tumultus statim demulcentur. Cum vero hac ratione vini spiritus plurimum obtundatur, diu servari nequit, sed paulo post in acetum aut vappam degenerat: quare necesse habent œnopolæ, ut vina hoc artificio emendata statim venalia exponant, & quam citissime exhauriant.

Hujusmodi vinorum effervescentiæ, licet tempestivè sedentur, priusquam vina in totum deperdantur: attamen vitia quædam relinquunt, quibus liquor vinosus à debito colore & consistentia alteratur, & palato fit minus gratus: etenim vina effervefacta sæpe fiunt coloris magis saturati, scilicet à limpidò & aquoso versus citrinum aut rubicundum degenerant, & rancorem gustui affigunt; quæ quidem omnia à sulphure nimis evecto & exaltato procedunt. Hujusmodi vinorum affectibus his modis occurritur. Pro colore emendando sæpe lac simplex, aut cum ichthyocolla vel amylo incoctis dolio infunditur; hæc enim & sulphuris exaltati secretionem quandam procurant, & albedine sua colorem versus limpidum restituant. Vina mucilaginosa emendantur albuminis combusti, calcis vivæ, gypsi, salis, & similium infusione; hæc enim fermentationem de novo inducunt, ut particulæ crassiores reliquis extrudantur, & versus fundum præcipitentur. Ranciditas iisdem remediis sanatur.

3. *Quod tertio erat propositum, vina depauperantur*, cum à longa effervescencia, spiritu & puriore sulphure plurimum exhalatis, particulæ salinæ exaltari incipiunt: in hoc casu remediis quibusdam velut cardiacis languidæ eorum vires sustentantur.

Sicut spiritui ac sulphuri nimium evectis & exaltatis medetur vinorum à fæce opulenta exemptio: sic iisdem depressis remedium est, ut fæci seu Tartaro ditiori committantur. Quare solent vinitores vina depauperata, spirituum ac sulphuris copiâ destituta, & quæ ob salem erectum acescere incipiunt, fæci seu Tartaro recenti seu lautiori affundere; ut spiritu & sulphure quasi de novo inspirata denuo fermentescant, & vigorem & vim novam recuperent: insuper ex vino generoso & ditiori, cum saccharo & aromatis, syrupos conficiunt, quos vinis exoletis & depressis affundunt. Porro vinis in acetosum vergentibus quædam alia remedia utiliter adhiberi dicuntur. *Gratarolus* pluribus effert lardum carnemque suillam salinam, lino involuta, & dolio im-

missa:

missa : & revera probabile est quod hujus odor sulphureus salis acetosi fluorem cohibeat : in hunc finem semen porri, nuces pinearum, triticum decorticatum, sapam, cineres, rasuras ligni salicis, & multa alia idem author commendat : etenim in hujusmodi subjecta sal acetosus promptè agit, viresque suas impendit ; non secus ac cum virgines picà laborantes talia absurda comedere appetunt, ut ventriculi fermentum extraneum, & plerumque acetosum, sibi met ipsis autem valde molestum saturent. Restat aliud medelæ genus, quo vina tenuia fere corrupta, & vapescentia pro tempore vigorem novum recuperant : scilicet Vini Rhenani, aut alterius multum fermentescibilis portio reconditur, & à ferverescendo prohibetur, unde fit αἰγλευκός, sive *semper mustum* : (vulgo vocatur *stumme* :) si modicum liquoris hujus dolio vini exoleti infundatur, & agitatione commisceatur, fermentationem novam & vegetam toti conciliat, ut vinum istud spumet & bulliat, vitroque inclusum exsiliat. Veruntamen potus hoc artificio emendatus admodum insalubris habetur, eo quod in sanguine nostro fermentationem immodicam ciere aptus sit : quare edicto sancitum est ut œnopolæ hoc fucationis modo abstineant.

Usitatum est insuper vina tenuia, etiam cervisiam novellam, per aliquod tempus utribus aut lagenis vitreis includere, quibus postea apertis, liquor adeo impetuose effervesceat, ut fere totus in spumam rarefactus è vase ebulliat ; qui præterea tantum acorem contrahit, ut vix deglutiri possit : quorum ratio (uti videtur) sic se habet : Hujusmodi liquorum turgescencia, & insignis acetositas, imprimis à sale exaltato, & fluorem adepto procedit : cum enim liquor Tartaro copioso, & spirita mediocri saturatus, vase strictim occluditur, particulæ simul omnes fermentari coguntur : cumque aliæ ab aliis aufugere & separari nequeant, sese plus exagitant, & minutissime refrangunt, ut hac ratione mixtionis vinculum penitus solvatur : attamen corpuscula ab invicem soluta, & velut libera, propter vas continens occlusum una coërcentur : quare cum vas aperitur, particulæ simul omnes in fugam paratæ, instar auræ, subito rarefactæ, cum strepitu & tumultu erumpunt : & quoniam ob Tartari copiam partes salinæ fluorem adeptæ, spiritu & sulphure potiores sunt, hinc insignis acetositas liquori inducitur.

Proxime ad vini, scilicet tenuioris, naturam accedit *pomaceum*, quod liquoris genus est tantum succus è pomis expressus, & fermentatione ad maturitatem perductus. Circa hujusmodi potum observatu dignum est, quod si è fructibus æstivis & nimis maturis conficitur, minime in vigore perdurat, quin cito in vappam degenerat : si è pomis valde crudis & austeris paratur, priusquam ad maturitatem assurgit acorem contrahit ; nimirum in hoc spiritus non satis emergunt, verum sali prius fluorem adepto cedunt : in isto autem non diu satis retinentur, sed antequam liquoris massa plenam fermentationem attigerit, prorsus aufugiunt. Sunt autem fructus huic operi maxime idonei, qui consistentia firmiore præditi haud cito corrumpuntur, nec nisi longo tempore perfectam maturitatem seu mollitiem attingunt : horum succus expressus, & dolio infusus, non, uti cervisia, cum valde spumoso capite ; sed vinorum ritu cum strepitu instar ollæ super ignem ebullientis effervesceat : dum hoc modo fermentescens depuratur, recrementa leviora sursum evehuntur, ac in superficie

velut florem constituunt : partes vero crassiores & Tartareæ copiosè ad fundum subsidunt ; attamen crusta solidior, sive Tartarus coagulatus, ad vasis latera minime affigitur : quod indicio est pomaceum, quia sale acetoso minus quam vina tenuia scateat, in potum nonnihil salubriorem, nec ita nervoso generi infestum evadere : utcumque fæce ista in fundo subsidente, liquor supernatans velut pabulo suo fruitur, ejusque afflatu in vigore servatur, à qua si forte exantletur, brevi acescet : enim vero hujusmodi potus à salis fluore, sive acescencia disperdi maxime periclitatur : contra hanc labem, præservationis gratia, solent nonnulli sinapis semen contusum aut confectionem ejusdem dolio injicere ; quippe hujus sal volatilis salis acetosi fluorem impedit, itaut liquor hinc illico clarescat, & diutius perduret : aliud medelæ genus contra pomacei acorem est, ut cum primum acescere incipiat, à fæce eximatur, & cum modico sacchari utribus stricti orificii reponatur ; hac enim ratione de novo fermentescet, & quoniam una cum salis fluore spiritus evecti à fuga detinentur, acetositas valde grata toti liquori conciliatur. Eodem fere apparatu, & simili fermentationis processu, etiam è pyris liquor potulentus conficitur ; qui tamen supra modum dulcis existit, & si copiosè bibitur, alvum, instar pharmaci assumpti, solutam reddit.

Hæc de liquoribus fermentandis, quorum virtus in *spiritu evecto*, & summa rerum potito consistit : restant alia præparata, quorum vigor in parte *salina exaltata*, & fluorem adepta collocatur ; inter hæc maximi nominis est *acetum*, cujus conficiendi ratio prædictis omnino dissimilis, fermentationis methodum ab ista superius descripta longe diversam requirit. V. g. vina tenuia aut cervisia generosior, doliis inclusa, tempore æstivo radiis solaribus diu exponuntur, aut etiam bruma urgente, prope hypocaustum, in loco calido detinentur : hoc modo dum spiritus nonnulli evaporant, reliquis sub jugum missis, partes salinæ exaltantur, & acore suo totam liquoris massam inficiunt : nec tantum vina diutius servata, aut cervisia inveterascens, è quibus spiritus sua sponte emigrare cœperunt ; sed recens mustum, aut cervisia novella hoc modo in acetum transeunt, namque solent mulieres rusticæ aliam fortiolem, & brasii farina optime imprægnatam, ac dein ipsam dolio infusam, tota æstate sub dio collocare, quo ritu acetum valde mordax, & penetrantissimum conficiunt.

Quinimo simili fere modo quoddam *Hydromelitis* genus nostrates parare solent, scilicet aquæ fontanæ *p. xv.* cum una mellis ad tertiæ consumptionem decoquunt ; adjectis dein aromatis quibusdam, una cum fermento acriore, liquorem dolio inditum per plures dies insolant, ac postea in cella vinaria collocant. Videtur insolatio adhiberi, quò partes salinæ versus fluorem perductæ mellis dulcedinem nauseativam nonnihil cohibere possint : indeque dulci cum acido temperato, sapor placidissimus huic potui concilietur.

Propter acetositatem à salis fluore oriundam, esculenta etiam quamplurima variis modis parari solent ; hinc carnes animalium, & piscium præsertim, si quando sulphure nimis turgeant, muria salina, aut liquoribus acetosis condiuntur, ut sale evecto stomacho gratiores evadant : tædio hic esset particularibus insistere : libet verò *jusculi avenacei* celebre quoddam genus, quo febricitantes, etiam tabidi & hectici commode nutriuntur, hoc in loco descri

describere. Hujusmodi potus ut grate acidiusculus evadat, farina avenacea per tres circiter dies aquæ communi infunditur, donec saporem nonnihil austerum acquirat : dein hæc infusio super ignem collocatur, & cum spatula agitur usquedum ebullitione tandem oborta cum spumosa effervescencia illico vasis ora excedat, quo viso in patinam effundi debet, & quam primum refrigerat instar gelatinæ apparebit, ut in frustra discindi poterit, quæ tamen à calore statim deliquescent : in hujus præparatione observare licet, quod à longa frumenti infusione partes salinæ eductæ fluorem adipiscuntur; dein hæc liquorem adeo imprægnant ut particulæ crassiores poris & meatibus ejus à calore introductæ strictim adeo includantur ut non facile subsidant, quin tota mixtura velut gelatina evadat.

Nimis etiam operosum esset hic varia condimenta & acetariorum genera congerere; poterit enim sub hoc censu *ars tota Coquinaria & Diætetica* conscribi. Etenim ab utrisque id unice agitur, ut in alimentis nostris, tum jucunditatis, tum sanitatis gratia, particulæ activæ in vigore & exaltatione sua collocentur; sic enim & palato maxime arrident, & faciliori digestionem in nutritum abeunt. Ob hanc rationem non tantum potus & confectiones frumentaceæ, aut oleraceæ, diversi generis & naturæ excogitantur: verum & carnes, tum elixas, tum assatas varie præparamus, iisque condimenta adhibemus, ut particulis, modo spirituosus, modo salinis, ad fluorem evectis, cum acumine quodam gustui arrideant. Quæ sunt fixioris naturæ, saccharo, sale, aut pipere condita ad exaltationem perducuntur. Solent carnes nonnullæ fere ad putrilaginem servari, ut particulis activis hoc modo in vigorem & motum collocatis, magis grati evadant saporis. De compositionibus medicamentosis poterit hic longa dissertatio interferi: quoniam vero hoc subjectum peculiarem considerationem meretur, hic plura dicere supersedeo. Proximè videamus, quo fermentationis motu, & principiorum habitudine corpora naturalia versus dissolutionem tendant, seu qualis sit progressus ad *putrefactionem & corruptionem* cujusvis rei.

C A P U T V I I I.

De Fermentationis motu, qui in corporum interitu, necnon putrefactione & corruptione observatur.

Corpora naturalia, in quibus spiritus, sal & sulphur in quantitate, vel mediocri reperiuntur, in eodem statu non diu permanent: etenim activa hæc principia perpetim in motu versantur. Cum primo conveniunt, à cruditate, & confusione versus perfectionem contendunt: cujus gratia, quando summum quò pervenire datur, attigerint, minime in hoc puncto quiescunt, verum exinde versus dissolutionem istius rei festinant. Quæ magis volatilia sunt, soluto mixtionis vinculo, primò erumpunt; dein cætera in partes secedunt, donec forma mixti penitus dispereat: spiritus ad summum evectus cum aqua & puriore sulphure, primò avolat, & exspiratu suo odorem

odorem satis gratum diffundit; postea sulphur crassius cum sale, à vinculo quo ligabantur, soluta & fluorem adepta, sensim evaporant, simulque foetorem valde tetrum dispergunt. Una cum his partes aquæ diffillantur, atque in terram, seu caput mortuum corruit subjecti compages.

Hujusmodi processum, tum in *naturalibus*, tum in *subjectis* ab arte paratis observare licet: circa res naturales, Elementorum disjunctio ac in partes secessus spectari debent, tum in corporum *viventium interitu*, seu vitæ & vegetationis extinctione; tum in eorundem defunctorum *corruptione*, & in *putredinem reductione*.

In *vegetabilibus*, sicut accretio & maturitas à principiorum combinatione, & mutua adhæensione; ita declinatio & interitus ab eorum discessu & separatione dependent: in plantis & fructibus, à succo crudo & austero, spiritu & sulphure sensim exaltatis, ad maturitatem pervenitur; cui sapor dulcis, odor & color amœnus accedunt: inde statim iisdem spiritu, & sulphure, cæterisque elementis à subjecto paulatim avolantibus, res cito in marcorem & putrilaginem redigitur. Sin postquam subtiles & puriores spirituum & sulphuris particulæ avolarunt, adhuc copia terræ & salis cum aliquali sulphure usque commorata fuerit, res minime putret, sed cum marcore exarescit: sin vero Sal & Sulphur crassius fluorem adepta, una cum cæteris, mixtionis vinculo soluto, è subjecto erumpunt, statim externa humiditas relicta ab his spatia occupat, & corpus in putrilaginem resolvitur.

Etiā *animalia* quæcumque *accretionis*, & *durationis* suæ *præfinitos habent terminos*. Etenim ab ortu tardis incrementis ad motum & sensationem, dein ad naturæ suæ vigorem, & exaltationem ascendunt; in quo puncto minime consistunt, verum æquis exinde gradibus versus occasum festinant.

Si hujusmodi limitationis causa inquiratur, dicimus quod naturæ parens posuit in primigenio cujusque rei semine talem spiritus, salis, & sulphuris copiam, quæ pro ducendis ultimis corporum staminibus, seu lineamentis, sufficeret: ita ut accretio, & rei ad *apex* ascensus, sit tantum istius materiæ radicalis evolutio, & in majorem dimensionem protensio; interim spatiola & vacuitates, quæ à protractione hujus materiæ fiunt, particulis activis à nutritione suppletis explentur; quæ etiam continuâ motus serie maturantur, exhalant, & aliis succrescentibus locum cedunt. Quamcitò seminalis ista materies ad summum evolvitur & exaltatur, ut ulterius promoveri aut expandi nequeat, res ad perfectionis suæ statum perducitur: deinceps vero aliquot substantiæ hujus radicalis particulæ, una cum secundariis ab alimento suppletis evaporare incipiunt; atque aliis quotidie, aliisque hoc modo absumptis, tum solidæ partes sensim mole sua decrescunt, tum etiam succus nutritius & sanguis usque in pectus declinant, donec longâ intabescentiâ stabilimenta corporis emarcescunt, & sanguis depauperatur adeo, ut sustentando igni vitali nequitiam sufficiant: haud secus ac in lampade cernitur, si oleo continuò absumpto, ejus vice aqua substituitur, liquor inops & dilutus redditur, ut ellychnii flammam diutius fovere omnino non valeat.

Quando vita animalium perit (sive modo prædicto sensim expiret, ac instar lucernæ, oleo penitus absumpto, extinguatur; sive morte præpropere fati aut morbi violentiâ accersita suffocetur,) statim spiritus cum sale & sulphure

sulphure in sanguine confluui, necnon cuiusque partis insiti, à motu suo regulari cessant, & in confusionem aguntur: deinde partim è poris cum calore evanescente exhalant, partim intus in cavitatibus conclusi cum reliquis particulis, inordinate fermentescunt, & corporis totius ac viscerum intumescencias faciunt. Postea vero partium solidarum compages sensim laxari, & particulæ sulphureæ una cum salinis fluorem adeptis evaporare incipiunt: hinc fœtor summus & putredo oriuntur. Principia activa confertim erumpentia, non raro se mutuoprehendunt, ac in cadaveris superficie combinata vermes producunt: tandem cum è subjecto penitus exhalant, quod superest in pulverem recidit.

Usitatum est in *aceto* quando corrumpi, viresque ejus disperdi inceperint, vermes generari: qui nimirum exigui admodum, oblongi etiam, & teretes anguillarum ritu liquori innatant, & crystallini interventu oculis nostris subjiciuntur: his conspectis dicitur vulgo aceti mordacitatem & aculeos ab animalculis istis procedere: quod tamen ita vanum est ut refutationem non mereatur; nam in vappescente solum aceto reperiuntur: & unde precor eorum dentes pro ferro elidendo sufficiant? quin omnis aceti vis corrosiva sali fluorem adepto verè accepta refertur: interea ista animalcula hac ratione gigni posse videntur. Satis notum est quod cum pleraque subjecta putredine resolvuntur, principia activa foras detrusa, usque tamen hospitium vetus affectantia, alicubi in vicinia coeant, & invicem conjuncta non raro corpora viventia producant: quare cum humida putrescunt, in superficie eorum vermiculi sæpissime concrefcunt. Verum in aceto paulo aliter se habet, quia nimirum particulæ elementares sunt fixiores, ideo cum penitus dissolvitur liquoris mixtio, principia activa, licet soluta, attamen ægrè & difficulter à compage erumpentia, in ipsis subjecti visceribus coeunt, ibidemque mutua coalescentia mediis in undis animalcula ista constituunt.

Etiam animalium corpora victui nostro parata versus putredinem disponuntur, si quando per aliquot dies reponantur, donec particulæ activæ lavari, & in motu ad exhalationem tendente esse incipiunt; quare tum caro flaccidior & inter comedendum tenera & mollis evadit; & si diutius servatur illa, dum partes salinæ & sulphureæ in fluorem evehctæ erumpant, statim fœtor & putrescentia inducuntur.

Plures extant modi, quibus carnes à putredine solent præservari: quorum præcipui sunt, ut *sale* aut *aromatis* condiantur. *Sale condita* longo tempore incorrupta, & comestui satis grata perstant: *Aromatis* cadavera imbuuntur, ut in sepulchris diu supersint. Quoad primum, muria, seu conditura salina, sulphuris eruptionem prohibet, & implexu suo ipsum in subjecto figit, ac retinet. Aromata, cum particulis valde activis constent, fermentationem novam in subjecto cadavere concitant, atque insita hujus elementa in motus sui societatem adsciscunt, & plurimas eorum particulas avolantes diutius adhuc in corpore retinent. Prout Sal & Aromata pro carnibus & sulphureis diu asservandis usurpantur (quæ etiam cæterea quævis à putredine vindicant,) ita vegetabilia, eorumque flores & fructus melius saccharo conservantur: hoc enim & particulas subjecti activas mulcendo intus cohibet, & præterea confectiones saporis valde grati reddit.

Mineralia imprimis solida & dura, quoniam salis & terræ copiâ cum minori sulphuris, & minima spirituum quantitate prædita sunt, ideo ut & resinosa, raro putredinem concipiunt. Par ratio est de resinosis, quæ licet Sulphure cum Sale & Terra abundant, quia tamen exigua est aquæ & spirituum portio, ideo eorum compages non facile laxatur, nec cito putredini sunt obnoxia. Inter mineralia tantum aqua communis sub hoc censu cadit: hæc enim si modo stagnet, aut in vase diutius conservetur, ejus Sal & Sulphur, in exigua licet quantitate, fluore prædita, evaporare incipiunt, simulque putredinem inducunt: quamdiu autem aqua in motu est, hæc particulæ usque aliis obvolvuntur, adeoque ab implexu mutuo & evaporatione detinentur.

Artificialia, & præparata, non minus quam naturalia putredinem subeunt, etenim panis & esculenta quævis, vinum, cervisia, exteri liquores potulenti, etiam confectiones medicæ diu servatæ, primo vires & vigorem amittunt, deinceps corrumpuntur; de quibus sequentia observare licet.

Quo magis res sunt compositæ, & principia habent simul omnia conjuncta, eo certius & facilius putredinem subeunt: quare esculenta è carnibus parata, juscula, herbarum decocta, item pharmaca pleraque Galenico more facta, intra breve tempus (nisi sale aut saccharo plurimum condiantur) solent corrumpi: interim destillata, & Chymice præparata, quæ homogeneis, aut non multum diversis constant particulis, facta tecta diu servantur.

In compositis, si nimia sit aquæ quantitas, res citius putrescunt: sic enim mixti compages nimis laxa est, ita ut principia fixa non possint volatilia prehendere, aut à fuga retinere. Ea autem in quibus spiritus cum sale, & sulphure mediocribus abundant, si in vase clauso servantur, ut parum evaporent, longo tempore perstant, uti cernitur in vino generoso. His proxime accedunt, quæ melle aut saccharo condiuntur, aut quibus particulæ salinæ copiosæ à natura insunt.

Plurima ex his, dum corrumpuntur, fiunt aut *mucida*, aut *rancida*, vel *acescunt*, vel in *vappam* degenerant: res fiunt *mucida*, cum particulæ subtiles inter exhalandum à crassioribus detinentur; atque in corporis superficie mutuo implexu inviscatæ, simul in mollem lanuginem concresecunt: veluti cum muscus faxis aut lignis humido expositis inducitur.

Ranciditas sulphureis imprimis contingit: etenim oleosa & pingua, à fervore aut vetustate rancida evadunt; nimirum cum spiritu plurimum exhalato, particulæ sulphureæ exaltantur nimis, & evaporare incipiunt.

Aciditas inducitur à sale nimis evecto & resoluto: cum enim spiritus deprimitur, aut exhalatur, sal fusus fluorem concipit, adeoque acorem infert: hinc vinum, cervisia, pomaceum, etiam lac, edulia pleraque, & herbarum succi, cum diutius servantur, vel si immodico aëris fervore aut concussione percelluntur, facile acescunt.

Liquida in *vappam* degenerant, cum principiis activis maxima ex parte exsolutis, præter aquam & terram nihil eminens, aut partium subtilium in subiecto relinquitur.

Ut contraham quæ superius dicta sunt: *Cujusvis rei corruptio solummodo est principiorum prius mutuo combinatorum (solutio mixtionis vinculo) à se invicem separatio, & in partes secessus: qui motus pro varia erumpentium diathesi (cum, vel sine fetore) in putredinem desinit, vel marcorem.*

Ubi Spiritus abundant, atque adest Sulphuris, & Salis copia, & particulae vinculis solutae confertim erumpunt, mistum cum *faetore* putrescit: etiamsi densa mole constet, ita ut cunctae partes haud rite ventilentur, à *putredine calorem concipit*: in tali corruptione *faetor* procedit ab exhalatione Sulphuris cum Sale aculeati: *putredo* sequitur, eo quod humiditas externa in locum particularum avolantium subingreditur: *calor* autem producitur à particulis Sulphureis confertim commotis, atque intra subjectum conclusis, ut simul aggregentur, & unitae fortius agant. Sin vero in subjecto adsit minor Salis, & Sulphuris proportio, ita ut cum mixtio solvitur, particulae segnius commoveantur & sensim evaporent, sine insigni graveolentia, putredine, aut calore corpus exarescit, & in *marcorem* redigitur.

Hoc in loco non abs re fuerit inquirere, unde vasa quaedam vacua, & corpora humidiora ex diutino situ quemdam absque putredine foetorem concipiunt, necnon labem eam aliis infusis, aut prope admotis communicare solent? huic affectioni vocabulum proprie adaequatum non facile occurrit, nostro idiomate *mustinens* appellatur, atque *mucoris* vocabulo aliquatenus designari posse videtur: nisi quod *ὑψῶς*, seu *mucor* corpora infecta lanugine quadam obducatur, quod hic neutiquam occurrit. Rei vero istius consideratio non improprie ad fermentationis doctrinam refertur, haec enim tinctura, seu foetoris impressio, veluti quoddam fermentum sese latissime explicat, ut vasa eadem leviter imbuta liquores quoscumque immisos, & eorum infusiones usque novas, & saepius iteratas inficiat: hujus duplicem effectum observare licet: modo enim *vasa* penè vacua, primo vitiata, postea liquida pleraque, quae forte recipiunt, odore mucido inquinant: modo *compacta*, & *solida* humidiora, cella nonnihil clausa diutius servata hoc vitium sponte contrahunt, cum interea repositorium minimè contagium sentiat: quae utrovis modo mucida evadunt non ideo corrumpuntur, verum in plerisque, spiritu, sale, & sulphure adhuc in mitionis vinculo contentis, rei compages integra servatur; atque vitium solummodo in hoc consistit, quod è subjectis hoc modo dispositis effluvia velut *aculeata* decedunt, ideoque *olfactui gustuique* nostris ingrata adveniunt.

Primo ut *vas* aliquod *mucorem* concipiat, requiri videtur: *primo*, ut interna ejus cavitas sit ampla, & orificium angustum; quo scilicet aëri externo patefcat aditus, eique ingresso concedatur quies: quippe amphora latioris, item utres penitus occlusi, hoc vitium non facile imbibunt. *Secundo*, ut præter cavitatem internam ampliorem, vasis latera poris & meatibus exiguis prædita sint: namque in hujusmodi spatiolis humore oblinitis, aër strictius inclusus quietior manet, & stagnare aptus est: quare utres vitrei haud ita prompte, uti lignei, aut lapidei hoc malum patiuntur. *Tertio*, ut humiditas quaedam, licet perexigua, circa vasis latera, aut in fundo ejus hærescat, quacum aër ingressus invisari poterit: nam si utres fundo inverso suspendantur, ut humor totus effluat, non omnino mucida evadunt.

Secundo, cum corpora sine vasis contagio sponte *ὑψῶτα*, seu situm contrahunt, observare licet primo quod ejusmodi sint, quae particulis heterogeneis, hoc est elementorum una omnium mitione constant: quippe hanc labem vegetabilium ad animalium partes ac præparata facile suscipiunt; mine-

ralia pleraque immunia ab illa degunt. *Secundo*, ut humiditas in concreto ubertim scateat, sicciora enim diu sine noxa perstant. *Tertio*, ut corpora vel in acervum congesta aliquandiu immota relinquantur, vel in arca aut cella oclusis minus eventilata servantur: ita enim frumentum in arca, nisi sæpius agitetur, etiam esculenta quævis conditorio strictiori reposita cito mucescunt.

His juxta positis, conjecturam facimus, quod *mucor* sit affectus corpori humidiori inanimato ab aëre ambiente intra poros ejus admissio, ibidemque stagnante inductus; quo nimirum istius mixti particulæ elementares una cum istis ab aura immixtis combinatæ in fermenti naturam exaltantur, ut mira activitate sese quaquaversus diffundant, earumque effluvia, tanquam aculeata, gustus & olfactus sensoria ingrate percellant. Cum itaque subjectum aliquod primitus *mucidum* evadit, portio quædam aëris juxta positi, & à ventilatione prohibiti, ejus poros & meatus subit, ibidemque materia tenaci inviscata, intra compagem istius concreti penitus occluditur: ab auræ inclusæ mixtione insita rei corpuscula, præsertim sulphurea, & salina *ἀρσόνια* novas acquirunt, ut postea cum nullo alio corpore sint exacte miscibilia: attamen valde fermentativa cuicumque licet confusa, indolem suam retinent, & per ingentem materiæ molem diffusa, totam inficiunt; scilicet particulas istius novæ materiæ eo ritu disponunt, ut ipsæ velut aculeis instructæ sensibus nostris pariter molestæ occurrant: interea tamen à *mucore*, sive primitus oborto, sive per contagium suscepto, rei mixtio non dissolvitur, nec principia dissipantur; quinimo quæ sint omnino *vappida*, vix ullo modo *mucida* evadunt: scilicet odor *ἰσχυρὸς* à principiis activis particulari ritu ab aëre involuto dispositis, eorumque effluviis potissimum dependet; quare si ista fere in totum è subjecto quopiam avolarunt, illud hujus affectionis fere incapax redditur.

Observare licet similitudinem quandam inter *mucorem*, & *Empyreuma*: namque quemadmodum in hoc particulæ *ignis* materia tenaci irretitæ, & inclusæ, diutiori illic morâ insita salis & sulphuris corpuscula pervertunt, unde eorum effluvia cum ingrato acumine sensibus nostris obversentur, insuper aliis admixtis pravitatis suæ indolem affigunt: ita in *mucore* particulæ *aëris* materia viscosa obvolatæ, & stagnantes præsentia sua corpuscula salina, & sulphurea à debita crasi immutant, quo nimirum ea velut stimulis donata sensoria nostra acerbe feriant, & valde fermentativa sui odorem aliis diffundant: alteratio quovis modo contracta vix ullâ cum aliis mixtione, aut ab arte emendatione deleri potest: potissima in utrisque medelæ ratio in reciproco trajectu sita est; scilicet *Empyreumatica aëri* humidiori diu exponantur, quo exhalent *ignis* particulæ: atque *mucida igni*, aut istis quæ naturam ejus redolent tradantur, scilicet calci vivæ, sulphuri, aquis stygiis, unde *aëris* inclusi partes abiguntur, adeoque reliqua mixti corpuscula statum pristinum recuperare solent; quapropter si liquores *mucidi* destillantur, aqua in recipiens decidua fœtore isto privabitur. *Empyreuma* autem hoc artificio non ita facile emendatur.

Hactenus de fermentatione, & principiorum motu, quatenus intra ejusdem subjecti confinia illud, vel ad *maturitatem* & *perfectiorem*, aut versus *dissolutionem* & *corruptionem* disponunt. Sequitur modo agendum de ejusmodi particularum, & principiorum motu, in quantum *aliqua unius corporis in aliqua alterius*

alterius agunt, eaque, vel mixtum dissolvendo, penitus educunt, & extramittunt; vel precipitando, in partes secedere faciunt.

CAPUT IX.

De Fermentationis motu, quatenus in corporum dissolutione observatur.

PRO solutione corporum duo sunt magna solventia, seu menstrua, quæ à natura existunt, scilicet *Aqua*, & *Ignis*. *Ignis*, si proximè & immediatè adhibeatur, corpora pleraque destruit, principia ab invicem abigit, & velut in auras dissipat, superstitè solum *Terra* cum pauxillo *Salis*; si *mediate* adhibeatur, particulas quasdam educit, ita interim ut aliæ supersint: quo modo *destillationibus*, & operibus Chymicis præcipuè inservit; etiam in parandis pro victu nostro necessariis, circa alimentorum tum *elixationem*, tum *assationem* usurpatur. *Aqua* non ita promptè destruit corpora, verum partes aliquas è subjectis elicit, easque in sinu suo excipit, & pro variis usibus firmè retinet: cum vero non facile corpora quævis penetret, sed quæ fixioris sunt naturæ fere intacta relinquat, varii excogitantur modi, quibus menstruum *Aquæ* acuitur, & quibusvis corporibus dissolvendis idoneum redditur. Etenim pro ratione corporum, quæ dissolvere; & partium, quas in se debet suscipere, quibusdam velut armis instruitur, quibus subjecta quævis referare, & particulas modo has, modo illas occupare poterit. Acuitur aquæ menstruum *Spiritu*, *Sale*, aut *Sulphure*; nimirum, vel singulis horum, vel pluribus simul alligatis. Dicemus primum de *menstruo aqueo* cum vario ejus acumine, & postea de *solvente igneo*.

Aqua communis corpora simpliciora, excepto *sulphure*, facillimè dissolvit, eorumque particulas poris, seu meatibus suis abscondit: *sales* cujuscumque generis promptè suscipit, *spiritus* facile imbibit, *terra* compagem laxat, ejusque tenuiora corpuscula complexu suo fovet: verum oleosis & pinguibus ægre miscetur, eorumque particulas non nisi aliorum interventu excipit, verum ad superficiem suam quasi non miscibiles propellit, aut ad fundum detrudit.

Corpora compositoria quorum compages est laxior, *aqua* aliquatenus subit: indeque particulas quasdam non *simplices*, sed *totius mixti naturam referentes* in sinum suum recipit: hinc vegetabilia pleraque, etiam animalium partes, & nonnulla mineralia, aquæ communi infusa ipsam virtute quadam imprægnant, & è metallis plerisque longa maceratione vires quasdam, licet exiguas, exportat. Corpora quædam dissolvuntur ab aqua, quæ tamen menstrua *sulphurea*, aut *spirituosa* fere intacta relinquunt: ut sunt *Gummi Tragacanthum*, *Arabicum*, &c. item *sales*, & *saccharum*.

Primus & communissimus acuminis modus, quo aqua simplex corpora dissolvenda facilius subit, est ut particulis igneis, seu caloris adventitii spiculis instruat: sic enim cum incitatione quadam in corpora profundius adigitur; atque ex intimis eorum recessibus ramenta aliquot & veluti minutias delibat.

Quare solemus materiam dissolvendam aquæ diu incoquere, aut saltem tepidæ infundere: qua ratione tenuiores & subtiles quædam particulæ, quæ subjecti indolem referunt, facile educuntur, & aquam cum totius mixti virtute imprægnant.

Hæc de simplici, seu naturali aquæ menstruo, quatenus scilicet ejus activitas solet interdum ab igne, seu calore ascititio promoveri. Verum hæc adeo simplex haberi nequit, quin aliquales in se contineat alterius generis particulas, prout ex ejus facili putredine colligi potest; sæpe enim halitibus spirituosus, aut salinis ex aëre aut terra contractis imprægnantur, ut pro eliciendis plurimum rerum tincturis nonnunquam menstruo artificiali præstet; quippe aquæ acidulæ minerales, aqua pluvia, & ros Maialis, pro insigni qua pollent dissolvendi facultate, apud Chymicos crebro in usu sunt. Porro vulgaris observatio est, quod aquæ nonnullæ *saponem* facillimè dissolvunt, & ab eodem penitus admixto in liquorem valde spumofum faceffunt; tales si digitis affricentur, lenes & molles sentiuntur. Aliæ vero lymphæ, quæ manibus tractatæ asperiores sunt, *saponis* æque ac *olei* mixtionem renuunt, adeoque vestium lotionibus inutiles habentur: hujusmodi aquæ si in vitro evaporentur, sæpe crustam ejus fundo & lateribus affigunt: quippe particulis *salinis* ex plus debito imprægnantur, quibus cum *partes salinæ* in *sapone* reliquæ combinantur, *sulphureæ* deferuntur, illæque poris exclusæ, ad summitatem liquoris velut non miscibiles protruduntur. Si quando carnes istis aquis elixantur, valde rubescunt; qualis revera tinctura inde contracta indicio est lymphas illas *vitriolo* aut aliis generis *sale* nonnihil imbutas esse. Sed transeamus ad menstrua artificialia, in quibus liquor aquosus *spiritu*, *sale*, aut *sulphure*, aut pluribus eorum simul collectis instruitur.

Menstruum aquæ spirituosum efficitur, quando è corpore spiritibus turgido liquor clarus & limpidus exstillatur, prout è vino, aut cervisia fortiori, aut corporibus aliis ritè fermentatis, & ad exaltationem perductis: hujusmodi dissolvens vix ita sincerum habetur, quin admistas habeat *purioris sulphuris*, quandoque & *salis volatilis* particulas. Prioris generis liquor dicitur *Spiritus vinosus*, qui subtilis, & valde penetrans vegetabilium, necnon animalium corpora & partes facile subit; mineralium vero ægre, aut vix omnino: particulas non qualvis, aut totius mixti indolem referentes (uti aqua communis,) è plerisque extrahit; sed imprimis spirituosas & sulphureas, cæteris fere intactis; quare pro magisteriis vegetabilium resinosi (quæ sub forma gummi, aut resinæ fere sincera educit,) usurpari solet: interim pro extractis plantarum, quæ Sulphure non ita præditæ sunt, aquâ communi minus præstat: E sulphureis, uti sunt Benzoin, Sulphur, Olibanum, Styrax, Succinum, & similia, tincturas elegantes elicit: Sales herbarum fixos, item corallii, & margaritarum, prius cum aceto paratos, longa digestionem dissolvit, eorumque tincturas in se recipit: saccharum & gummi, in aqua solubilia, fere intacta relinquit. Menstruum vero spirituosum alterum, quod *sale volatili* acuitur, qualis est liquor qui ex sanguine, c. cervi, aut fuligine exstillatur, superiori longe potentius existit, & corpora pleraque, exceptis metallis, in partes discindit, & sæpe totius mixti formas destruit: quinimo metallum fixissimum, scilicet aurum, à proprio menstruo prius in calcem redactum,

Etum, optime secundò dissolvit, ac in tincturam, seu liquorem potabilem reducit.

Menstrua *sulphurea* habentur, quæ à corporibus sulphureis sub olei forma educuntur: hæc autem vel *destillatione* parantur, qualia sunt imprimis oleum Terebinthinæ, Juniperi, & similia; vel *expressione*, qualia ex olivis, amygdalis, aliisque vegetabilium fructibus aut seminibus extorquentur. Destillata majoris efficaciam sunt, quam expressione parata; utraque è vegetabilibus, aut animalibus particulas quasdam extrahunt, quarum virtutibus hæc olea imprægnata usui medico accommodantur. Quinetiam pro extrahendis sulphureis mineralium particulis, satis idoneè usurpantur, quas aliquando sinceras educunt: sic oleum Terebinthinæ, aut lini, sulphuris communis partem combustibilem dissolvendo extrahit; interim partes salinæ residuæ, ac à menstruo intactæ, in crystallos concresecunt, uti cuivis obvium est in præparando Balsamo sulphuris.

Corpora mineralia, in quibus *concretionis vinculum à sulphure imprimis dependet*, ut sunt lapis pyrites, antimonium, sulphur commune, & similia, à menstruo sulphureo aliquatenus dissolvuntur, quod nimirum particulas congeneres à corpore educit, salinis fere intactis: quare oleum Terebinthinæ, lini, &c. ex his tincturam eliciunt; interim *menstrua salina*, ut sunt acetum destillatum, aut aquæ Stygiæ, pro solvendis eorum corporibus parum proficiunt: quin ista, nisi prius calcinata, vix adoriuntur. E contra autem, ubi mixti compages *vinculo salino constat*, ut sunt ferrum, cuprum, & similia; *menstruo salino*, prout aqua fortis, spiritus vitrioli, salis, &c. particulas sibi nec congeneres dissolvendo excipiunt, sulphureis penè intactis. Hoc manifestè apparet in metallorum solutionibus, præcipue autem & insigniter in Camphora, quam Aquæ Stygiæ in liquorem olei-formem, menstruo innatantem reducunt; nimirum ejus compagem solvunt, & partes aliquotas, è quibus concretio dependet, salinas in se excipiunt: interim *Sulphurea* intactæ seorsim in superficie liquoris aggregantur. De *Antimonio* hîc loci quiddam mirari subest: quod nimirum concretio ejus, anomala admodum, minerale illud non solum mixtis aliis, sed sibi etiam ipsi prorsus dissimile efficiat: laxum valde, & nihilominus plurimum compactum existit; minimis patescit injuriis, tamen maximis fere impervium, ut & ex æquo clades cum triumphis numeret: quædam ejus particulæ adeo solutæ jacent, ut in menstruo quovis oleoso, aut à lixivio communi educantur: interim aliæ ita pertinaciter cohærent, ut *aqua-fortis* illas non omnino adoriatur: sola *aqua-regia* huic suffusa corrodit, quæ adeo violenter hoc præstat, ut fumus inde excitatus illico totas obscurârit ædes. Quare videtur hîc inesse partes disparis omnino indolis, quasdam imperfecte mistas, scilicet *Terrestres & Sulphureas*, quæ facillime ab idoneo solvente laxantur; interim alias omnino *metallicas*, perfectius commistas, ad ipsius *auri* naturam aliquatenus accedentes: quæ idcirco tantum à menstruo Salis adaptato dissolvi queant.

Menstrua salina sunt diversi generis, & naturæ, scilicet *vegetabilium, animalium*, aut *mineralium*. Inter vegetabilia eminent fructuum & herbarum *succi acetosi, aceta factitia, liquores acidi* è lignis ponderosis, ut sunt Guaiacum, Quercus, & Buxus, exstillati: in quibus omnibus particulæ *Salinæ* fluorem aut ab

arte, aut à natura adeptæ, insignem acorem referunt. Vel constat menstruum vegetabile è *Salibus tartari*, aut *herbarum incineratione factis*, & *deliquatis*, qui ab igne acuuntur valde, & acredinem acquirunt: in his particulæ Salinæ sunt fixæ, & in statu fluori opposito. Ad *Animalium classem* refero Spiritum Urinæ, Cornu-cervi, &c. qui licet Spiritibus imprægnentur, tamen à sale volatili vires præcipuas sumunt. Menstrua autem Salina potentissima è *mineralibus eliciuntur*, qualia sunt liquores acetosi, qui ex salibus Nitri, Marino, Alumine, Chalcantho, & similibus, igne fortissimo urgentur.

Qui è *vegetabilibus* eliciuntur, uti *aceta*, & *liquores acidi*, optime dissolvunt corallia, margaritas, conchyliæ & testacea: quoniam in his magna est copia *salis alcali*, cum quo *sal fluidus* qui in menstruis acetosis istiusmodi abundat, strictissime uniri appetit; quare corpori dissolvendo apposita, ejus poros & meatus subeunt, particularum salis alcali complicationes solvunt, easque in amplexum suum rapiunt. Eodem prorsus modo *sal fluidus* in menstruo vegetabili *salem volatilem* in cornibus animalium adoritur.

Hujusmodi menstrua metalla quædam superficie tenus corrodiunt; verum non ita potenter, uti Aquæ Stygiæ, eorum copora dissolvendo referant. Sulphurea quædam subjecta calcinatione prius laxata satis apte subeunt, indeque particulas salinas educunt. Quare pro sale stanni, plumbi, antimonii, fuliginis, aliorumque in calcem prius redactorum, aceto destillato utimur.

Sales tartari & herbarum fixi, licet *precipitationi* magis quam *dissolutioni* inserviant, tamen quia particulis acutis, & valde penetrativis constant, egregii sunt usus: his enim menstrua aquosa pro extrahendis vegetabilium tincturis præcipue acuuntur. Et quanquam corpora, quæ *Alcali* scatent, uti margaritæ, corallia, &c. omnino intacta relinquant, ob nimiam in utrisque partium homogeneitatem; etiam *metallis* apposita eadem tantum superficie tenus parum corrodant, ac cum sale ac sulphure eorum in rubigines accrescant: Tamen *corpora sulphurea*, modo ab igne laxata, prompte subeunt, eorumque compages referant, & divellunt; quare pro conficiendo lacte seu magisterio *sulphuris* sal Tartari optime conducit.

Menstrua *salina fortissima* sunt quæ ex mineralibus destillatione propelluntur, scilicet ex Chalcantho; Nitro, Sale marino, Alumine, Arsenico, aut singulis, aut ex pluribus eorum simul commixtis liquores acetosi destillantur: qui cum sint summæ acridinis, instar ignis, corpora pleraque, imprimis vero metallica, & quæ vinculo salino constant, prompte subeunt, eaque in partes minutas facile dissolvunt. Sunt autem hi liquores tantum particulæ salinæ, quæ vi caloris à terræ suæ complexu propulsæ, indeque fluorem adeptæ, in aquam convertuntur. Quemadmodum *ignis actualis sulphurea* imprimis adoritur, & corpus destruendo, partes sibi congeneres educit: sic aquæ Stygiæ (quæ & *ignis potentialis* dicuntur) corpora quæ sale plurimum abundant, uti metalla, facile divellunt, eademque ab igne inviolabilia in minutissimas partes confringunt.

Circa *mineralium solutiones* observare licet, quod eorum compages, non uti cætera naturâ concreta, facile diruitur, aut in partes laxatur; verum ad hoc menstrua fortissima, eaque imprimis acetosa, è salibus destillata requiruntur: cujus ratio est, quod mineralium concretio à sale copioso, tanquam

vinculo

vinctulo cæteras particulas colligante, potissimum dependet: quare eorum moles solidior, magis dura, & compacta existit, quin & soli menstruo salino cedit. Cum minerale quodvis, aut metallum dissolvitur, particula *salis fluidi* in menstruo, *salis fixi* in mixto complicationes strictissimas, & alii cuiusvis solventi impervias facillimè subeunt, à nexu laxant, atque in amplexus rapiunt; hoc modo salium particulae adunitæ, & à liquore dilutæ, menstrui poris & meatibus absconduntur; atque his una coherent, simulque à menstruo absorbentur quæ puriora & minutissime divisa in mixto extiterunt terræ aut *sulphuris* corpuscula; interim crassiora, & terrestreitate magis referta ad liquoris solventis fundum præcipitantur. Quare aurum & argentum in totum à menstruo devorantur; ferrum vero, plumbum, &c. ut & recrementa metallica, inter dissolvendum particulas heterogeneas, velut scorias quamplurimas, à se dimittunt. Quando mineralia hoc modo in partes franguntur, particulae divisæ & minutissimè confractæ (quamdiu cum particulis salis fluidi, quæ in menstruo sunt, æquabiliter coherent) per liquorem menstrui dispersæ, ejusque poris & meatibus absconditæ absorbentur, ac invisibiles redduntur. Quin etiam, menstrui humore avvocato, calx residua, quæ constat è particulis mixti & salis fluidi una combinatis, in quolibet præterea liquore dissolvitur: sin vero post solutionem metallicam sal fluidus à soluti particulis aut calcinatione avocatur, aut nova salis fixi adjectione liquori cui inest, præponderat, soluti corpuscula menstrui poris excidunt, nec à liquore quantumvis addito denuo absorbentur.

Quod vero è metallis nonnulla à quolibet liquore acetoso corroduntur, interim alia, uti argentum & aurum, à solvente peculiari, tanquam clave appropriata, referari postulant; quodque magis mirum est, aqua fortis communis, quæ argentum exedit, aurum omnino intactum relinquit; dein idem liquor additione salis Armoniaci fit proprium auri dissolvens, & nullam argento vim infert; horum ratio ad hunc modum se habet: Aurum & argentum sunt metalla compactiora, à terrestri materia plurimum defæcata; quare non à quolibet solvente, sed ab ejusmodi tantum mensuris quæ sale cum istis homogeneo constant, in partes franguntur. Cum autem Lunæ compages à *sale vitriolico* dependeat, atque Solis à *sale Armoniaco*, (sive generis perfectioris, qualis nimirum cum *sulphure* arctissime complicari solet) hinc aqua fortis, quamdiu vitriolica pollet virtute, cum argenti sale combinatur, ideoque compagem ejus recludit: veruntamen auri concretionem, quæ à vinctulo heterogeneo dependet, minime laxat: quod si huic menstruo *sal Armoniacus* addatur, *vitriolici* potentia deletur, & solventis spicula salina, *Luna intacta*, solummodo *Soli* adaptantur.

Cum mineralia à mensuris acetosis corroduntur, non ideo semper in partes elementares eadem resolvi putamus: ut sal & *sulphur* eorum hoc modo sincera habeantur (licet nonnulli tales metallorum analyses se facile ostensoros venditent) quin nostræ observationi & crebræ experientiæ constat, quod pleraque horum adeo sint compactæ & solidæ concretionis, ut in partes non nisi integrales frangi possint; v. g. *Aurum* & *Mercurius* quocumque fere modo tractata, si quando in calces diversimodas redigantur, ab igne intenso denuo proprias acquirunt formas, scilicet menstrui particulae

salinae vinculum concretionis solvunt, quo *partes mixti integrales* minutissimæ invicem cohærent; at primæ *mistionis copulam*, qua elementa mutuo colligantur, idem solvens in omnibus disrumpere non valet: adeo ut calces pleræque metallicæ sint tantum concreti in globulos minutissimos fracti corpuscula particulis menstrui salinis involuta; quare, igne applicato, sales isti corrosivi à complexu divulsi prorsus abiguntur, dein minutia, seu scobes metallici à calore intenso velut globuli particulatim fusi, & in massam unam liquatione coeunt metalli speciem resumunt; quare qui vulgo perhibentur mineralium Sales, plerunque sunt tantum solventis particulæ salinae, cum metallo velut in pollinem redacto conjuncti: ita se rem habere in *Solis & Mercurii* præparatis, extra dubium ponitur; etiam Sal, sive *Saccharum Saturni*, nihil præterea est: ista autem dulcedo tantum ab aceto provenit; nam si in destillatione aceti vasorum junctura luto ex sale, argilla, & stercore equino claudantur, in superficie hujus sal albissimus mire dulcescens, sacchari istius ad amussim æmulus, concresecet: è quibusdam vero, scilicet *ferro, cupro, & argento, vitriola factitia* parantur, quæ maximam partem salina existunt: Quippe eadem destillatione in liquores acetosos, uti recrementa metallica, urgeri poterint.

Præter solventia hætenus citata, (quæ pro ratione particularum, quæ in ipsis præpollent, in peculiarem, & determinatam materiam agunt;) scio Chymicos mirabilia venditare de *menstruo* quodam *universali*, cujus afflatu unumquodque corpus in principia, seu Elementa primigenia facillime resolveri poterit: & licet *Helmontius* se arcanum hoc proprio labore eruisse jactitet, & quotidie nunc Chymia Adepti in hanc metam aspirent: tamen plurimos in hoc opere, non secus ac in lapide Philosophico, spes & votum fefellerunt. Sunt & alia quædam menstrua famosa, scilicet Quercetani *Aqua vitæ Tartarisata*, ejusque *acetum Philosophicum*, quæ pro medicamentis parandis insignioris sunt usus; cum vero in dissolutione corporum nihil novi, aut miri apporent, eadem hic sicco pede præterimus.

Hætenus de *menstruis solventibus*: circa corpora dissolvenda apparatus quidam institui poterit, quo quidem facilius eorum compages referari, & in partes minutas dissecari valent. Propterea concretum modo in pulverem contunditur, modo in taleolas discinditur, ut ad intimos ejus recessus solventi patefiat aditus. Quod si durior, & constrictior sit subjecti compages, ut non nisi longo tempore menstruo cedat; antequam dissolutio inchoetur, adhiberi debent aperitiva quædam, quibus concretio prius laxari, & nonnihil recludi queat: quare tinctura chalybis facilius extrahitur, si limatura ejus succo limonii, aut spiritu vitrioli irroretur: simili modo cornu cervi, aut rasura Eboris tractatur, cum eorum decocta cito perfici intendimus. Cum pridem super hac re fueram valde sollicitus, scilicet ut corpora duriora in quovis menstruo facile solubilia redderem, & imprimis circa ferrum plurima tentassem; post varia experimenta, tandem casu quodam, & fere aliud agenti mihi præparatio inventa est, qua sine quovis corrosivo, aut liquore acido, mediante solum leni calore, ferri corpus aperitur, ut in pulverem redactum, in quovis liquore tincturam immediate deponat, ut nec sales ipsi citius in aqua communi dissolvantur. Hoc modo aquas minerales, quæ Acidulas nostras

Tumbrigenſes exacte referunt, in magna quantitate extempore parare ſoleo; atque etiam vina, cerviſiam, lac, aut ſerum ejus, nullo cum negotio chalybeata reddere. Hoc modo Syrupi, tincturæ, extracta, aut magiſteria ex chalybe facillime habentur. Inſuper eodem plane artificio corallia, margaritæ, oculi & chelæ cancrorum, & teſtacea quævis parantur, ut eorum pulveres tincturam, ſeu totius concreti virtutes cuilibet menſtruo ſtatim impertiant. Atque in hac præparatione nulla qualitas aliena ſubjecto introducitur, nec propria amittitur.

Quando hoc ritu corpora quæcumque vinculo conſtant ſalino reſerare didiſſem, ſtatim ex hujus analogia innotuit modus recludendi ſubjecta, quorum concretio eſt omnino ſulphurea; etenim ſulphur commune ita parare ſoleo, ut pulvis ejus quemvis liquorem ſulphuris tinctura & virtute immediate imprægnat. Spiritus vini colorem ſaturatum & valde rubicundum, illo immiſſo brevi contrahit. Aqua communis infuſione, aut coctione ejusdem pulveris plane ſulphurea redditur, & argentum deaurat, atque hoc modo è tincta illa, è vino albo aut aceto præcipitatione facta, lac ſulphuris in magna quantitate facile paratur. Ex vino hujus infuſione ſulphurato ſyrupum conficio, quo in affectibus thoracis vix datur præſtantius remedium. Tincturæ, extracta, magiſteria ex ſulphure hoc modo nullo cum labore & ſine quovis Empyreumate præparantur. Eodem ritu è ſuccino, benzoin, aliſque ſulphureis præparata, in quovis menſtruo diſſolubilia facile componuntur. Sed de his ſatis ſuperque; ad alterum naturæ magnum diſſolvens tranſitum faciamus.

CAPUT X.

De natura Ignis, & obiter de colore & luce.

QUod olim Philoſophi de Materia prima, fere idem pronunciare poſſumus de igne, quod nimirum potentialiter ſit ubique, & in omnibus: verum actu in nullis. Etenim inter hæc ſublunaria, ignis ex ſua natura nullibi exiſtentiam, aut certum durationis modum obtinet: in quolibet fere ſubjecto producit, verum in nullo diu retinetur, quin brevi evaneſcit, & exſpirat: imo niſi externa quædam accidentia ad ejus productionem ſæpè concurrerent, puto quod in terrarum orbe vix omnino ſuper-eſſet. Somniarunt nonnulli, ejus ſphæram ſub concavo lunæ ſitam: verum hoc ſolùm pro contexenda quatuor Elementorum hypotheſi, phantaſma introducebatur: nec enim tale quiddam ſenſui, aut rationi conſonum videtur. Ut naturam ignis rite indagemus, inquirere oportet, in quibus præcipue corporibus, & quomodo diſpoſitis reperiatur: dein ad eſſentiam ejus explicandam procedemus.

Subjecta igni tum producendo, tum ſuſtinendo maxime idonea, ſunt ejusmodi, in quibus habentur plurimæ ſulphuris particulæ: verum aquæ, ſalis, & terræ portio tantum mediocris: hæc enim accenſionem ignis impediunt, & copioſè ſuffuſa accenſum extingunt. Quare bituminofa, pingua, & oleoſa flammam citiſſimè concipiunt: ſic item ſtipites, ſtramen, ligna exſiccata,

& minus ponderosa : interim metalla, mineralia, telluris gleba, fimus, stramen madidum, & ligna viridia ægre aut vix omnino accenduntur.

Secundo observamus, quod toto tempore quo ignis in subjecto perdurat, particulae sulphureae confertim avolant, & ab earum discessu corporis accensi compages sensim disperditur : interim salis & terrae plurimum sub forma cineris post incendium remanet.

Erit *tertia* observatio, quod cum particulae sulphureae à subjecto quopiam penitus, aut maxima ex parte avolarunt, incendium omnino cessat, & forma ignis penitus destruitur, nec in materia residua sulphuris experte redintegrari potest.

Quarto sit notandum, quod interdum corpora quædam sine ignis alterius adventu, tantum propriâ effervescentiâ, & ab intestino particularum insitarum motu incendium concipiant, & sponte sua in cinerem redigantur : velut cum fœnum madide repositum primo incalescit, dein postea in fumum, & flammam erumpit : aut curruum rotæ & axes agitatione nimia excalefactæ accenduntur.

His juxta positis, asserere possumus, quod *forma ignis* omnino dependeat à *particulis sulphureis*, in *subjecto* quopiam *agglomeratis*, & *confertim erumpentibus* : quodque ignis sit nihil aliud, quam *ejusmodi particularum impetuosius concitarum motus & eruptio*. Est enim sulphur indomitæ prorsus, & efferatæ naturæ, cujus corpuscula, cum excusso mixtionis jugo, densius agglomerari incipiunt, torrentis instar quaquaversus se diffundunt, subjecti cui insunt, repagula diffringunt, & quicquid in oppositum venit, destruunt, aut in præceps deturbant. Nec solum propria subjecta reserant, verum & proximi cujusvis quod attingunt, fores & ostia patefaciunt, ibidemque sulphuris particulas quasvis congeneres pari furore incitant, & ad eruptionem provocant : quare ignis passim ignem accendit.

Particulae sulphureae, dum intra subjecti sui confinia, aut in superficie ejus agglomeratae motu rapido agitantur, aliorum vero corpusculorum implexu ab eruptione liberiore, & magis aggregata detinentur, *formam ignis* constituunt, qualis in *prunis ardentibus*, aut in *ferro candente* conspicitur : cum verò ex eodem subjecto ejusmodi particulae confertim, & simul colligatae avolant, *flammam* producunt, quæ est tantum *congeries, seu potius torrens particularum sulphuris simul confluentium, & conjunctim avolantium* : si particulae aquæ, terrestres, & salinæ cum sulphureis erumpentibus sint commixtæ, easque disjungere & segregare valeant, tantum *fumus* excitatur, qui postea corpusculis Sulphureis uberius exhalatis, & invicem coeuntibus, in *flammam* erumpit.

Ignis accensio pluribus modis contingit : *primus*, & simplicissimus est, cum à corporibus duris invicem allisis, sæpissimè autem à silice ferro percussa, ignis scintillæ erumpant ; quæ fomite, & panno lineo ad nigredinem usto exceptæ se dilatant, & dein, sulphurato admoto, flammæ accensionem faciunt. *Secundo*, Ignitio in lignis aridis, & exsiccatis non raro accidit, cum à nimio partium attritu, & agitatione effervescentia, sponte incendium concipiunt. Erit *tertius* modus, quando corpora Sulphure abundantia, uti fœnum, aut linum madide reposita (de quibus supra mentio fuit) sponte
excale

excalescunt, & postea accenduntur. *Quarto*, Modus usitatissimus introducendi ignem in quodvis subjectum, est ut ab alio igne accendatur. Singulos horum processuum modos paulo expendamus.

I. *Corpora dura invicem allisa ignis scintillas excutiunt*: prout filix cum ferro, aut filice, cannæ Indicæ, lapis Pyrites, & alia quamplurima. Hujus ratio est, quia Sulphuris particulæ, quæ in corporis duri superficie resident, si ab alio corpore duro percutiantur, intus recedere nequeunt, (quoniam in duris non datur partium à loco in locum cessio) nec possunt particulæ Sulphuris concussæ paulatim evaporare; quin ob ictûs vehementiam necesse habent confertim erumpere. Quare cum hac ratione plures earum commoveantur, & simul aggregentur, ignis apparitionem exhibent. Scintilla linteo semiusto excepta in majorem ignem dilatatur, eo quod Sulphureæ particulæ in tali subjecto emineant, & ad ipsum eruptionis velut apicem producantur: quare à minima scintilla, qua data porta, citatæ aufugiunt.

Par omnino ratio est de *lignis à nimia attritione excalescētis*, & postea *accensis*; quo pacto curruum, aut molendinorum axis, & rotæ non raro igniuntur: etenim particulæ Sulphureæ hac ratione plurimum commotæ, densius agglomerantur; & cum, facto velut agmine, cæteras amovere, aut eliminare possunt, illico catervatim erumpunt, & discessu suo incendium producunt.

In *fæno* aut *fimo madidè repositis* sulphuris particulæ plurimum scatent, quæ latice aquoso pro vehiculo potitæ, sese in motum exerunt: cum vero ob ventilationis defectum paulatim exhalare nequeunt, intus coërcitæ, adeoque in exaltationem suam productæ, invicem magis approximari, & se mutuo incitare valent: dein postea plurimum conglobatæ, sese latius explicant, & subjecti claustra perrumpere incipiunt, adeoque incendium producunt. Etenim observare licet quod in quocumque subjecto, quando sulphuris particulæ segnius commotæ paulatim avolant, nec calor, nec ignis, verum *siccitas* tantum, & marcor succedunt. Sin rapidius commoveantur, quam ut sensim exhalare possint, *calor* in subjecto excitatur: dein si adhuc vehementius, & impetuosius agitentur, simulque densius agglomeratæ confertim erumpunt, *calori deflagratio* supervenit.

Ignis in subjecto quovis accensus proximum quodvis sulphureum aggreditur, & accendit. Nam veluti menstrua salina, scilicet aquæ Stygiæ, metalla sale minerali referta adoriuntur, & particulas eorum salinas, utpote congeneres, à mixtione solvunt: sic etiam particulæ sulphureæ accensæ proximas quasvis sulphureas corripunt, & imparem cum ipsis incendii motum suscitant.

Hæc de *natura & productione ignis*: restat proximè ut de *effectis ignis*, necnon de virtute ejus, & efficacia inquiramus; qualia nimirum corpora, & quo pacto dissolvat, & quibus insuper usibus inserviat. Ignis effecta præcipua sunt *calor*, & *lux*; utraque per emanationes, sive effluvia à corpore accenso dimissa excitantur: verum modo longè diverso, siquidem calor sine luce, etiam lux sine calore sensibili sæpissimè ad distans producitur.

Calor quatenus ad sensum tactus spectat concipitur, cum in cute, aliòve tactus organo passio quædam inducitur, qua fibrillæ, partesque nervosæ

varie distrahantur, in leves spasmos aguntur, ac interdum (si ictus sit vehemens) solutionem continui patiuntur. Hoc fieri solet, vel admonitione ignis, vel corporis alterius ab igne, aut alio modo excalescenti. Etenim ab utrisque particulæ sulphuræ, seu caloricæ, in motum rapidiorem excitatæ & confectionem erumpentes dimanant, quæ velut totidem spicula cuti nostræ, aliive tactus sensorio impacta, eadem vel leniter *titillando*, placidum caloris; vel gravius *feriendo*, molestum *ustionis*, vel *coctionis* sensum inferunt.

Propter caloris effectum ignis applicatur corporibus, vel *immediatè*, & sic vel *combustionis*, *coctionis*, aut *fusionis* gratia; vel *mediatè*, scilicet alterius corporis interjectu. *Comburentur* bitumina, carbones, & alia fossilia, etiam vegetabilia, & præcipue eorum folia, & ligna, propter calorem (ad usus humanos necessarium,) & producendum & conservandum. Comburentur lapides propter calcem vivam; vegetabilia ad parandos sales: *torreri* solent animalium carnes, & vegetabilium fructus, quo quidem hominibus in meliorem escam cedant. Etenim à coctione humiditas superflua evaporatur, & partes sulphuræ à calore vicino commotæ in vigorem & exaltationem, ventriculo & *visceribus* præbent. Ab igne *funduntur* metalla, & mineralia pleraque, quo nimirum aut purificentur, aut à fabris in varias figuras melius efformantur. Metalla, & mineralia pleraque, etiam sales, licet non inflammentur, & incendium capiant, (quia sulphure minus quam sale abundant) tamen ab igne violento candescunt, & fusionem patiuntur; eo quod sulphuræ ignis particulæ corpuscula salina, licet compactissima, subeunt, eaque ad tempus dissociant, quæ tamen ab invicem divulsa, statim igne exhalato denuo coeunt, & strictim uniuntur.

Secundo, quando ignis *mediatè adhibetur*, sulphuris soluti & in ignem conglobati particulæ dissociantur, veluti cum nubes in minutissimas pluviae guttas dispergitur: quare ignis formam deponunt; verum, dispersæ licet, obicem quemvis facile pertranseunt, & calorem satis fortem cuilibet subjecto inducunt. Hoc modo ignis plures ad usus accommodatur, quorum præcipui, & magis consueti sunt elixatio, digestio, & destillatio.

In *Elixatione* particulæ caloris menstruum aqueum subingrediuntur, ejusque particulis unitæ sese in rem coquendam altius insinuant: cujus humiditates superfluas auferunt, cruditates digerunt, ac in maturitatis statum evehunt. Instituitur elixatio, vel ut liquor rei coquendæ viribus imprægnetur, vel ut res coquenda à liquore subeunte inteneretur, ejusque particulæ exaltentur: etenim cibi & esculenta quævis ab elixatione, non secus ac à coctione, palato gratiora redduntur.

Digestio ut plurimum adhibetur in medicamentis, ut eorum particulæ segiores ad majorem activitatem evehantur; atque interdum, ut nimis efferatæ figantur, & mitiores reddantur.

Nobilissimus usus caloris, seu ignis mediati in *destillationibus* habetur; etenim caloris particulæ alias subjecti particulas ab aliis divellunt, vel (ut anatomia spagyrica) corpora quæque in partes suas, & principia resolvunt. Verum hujus consideratio nimis operosa, & ardua est ut huic tractatui inferatur.

Prout calor Tactus, ita lux Visus sensorium respicit, ipsumque adeo proprio & peculiari modo afficit, ut nihil omnino cernatur præter lucis radios, directos, aut reflexos.

reflexos. Etenim variae colorum apparentiae, & diversimoda corporum simulachra, quicquid demum oculis videmus, tantum lux est; aut recta nimirum à corpore lucido prodiens, aut ab alio corpore in oculum retorta, indeque in varias configurationes, & chromatismos efformata. Consideratio lucis res plurimum stupendas, & altae speculationis in se continet; quæ tamen hujus loci propriae non sunt: paucula hic annotasse sufficiat circa ejus *originem, motum, & perceptibilitatem*.

Lux distingui solet, quod sit vel *atherea*, quæ à sole & sideribus profluit; vel *elementaris*, quæ tantum a corpore ignito in flammam accenso procedit. Videtur, quod utraque sit tantum *flamma in majorem dimensionem accensa, ac in obliquam tenuissimam dilatata*: etenim sensui constat, quod à sulphureis inflammaticis, exempli gratia, à lucerna ardente, effluvia tenuissima seu corpuscula minutissime divisa perpetim dimanant: quæ in orbem diffusa, & rectis lineis velut à centro in circumferentiam exporrecta, usque in magna congerie quaquaversus expanduntur, totumque intra sphaeram activitatis suæ spatium radio luminoso complent. Flammæ particulae, quæ à corpore lucido primò decedunt, ab iis ponè sequentibus prorsum adiguntur, atque hæ demum ab aliis, & sic è continuata serie particularum flammæ usque succedentium, lucis radii efformantur, & in omnes partes confertissimè diriguntur.

Horum *motus* est admodum pernix, ut instar virgulæ aquarum cum impetu erumpentium, ictu oculi citius medium pertranseant, & velut ejusmodi aquæ, si prope fontem motus succiditur, citissime evanescant. Cum lucis radii à corpore luminoso recta pergunt, sine coloris aut imaginis cujusvis apparentia medium solummodo diaphanum, sive lucidum constituunt: cum iidem radii corpori solidiori occurrunt, haud recta pertranseunt, sed vel refracti immerguntur, vel denuo reflectuntur, & resiliunt, velut cum pila in parietem projecta, motu continuato in alias partes juxta incidentiæ angulos repercutitur. Lucis radii ab aliis corporibus reflexi, inque oculum illapsi, rerum visibilium imagines, & colorum varietates repræsentant. Cum enim corporum visibilium sint asperæ superficies, porulis & eminentiis innumeris præditæ; hinc lucis radii densissime iisdem impacti, & ab omni parte juxta omnes inclinationum & directionum modos reflexi, quousque pergunt, circumquaque in conorum apices quamplurimas coeunt, in quibus radii à toto objecto, velut basi prodeuntes, totius imaginem sive simulachrum referunt; atque hujusmodi imaginibus medium undequaque est confutum, ut ubicunque ponatur oculus, ejusdem rei, licet non prorsus eodem modo, imaginem cernat. Quatenus vero ejusdem lucis radii cuilibet corpori impacti, & circa superficies ejus asperas & inæquales varie refracti & distorti, inde in oculum, velut cum gyris, & vorticibus reflectuntur, diversimoda *colorum* phænomena apparere faciunt. Enimvero colores, & rerum imagines ex sua natura non existunt, sed velut spectra, tantum aliunde, scilicet ex radiis lucis apparitiones suas mutuuntur. Cum nox obscura interiori huic mundo tenebras altas inducit, res nisi quod tactu percipiuntur, *quæres* suas omnino amittunt: quando Sol hemisphaerium revisit, nova prodit rerum creatio, & tota simul Atmosphæra multiplici & subita progenie, scilicet infinitis *corporum simulachris & colorum apparentiis* oppletur.

Itaque lux haud tantum illustrat medium, ut visio peragatur, uti nonnulli volunt;

volunt ; verum & ipsa creat visus objecta , eademque in oculi penetralia , imo ad intimos cerebri recessus introducit ; idem hoc præstat officium oculo , quod intellectus animæ , scilicet corporum Ideas sive Imagines cudit , atque easdem ab intuitiva facultate perceptibiles reddit. Lux sola tunicas & humores oculi penetrare , nervi Optici fibrillas commovere , & in sensationis actum concitare valet. Quippe rerum simulachra è lucis radiis varie reflexis , & in conorum apices coëuntibus conflata , intra oculi pupillam sistuntur ; veluti in camera clausa objecta per foramen admissa , ad vivum depingi videntur : atque vitra concava aut convexa , quibus radii paralleli refringantur , vel inversi reducantur , supra humanæ artis industriam , egregie suppleant humores in oculo collocati ; quorum ope objecti cujusvis imago in justa figura & proportione , juxta retinam depingitur : ac dein à motu , quem hæc imago fibrillis nervi Optici imprimit , visionis actus in cerebro perficitur. Hactenus de colore & luce , quorum speculatio licet à fermentationis doctrina prorsus aliena videatur , quatenus vero ejusmodi particularum *sulphurearum* motu , æquè ac pleræque aliæ operationes physicæ , perficiuntur , brevis eorum mentio hoc in loco præteriri non debuit. Priusquam vero ignis considerationem plane dimittamus , erat hic operæ pretium de subjectis quibusdam velut anomalis inquirere , in quibus nimirum ignis virtutes admirandas & præter communem sui morem exerit : hujusmodi autem sunt è simplicibus *sulphur* commune , & *sal-nitrum* , è compositis *pulvis Pyrius* , & *Aurum fulminans*.

De *sulphure* communi observare licet , quod cito ignem corripit , quod immediate in flammam prorumpat (qualiter præterea nihil ,) quod de flagratione sua ignem culinarium extinguat , quod flammam caruleam emittat , & fuligine sua objecta quævis dealbet. Si hujus subjecti materiam spectes , sive partes è quibus mixtum conflatur , spagyrica ejus analysis exhibebit *sulphuris* puri copiam ingentem , *salis Vitriolici* quantitatem modicam , *spiritus* , *aqua* , & *terra* tantillum. Cum enim *sulphur* commune à spiritu Terebinthinæ dissolvitur , pars *sulphurea* tincturâ valde saturata menstruum imprægnat , salina in Chrystallos concrescit : aut quando sub campana accenditur , *sulphur* penitus deflagrat , interim sal resolutus & fluorem adeptus circa vasis latera defigitur , adeoque liquorem exhibet spiritui vitrioli simillimum , aut potius ipsummet eundem. Quibus adde , quod si oleum Vitrioli & Antimonium commisceas , & in retorta destilles , *sulphur* citrinum , communis æmulum , in collo retortæ sublimabitur.

Dico igitur , quoniam in hoc concreto plurimæ adsunt *sulphuris* particulae , eaque satis laxæ solutæ in mixto jacent (scilicet neque terræ aut aquæ interjectu divisæ & separatae , nec à sale multum constrictæ ;) ideo sunt motus promptissimi : quare ab ignis scintillula , solutâ compage , erumpunt ; & quia plures una se foras proripiunt , ideo non ignis nudus , prout in qualibet præterea re combustibili , sed primo & immediate flamma accenditur. Ejus flamma carulea evadit , quia purum fere *sulphur* exardescit , non cum admixtis aquæ , & terræ particulis , prout fit in ligno , aut stramine. Simile omnino contingit in spiritu vini inflammato. Ignem culinarium extinguunt ob salis Vitriolici corpuscula derelicta ; eademque cum flamma , & fumo *sulphuris* eventilata , colorem album rebus obducunt ; cui etiam simile efficiunt effluvia à spiritu Vitrioli , aut aquis Stygiis exhalata.

Circa Sal-nitrum annotamus, quod *per se non omnino accenditur*, sed ab igne intenso colliquatur; *sulphureis vero quibuscunque admixtum, cum impetu & explosione quadam in flammam prorumpit*. Etenim Sulphuri communi, Antimonio, aut Tartaro additum cum intonatione deflagrat; etiam si nitro colliquoato lignum aut carbonem indideris, flamma cum vento circumcirca exploditur, ita ut materies immissa huc illuc agitetur & sæpe extra vasis ambitum ejiciatur. Ab hujusmodi deflagratione quicquid nitrosum, absumitur, sale fixo (qualis Tatarum est) residuo. Quando Nitrum destillatur, sabulum aut farina laterum in dupla (ut minus) quantitate admiscetur; secus Nitrum colliquescens non omnino in vaporem solvitur. Inter destillandum vapor emissus admodum rubescit, ut receptaculum, velut à flamma inclusa, cum splendore rutillet. Exstillatur liquor acetosus corrosivus, qui metalla pleraque, etiam aurum dissolvit.

His rite perpensis, videtur quod mixtum hoc præcipue constet ex *sale copioso*, & *modico sulphure*; verum iisdem non fixis, & otiosis, sed utrisque exaltatis, in motum promptis, & non sine renitentia quadam unà colligatis: nimirum corpuscula sulphurea salinis obvoluta, & velut arcte compressa usque emicare nituntur; verum intus constricta, vi aut indole propria emergere nequeunt: quamcitò autem corporis alterius sulphurei mixtura, & accensione disjunguntur salis particulae, & claustra referantur, statim inclusa sulphuris corpuscula, velut carcere effracto, se cum impetu proripiunt, obicem quemvis amovent, & aërem subita eruptione violenter feriunt.

Quare quod ignis Nitrum vase inclusum non accendat, sed tantum colliquet, cum interim materia quævis sulphurea ignita ipsum cum strepitu deflagrare facit, ratio est, quoniam quæ ab igne decidunt corpuscula, nitrumque subeunt, parum laxant & dissociant salis concretionem; ipsum vero non ita solvunt, ut sulphuri incluso patefiat aditus. Verum à sulphureis adjectis compactio salina plus dissolvitur, ac in tantum referatur, ut inclusa sulphuris particulae una omnes avolent, & ab angustiis liberatae se valde amplient, & spatium immensum desiderent.

Quod sulphur copiosè insit Nitro, præter deflagrationem ejus, satis testatur ipsius *genesis*; nascitur enim præcipue in locis ubi scatent animalium excrementa sulphurea. Idem arguit *usus in agricultura*, quoniam ab hoc terræ fertilitas plurimum dependet: hoc etiam *calor flammæ* inter destillandum emicans suadere poterit.

Ex præmissis non difficile erit *pulveris pyrii* in tormentis bellicis usitati naturam explicare. Etenim subita accensio, & vehemens explosio ejus exinde oriuntur, quòd plurimæ illæ & penè infinitè sulphuris particulae, quæ corpus illud *πυρῶδες αἶον* constituunt, uno momento ignitæ avolant; quæ simul omnes impetu facto erumpentes, & pro expansione sua spatium liberrimum, & amplissimum arrogantes, aërem & obstacula quævis violenter submovent, adeoque cum strepitu exploduntur. In mixtura hac adhibetur *sulphur commune*, eo quod ejus particulae sint laxæ & in motum promptæ, ideoque etiam accensionem promovere aptè: adjicitur *pulvis carbonum*, quoniam in hoc etiam corpuscula sulphurea, (velut in fomite qui à linteo semiuisto conficitur, videre est) ad ipsum eruptionis apicem perducuntur: quare

& hæc incendium statim concipiunt. Utraque hæc accensa, & *nitro* apposita illico ipsius compagem solvunt, & particulas sulphureas in ea inclusas extromittunt: quæ quidem è repagulis suis cum impetu erumpunt, & velut folium afflatu totius incendii vim adaugent. *Pulvis carbonum* in modica quantitate adjectus, licet terrestri materia scateat, tamen ob sulphur in eo eventum, hujus mixturæ deflagrationem accelerat: namque *carbo* & *nitrum* simul trita, citius & cum majori explosione igniuntur, quam nitrum & sulphur: at tamen si huic compositioni (quemadmodum parari solet pro tormentis majoribus) *carbones* in debito majori quantitate, & *nitro* improporcionata addantur, instantanea ignitio ob materiæ terrestri interjectum nonnihil retardatur, evenitque ut corpuscula inibi sulphurea nimis propere accendi apta parum disjungantur, adeoque pulveris infusi moles successive & per partes, & non tota simul flammam concipiat.

Auri fulminantis ratio non ita manifeste patet: quin mirum videtur, ut metalli alias ab igne inviolabilis calx in pulverem cedat, cujus granum unicum ab igne leviter incalescens cum tanto impetu explodatur & strepitum edat, qualem non centuplum pulveris pyrii. Scio plures à mixtura nitrosulphurea, velut in pulvere pyrio, hujus causam deducere. Nimirum supponunt, nitrum à menstruo solvente elicitum cum sulphure metalli coalescere, ideoque pulverem hinc paratum vim fulminantem adipisci. Verum enim vero hæc res accuratius pensitanti longe diversa apparebit: quippe hic *Χειροκράτου* pulvis non omnino accenditur veluti præparata ex nitrosulphureis: si admovetur ignis, per granula tantum successive crepitat, nec uti in pulvere pyrio simul totus fulminat: vasi autem ferreo, argenteo, aliive idoneo impositus & ab igne subito diu incalescens, tandem particulis una omnibus in motum concitis, cum ingenti strepitu exploditur: explosus vero nec flammam, nec scintillas edit, neque aurum deperditur. Si enim in vase cooperto hic pulvis fulminet, quicquid auri est, sub forma pulvisculi purpurei post detonationem remanet, & colligi potest. Ut hujusce causa genuina extricetur, erunt nonnulla circa præparationes ejus observanda, quæ faciem non levem præferant.

Pro conficiendo hoc pulvere omnino requiritur, ut solutio Auri fiat cum menstruo *Sale Armoniaci* imprægnato, aut saltem huic analogo: etenim cum spiritu nitri, salis, cum spiritu Bezoartico & nonnullis aliis incassum tentavi. Dein proxime requiritur, ut calx præcipitetur cum *oleo Tartari*: nam si eadem eum Argento aut Mercurio injectis in pulverem colligatur, vim fulminantem amittit. Item si liquor Tartari præcipitanter nimis infundatur, ut cum magna effervescencia fiat soluti percussio, sæpe *Virtus χειροκράτου* perit: præcipitatione vero sensim facta, pulvis ad fundum subsidens aquâ calidâ sæpius affusâ elevatur: qui tamen licet sæpissimè elotus & exsiccatus, auri dissoluti pondus longe superat.

His juxta positis, verisimile videtur, quod dum aurum à menstruo ad hanc rem appropriato solvitur, ejus particulis corpuscula quædam salis Armoniaci (aut alterius forsan analogi) utpote maxime Soli congenere, arctissime coherent: quæ dein à sale Tartari sensim infuso, inter præcipitandum plus finguntur, & una strictius colligantur: & dein istius pulveris, sive calcis solaris expressio sit nihil aliud, quam ejusmodi salium ab auri cohesione violenta abruptio. Cum

enim

enim pulvis ad hunc modum paratus igni admoveatur, aut alias incalescit, calor particulas Sal-Armoniacas, aliasve analogas solaribus affixas dissociare satagit : quæ tamen (cum ægre ab invicem discedunt,) non sine forti & diuturno calore divelluntur : postea tamen vi quadam divulsæ, propter subitam & violentam abruptionem aërem impetuosè feriunt, adeoque strepitum pro ipsarum mole validissimum edunt. Interea tamen, si subtus cochlear argenteum explosio fiat, videbis utriusque particulas segreges factas : hinc solares coloris purpurei : illinc salinas coloris cineritii. Quod vero hic pulvis non fulminet, nisi cum oleo Tartari sensim præcipitetur, ideo est, quia nonnullæ salis Tartari particule cum Sal-Armoniacis prius colligatis una coeunt ; qua ratione simul omnes fortius combinantur. Etenim sal Tartari cum mixtura Nitri, & sulphuris tritus eorum particulas pro tempore figit, ut hæc compositio non statim à calore accendatur ; postea tamen cum strepitu validiori exploditur. Atque pulvis hoc modo paratus auri fulminantis naturam imitari videtur : & probabile est, quod ex aliis mineralibus solutis & præcipitatis, ob *strictas salis cum materia metallica cohesiones, & violentas abruptiones, calces xρυσταίνι parari possint.* Quod revera hujus præparatio à *Salium combinatione* præcipue dependeat, constare videtur, quoniam si inter præcipitandum (uti interdum accidisse novi) oleo Tartari confertim nimis infuso, salium cum re metallica complexus dissolvitur, pulvis ad fundum decidit in exigua quantitate, & coloris valde purpurei, cujus granula sunt auri fere puri puti ramenta, ideoque non omnino fulminant : postea in liquore isto præcipitato crystalli tenues plurimi concresecunt, qui nimirum sunt sales à metallo divortium passi. Præterea quod sal Tartari hujusce pulveris præparationi nonnihil confert, indicio est, quod quæ vim fulminantem hinc adimunt, sunt ejusmodi quæ in salem Tartari præcipue agunt ; utpote trituratio cum sulphure communi, spiritu salis, oleo Vitrioli, aut sulphuris ; hæc enim cum sale Tartari effervescent, & conjungi appetunt, adeoque ipsum ab auri amplexibus avocant ; unde laxatur salium cum Solis particulis combinatio, & propterea vis sclopetaris perit. Quod fertur vulgo, hunc pulverem à levissimo calore, aut propter agitationem cum tudicula ferrea protinus accendi, aut explodi, uti mihi sæpius tentanti constitit, nullatenus verum est. Nec magis fide dignum, quod dicitur hunc solummodo *deorsum impetere*, & vi sua tabulata crassiora perforare ; interim superimposita nequaquam movere, aut concutere ; quippe olim hoc modo expertus sum : Bina hujus grana cochleari argenteo indita, cum thalero obtexi ; dein lucernâ cochleari subdita, à pulvere exploso strepitus validus insequutus est, eratque simul fovea in fundo cochlearis fere ad perforationem impressa, & nummus usque ad cameræ tectum cum impetu ferebatur ; quare cum hic pulvis *χρυστοκρυσταίνι* exploditur, ejus vis in orbem diffunditur.

Licet calor vehemens atque incitatus, necnon fumi & fuliginis emissio plerumque ab igne dependeant, tamen aliquando sine eodem actualiter accenso in quibusdam subjectis, idque gradu valde intenso, produci cernimus. Cujus rei instantia notissima est *calx viva* aquâ aspersa : Quod etiam præstant *aqua stygia ferro, butyro Antimonii, & stigmatibus vegetabilium salinis* commissæ. Viri doctissimi Gunterus, Coringius, Hogelandus, & fere quotquot fermentationis doctrinam attigerunt, hujusmodi effectus velut præcipua *ζυμώσεως*

exempla tradidere ; quamobrem operæ erit pretium de singulis nonnihil inquirere : hac tamen lege (quam etiam in aliis disquisitionibus mihi latam volui) aliorum sententias consulto omittam , libentius enim viator ex ipsis fontibus haurire solet : rem ergo ipsam breviter & succincte quâ licet perstringam.

Calx viva fit è lapide calcario, necnon plerisque etiam aliis (exceptis fere tantum quæ granis subrubris & quasi sabulosis constant) in furno clauso per plures dies ab igne reverberii calcinatis : hoc modo mixti compages laxatur, ut in materiam friabilem cedat, quæ ob summam qua pollet adstrictionem, cements pro re muraria parandis optimè inservit : calx ista furno exempta formam lapideam adhuc retinet, & tactui frigida videtur, attamen aquâ affusâ in molem attollitur, cumque fumo emissio mire incalescit, ut corpora quævis ad-mota comburat : insuper in pulverem album sponte diffluit. Quibus particulis iste motus, & effervescencia ascribi debeat, scilicet an lapidis calcarii insitis, an aliis ab igne ascititiis, haud facile constat : sed ut hunc nodum si quâ liceret solverem, calcis vivæ hanc analysin institui. Ejus circiter sesquilibram cucurbita ampla indebam ; dein aqua affusa capitellum cum recipiente capacissimo adaptavi : Mox intra horæ minuta materies intumescere & valde effervere cœpit ; inde fumus & halitus excitari vasa omnia in tantum excalefaciebant, ut eadem vix manibus tangere liceret : aqua limpida exstillabat in recipientem ad unc. 6. quæ minimè erat acris, at saporis subdulcis, & styptici : pulverem in cucurbita residuum aquæ communi incoxeram, & lixivium inde confectum igne leni decoquendum satagebam : dum evaporabat, pellicula alba, & crustacea, subdulcis etiam saporis, in superficie liquoris concrevit, eademque exemptâ statim nova successit : humore demum in totum exhalato, nihil acre aut salsum in fundo remansit.

Ex his colligi videtur, quod calor iste non ab insitis calcis principiis, scilicet aut salinis aut sulphureis quovis modo inter se commotis procedat : nam sal tantum subdulcis in ea reperiatur, qui etiam volatilis fuerat ; atque sulphuris haud multum in lapide calcario subesse indicio est, quoniam à diuturna calcinatione mixti forma non penitus destruitur, nec moles omnino corrumpitur : quare verisimile est, quod dum lapides hi in furno comburuntur, particulae quædam ignis cum salinis arcte cohærent, adeoque in mixto illo velut hospites extranei resident ; quæ quamdiu sopitæ & otiosæ jacent, terræque interjectu ab invicem secretæ, plurimæ licet ipsæ fuerint, calorem non cient : (quippe calor omnis à motu dependet) cum vero aqua affunditur, istæ particulae igneæ alveolis suis exturbatæ una confluunt, simulque ex hospitio confertim avolant : ita conglobatim erumpentes calorem valde intensum, & quia ab aqua dilutæ, solummodo fumum, & non ignem actualem constituunt.

Ignis corpuscula, seu empyreumata in materiis diu calcinatis etiamnum hæ-rere, indicio est, quoniam instrumenta ferrea, juxta quod plus aut minus, sensim aut confertim ex eorundem poris istæ particulae igneæ depelluntur, mollia aut dura, tenacia aut fragilia evadunt : insuper observare est, quod lateres aut vasa terrea recentia, aquæ immersa sibilationem quandam profertunt ; necnon tubuli pro excipiendo Nicotianæ fumo cocti, si extremitas altera

aqua

aquæ imponatur, & altera auri admota sit, argutum quendam strépitu & borborygmum edunt: his adde quod sales fixi calcinati, aut ab igne fluorem passi, longe acriores evadunt; etiam aquæ stygiæ propter involuta ejusmodi corpuscula, quæ postea sensim evaporant, fumos acres perpetim emittunt: cumque istæ calcibus salinis affunduntur, non solum ebullitio excitatur propter discrepantes salium particulas, quæ se mutuo quò strictius combinentur, atterant: at insuper calor & fumus succedunt, quæ plerumque à particulis igneis è latebris excussis oriuntur: cur autem calx viva, & minimè alia concreta ejusmodi empyreumata adeo copiosè retineant, & ea ab aqua affusa calorem intensum producant, non facile est rationem assignare.

Satis constat quod cum ignis effluvia *sulphurea*, (utpote penetrantissima,) corpora quævis admota subeunt, eadem diversis modis afficiant: quæ laxiora sunt, & principiis activis referta, à combustionem omnino destruuntur; & quia compages eorum corrumpitur, particule igneæ velut milites in urbe ab ipsis direpta, soloque æquata, non diu diversantur, quin ultra pergunt, & castra promovent: ubi vero subjecti concretio est valde compacta & elementa ejus ab igne adeo minime divelli queant, ut potius obrigescant, uti in metallis, vitro, lateribus aliisque aut coctione aut fusionem induratis videre est; empyreumata ingressa, seu hospitio minus commodo excepta statim exeunt, & idcirco pauciora tantum in hujusmodi mixtis aut fuis aut calcinatis restitare solent: sin vero ignis durioribus concretis, cujusmodi sunt saxea pleraque & testacea, ita applicatur ut missionis vinculum referetur, partesque aliquotæ, scilicet aqueæ & sulphureæ abigantur, & ita spatia quædam excaventur advenæ cuilibet excipiendo satis idonea, interim ut rei compages haud prorsus destruat, at in forma compacta, & lapidea perstet, quæ non una cum particulis suis diffluat, & ruinam semper minetur, in tali præcipuè subjecto particule ignis partium profugarum spatia occupantes copiosè diversantur; ibidemque corpusculis salinis arcte cohærentes terrestriumque interjectu ab invicem detentæ quietæ jacent; quæ tamen postea hospitibus istis violenter propulsæ, eruptione sua calorem intensum ac fere igneum producere valent; interim corpuscula ista salina à diuturno igneorum contubernio, & complexu tum mutuo, tum alieno ita laxantur, ut volatilia evadant, & aqua diluta cum ipsa magna ex parte evaporent; atque sal residuus, quia etiam volatilis, simulque ab aliis principiis fere divortium passus, & subdulcis est, & conjugii appetens atque astringens evadit: ideoque etiam pro re-muraria usus egregii est.

Quod vero aquæ stygiæ salium fixorum stigmatis affusæ calorem producant: eademque ferro aut butyro Antimonii commissæ, ardorem ingentem cum fumo nigricante cient, ratio in propatulo esse videtur. Quoad aquas *stygiæ* & *sales fixos*, dicendum est quod ambo hæc concreta sunt tantum sales status diversos ab igne sortiti, adeoque particulis igneis (quæ scilicet sunt minutissimi sulphuris atomi) utrique plurimum referri: isti autem invicem confusi illico in mutuos amplexus ruunt; & quoniam utriusque particule dissimiles factæ sunt, ideo quo strictius uniantur, fit magna partium attritio, simulque particularum ignearum excussio, unde ebullitio ingens cum calore excitatur: quando eadem menstrua ferro aut glaciei Antimoniali affundun

affunduntur, sales utriusque coeunt, atque empyreumata, simulque particulas sulphureas in utroque subjecto prius insitas excutunt; quæ confertim avolantes, cum calore fumum, & tantum non flammam constituunt.

CAPUT XI.

De Fermentationis motu, quatenus in corporum præcipitatione observatur.

DE corporum *solutionibus* hætenus: restat ut de *præcipitatione* agamus. Celebratur hæc tantum in liquidis; quæ cum particulis heterogeneis sint referta, à materia præcipitante istarum particularum coguntur aliæ ab aliis secedere, & diversa subsistentiæ suæ loca, & modos obtinere: quare cum in hoc opere sit partium exagitatio & motus, ad fermentationis doctrinam ejus consideratio referri debet.

Præcipitatio adhibetur, vel in *naturalibus*, uti imprimis in *lacte*, *sanguine*, *urina*, & forsan quibusdam aliis; vel in *artificialibus*, quæ sunt diversi generis, & naturæ; verum ordine quodam conscribi, & recenseri possunt, quatenus liquor aut *præcipitandus*, aut *præcipitans* sit vel *spirituosus*, *sulphureus*, *aqueus*, aut *salinus*: præterea in quantum particula à reliquis secreta sint vel *Elementares* (scilicet vel sulphureæ, terrestres, aut salinæ,) vel *integrales*, quæ de totius mixti natura participant, & sunt tantum minutæ ejus portiones plurimum contractæ.

Duo sunt vulgares, & triti præcipitationis modi, quibus è lacte conficitur tum *caseus*, tum *butyrum*: quoad primum, si lacti tepenti quodvis acidum infundatur, illico partes crassiores, & caseosæ à serosis & tenuioribus secedunt, ac in crassamentum spissius congregantur: Cujus ratio in hoc sita est. Habet lac consistentiam nonnulli crassam, ejusque pori & meatus sunt contentis spissioribus (nimirum caseosis) plurimum obstiti; quare cum aliquid subtilius & penetrantius (quale est coagulum acidum) liquorem permeat, crassiores quibus pori occupantur, particulas facile extrudit, quæ dein se mutuo implicant, & seorsim à tenui & seroso liquore secernuntur. Quando lac diutius ad acorem servatur, absque coagulo infuso (modo super ignem intepescens) eodem ritu præcipitatur. Etenim lacte inveterascente ejus partes salinæ fluorem adipiscuntur; dein ab igne commotæ, proprio acore coaguli acidi vicem supplent. Quin etiam non improbabile est, quod sal fluidus in coagulo lactis particulas salinas in fluorem provocat, & quod potissimum sub hac ratione coagulatio ejus succedat: nam siquidem partes salinæ sponte fluorem adeptæ poros liquoris ita constringunt, ut contenta crassiora iis ultro exterminentur; quidni quando ejusmodi salis fluor ab alio immisso inducitur, idem idpropter evenire dicamus? Quod vero lactis coagulatio non tantum ob liquoris meatus, & poros alieno corpore occupatos contingat, indicio est, quia *sal Tartari*, licet maxime præcipitatorius, nihil hujusmodi efficit, atque fere tantum ab *acetosis* hic effectus excitatur. *Saccharum* lactis plurimumque aliorum liquorum præcipitationes impedit, quatenus

quatenus nimirum & salis acetosi fluorem cohibet; & cum sit facile solubile, ejusque particulæ sint molles, & obtusæ, contenta liquori prius insita non extrudunt; quin vacuitates quasvis replent, ut postea non sit spatium quo liquor alter præcipitans sese explicet, & in aliena domicilia perrumpat.

Butyrum vero solent rusticæ è *floribus lactis*, plerumque ad acorem servatis, solum conquassando conficere; cujus ratio (uti mihi videtur) ita se habet: floribus lactis inest copia sulphuris, cui etiam portio mediocris salis, & terræ admiscetur, prout conjicere licet è liquoris à butyro residui tum acore, tum consistentia spissiori. In hoc mixto partes tum salinæ, tum sulphureæ sunt in motu & fluore: cum vero liquor sit crassior, statim avolare nequeunt; quare restat ut si mixtionis vinculum ulterius solvatur, in partes secedant: & imprimis ut sulphuris particulæ, quæ cæteris copiâ excellent, mutuo implexu una congregentur: quare hæc duo præstat florum lactis concussio: scilicet partes sulphureas crebra earum obvolutione sibi invicem adducit, quo se implicent magis, & mutuò irretiant: insuper earum cum cæteris mixtionem dirumpit. Ob hanc rationem tempore hyberno (cum flores lactis sunt tenuiores, & sulphure minus abundant) butyrum difficiliter conficitur. Præterea salis, aut sacchari mixtio ejus confectionem omnino impedit: quoniam horum corpusculorum interjectu partes sulphureæ à mutua adhæsione detinentur.

Præcipitatio *sanguinis* præcipua, quæ intra corpus animale peragitur, fit in renibus, ubi non sine coaguli cujusdam vi materia serosa à reliquo cruore secernitur, non secus ac serum à lacte: ob quam rationem diuretica sunt ejusmodi, quæ & lacti congelationem inducunt; ideoque quia sanguinem fundendo plus præcipitant, largam urinæ profusionem inferunt. Sanguis extra vasa missus, propria indole in varias substantias secedit: dum incalescit, à liquoribus quibusdam infusis varie præcipitatur, (pariter etiam urina) non sine jucundo spectaculo. Si modo sanguini calenti spiritum vini, c. cervi, fuliginis, vitrioli, aliosve liquores imprimis spirituosos, aut salinos infuderis, mira ebullitio, & effervescentia excitabitur: unde conjicere licebit, quo ritu in febricitantibus turgescat. Præ cæteris autem sal Tartari, & solutio Aluminis, tum in sanguine, tum in urina maximam liquoris perturbationem, & partium subsidentiam procurant: hæc enim contenta quævis poris & meatibus liquoris deturbant, & dein adstrictione sua ipsos plurimum obferant.

Præcipitatio in *artificialibus* majoris notæ & usus est: hæc enim dissolutiones plerumque sequitur, iisque velut ordinis cujusdam ritu succedit; siquidem hæc prædam, quæ menstrua quævis dissolvendo aucupantur, velut faucibus eorum exigit, ac seponit. Pro diversitate menstrui, ac corporis dissoluti, etiam præcipitatio varie contingit: in quibusvis tamen subjectis circa præcipitationis modum duo sunt imprimis notabilia nimirum soluti particulæ menstrui poris & meatibus immerse solent iisdem excidere, vel propter *spatii continentis angustiam*, vel propter *contenta pondere*, & *mole aucta*. Etenim in nonnullis solventis pori aut sensim constricti, aut corpore alieno obsessi, soluti corpuscula cellulis suis excludunt, ac ad fundum dimittunt, uti observare licet in solutionibus sulphureis, aut totius mixti partium integralium, in tenui liquore factis: quæ à frigore externo, aqua simplici, aut saltem ab acido quovis infuso turbantur, & contenta sua deponunt. Ad hunc modum tincturæ resinose etiam

sulphuris

Sulphuris, Benzoin, olibani, vegetabilium infusa & decocta, item urina, lac, & sanguis præcipitari solent: verumtamen in quibusdam aliis, quod propterea pori & meatus aut sensim contrahuntur, aut novo hospite occupantur, etiam soluti particulis à materia præcipitante aliquid novi accrescit: quo quidem pondere & mole auctæ, amplius sustentari nequeunt: quin necesse habent ad fundum subsidere. Hoc præcipue cernitur in solutionibus mineralium salinis, quæ tantum à salibus præcipitantur: quorum particulæ protinus cum soluti corpusculis cohærent, eorum moles adaugent, ut proprio statim pondere ad ima descendant: etenim in solutionibus salinis soluti corpuscula cum particulis salis fluidi à menstruo arcte constringuntur, atque in ejusdem salis fluidi amplexus particulæ salis fixi à præcipitante infuso confestim ruunt, & una agglomerantur; quare cum hæc tria (nimirum *utrinque salis, & rei soluta corpuscula*) simul cohærent, granula majora constituunt, quàm quæ in angustis menstrui spatiolis contineri queant, ideoque detrusa versus fundum decidunt. Quod hæc revera ad hunc modum se habent, indicio esse poterit tum salis fluidi & fixi magna affinitas, ut amborum particulæ juxta positæ, aut commistæ statim una combinentur: tum quia solutiones pleræque mineralium à sale fixo statim præcipitantur, non autem à vitriolo aut alumine injectis, quæ multo magis constringunt & liquoris poros obducunt. Tertio demum, quia materiam in præceptis datam, mole & pondere solutam longe superare, & sale fixo adhærente imprægnari, vel sensuum examini liquido constat. Verum his insuper habitis, ad particulares præcipitationum casus descendamus; quatenus scilicet pro *diversitate menstrui, materia soluta, & præcipitantis infusi*, præcipitatio multifariam peragitur.

Aqua simplex, quas *infusione* aut *coctione* in se excipit mixti particulas, licet non bene sustineat; tamen à præcipitatione eas ægre dimittit. Sunt enim pori hujus menstrui nimis aperti & laxi; quare materia præcipitans soluti corpusculis non facile impingit: interim ob laxiorem menstrui compagem corporis soluti partes quædam subsidunt, aliæ sponte evaporant; unde liquor iste virtutes, aut tincturam quibus aliunde imprægnatur, non diu servat. Ut partes quædam crassiores, & terrestres ad fundum deturbentur, aut aliàs secernantur, vel succum limonii, vel quodvis acidum instillamus, aut ovorum albumina incoquimus, nimirum ut viscosæ eorum substantiæ quicquid spissius est, adhærescat.

Menstrua *spirituosa*, & *sulphurea*, dissoluti particulis sulphureis imprægnata sarcinam suam facile deponunt: etenim aqua communi, aut quavis stillatitia præcipitantur, prout cernere est in tincturis sulphureis & resinosis, sulphuris, scammonii, benzoin, thuris, aliisque hujus generis cum spiritu vini aut oleo Terebinthinæ paratis, quæ ab aqua, aut phlegmate, infuso statim lactescunt. Etenim in hujusmodi solutionibus pori sunt omnino occupati, ut nihil præter dissolutum admittant: & præterea tum liquor, tum materia soluta, sunt admodum tenuia, ut cuivis præterea infuso facile locum cedant.

Cum hujusmodi menstrua particulis salinis saturantur, ut in tincturis è sale coralliorum, Tartari, & similibus observare licet, non statim ab aqua communi, sed à liquore acido, ut spiritu Vitrioli, salis, &c. præcipitatio succedit.

Menstrua *salina*, lapidum aut metallorum solutionibus imprægnata, à particulis

ticulis salinis facillime, & vix ab aliis, præcipitantur. Liquor maxime præcipitatorius est sal Tartari, aut herbarum incineratarum deliquatus; hic enim cuiusvis soluti particulas repercutit, ac in fundum deturbat; quatenus nempe solventis spatiola undequaque permeat, & contentis adhærescens, eadem mole auget, ut pondere suo menstrui poris etiam una constrictis, facilius excidant.

Quod *sal fluidus* (uti sunt acetum, aquæ stygiæ, &c.) dissolvit, idem *sal fixus* præcipitat, & è contra; quippe sal Tartari deliquatus sulphur commune optime penetrat, & tincturam excipit, quæ dein à sale fluido, scil. spiritu vitrioli & similibus præcipitatur. Quod quidem accidit non ob particulas salium discrepantes, & se mutuo oppugnantes: sed propter easdem valde affines, & in mutuos amplexus ruentes: hinc enim soluti granula propter salium una amborum cohæsiones, pondere & mole aucta, promptius è menstrui spatiolis deturbantur, & ad fundum descendunt. Hujusmodi instantiis parcius hoc in loco insistimus, quia plenior eorum tractatus ad opus chymicum spectat.

Præcipitatio non solum in materiæ crassioris à seroso latice secretionem, partiumque deturbatarum versus fundum subsidentia, observatur, verum aliquando particulae intra poros & meatus liquoris conclusæ adeo sunt minutæ, & subtiles, ut in præcepta datae haud visu discernantur, neque statim ad fundum descendant; sed tantum ex earum situ & positione varie immutatis calor & consistentia liquoris diversimode alterentur. Olim ludere solebam cum vegetabilium & mineralium solutionibus, quæ cum seorsim factæ (instar aquæ fontanæ) claræ & diaphanæ apparebant, invicem commixtæ calorem modo atrum, modo lacteum, rubicundum, viridem, cæruleum, aut aliis generis referebant. Solutio Saturni cum aceto destillato facta, tanquam aqua communis pellucida apparet: huic si oleum Tartari instar aquæ limpida adjicias, mixtura statim lacti similis albescit. Si Antimonium cum nitro calcinatum aquæ fontanæ incoquitur, colatura videtur limpida & fere inodora; quæ tamen acido quovis perfusa, colorem illico croceum cum pessimo foetore acquirit. Aqua communis *Mercurii sublimati* infusione imbuta, ab *oleo Tartari* instillato statim flavedine tingetur. *Argentum vivum*, & *sal Armoniacus* simul trita, & in matraccio calore arenæ sublimata, in pulverem album facessunt: hic vero deliquio solutus aquam limpida fontanæ æmulam exhibet, quæ tamen *ari* aut *cupro* illita *argentea* apparet, & vasis æneis leviter affricata, eadem velut perfecte deargentata reddit. Solutio stanni calcinati sali Tartari deliquato commissa, cærulea evadit. Infusio gallarum limpida solutioni vitrioli permixta, fit atramentum; huic si spiritum vitrioli, aut aquam stygiam adjicias, liquor nigricans instar aquæ fontanæ fit denuo pellucidus; hunc oleum Tartari rursus in atramentum reducit. Quodque magis mirum est, si in charta cum Vitrioli infusione limpida scribas, & literas quasunque exaraveris, quod ita scribitur brevi evanescit, nec characteris vestigium aliquod relinquitur: veruntamen si infusio gallarum chartæ illinatur, protinus literæ velut atramento scriptæ legenti prostant: quas tamen penna spiritu vitrioli intincta uno illitu prorsus delet: atque statim alia liquore Tartari imbuta denuo reddet. Tinctura violarum cærulea oleo Vitrioli suffusa purpurascit: cui si guttas quasdam spiritus cornu cervi addas,

color iste purpureus in viridem mutatur. Lignum Acanthinum è Brasilia petiitum, aquæ communi infusum, tincturam grate rubicundam vino rubello similem deponit: huic si parum aceti destillati infundas, liquor instar vini albi limpidus apparet: guttæ quædam olei Tartari colorem valde purpureum reducunt: dein si spiritus vitrioli infundatur, instar vini Hispanici pallide flavescit: si plumbi salem deliquio solutum adjicias, mixtura illico lactescet. Hoc ritu imitari licet famosum istum *ὁδὸς ποτόν*, qui aqua fontana copiose ingesta, evomere solebat in vitra hinc inde posita liquores diversimode coloratos, & vinorum diversi generis ideas referentes: cristallina enim prædictis tincturis (leviter ita ut astantium oculos omnino fugiant) medicata, immixtam aquam non solum vina quælibet imitari instituent; sed ipsum Poëtarum Prothea in undas mutatum, & dein colores omnes formasque infinitas induentem exhibebunt.

Hujusmodi phænomenon ratio si inquiratur, omnino peti debet à particulis minutis intra poros cujuscunque liquoris contentis; quæ quoad situm, & positionem ab alio liquore infuso diversimode alteratæ, radios lucis varie transmittunt, multifariam refringunt aut reflectunt, adeoque diversas colorum apparentias faciunt. Cum enim radii lucis fere recta pertranseunt, fit color instar aquæ fontanæ *limpidus*: si in transitu parum refringantur, liquor *citrinescit*; plus adhuc refracti, *ruborem* inducunt: si incurventur adeo ut non denuò emergant, *opacitas* aut *nigredo* oritur: si ab extrema liquoris superficie statim reflectuntur, *albedinis* phasim creant: atque hoc ritu circa alios colores, eorumque apparentias varie philosophari licebit, quorum diversitas, & subitæ alterationes in liquidis à præcipitatione imprimis dependent. Quippe prout particulae in liquore contentæ, ab alio infuso modò proprius adiguntur, ut se invicem complicant; modò in alias positionum series ordinantur, fit diversimoda colorum representatio. Etenim liquor hujusmodi corpusculis, sive atomis minutissime confractis imprægnatus, videtur quasi acies militum statis ordinibus collocatorum, qui prout stationum ordinarum series, modo contrahunt, modo dilatant, modo dextrorsum aut sinistrorsum invertunt, pro multiplici artis Tacticæ apparatu, diversissimæ apparent. Cum duo pellucidi liquores simul commisti atramentum conficiunt, ideo est quoniam particulae in utrisque contentæ invicem approximantur, & velut clausis ordinibus collocatæ, radiorum lucis transitum inhibent: cum ab alio liquore infuso atramentum hoc denuò clarescit, ideo est, quoniam infusi nova corpuscula particulas priores attiguas ab invicem dispertiunt, ac in ordinum clausorum aperturas adigunt.

C A P U T XII.

De fermentationis motu, quatenus in corporum coagulatione, & congelatione observatur.

Coagulatio & congelatio corporum naturalium, non minus quam solutio eorundem, à principiis hisce nostris unice dependet. Improportionata horum mixtura, & quorundam præ cæteris exaltatio ac præpollentia, utriusque

que causa sunt. *Spiritus* & sulphur vinculis soluta, non tantum propria divellunt subjecta, sed & proxima quævis adoriuntur; ac ubi copia ac viribus præstant, nihil magis quam divortia & separationes à reliquis principiis affectant, & nullibi moram patiuntur: è contra autem *Sales* cum cæteris uniri, & in substantias duraturas, & solidas compingi amant; atque reliquorum consortio destituti, statim novas inire amicitias, & tantum non cuilibet obvio conjungi appetunt. Si quando, seu invito genio impetuosius moventur illi, aut soluti aliorum compages destruunt, videtur res ista in hunc finem quasi à natura destinatum fieri, ut subjecta sibi congrua adinveniant, & pace per bella parta, iis tandem strictius uniantur: quare cum menstrua salina lapides aut metalla corrodunt, cum eorum particulis coagulantur, & in crystallos diversimode figuratos concresecunt.

Cum de *coagulatione* hic agimus, haud more usitato hoc vocabulum sumimus: nimirum vulgò usurpari solet, quando lac congelatum redditur, hoc est, ex simplici & æquabili liquore in substantias heterogeneas, scilicet caseosas & serosas, sive crassas & tenues faceffit; pariter cum sanguis aut alii humores eoritu in partes secedunt, coagulari dicuntur: etiam nos alibi hunc sensum huic verbo concedimus, licet propriè loquendo istiusmodi motus ad præcipitationem potius, quam coagulationem referri debent. Hic autem *coagulationis* nomine intelligi velim ejusmodi in corporibus alterationem, ut cum res prius teneræ & molles in materiam rigidam ac velut saxeam obdurescunt: sive coagulari aliquid dicatur, quando corpuscula salina in subjecto quopiam latè dispersa congregari & invicem conjungi incipiunt, indeque aut sibimetipsis, aut cum terra unita, è fluida, aut molli substantia duram & compactam producant. Hoc advertere licet in fructuum & seminum putaminibus plane saxeis, in ossibus ac cornubus animalium, in piscium conchis, & incrustamentis testaceis; quæ quidem omnia sale Alkali, aut eodem volatilifato plurimum abundant. Inter chirotechnica, sive humanâ industriâ parabilia, *salium cristallisatio, vitrificatio, necnon ollarum & fictilium coctio* ad coagulationem referri debent.

Congelatio autem dicitur propriè, cum particulae salinae aliunde advenientes, subjecta quibus impinguntur arcte constringunt, particulas intra mixti compagem varie commotas figunt, & invicem colligant, ut totum exinde rigidum & velut saxum evadat. Hujusmodi effecta cernimus in *glacie & pruina*; quibus molle cœnum aut fluidæ aquarum scaturigines in duritiem plane marmoream obrigesunt. Necnon inter artis opera idem manifesto cernitur in salium quorundam confusione, & inter sublimandum mutua concretione; unde in substantiam modo glaciei, modo nivis æmulam faceffunt. Quibus addi potest aquarum *conglaciatio artificialis*, quæ salis & nivis commistione peragitur; instantias verò, quas in utrisque his circa artis opera notavimus, hoc in loco breviter percurramus, earumque rationes & modos fiendi paulò expendemus.

Cristallisatio salium ad hunc modum procuratur; sales cujuscunque generis in aqua communi quoad minima dissolvuntur, eorumque particulae per totam liquoris massam dispersæ omnino disparent: postea si liquor iste aliquatenus evaporetur, ut meatibus & poris ejus nonnihil constrictis, salis corpus-

cula sibi invicem approximentur, se mutuòprehendunt, & externo frigore constipante una coeunt, & mediis in undis in crystallos suæ naturæ proprias figurantur. Hoc modo sal nitri in pyramides, marinus in cubos, Alumen in figuras octohedrias, sal Armoniacus in hexagona, salesque alii in alias figuras sua sponte, constanti ritu efformantur.

Si in hujus rationem inquiratur; dicimus, quod ejusmodi sales non sunt elementa simplicia, sed corpora ex sale copioso cum reliquis principiis in exigua quantitate varie permixtis conflata: quæ perinde ac alia naturæ concreta, juxta falis, aut spiritus præpollentiam, & cum cæteris commixtionem, peculiare figurationum modos à primo conditore sortita sunt. Etenim in corporum naturalium figuris determinandis, *spiritus* ac *sal* habent se uti *circinus* ac *regula* in describendis figuris Mathematicis. Spiritus uti pes. Circini mobilis, sive stylus in manu artificis, varie excurrit, & diversimoda lineamenta huc illuc protrahit. Sal autem (velut regula apposita) alterius excursus moderatur, & determinat, atque intra confinia à natura designata coercet. Ubi sali spiritus præpollent, prout in vegetabilibus & animalibus, in figuratione rerum occurrit major varietas; quoniam spiritus latius excurrere protractus sui plura efformat vestigia, & lineis non rectis, sed intortis, & plurimum variegatis corpora describit. Ubi sal spiritui dominatur, uti in concretis mineralibus, & præcipue salinis, cum figuris minus exornatis, & ejusmodi quales in mathesi lineis rectis aut circularibus descriptæ, primæ & simpliciores habentur, corpora concresecunt. Sunt enim sales isti elementa velut secunda: & ab eorum in corporibus insitione, propriæ & nativæ rerum figuræ plurimum dependent; quare & ipsi configuratione quadam elementari primitus à natura imbuuntur. Adeo juxta Platonem, revera *πρῶτος ὁ Θεός*, & in simplicioribus figuræ primò regulares cuduntur, ut ex iis composita omnimodâ figurarum varietate instructa emergant.

Sales herbarum fixi calcinatione parati, quia spirituum consortio fere destituuntur, vix omnino in crystallos abeunt, nec sine longa evaporatione coagulantur. Sal marinus spiritu admodum paucò contentus, magno cum labore in cubos facessit. Proximè huic Alumen paulo uberius spiritu dotatum facilius coagulatur, & in elaboratiores figuras, scilicet octohedricas concresecit. Sal Nitri spiritu turgescens facillimè coagulatur, & in figuram perfectiorem, scilicet pyramidalem, quæ lineis sphericis, æque ac rectis constat, effigiatur. Sal autem volatilis, (qualis ex urina, sanguine, ac cornibus animalium extillatur) spiritui copioso associatus, in concreta plurimum variantia, quæ modo cervorum cornua, modo plantarum figuras imitantur, exarantur. E Mercurio cum sale, seu calce lunæ, mediis in aquis amalgamato, arbor argentea cum stirpe, trunco, & ramusculis ad vivum quasi depictis efformatur. Tempore hyberno usitatum est, auram vaporibus salinis imprægnatam, & in fenestratum vitra impactam, in pulcherrimas arborum, imo sylvarum Iconas condensari. De salium crystallisatione hæcenus: alia coagulationis species est vitrificatio, de qua proximè dicemus.

Vitrificatio (quæ & dicitur Ultima corporum mutatio, cujus natura capax est, & à qua non datur regressus) à sale fuso, & materiæ terrestri secundum minimas particulas unito dependet: cum enim ab igne vehementissimo

utraq;

utraque hæc materies funditur, ac per minima dividitur, utriusque corpuscula in fluore posita adeo stricto connubio invicem junguntur, ut postea non in perpetuum divellantur.

Vitrificationis plures sunt modi, & diversi apparatus; nimirum ex sale Alkali cum arenis aut materia sabulosa ab igne violento simul fufis, vitrum commune paratur: quod transparens est, & ob salis copiam, & ob sabuli diaphaneitatem; si enim arenulas è quibus vitrum conficitur, microscopio intuearis, singuli eorum globuli (tanquam gemmæ vitreæ) clari & pellucidi apparent. Quare sal istius materiæ diaphanæ fusionem ab igne inducendam promoveret, & deinde in fusæ amplexus strictissimos admittitur.

Præterea ex Minio, calce stanni, Antimonii, & aliorum quorundam mineralium (quando pars sulphurea prius avolarit) modo per se, modo cum filice aut materia arenosa fufis, vitra diversi coloris, & consistentiæ parantur. Quorum omnium ratio in hoc sita est, ut sal, & terra à violenta ignis fusionem minutissimè confracta, & quoad minimas particulas divisa, se invicem prehendant, adeoque strictissimo mixtionis vinculo simul colligentur. Horum coalitio non denuo resolvitur, quoniam intus in mixto desunt alia principia, quæ subjecti compagem referent: quin sal & terra mediante igne conjuncta adeo intime coherent ut divortia neque ex se affectent, neque ex alio patiantur.

Vitrificationi affinis est *ossarum fictilium & laterum coctio*: qua udum & molle lutum in duritiem plane saxeam obrigescit: verum in his major subest terræ copia & minor salis; quare sunt minus fragilia, & minimè transparent. Circa hæc dicendum est, quod mediante ac velut manuducente igne particule salis minutissimè confractæ & divisæ singulis materiæ terrestris particulis maritantur, & cum ipsis in substantiam velut lapideam, eamque non facile resolvablem obdurescunt. Etiam in materiis hujusmodi ab industria humana paratis, eleganti sanè artificio, concretiones ossium & lapidum in diversis animalium, vegetabilium, ac mineralium familiis à natura factas imitatur.

Quod ad *congelationem* spectat, sales diversi generis non raro simul coeunt, & in substantiam velut novam obrigescunt: hoc autem pluribus modis contingit. Ex his salibus nonnulli una commissi statim in crystallos concrefcunt: etenim spiritus mineralium acidi salibus Tartari, aut vegetabilium incineratione factis additi, cum effervescencia spumosa in coagulum album instar nivis facessunt. Cujus ratio est, quod particule salis fluorem adepti in spiritu, alias salinas in deliquio alcalifatasprehendunt: verum ob particulas utriusque primò dissimiles factas oritur lacta: dein ab eisdem unà consociatis crassamentum istud album consistit.

Non absimili modo iidem spiritus acetosi, puta Vitrioli, Nitri, Salis, & aliorum, metallis commissi ea dum corrodunt, una cum salinis eorum particulis crystallifantur: Ita spiritus Vitrioli, Nitri, item aquæ Stygiæ (quæ sunt tantum sales fluorem adepti) argentum, ferrum, cuprum, & alia dissolvendo, in crystallos elegantes efformantur. Etenim sales (æque ac sulphur) à mixtione soluti alia dissolvunt mixta, cumque homogeneis istius subjecti particulis uniri appetunt.

Erit alter *congelationis* modus, quando sales cum alia quadam materia commixti sublimatione è subjectis suis eleventur, ac dein particulas istius novæ materiæ, quas secum apportant, congelant, & unà cum ipsis (meteori instar) in sublimi concresecunt. Hoc modo sales vitrioli, nitri, & marini, cum Mercurio sublimati, in substantiam velut niveam congelantur: iidem cum Antimonio meteorisati, in materiem glaciei persimilem facessunt. Licet hoc modo congelationes naturales, quibus mineralia quædam ac imprimis vitriola, & sulphurea in terræ visceribus nascuntur, imitari. Etenim ex ferro & cupro vitriola factitia parantur, quæ naturalibus sunt perquam similia: ex Antimonio sulphur conficitur, quod nostro vulgari inflammabilitate, necnon calore, & odore ad amissum respondet, v. g. Antimonio pulverisato oleum vitrioli ad digiti transversæ eminentiam affundatur, ac in retorta, in furno arenæ destilletur; in collo retortæ sulphur citrinum sublimabitur, quod à communi sulphure neutiquam discerni poterit: quod indicio est, concretionem sulphuris in terra fieri, cum à sale vitrioli minerale quoddam sulphureum corroditur, cujus pars sulphurea cum eodem sale congelatur. Hoc etiam argumento est, oleum sulphuris, quod accensione sub campana à materia sulphurea separatur, esse tantum salem Vitriolicum, nec ab oleo Vitrioli quidpiam differre.

Congelationum instantias & exempla concludet *congelatio artificialis*; qua nimirum aqua communis, aut alii liquores etiam in hypocausto aut super ignem positi, subito in glaciem stringuntur: modus satis tritus & vulgò notus est. Sal cum nive & glacie commixtus, in vase aquæ imposito agitetur, & derepente aqua vasis latera circumambiens congelabitur. Res succedet, si cum sale communi, sive marino, nitro, aut etiam vitriolo, alumine, sale Armoniaco, aut Mercurio sublimato tentaveris: etenim sal cujuscunque generis, nivi aut glaciei additus, eorum mixtiones solvit, & particulas nitrosas, & congelativas à subjectis dimittit; quæ statim aquæ vicinæ immersæ ipsam (veluti si recens à Borea sufflarentur) congelant.

Quod magis mireris, patina nivem continens super prunas ardentes collocetur, atque in medio nivis imponatur vitrum aqua plenum: prout nix sensim ab igne deliquescit, aqua congelabitur; scilicet particulae nitrosæ à calore fugatæ, decessu suo aquæ vicinæ impinguntur, & ipsam congelant.

Atque hæc de *fermentatione* in genere, variisque ejusdem partibus breviter dixisse sufficiat: instantias in re tam diffusa congerere, infinitæ prorsus & nostro proposito alienæ esset operæ. Quæ hætenus habentur utcumque ex Philosophia naturali delibata, *dissertationi medica* proximè succedenti æquum erat ancillari, ut motuum mutationumque causas quæ in corporibus quibuscunque varie occurrunt, aliquatenus perspectis, tumultuum qui ab irritato sanguine reliquisque humoribus in corpore humano subinde nascuntur, originem, progressum, & statum, necnon remedia, & curam feliciter assequeremur, in quam palæstram favente numine jam tandem descendamus.



Caput primum de Febribus præ festinatione editionis,
& incogitanter ante præfationem typis datum, quam-
vis post eam legendum.

AMICO LECTORI,

P R Æ F A T I O.



DOCTRINAM de Febribus novam hoc sæculo instituere, forsàn idem videatur, ac si quis regionem hic in medio sitam pro terra priùs incognita describere satagat. Nam quæ ad huius morbi diagnòsin spectant, veterum, & recentiorum præceptis, & praxi jamjam firmiter stabilita videntur; imò, longâ experienciâ duce, adeò omnium in ore, & passim nota sunt, ut nulli domus magis sit sua. Utcunque tamen, si à vulgari circa Febres sententia, tanquam via maximè trita, paulisper recedam, & minùs calcato insistam tramiti, veniam meruero, quoniam non primus ipse, aut solus contra receptam opinionem, velut torrentis decursum brachia direxi. Enimverò in re medica (idque jure merito) nō ea nostris, quæ prioris ævi hominibus placuere: quippe veteres, supposito circa motum sanguinis falso innixi, velut per lubricum, & loca paludosa procedentes, sæpius fœdè, nec minùs periculosè lapsi sunt. Quare ex quo insignissimus *Harvæus* noster circulationem sanguinis, tanquam novum in Medicina fundamentum, posuit, nihil mirum si instaurandam penitus *iarum* & fulcimentis veteribus collapsis, ædificium ab ipso solo (quod aiunt) reficiendum curaverint posterì. Atque in hoc opere tum nostratium imprimis, tum exterorum Viri Doctissimi, non modo in amovendis prioris structuræ ruderibus, sed marmore, tabulatis, reliquâque materia ubertim suppeditanda, feliciter desudârunt. Olim inter antiquos, prout humoris nutritii, sanguinis, & succi

P R Æ F A T I O.

nervosi distributio, & motus naturales; ita eorundem præternaturales; & effervescentiæ febriles omnino in abstruso, & tenebris latuerunt; nunc vero, cum nova affulserunt lumina, & prius abditas rerum causas novisse datum est, minimè decet viros prudentes, & Philosophiam professos, usque clausos tenere oculos, atque in luce ipsa etiamnum cœcutire; præsertim verò circa morbum, à quo tertia pars mortalium usque hodie cadit, malle cum antiquis errare, quàm cum neotericis verum sentire, aut verisimilius opinari, animum insignis pervicaciæ reum arguit. Cum itaque prioris Medicinæ *πυρετολογία*, basin instabilem, & minùs firmam habere; atque huic plurima erronea, & planè falsa superstrui facilè sit ostendere, quid obstat, quin nos, principia certiora nacti, circa Febres scientiam meliorem erueremus? Profectò vix fieri posse arbitror, quin, licet veterum placita adhuc in Scholis palam venditentur; plerique tamen Medici, quibus intra corticem prospicere animus est, ratiocinatione propriâ sibi novas cudant Hypotheses, quibus exactius, quàm vetustiori isti febrium quadrent Phænomena. Quod verò objicitur, iisdem remediis, & simili medendi methodo, ab *Hippocratis*, & *Galen*i temporibus in hunc usque diem febres sat feliciter curatas fuisse; ideoque opus temerarium, & minus tutum videri, ut posthabitâ tot sæculorum experienciâ, res novas moliremur, præcipuè cum de corio luditur humano: huic facile erit referre, quòd Medicina fuit primitùs Empirica, & remedia crebro singularium tentamine minimèque præceptis generalibus, aut Analogiâ fuerint inventa: atque si, *Hippocratis* exemplo ducti, posterius ejus observationes tantum, & experimenta recoluissemus, proculdubio ars Medica cum majori ægroantium fructu, melius & ornatius accrevisset. Quod verò lumen ab antiquis clarè accensum citò præcluserit, posterumque oculos obfuscavit, fuit præposterum illorum studium, qui properè nimis *ισχυρικῶς* in methodum generalem, ad modum scientiæ alicujus speculativæ, tantum non ex ingenio suo, efformabant: namque hac ratione, prius quàm fundamenta firma ponerentur, speciosa satis, ac fallax, & instabilis struebatur doctrinæ moles. Quòd igitur, in curatione febrium indicationes quædam, antiquitus receptæ, adhuc ratæ præstant, eruntque in perpetuum

perpetuum observandæ experientiæ , primæ hujus artis magistræ , & minimæ Scholarum præceptis totum debetur. Atque hinc defensionem satis locupletem paratam mihi spero ; si enim veterum scita prorsus erronea non obstiterint , quin praxis Medicinæ , observationum inductione quâdam primo instituta , commodè satis processerit ; multo minus theoria , veritate subnixa , damni aliquid languentibus apportabit ; aut à tramite illo , quem longa ætas nobis laudatum dedit , Medicinam facientes transversos rapiet. Interim non dissimulandum est , nudam Empiricam , sine methodi , rationisque subsidiis , parùm valere , imò non rarò quamplurimum obesse ; neque enim iidem morbi iisdem remediis ubique profligantur. Qui verò utraque conjunxerit , ut non ratio experimenta & naturam ipsam pervertat , neque hæc rationem à gradu dimoveat , omne tulisse punctum videbitur. Quod licet me quàm minimè assequutum satis sciam , liberè tamen profitebor in hunc scopum me collimasse ; & fortasse aliqua pars erit laudis , ejusmodi ausis vel excidisse ; postquàm enim in libris quod animo veritatis avido satisfaciat minime reperirem , mecum statui in vivis , spirantibusque exemplis perquirere : ideòque , ægrotis crebrò assidens , eorum casus sedulò explorare , symptomata singula perpendere , eadèmq , cum exactis morborum diariis , scriptis tradere solebam ; dein super his assiduè meditari , alia cum aliis conferre , atque demùm particularibus eventis notiones generales adaptare cœperam : cùmque , hoc ritu , longo tempore , febrium accidentia , & decursus observando , & pro iisdem solvendis rationum formulas inveniendò occupatus fuisset , tandem nova hujus morbi pathologia animo concepta est ; quæ postea , accedente crebrâ observationum syndrome , velut succo & sanguine in fœtum , qualis modo videtur , sensim formata est. Partum vero , quem paradoxis , velut specie monstrosa , insignitum , intra privatos lares furtim tueri institueram , importuna amicorum diligentia manibus meis abstractum in propatulo incedere , atque coram aspectari curavit. Quæ ergo præter communem morem isthic de Febribus dicuntur , nolo quispiam à me tanquam è cathedra *disputare* ; prolata existimet : cogitata hæc dubitans in medium profero , doctiorumque examini , & emendationi submitto. Priores super hac re

non

P R Æ F A T I O.

non omnia verè dixisse, argumento erit me posse errare, imo (si libet) errasse : utcunque, si aliqua saltem in nova hac veritatis indagine vestigia rectè posuerim, atque alios (qui longè meliùs possunt) ad istam penitus eruendam hac occasione incitavero, haud omnino me cœpit hujusce, licèt temerarii, pœnitebit.






D E FEBRIBUS.

CAPUT PRIMUM.

Anatome sanguinis : ejus resolutio in quinque principia : comparatio cum vino & lacte.



EXPLICATA fermentationis doctrina, restat de præcipua ejus instantia, seu exemplo; nimirum de febribus tractare. Videtur enim quod febris sit tantum fermentatio, seu effervescencia immunda sanguini, & humoribus inducitur. Hujus nomen à februo (seu purgamento, quod etiam à ferveo derivatur) ortum ducit: quæ quidem vox commode omnino febrim imponitur, eo quod sanguis in hoc morbo effervesceat, & insuper fervore suo, velut mustum efflorescens, à sordibus purgatur. Ut vero fermentatio hæc, seu effervescencia febrilis rite explicetur, erunt hæc tria perpendenda. *Primo*, quis sit liquor fermentescens, an tantum sanguis, alii præterea humores. *Secundo*, quibus in mixtione principiis, & quali eorundem proportionem liquor iste constet. *Tertio* demum, quali istarum partium, aut particularum è quibus sanguis conflatur, motu & turgescencia effervescencia febrilis concitetur. His ita præmissis, febrium doctrina non ex aliorum Placitis, verum juxta rationum syllogas, crebra & diligenti observatione (nostra licet) erutas, certisque experimentis confirmatas, tradetur; quæ tamen omnia peritiorum judicio lubens submitto.

Sanguinem in febre immaniter ebullire, & impetum facere, vel sensui plane constat; etenim de cruore affecto, eodemque in vasis effervente, ac velut in furorem acto, unusquisque (rudis, & imperitus licet) febricitans queritur. Etiam præter sanguinem in venis & arteriis æstuantem, suspicari fas sit, quod succus iste quo cerebrum & nervosæ partes irrigantur, sæpe in vitio esse solet; cum enim liquor hic motu constanti, & circulatione quadam è sanguine in nervosum genus, indeque per vasa lymphica in cruoris sinum referri videatur, probabile est, si ob labem à sanguine contractam humor iste in crasi depravatur, aut à motu suo æquabili pervertitur, quod exinde rigor, & dolor, convulsio, delirium, phrenitis, & pleraque nervosi generis symptomata in febribus usitata oriuntur.

Post *sanguinem*, & *liquorem nervosum*, duo alii humores, prout effervesce apti, in considerationem veniunt, scil. chymus, sive *succus nutritius*, cruoris massæ continuo adveniens, & *latex serosus* ab eadem perpetuò discedens, qui licet primò, & ultimò sint liquores à sanguine secreti, & ab eo distincti, tamen huic confusi, velut partes ascititiæ seu complementa ejus debent censeri; etenim *sucus alibilis* recens adductus, sanguinis pars cruda, & assimilanda, atque *serum* pars ejus inveterascens, & ableganda habetur. Atque hoc modo, quandiu cum ipso sanguine in vasis utraque circulantur, de cruoris primogeniis effervescentiis participant, & non raro easdem occasionaliter inchoant, aut inceptas augment: quibus tamen modis hæc fieri contingunt, propriis in locis inferius dicitur. Quoad cæteros humores, qui sunt tantum succi nutritii, aut sanguinis recrementa, cum sint aut propriis receptaculis inclusi, aut in visceribus intra spatia angusta coërciti, nec uti cruor, aut liquor nervosus, aut reliqui humores modo citati singulas corporis partes lustratione continua perluant, erunt ab hoc censu eximendi; aliquando forsan causa occasionalis esse poterint, ut sanguis effervescentiam indebitam concipiat, aut in eadem diutius persistat: veruntamen ipse est solummodo sanguis (cum *liquore nervoso*, *succo alibili* & *sero adscititis*) qui excandescencia sua supra modum ebulliens, & per vasa cum impetu citatus, calorem præternaturalem in toto corpore diffundit, ac febris rationem formalem inducit; attamen quo pacto hoc fiat, non nisi ex sanguinis natura intime perspecta, & liquoris ejus velut *Anatome* facta, planum habetur.

Sanguini (quemadmodum liquoribus quibuscunque fermentativis) insunt *particula heterogenea*, quæ cum diversæ sint figuræ & energię, earum mutuo occurſu & subactione, quamdiu in mixtione perstant, fermentationis motus jugiter conservatur; prout in vino, cervisia, aliisque liquoribus fermentescantibus cernitur: dein si à fermentis adjectis liquoris mixtio nonnihil resolvatur, particula activæ à vinculis liberatæ adhuc magis turgescunt, & fermentationem cum motu rapidiori, & calore inducunt; quod videre est in familiari Chymicorum experimento, scil. cum sales fluidi liquoribus alius generis salinis committuntur, inde calor ingens, ac ebullitio concitantur. Quare de sanguine inquiramus oportet, quibus particulis constat, ut sit ex sua natura (uti vina, cervisiæ, aliique liquores) ad *fermentescendum habilis*: dein cujusmodi fermentorum ope, cum calore & motu citatiori effervescentiæ ejus tum naturales, tum febriles peragantur.

Cruoris massa ex opinione veterum, *quatuor humoribus*, nimirum *sanguine*, *pituita*, *bile*, & *melancholia* constare perhibetur: pro hujus aut illius humoris eminentia, diversa temperamenta efformari, atque propter eorum fervores, aut exorbitantias fere omnes morbos oriri statuitur. Hæc sententia, licet à *Galen* usque temporibus medicorum scholis increbuerit, nostro tamen seculo, cui sanguinis motus circularis, ejusque aliæ affectiones prius incognitæ innotuerunt, aliquantulum suspecta esse cœpit, nec ita passim pro solvendis morborum phænomenis usurpari; quippe ejusmodi humores sanguinem minime constituunt, verum qui sic appellantur (excepto sanguine) sunt tantum cruoris recrementa, quæ debent ab ipso continuo secerni: est enim sanguinis revera humor

humor unicus, nec alius circa viscera, & alius in habitu corporis; nec alio tempore movetur pituita, & alio bilis, aut melancholia (uti vulgò asseritur) sed liquor in vasis effervescens solummodo sanguis est, & ubicumque loci per singulas corporis partes defertur, usque idem est, & sui similis. Quoniam vero in aliquibus ob caloris insiti abundantiam, & propter ejusdem in aliis penuriam, alimenti coctio & in visceribus, & in vasis modo intentius, modo remissius peragitur, ideo sanguinis (licet unici & ejusdem semper liquoris) temperies diversa existit; & juxta variam hujus crasin dici potest, quod homines sint *biliosi*, *melancholici*, aut *alius temperamenti*. Præterea, quia dum sanguis in vasis inter circulandum conficitur, partes quædam continuo inveterascunt, & aliæ de novo supplentur, hinc à cruditate aut nimia coctione quid excrementitium congeri necesse est: quod tamen effervescentiâ (veluti in vinorum efflorescentia, seu depuratione succedit) ab ejus massa separatur: scilicet *humor aquosus* visceribus aut solidis partibus defixus, is est qui dicitur *pituita*: *Salis & sulphuris* adustorum reliquiæ quædam in hepate secretæ & vasis choledochis exceptæ, dicuntur *bilis*; *faculentia terrestres* in lienem depositæ, dicuntur *melancholia*. Interim sanguis, si rectâ depuretur, pituita, bile & melancholia carere debet: non secus ac cum vina quædam aut cervisia depurantur, particulæ leviores sursum evehuntur, quæ ejus *florem* constituunt; crassiores & fœculentiæ in imum deprimuntur, quæ in *facem*, sive *Tartarum* concrevunt: tamen nemo rectè dixerit vinum, vel cervisiam è *floribus*, *tartaro*, & *liquore vinoso componi*. Cum autem humores isti vulgò sic dicti ex aliis principiis constant, scilicet bilis ex sale & sulphure cum admixtione spiritus & aquæ, & melancholia ex iisdem cum adjectione terræ; cumque ex hujusmodi principiis sanguis immediatè conflatur, & in eadem sensibiliter solet resolvi, satius duxi, missa vulgari humorum acceptione, pro explicanda sanguinis ejusque affectuum natura, celebrata hæc Chymicorum principia in usum adsumere. Insunt igitur *sanguini*, veluti liquoribus quibuscumque ad fermentescendum aptis, plurimum *aquæ & spiritus*, modicum *salis & sulphuris*, & aliquantulum *terræ*. Sanguis putrefactione resolutus eadem exhibet separata, & distincta. Etiam in sanguine vasis contento, aut iisdem recens immisso, eorundem energias & effectus licet detegere. Præterea cum esculentis quibus vescimur, & quorum succo sanguinis liquor constat, hæc eadem insint, etiam cruorem ex iisdem conflare, nemo inficias eat: quare hæc breviter percurram, & quo pacto sanguinis consistentiam, proprietates & affectiones constituent, ostendere conabor.

I. *Spiritus* (qui facile principatum obtinent) sunt subtilis & maximè volatilis sanguinis portio. Eorum particulæ semper expansæ, & avolare nitentes, cæterorum quibus obvolvuntur, corpuscula crassiora exagitant, & in fermentationis motu continuo detinent. Horum effervescencia, & æquabili expansione in vasis cruoris liquor continuò ebullit, cæteraque principia in motu ordinato, & sub exactæ mixtionis vinculo continentur. Si quid heterogeneum aut mixtioni ineptum massæ sanguinæ confunditur, statim spiritus in motu suo perturbati impetum faciunt, sanguinem exagitant, & immaniter effervere cogunt, donec quod extraneum est & non miscibile, aut subigitur, ac reducitur, aut foras eliminatur. Horum irradiatione, seu potius irrigatione,

nervorum corpora inflantur, viscerum functiones, necnon motus & sensationis munia obeuntur: à spirituum defectu, item ex eorum motu depravato, aut impedito oriuntur maxima œconomiae naturalis vitia. Horum *motus*, & *effervescencia* in sanguine (supra quàm quod in vino est) *citior*, præcipuè dependet à *fermento cordis*; quippe dum sanguis cordis sinus pertransit, ejus mixtio plurimum solvitur, ita ut spiritus una cum particulis sulphureis aliquatenus laxati, & velut in flammam accensi, dissiliant, & plurimum expandantur, indeque deflagratione sua calorem Toti impertiant. Propter hujusmodi expansionem, & caloris suffusionem fit jugis spirituum expensa, qui nimirum rarefacti, velut accensi continuò avolant, & foras evaporantur, atque horum, quoad vivimus, fit continua reparatio per alimenta imprimis generosa, quæ plurimum spiritus & materiae turgescens in se continent; è quibus succus per digestionem elicitus, & sanguini collatus, ipsi assimilatur, ejusque defectus refarcit. Quando sanguis animalium destillatur, spiritus (instar aquæ vitæ) coloris limpidi ascendunt, salis adhæsione fiunt plurimum acres, & pungitivi, non tamen ita facile prout spiritus vini proliciuntur, quin necesse habent intensiori igne urgeri, quoniam à consortio crassiorum, quibus obvolvuntur, partium agrè propelluntur.

I I. Quod *sulphur* copiose insit sanguini, constare videtur, quoniam alimentis pinguibus & sulphureis præcipuè vescimur; etiam à sanguine nutrimentum solidis partibus appositum in sulphur & pinguedinem facessit. A dissolutione hujus verisimile est quod rubicunda sanguinis tinctura oriatur: etenim corpora sulphurea, præ cæteris quibuscunque, menstruo solventi colorem rubedine maximè saturatum impertiunt; & si quando ob nimiam cruditatem sulphur minus dissolvitur, sanguis aquosus & pallidus existit, ut vix lintea rubore inficiat. Sanguinis massa sulphure, una & spiribus imprægnata, valde fermentiscibilis existit, quæ tamen dum cordis ventriculos subit, illic effervescenciam majorem seu potius accensionem patitur, & à particulis præcipue sulphureis deflagratis, & inde per totum diffusis, calor in nobis vegetus & vitalis dependet. Quando pars sulphurea evehitur, ac in cruore nimis luxuriat, ejus crasin à debito statu pervertit, ut exinde sanguis vel depravatus seu biliosior factus, succum alibilem non rite coquat; vel in totum accensus, æstus atque ardores, quales in febre continua oriuntur, concipiat. Etenim sulphur nimis exaltatum & plus debito turgescens, maximas in sanguine effervescencias concitat: & quorum sanguis sulphure uberius imprægnatur, ij sunt febribus maxime obnoxii. Propter hujus particulas succo nutritio incoctas, indeque solidis partibus appositas, pinguedo, mollities, & teneritudo corpori nostro accedunt. A carne aut sanguine putrescentibus propter copiam sulphuris evaporati, fœtor pessimus exspirat: in destillatione sanguinis sulphur sub olei nigricantis forma ascendit, quod etiam propter empyreuma perditissime fœtet.

I I I. *Salem* inesse sanguini gustu evincitur; qui tamen è vegetabilibus *fixus*, ex aliis esculentis primò minus volatilis comestui elicitur, postea optima naturæ digestionem & circulationem summe *volatilifatur*, ut non tantum sine capite mortuo residuo singula corporis nostri membra, & partes permeet, verum & sanguine destillationi exposito alembicum ascendat, & caput mortuum, velut

velut terram insipidam relinquat : si quando in sanguine , propter malam digestionem , particulæ salinæ non rite exaltantur , verum crudæ & magna ex parte fixæ permanent , inde cruor evadit spissus , & circulationi ineptus , ita ut in visceribus & solidis partibus obstructions gignantur , & cruditates ferossæ passim congerantur : sin vero spiritu depresso , aut deficiente , Sal nimis evehitur , & fluorem patitur , sanguini diathesis acetosa & austera accersitur , qualis in scorbuticis & febre quartana laborantibus observatur. Etiam à sale ob hanc rationem varie coagulato , Arthritis , strumæ , nephritis , lepra , & morbi plerique chronici oriuntur. Cum autem in visceribus , & vasis , coctione rite peracta , Sal debite exaltatur , & spiritui associatus volatilifatur , tunc propter ejus mixtionem liquor sanguinis magis æquabiliter fermentescit , etiam à putredine , stagnatione , & coagulatione vindicatur. Etenim particulæ salinæ spirituum , & imprimis sulphuris , efferationes refrenant ; quare qui sanguinem habent sale volatilifato bene saturatum , ii sunt minus febribus obnoxii : hinc etiam qui sæpius sanguinem mittunt , ad febres aptiores fiunt.

IV. Insuper sanguini (cum sit humor crassus , & consistentiam habeat spissam ,) particulæ *terrestres* copiose insunt : hinc etiam nimia ejus volatilifatio velut statuminatur , & præpropere nimis accensio inhibetur : non secus ac pulveri pyrio carbones sæpe in majori proportionem adduntur , ne partes ejus simul & cito nimis ignem concipiant. Porro à terrestribus sanguinis & succi nutritii particulis corpori moles & incrementum accedit. Denique à destillatione sanguinis caput mortuum leve & friabile in magna copia relinquitur.

V. *Ab aquosa* sanguinis parte fluiditas ejus dependet ; hinc enim stagnatio ejus impeditur , & sine inspissatione cruor in vasis circulatur : etiam nimia ejus conflagratio & adustio restinguitur , necnon calor attemperatur. Cum sanguis destillatur , aqua limpida & insipida , respectu cæterorum in dupla utminimam proportionem educitur ; hinc enim urinæ , sudoris , ac humidi cujusvis excrementi materia maxima ex parte procedit.

Quæ de sanguinis *principiis* & *affectionibus* inde deducendis modo afferuntur , melius elucescent , si cruorem juxta partes ejus sensibiles paulum expendamus : ipsumque cum aliis liquoribus , qui inter nos crebro sunt in usu , conferamus. Sunt autem liquores ejusmodi , quibus cum sanguine maxima intercedit analogia , scilicet. *Vinum generosum* , & *Lac*. Quoad *fermentationis* ac *effervescentiæ* rationes aptissimè comparatur *vino* : quoad *consistentiam* , *coagulationem* , & *partium à se invicem discessum* , confertur *lacti*.

Primò igitur de *vino* observare licet , quod quamdiu vase , sive dolio includitur , ejus particulæ subtiles & spirituosæ alias crassiores perpetuo exagitant , refringunt , & exactæ mixtionem aptas reddunt : quod heterogeneum est & subactioni ineptum , effervescentiâ secernitur. Interim liquor depuratus blande fermentescens in perenni est motu , quo partes omnes (velut atomi in transfenna lucis varie permoti) quaquaversus sese expandunt , & à summo ad ima , ab imo dein ad summa , constanti circumgyratione contendunt. Particularum attritu & refractione à liquore decedunt plurima atomorum effluvia , quæ si vase strictim occluso intus cohibentur , liquor nimis effervesceat , ac sæpe vas continens in partes dissilire facit. Non absimili modo sanguis intra venas & arterias conclusus constanti circulatione urgetur : spiritus vitalis cras-

fiores particulas subtiliat, refringit, & exactè subigit: quod heterogeneous est, & non miscibile, foras expellit: interim à partium & corpusculorum refractione, & subactione caloris effluvia constanter emanant, & per poros foras evaporant; quibus occlusis si transpiratio impeditur, statim ob nimiam sanguinis effervescentiam febris accenditur.

Secundò, circa vina observamus, turgescere ea si aliquid extraneum & fermentativæ naturæ iis confunditur; imo interdum sponte sua plus solito commoveri. Cum enim longa digestionem pars vini sulphurea nimis exaltatur, effervescentiam debito majorem concipit, & (ni statim sedetur) turgescentiâ suâ totius liquoris crasin pervertit. Par omnino videtur ratio de effervescentia febrili in sanguine excitata, quæ ob ejusmodi causas introduci solet, prout capite proximo ostendetur, ubi de motu & effervescentia sanguinis agemus.

Tertia observatio, si sanguinis cum vino collatio erit hujusmodi: vina (ut & plerique alii gratia, exempli, cervisiæ aut pomacei liquores) habent suâ *cruditatis*, *maturationis*, & *defectionis* tempora. Cum enim primò conficiuntur, partes spirituosæ cæteris crassioribus ita obvolvuntur, ut parum emineant, & fere nihil virium, aut virtutis exerant: cumque cæteræ particulae nondum sint subtiliatæ, nec rite excoctæ, totus liquor *crudus*, & ingrati saporis existit; & si destillationi committatur, nequaquam spiritus ascendit. Ab hoc statu ad *perfectiorem* paulatim pervenitur, & cum spiritus involucris extricati fiunt sui juris, & crassiores cæterorum particulas subtiliarunt atque exaltarunt, tota liquoris massa clara, spirituosa, dulcis, & balsamica evadit. Ultimò, cum à longa fermentatione spiritus absorbi, ac tandem deficere incipiunt, inducitur *defectionis* status, quo vina aliique liquores, aut in vappam transeunt, aut demum sale vel sulphure nimium exaltatis, acetosi aut rancidi fiunt. Pari- ter & sanguis, dum in vasis circulatur, juxta triplicem hujusmodi diathesin considerari potest: primo in *fieri*, seu *cruditate*, quæ ad chymum in visceribus modò confectum, & sanguini recens confusum, spectat; cujus particulae, instar fructus immaturi, sunt crudæ & indigestæ. Secundo, in *perfecto* statu, siue *maturatione*, quæ ad cruorem satis elaboratum, & secundum omnes suas particulas volatilifatum pertinet, postquam fermentis inspiratus, & in corde accensus exaltatur. Tertio, in *defectione* quæ sanguinem respicit postquam deflagravit, ejusque partes spirituosæ plurimum avolarunt: reliquæ autem senescentes, & depauperatæ necesse habeant amandari, & sic, vel sunt reliquæ salis, quæ cum sero continuò per urinam excernuntur; vel sunt salis & sulphuris particulae simul coctæ & adustæ, quæ virtute hepatis in vasa choledocha secernuntur: vel denique sunt ipsius sanguinis fæx & recrementa terrestria, quæ in lienem deferuntur, ibidemque (velut caput mortuum nova digestionem exaltatum) in fermentum sanguini denuo transmittendum facessunt. Quamdiu ad hunc modum rite peraguntur sanguinis genesis, ejusque debita maturatio, intra vasa placide circulatur ille, neque motu aut calore deficit, neque iis inordinatè urgetur. Sin vero aut succi alibilis supplementum cum reliquo cruore non sit congener, nec cum ipso assimilatur, quin vel ob coctionis defectum in humorem prorsus crudum diluatur, vel propter ejus excessum in materiam retorridam assetur; aut si sanguis veterascens suas non deponit exuvias, & novo cedit humori nutritio: propter hujusmodi (inquam)

circa αἱματώσιν vitia, cruor à debita crassi, & motu æquabili variè pervertitur, evaditque modo æquosus & frigidus, modo acris aut salus, modo acidus, austerus, aut alia saltem ratione degener, ac interdum stagnationibus, quandoque etiam immodicis effervescentiis obnoxius.

Observare licet hujusmodi *cruditatis*, *coctionis* & *defectionis* gradus in sanguine tum *sanorum*, tum *agrotantium*; in *sanis*, post uberiores pastum, crapulam, aut largiores potus, cum nimium feri, aut succi cruori infunditur, tota ejus massa humore *crudo* nimis diluta, aquosior, & minus spirituosam existit: quare homines redduntur torpidi, & ad motum aut exercitium inepti. In *agrotis*, phlegmatica corporis constitutio massæ sanguineæ talem cruditatem inducit, prout in leucophlegmatia, hydrope, pica, & χλωρόσιν cernitur. Etiam in febre intermittente hujusmodi cruditatis status occurrit, & revera accessionis febrilis causa existit, scilicet ob sanguinis dyscrasiam succus alibilis congestus ipsi non assimilatur, sed magna ex parte in materiam crudam aut aliàs degenerem facessit; quâ cum cructis massa ad plenitudinem saturatur, turgescens paroxysmum infert.

Maturationis status coctione finita in *sanis*, aliquot à pastu horis, præcipuè matutino tempore, contingit; quando scilicet chymi supplementum circulationibus iteratis in totum spiritualefcit, ac velut accenditur: tunc enim magis vegeti, & vividi fiunt homines, & ad studia aut negotia quævis expeditiores.

Defectionis statum in sanguine patiuntur *sani* post inedia, duos labores, & longa jejunia; tunc enim spiritu vitali plurimum evaporato, cruoris massa quasi vappescere incipit; quare oblanguescunt illico, atque imbecilles fiunt. Insuper sanguis à diuturna nimis coctione aduritur, & bilefcit, unde inediae aut jejuniis assueti tristes & melancholici ut plurimum evadunt. Morbi quidam talem sanguinis diathesin habitualiter inducunt, ut sunt scorbutus, iſterus, cachexia, febres diuturnæ & morbi plerique chronici, in quibus tota cruoris massa à spirituosam in naturam aut acrem, aut acidam, aut austera transit.

Hæc de comparatione sanguinis cum *vino* generoso: quæ sequitur ipsius cum *lacte* similitudo, consistit in partium diversitate, & ab invicem subsidencia, quæ potissimum cernitur in ipso è venis emisso, & in vase refrigerato. Cum enim calor & spiritus vitalis, qui omnia in mixtione conservant, avolarunt, partes residuæ à se invicem decedunt, & fit *tenuis* à *crasso*, *seri* à *sanguine fibroso* secretio. Hujusmodi partium separatio ferè ad eundem modum ac in lactis coagulatione succedit. Insunt lacti partes *butyraceæ*, *caseosæ*, & *serum*. Pariter se habet sanguis, dummodo à crassi naturali haud longe recedat: etenim mediocriter se habens, cum venis emissus in vase frigescit, partes ejus simili ritu subsidunt: portio nimirum purior & sulphurea (cremoris instar) in superficie concrefcit, quæ in *sanis* splendide rubescit; atque hæc flori lactis respondet. Huic substernitur crassamentum purpureum, quod constat è filamentis & fibris una coïncidentibus, & velut in parenchyma concretis: etenim calore absumpto & mixtionis vinculo soluto, partes fibrosæ se invicem implicant, & pondere suo in coagulum crassius subsidunt, quod caseosæ lactis portioni respondet: interim partes serosæ cæteris extrusæ sui juris fiunt, & liquorem instar aquæ limpidum constituunt; qui tenuior cum sit, ad summum ascendit,

& cæteris innatat. Porro veluti serum lactis ulterius coagulari solet, & adhuc partes aliquotas, tum butyraceas, tum caseosas in se continet: ita liquor hic sanguini innatans, si vel igni exponatur, instar albuminis ovi parum cocti inspissatur: vel si liquor acidus ei suffundatur, in coagulum album præcipitabitur. Hoc verò existimant nonnulli, aquosum istum latcem esse succum alibilem, qui è cruoris massa inter circulandum toti corpori nutritum impertit, & quod reliquus sanguis sit tantum vehiculum caloris & spirituum, ac nulli præterea usui inserviat. Mihi autem verisimilius videtur, quod in liquore isto aquoso succus continetur nutritius, qui nervosis, & partibus vulgo dictis spermaticis impenditur: è fibroso autem sanguine parenchymatis, & musculofo generi nutrimentum suppeditetur. Ad hunc modum cruor non multum vitiatum instar lactis in partes secedit: sin vero insigniter depravatur, quando subsidet, longe diversam refert indolem, & quoad singula ejus contenta varias apparentias fortitur: etenim *cremor* in summitate concrescens interdum albus, quandoque viridis, modo citrini, aut lividi coloris videtur: etiam haud tener, sed plurimum viscosus evadit, ut instar membranæ vix in partes divelli poterit. Quando sanguis intemperie febrili aliquandiu effervescens, vena secta emittitur, in superficie ejus vice *cremoris coccinei*, pellicula alba, aut alius coloris non raro concrescit: cujus ratio est, siquidem dum cruor ebullitione nimia perassatur, purior ejus portio velut elixatione quadam à rubra & tenera in albam & tenacem excoquitur: atque si interea massa sanguinea recrementis salis, ac sulphuris adustis haud satis expurgatur, pelliculæ isti color citrinus, aut lividus accedit; atque idcirco aqua supernatans sæpe eodem ritu tingitur: porro *crassamentum purpureum* se varie habet: scilicet interdum est coloris nigricantis, quando sanguis effervescentiâ diuturna nimis torretur. Quandoque vitiantur fibræ, ut in parenchyma non concrecant, sed liquor colostro similis crassiusculus & tamen fluidus maneat, quod revera magnam sanguinis corruptionem arguit: uti in febre putrida, aut insigni cachexia evenire solet; *latex aquosus* interdum *dest*, uti in hæcticis, & nimia diaphoresi. Aliquando *superatundat*, prout in hydropticis; nec totus in coagulum album à calore facessit. In quibusdam cachecticis sanguis aquosior factus instar loturæ carnis apparet. Novi quendam vitioso corporis habitu præditum, cruorem albicantem & lacti similem emittere solitum, dein cum iste à remediis chalybeatis melius haberet, erat sanguis modice rubicundus. Sed de cruoris subsidentia & apparentiis nimium satis. Quemadmodum vero sanguis vasis emissus coagulatione, & partium ab invicem discessu, lactis gelati varias substantias imitatur, ita nonnunquam in venis & arteriis conclusus, instar ejusdem coagulo perfusi, à causis morbificis parem omnino mutationem subit: ob quam in circuitu præpeditus, aut alicubi congelatus, juxtaque portiones defixus, plures affectus producit: videtur enim, quod hinc pleuritis, angina, peripneumonia, dysenteria originem ducunt, atque huic Causæ morbi pestilentes perniciem suam imprimis debent, prout inferius suo loco dicetur.

Sanguinis parallelam huc usque produxisse satis est; è cujus cum vino & lacte comparatione colligi potest, cujusmodi substantias & particulas in se comprehendit; scilicet spirituosas, & valde agiles, (quales habet vinum genero

generosum ;) pro calore , & motu ; & præterea molles & teneras (quales lacti insunt) pro corporis nutritu. Quinimo hæc analogia ejus cum vino & lacte adhuc ulterius confirmatur usu istorum in victu nostro , è quo sanguis generatur , siquidem lac est optimum , & simplicissimum alimentum ; eoque infantes & pueri , quibus uberi sanguinis proventu opus est , potissimum nutriuntur ; vinum autem spiritus vitales præ cæteris rebus copiose gignit , atque debiles & collapsos optime restaurat : quare senibus provectæ ætatis hominibus Nectaris loco haberi solet.

Explicatis ad hunc modum sanguinis intra vasa conflui natura , & analysi , adhuc considerationem meretur *succus nutritivus* è sanguine suppeditatus , & pro nutritione solidarum partium è cruoris massa secretus , iisque (quo melius assimilatur ,) instar roris adhærescens. Etenim nervi , membranæ , tendines , cæteræque totius corporis solidæ partes succo quodam alibili perfunduntur : Hujus vehiculo spiritus animales potiti corpora nervosa ad tensitatem inflant , atque motus & sensus actiones expeditè obeunt : etiam humor iste solidis partibus adpositus , iisque adsimilatus , molem , & accretionem largitur. Hujus originem , exortum , & dispensationis modum non est hujus loci exquirere : sufficiat solum annotasse quod à massa sanguinis suppeditetur , ac circulatione quadam (uti summe probabile à doctissimis *D. Glissonio* , & *Vvariono* redditur) postquam nervosas partes trajecerit , quod superest , effectum jam & quasi pauperius factum , per vasa lymphica ad sanguinem relegatur. Cum à sanguine depravato hic succus minus coctus , aut defæcatus partibus nervosis admovetur , solet eas in spasmos & motus convulsivos varie irritare : etiam non pauca in febribus symptomata propter hujus succi depravationem & motum irregularem oriuntur , prout alibi fasius patebit.

C A P U T II.

De sanguinis motu & effervescentiis.

H Actenus de sanguinis anatome , quoad ejus elementa primaria , & partes constitutivas , in quas sensibilibiter resolvi solet ; necnon juxta affectiones quæ ex comparatione hujus cum vino & lacte elucescunt : restat proxime inquirendum de *sanguinis motu* , tum *naturali* : (scilicet cujusmodi fermentorum ope , & quali partium turgescencia , perenni motu per vasa circuletur :) tum *præternaturali* , scilicet ob quas causas , & qualium partium orgasmo quandoque supra modum in vasis ebulliat , & effervescentias febriles concipiat. His rite explicatis & præmissis , doctrinam de febribus aggrediemur.

Circa motum sanguinis naturalem non hic inquirimus de circulatione ejus , scilicet quali cordis & vasorum structura , velut in machina hydraulica , constanti ritu circumgyretur ; verum de ejus *fermentatione* , scilicet quali partium mixtione earumque mutua in se invicem actione (instar vini in dolio fermentescentis) continuò ebulliat. Atque hujusmodi motus (nimirum sanguinis verè intestinum bellum ,) dependet tum à *partium ipsius sanguinis heterogeneitate* , tum à *variis fermentis* , quæ à visceribus cruoris massæ inspirantur.

Quoad

Quoad primum, quæ omnino consimiles habent particulas, minimè fermentescunt, quare nec aquæ destillatæ, olea Chymica, spiritus vini, aut alii simplices liquores commoventur, uti suprâ observatum: dixi autem sanguinem, pro ingenio rerum cito irritabilium, constare ex proportionata elementorum mixtura; in quibus *spiritus*, utpote valde agiles, sese continuo expandere & avolare nituntur, crassioribus vero cæterorum particulis irretiti in fuga detinentur. Atque hoc modo detenti, crassiora quibus impediuntur corpuscula exagitant, refringunt, & plurimum subtiliant; *salem* alioqui fixum minutissima subactione & sui adhæsione volatilifant; *sulphur* in se compactum, & cum cæteris non miscibile perfectè dissolvunt, & *sero* incoquunt: *terram* secundum minima refringunt, & cæteris commiscent. Interea tamen à salis & sulphuris subactione, & attritu caloris effluvia ubertim procedunt, quæ reliquis commista quaquaversus diffusa, fermentationis motum adaugent. Atque ad hunc modum omnia minutissimè confracta & particulis *aquosis* diluta, liquorem sanguinis constituunt: qui dum in vasis, velut vinum in dolio, includitur, continuo fermentescit, & secundum omnes suas particulas in perpetuo est motu.

Interea tamen in hoc differt fermentatio *vini* & *sanguinis*, quod in *vino* nulla sit veterum partium absumptio, & novarum accessio; quin liquor vase inclusus usque idem perstat: secus ac de *sanguine*, in quo partes quædam continuo deperduntur, & earum loco semper aliæ de novo generantur. In *vino* cruditatis, maturationis, & defectionis tempora sunt distincta, & successivè in toto peraguntur: in *sanguine* triplex iste status eodem tempore, & per partes celebratur. In *vino* fermentatio semel incepta usque ad finem prorogatur: in *cruore* autem, quoniam crudis usque succis perfunditur, usque renovari debet, quò humoris nutritii particulae non congeneres reliquo latici assimilentur; quare ad hoc opus præter fermentationem semel in *sanguine* inceptam fermentis quibusdam opus est, quæ eandem aliàs desitutam usque continent.

Fermenta ad sanguificationem requiri argumento est, quod cum à natura deficiant, bono cum successu artis operâ supplentur: etenim sales fixi, alcalia, extracta, digestiva, deoppilantia, & imprimis remedia chalybeata tantum sub hac ratione juvant, quod velut fermento quodam sanguinis ebullitionem aut imbecillem aut fere extinctam de novo restaurant.

Quod ad *fermenta naturalia* spectat, possunt certè plura formari, & diversis partibus aut visceribus recondi: etenim *humor quispiam*, in quo *salis*, *sulphuris*, vel *spiritus particula plurimum exaltata* continentur, fermenti naturam induit: ad istum modum flores aut fæces cervisiæ, vel musti, farinæ subactæ massa ad acorem servata in hunc censum veniunt, quibus cervisia novella, & consimiles liquores, necnon panis massa optimè fermentantur. Pariter in *ventriculo* humor acetosus de sale exaltato participans, coctionem ibidem adjuvat: & in *liene* faculentia sanguinis de sale & terra exaltatis in fermentum abeunt.

Quantus ab *utero*, & *partibus genitalibus* sanguini accedit vigor, hinc constat, quia ab horum privatione aut dyscrasia in virginibus *Χλόρωσις*, in viris barbæ sterilitas, vox tenella, & virilitatis amissio sequuntur. Præcipuum vero fermentum, quod sanguificationi inservit, in *corde* stabulatur; hic enim

maximus

maximus caloris focus, in quo velut accenduntur crudiores chymi particulae, & volatilitatem acquirunt; quod multis rationibus confirmare licet, præcipuè vero ab affectibus quos in præcordiis patimur quoties sanguis debito plus aut minus fermentescit: quando enim nimis in corde accenditur, impetuose veluti ab admotis ignibus agitur; (cujus immodicæ ebullitionis signa sunt pulsus altus, & vehemens) tum in præcordiis æstus fere intolerabilis sit, cum sit vehementi. Ex altera parte cum in corde diminuta est fermentatio sanguinis, respiratione difficili & anhelosa ad quemvis motum afficimur, prout in hydrope, chachexia, & ictero cernitur: cujus ratio est, non quia pulmones sunt infracti, vel ichore lento oppleti; sed quia sanguis non rectè in illo ζυμώσεως conditivo fermentescit; quare in sinus ejus illapsus non statim rarefit, nec cito in pulmones exsilit: quin illic stagnare & residere aptus, cordis ipsius oppressionem inducit, in cujus sublevationem respiratio crebra instituitur, ut sanguine in pulmones exantlato eidem succurratur: sin motu aut exercitio cruor in illius ventriculum plus urgetur, quàm respiratione aut pulsu potest in vasa pneumonica derivari, suffocationis periculum incurritur. Pariter in moribundis contingit: quando pulsus est valde exilis, & sanguis in corde agglomeratus præ fermentationis defectu stagnare & grumescere incipit, tunc altius cum strepitu & pectoris elevatione respiramus; nimirum ultimo naturæ conatu, & toto pulmonum nixu sanguis, quamdiu fieri possit, in pulmones exantlatur, ne in corde residens ipsum omnino suffocet.

Itaque *motus* & *calor* in sanguine à duobus præcipuè dependent; scilicet partim à *propria* ipsius *crassi* & constitutione, qua principiis activis spiritus salis, & sulphuris ubertim conflatus, in vasis (non secus ac vinum dolio inclusum) sponte turgescit: & partim à *fermento cordi insito*, quod liquorem sinus ejus pertranseuntem plurimum rarefacit, & cum spumosa effervescentia exsiliare cogit: ut qui per venas, instar fluminis leniter decurrentis, cordi placidè instilletur cruor, inde per arterias (torrentis more) cum strepitu, & orgasmo exsiliens ad singulas totius corporis partes proripiat. Quo ritu hoc fiat, licet mechanicè explicare in promptu non sit, tamen à doctissimis viris *Ento*, *Cartesio*, aliisque rei hujus modi, & rationes quædam non improbabiles traduntur: supponunt nimirum, velut Ignem in cordis foco continuò stabulari, qui sanguinem per venas infusum protinus accendat (quemadmodum cum vinum flamma admota exardescit,) qui dein accensus, deflagratione sua (fulguris instar) arterias citissime trajiciat: ita ut *calor*, *motus rapidissimus*, & *effluvia* per διαπορεύειν emissæ, à sanguinis in corde accensione solummodo procedant. Statuit *Hogelandus* fermentum in cordis sinibus recondi, quod sanguinis liquorem, cum calore & copiosa fuliginum emissionem, ebullire & effervescentia cogit, non secus ac cum spiritus nitri Butyro Antimonii confunditur. Adeo ut sanguis leniter per venas influens, à fermento cordis illico in spumam, & vaporem rarefactus, impetuose admodum arteriarum ductus pervadat. Res fere eodem recidit, sive hoc, sive isto modo fieri dicatur: etenim alteratio quam sanguis in corde recipit, possit æquè à *flamma* ac *fermento nitro-sulphureo* (illic collocari supposito,) deduci. Quippe dum sanguis cordis ventriculos illabatur, statim liquoris compages solvitur, & particulae

activæ imprimis spirituosæ & sulphuræ, soluto mixtionis vinculo, à cæteris exsilire & sese quaquaversus expandere nituntur; verum à vasis intus contentæ, & cum reliquo liquore simul coërcitæ, per apertos arteriarum ductus, qua data via, cum tumultu & turgescencia ruunt, & exinde caloris effluvia per totum corpus diffundunt: parum interest si hæc particularum cruoris expansio, & in motus libertatem exertio, ab accensione, vel à *fermentatione* fieri perhibeatur, siquidem utrovis modo sanguinis compages ita referari poterit, ut exinde spiritus, salis, & præcipuè sulphuris particulæ in motum concitæ, (velut ab igne accenso) calorem toti corpori impertiant.

Hæc autem cruoris in corde rarefactio siue accensio, ab ipsius sanguinis in vasis crassi, & constitutione plurimum dependet: si enim liquor ejus sit rite coctus, volatilifatus, & (instar vini generosi) ad maturitatem evectus, tunc debito modo illic fermentescit; quo solutæ spirituum & sulphuris particulæ calorem æquabilem & moderatum singulis partibus diffundant. Quod si cruor ob malam victus rationem, & coctionis defectum sit crudus & aquosus, tunc minus in corde accenditur; indeque frigida totius intemperies, respiratio difficilis, & anhelosa, cum pulsu imbecillo, & languido sequuntur; prout in cachecticis, *χλωρόσι* affectis, & moribundis cernitur: sin vero sanguis ob sulphuris evecti copiam, aut effluvia cohibita, aut victum calefacientem, nimis luxurians & turgescere aptus evadat, ejus in corde siue accensio, siue fermentatio plurimum intenditur, ita ut exinde calor febrilis, & effervescentiæ solito majores in Toto concitentur. Varia hæc sanguinis in corde fermentatio, juxta variam ejusdem temperiem, illustrari potest exemplo vini: quod adhuc crudum, & recens mustum, licet coquatur aut igni admoveatur, minimè exardescit: hoc vero defæcatum & maturitatem adeptum, facile accenditur, sed flammam exiguam & cito desituram emittit. Idem prius effervesceus, aut alias excalefactum, si accendas, valde inflammatur, & deflagratione magna ex parte absumitur.

Dum sanguis hoc modo in corde rarefactus, seu accensus, indeque per vforum ductus effervescens in partes minutas resolvitur, à soluta ejus compage corpuscula quædam discedunt, quæ denuo aduniri, & cum reliquo liquore coaptari renuunt: hæc autem sunt duplicis generis, vel *tenuia*, quæ velut fuligo ab igne accenso, aut effluvia à liquore fermentato, à sanguinis liquore constanti diaphoresi per corporis spiracula evaporant: vel *crassiora*, quæ velut cinis ab incendio residuus, aut fæces à fermentatione subsidentes, à cruoris massa protinus secerni, & foras amandari debent: secus enim confusione sua insignes perturbationes in sanguine producant. Quo plus effervescens cruor magis in corde dissolvitur, eo recrementa hæc tum fuliginosa, tum terrestria copiosius aggeruntur; & cum præ nimia congestione statim subigi, & à cruoris massa secludi nequeant, sanguinis turgescenciam & febriles effervescencias pariunt.

De sanguinis motu, calore, & fermentatione *naturali*, in quorum æquabili tenore sanitatis nostræ ratio consistit, quæ hætenus dicta, sufficiant. Explicatius aliquanto agemus de *præternaturali*, seu effervescencia nimia, è qua febrium typi, & paroxysmi dependent. Fermentationem nimiam seu præternaturalem dico, quando sanguis (instar ollæ super ignem ebullientis) ultra modum

modum effervescit, & turgescentiâ spumosa rarefactus vasa distendit, pulsum celeriores excitat, & velut liquor sulphureus incendio concepto, calorem adurentem quaquaversus diffundit.

Hujusmodi motus seu fermentatio sanguinis optimè illustratur exemplo vinorum effervescentium. Etenim vina, præter lenem & æquabilem fermentationem, qua primò depurantur, quibusdam temporibus adeo insigniter ebulliunt, ut vasis ora excedant; & si strictim occludantur, in partes dissilire faciant. Ad hunc modum velut orgasmo percita, ni statim à Tartaro, seu fæce sua in vas aliud deplentur, effervescere non cessant, donec spiritu plurimum exsoluto atque sulphure vel sale nimium exaltatis, aut rancida fiunt, vel in acetum degenerant.

Talis effervescencia ob duas præcipue causas solet concitari; *primo*, quando aliquid extraneum, & non miscibile dolio infunditur: (ita guttæ quædam sevi, aut pinguedinis dolio instillatæ hunc modum producant:) vel *secundo*, quando vina fæce, seu Tartaro nimis opulento ditata (propter partes sulphureas supra modum exaltatas,) sponte fervores concipiunt & immaniter ebulliunt: Etenim in quacunque substantia sulphur luxuriat, ejusque particulae à mixtione solutæ invicem consociantur, & una coërentur, ibidem tales effervescentiæ immodicæ conciliantur.

Consimili (licet prorsus non eodem) modo, quo vina effervescunt, ebullitio sanguinis inducitur; nimirum *vel* quid extraneum, & minime congener cruori permiscetur, quod cum non assimilatur, perturbationem & effervescentiam inferre solet, donec heterogenum illud aut subigatur, aut foras eliminetur; & particulae sanguinis confusæ, & perturbatæ denuo extricentur, ac priorem in mixtione repetant positionem & situm. Vel *secundo*, sanguis præter modum effervescit, quia principium quoddam seu elementum, ejus constitutivum, (scilicet *spiritus* aut *sulphur*, (ultra temperiem naturalem evehitur, atque efferatum evadit; quo nimirum hujus aut illius particulae non congeneres cæteris, à mixtione solvuntur; solutæ plus debito impetum faciunt, sanguinis liquorem exagitant, & effervescentiam pariunt, quæ minime sedatur, donec sanguis velut inflammatus diuturno febris incendio deflagraverit. Utroque modo, sive cruor *ob rei non miscibilis confusionem*, seu *ob spiritus* aut etiam *sulphuris* evecti *efferationem*, in vasis efferbuerit; quoniam hinc compages ejus plus laxatur, ideo magis in corde accenditur, & particulae activæ prius solutæ, à fermento illic confito plurimum excandescunt, à mixtione exsiliunt, & motu suo calorem intensum ac velut igneum quaquaversus dispergunt: sub hoc tamen discrimine, quod effervescencia quæ ab extranei cum sanguine confusione dependet, sit plerunque brevis, aut interpolata; quæ cum heterogeneum quodvis secernitur aut subigitur, sponte sedatur: partesque sanguinis conquassatæ, & extra ordinem positæ facile ad situm, & crasin naturalem redeunt. Quæ vero à *spiritus* aut *sulphuris* efferati inordinatione ebullitio exoritur, sit continua: nimirum hic tota cruoris massa ita laxatur; & stricto mixtionis vinculo exsolvitur, ut tanquam liquor oleosus incendio correptus, effervescere seu inflammari non desinat, donec *spiritus*, aut *sulphuris* seu materiae combustibilis particulae maxima ex parte deflagraverint.

Restat adhuc tertius præternaturalis effervescentiæ modus, in quo sanguis alterationem subit, quæ minimè vino, sæpissimè autem lacti contingit: nimirum aliquando à causa morbifica ejus liquoris coagulatio inducitur, ita ut substantia illius fundatur, ac in partes secedat, fiatque crassi & terrestri à tenui secretio: cujus ratione cruor minus idoneè in vasis circulatur: quin portiones ejus gelatæ in extremis defigi, aut in corde stagnare aptæ, motum æquabilem interrumpunt, aut graviter impediunt: cujus restaurandæ gratia effervescentiæ solito majores in sanguine concitantur: quales nimirum in pleuritide, peste, variolis, & morbis venenatis passim occurrunt.

C A P U T III.

De Febris intermittibus.

PRæmissis quæ superius de sanguinis anatome, motu, & effervescentiis dicta sunt, ad tractatum de febris facilis nunc patet aditus. Quæ de febre ex vi vocis & Etymologia vulgo prostant notiones, hic consultò omittam: describi potest in hunc modum, quod sit *motus inordinatus sanguinis, ejusque nimia effervescentia cum calore, & siti, aliisque præterea symptomatis, quibus œconomia naturalis varie perturbatur*. Prout supra de sanguinis effervescentia, ita modo de febre advertimus, quod nimirum accessio ejus sit vel brevis, & interpolata; quæ idcirco dicitur intermittens: vel etiam magna, & diu protracta, quæ & febris continua appellatur: primò de febre *intermittente* dicemus.

Licet febris intermittens populari nostro idiomate, proprio insigniatur nomine, & febris communiter acceptæ contradistinguatur; tamen quia sanguinis nimiam effervescentiam habet adjunctam, febris dicenda erit. Huic à febre continua peculiare est, quod quædam ἀνωρεξίας, sive intermissionis habeat tempora; quod quilibet paroxysmus à frigore, aut rigore plerumque incipiat, & in sudorem desinat; quod accensiones statis periodis, certisque temporum intervallis redeant, ut non sit automaton horologicum exactius. Quare *Primo* circa hanc febrem in genere disquiremus, qualis sit sanguinis effervescentia quæ paroxysmum ejus constituat, & unde suscitetur. *Secundo*, quare paroxysmus æquè frigore constat ac rigore cum sudore succedente. *Tertio*, quæ sit intermissionis necnon periodorum statarum causa. *Quarto* & ultimo, subjungentur anomalix quædam febrium intermittantium, ut cum desit modo frigus, modo calor, aut sudor; aut cum periodi sint vagæ & incertæ, cum ἀνωρεξίας sive intermissionis spatium non sit æquale, sed modo præoccupet, modo postponat, & interdum reduplicet: atque horum, aliorumque phaenomenon, quæ in hoc affectu varie contingunt, rationes assignare conabor. Hisce explicatis, proximo in capite febris intermittantis divisionem, ejusque species explicare aggrediar.

Quoad primum: effervescentia sanguinis in febre intermittente, pro duratione paroxysmi, æquè intensa & violenta est, ac in febre continua: quare partes sanguinis *inter se*, aut *cum heterogeneo quodam admisto colluctari* & supra

modum

modum fermentescere concludendum est. Ut vero *inter* se fermentescant & nimis ebulliant, requiritur ut principium quoddam, velut imprimis *spiritus* aut *fulphur*, nimis exaltatum & efferatum cæteris superemineat; quod dum iis conjugari nequeat, luctam & effervescentiam continuam inducat: verum ab hac causa febris continua ortum duceret; quia talis ebullitio sanguinis semel incepta non subito sedatur; & si quando compescitur, non illico statim repetit. Quare pro febre intermittente supponendum est, *heterogeneum aliquid* sanguini confundi, cujus particulæ, cum non assimulantur, eo usque ejusdem ebullitionem faciunt, donec vel subactæ miscibiles reddantur, aut subtiliatae foras excludantur. Quare tali materia subacta aut foras exclusa, cessat paroxysmus; & quando repullulat hæc materia, novam ebullitionem concitat, & proinde novus infertur paroxysmus.

Circa hanc materiam, quæ sanguini confusa periodicas effervescentias & cætera febris intermittens symptomata inducit, valde ambigitur, & diversimode inter Medicos disceptatur, ubi generatur, in qua sede seu foco hospita-
tur, & qua ratione adeo exacta motus & ebullitionis suæ tempora observet. Singula hic veterum & recentiorum placita recensere, in ordinem redigere, eorumque rationes expendere, esset opus nimii laboris, & tædii: quare quid mihi rem accuratè pensitanti in mentem venerit, dubitans proponam, aliorumque judicio submittam.

Quod sanguinis effervescentiam exacte periodicam infert, sit aliquid necesse est, quod ad singulas periodos seu febris accessiones, in stata mensura & æquali semper proportionem in corpore nostro generatur, & cruoris massæ communicatur; quod cum sanguis ad plenitudinem saturatur, illico turgescit, & effervescentiam concipit: hoc autem supponitur esse vel *humor excrementitius* in minera quadam delitescens, qui sensim, & stato tempore ad incrementum proventus, & commotus, cum cruore fermentescat: vel est *succus nutritivus* ex esculentorum materia suppeditatus, & in pondere & mensura sanguini delatus, qui cum ob hæmatoseos defectum minimè assimiletur, ad plenitudinem in vasis congestus, propter sui expulsionem turgescientiam sanguini inducit. Priori modo febrium intermittentium ratio vulgo explicatur, & ab humoris natura ejusque sede seu foco, intermissionis & statarum accessionum causæ petuntur: Hujus morbi focus, seu minera unanimi ferè consensu ad primam corporis officinam relegatur; atque hinc petitur intermissionis ratio, & febris intermittens à continua differentia: materiam verò statuunt bilem, pituitam, & melancholiam; & prout humores isti tardius aut citius putrescere perhibentur, etiam circuitus febriles unius aut plurium dierum spatium absolvi dicuntur. Verum hæc opinio, postquam circulatio sanguinis plane omnibus innotuerit, merito rejicitur. Cum enim sanguis nusquam in vasis stagnet, sed cum perenni motu loca quævis perluat, eorumque sordes continuò transferat, impossibile est ut in venis mesaraicis, ubi vulgo asseritur hujus morbi minera, subsistat: quod attinet ad cavitates, sive specus pro congestionem humorum in visceribus, nec constat quo ritu sine tumore, aut abscessu tales cudantur; nec quo instinctu tales humores in foco conclusi adeo exactis temporum intervallis accrescant, absumantur, ac denuo repullulent. Præterea quod de bile,

pituita, & melancholia, eorumque motibus periodicis affirmatur, omnino suspectum habemus; quia non dantur ejusmodi humores sinceri, quales in Scholis describuntur: verum sanguis aut variam fortitus indolem, prout modo calidior, modo frigidior, natura sua talium humorum qualitates imitatur; aut inter circulandum recrementa sua deponit, quæ in propriis capsulis vasisque deposita humores morbifici & præternaturales falsò creduntur. Quare cum succus nutritius sit unicus humor quo sanguinis massa quotidie reficitur, ejusque supplementa usque in mensura & proportionem fiant, proculdubio periodicæ sanguinis effervescentiæ ab hujus accessu & commixtione erunt deducendæ.

Superius annotavi circa particulas sanguinis triplicem cruditatis, maturationis, & defectionis statum: nimirum succus nutritius è quotidiano pabulo suppeditatus, crudus advenit; sanguini commixtus, & aliquandiu circulatus assimilatur, & in humorem perfectum maturatur: postea veterascens in partes abit & seponitur. Dum æquabili hoc ritu sanguis continuò instauratur, & ejus dispendia reparantur, sine tumultu aut immodica effervescencia placidè fermentescit, & intra vasa circulator; si vero succi nutritii supplementum non (uti prius) maturatur, nec digestionem perfectam in sanguinem facessit, ejus particule cruori confusæ, velut heterogeneum quoddam & non exacte congener, in sanguinis massa persistunt; quibus cum ad plenitudinem saturatur, illico turgescit sanguis, & effervescenciam febrilem concipit, qua vel subigitur, vel foras excluditur depravati hujus succi recens supplementum. Dico igitur, à primo instanti, quo succus nutritius cum sanguine non assimilatur, ejus particule, licet commixtæ, adhuc cum eo sine magno tumultu, aut perturbatione circulantur, atque ita deinceps, donec ad turgescenciam cruoris massa adimpletur; tunc vero protinus ebullit illa & fervorem concipit: ad eundem fere modum ac cervisia novella utribus infusa, quæ si strictim occluditur ut nihil evaporet, primo sine fervore aut impetu in vasis illis continetur, postea cum effluviis usque cohibitis liquoris massa turgescit, insigniter fermentescit, & propter fermentationis impetum sæpe vas dissilire facit. Etiam hoc statò tempore contingit, & totidem horarum spatio, velut in febre intermittente, liquor ad turgescenciam *αῖμα* assurgit.

Adhuc difficultas restat, quam ob causam succus nutritius cruori confusus non assimiletur, quin in materiam heterogeneam & fermentativam degeneret? Hoc ut plurimum fieri existimo, non alimentorum, nec etiam viscerum culpa, sed ipsius sanguinis vitio. Etenim sanguis, non secus ac vina, interdum à nativa & genuina indole in naturam acrem, acidam, aut austeram transit; & quia sanguis sanguificat, usu venit ut cum ipse à debita temperie desciscat, succi nutritii penum, quo reparari debuit, facile pervertat. Qualis sit ista sanguinis diathesis, & quo pacto contrahatur, inferius dicitur, ubi de febrium intermittentium speciebus, earumque causis evidentibus, & procatharticis verba faciemus. Effervescencia itaque sanguinis, quæ febris intermittens paroxysmum constituit, unice dependet à succi nutritii assimilatione præpedita: hujus particule sanguine confusæ non (uti prius) maturantur, neque in cruorem perfectum facessunt: quin harum mixturæ sanguinis massa, (veluti cervisia novella) corpusculis valde fermentativis imbuitur;

imbuitur; quæ cum densius agglomerantur, iisque cruor ad turgescientiam saturatus illico effervesceat, fit ingens particularum agitatio, & lucta, qua se invicem infringunt & subtiliant: donec tandem spiritu vitali præpollente, cæterisque subactis, quod heterogeneum est foras protrudatur: cujus consortio cum sanguis liberatur, sequitur ἀναρξία & accessionis febrilis intermissio: postea vero à novo hujus succi supplemento novus inducitur paroxysmus.

Secundo quoad rigorem, aut frigus in hoc affectu calori præcedaneum, dico: Cum succi nutritii particulæ à cruditatis statu versus maturitatem pergunt, ipsam vero non attingunt, insignem acorem contrahunt, quo partes nervosas valde pungunt, & vellicant, atque frigoris sensum incutiunt: (non secus ac cervisia quæ utribus inclusa à dulci in acidum & nitrosum saporem transit, ut præ acore & frigiditate vix deglutiri poterit.) Cum itaque sanguinis massam hujusmodi crudi succi particulæ nitroso acore præditæ ad turgescientiam implerunt, & cum densius agglomeratæ in fluore esse incipiunt, spiritus vitales acore suo primò obtundunt, & calorem nonnihil obruunt: quare sanguis frigidior existit, & tardius circulatur; quin & ob caloris defectum sensus frigoris in toto corpore percipitur, & pulsus admodum rarus existit. Porro cum hujusmodi succo acetoso partes nervosæ, & solidæ, pro ultimo suo alimento irrigantur, hujus fluore qui simul contingit cum sanguinis turgescencia, partes istæ sensiles vellicantur, & in tremores ac spasmos irritantur. Atque hæc proculdubio est vera & genuina causa frigoris & rigoris quæ in paroxysmo febris intermittens excitantur; nimirum succi nutritii in materiam nitrosam degeneris fluor, & turgescencia, quo spiritus & calor suffusi obtunduntur, & corpora nervosa irritata in tremores cientur. Postea vero, cum particulis hisce nitrosis aliqua ex parte in superficiem corporis protulis, earum gravamine & oppressione sanguis nonnihil liberatur, spiritus vitales se recolligunt, & emicare incipiunt; deinde autem calor intensissimus succedit, quoniam & cruoris massâ propter effervescentiam cum materia febrili laxatâ, ejusque mixtione solutâ, particulæ sulphureæ uberius in corde accenduntur; & quia (poris cutis ab eadem materia versus circumferentiam corporis protrusa occupatis) effluvia vaporosa intus cohibentur, quæ sanguinem magis exagitant, & effervescent; calor iste in sanguine usque persistit, donec materia ista fermentativa penitus combusta, ac una cum recrementis adustis à deflagratione residuis plene subacta, & subtiliata, seroque involuta, sudore aut transpiratione insensibili evaporet.

III. Hisce præmissis non difficile erit intermissionis, necnon statarum periodorum rationes & causas ostendere, scilicet intermissio sequitur, quia materia morbifica uno paroxysmo omnis difflatur; adeoque donec nova substituitur, ἀναρξία sequatur necesse est. Gigni autem incipit nova, ex quo ultimus desit paroxysmus: nimirum sanguinis massa modò inanita, denuo excipit succum nutritium, ipsumque ob debitæ πρὸς αὐτὴν & coctionis defectum (uti prius) in materiam fermentativam pervertit: verum exigua hujus copia parum aut nihil molestiæ aut fermentationis ciet; cum vero sanguis ad turgescientiam impletur, illico effervesceat, & in fluore est, veluti

cum

cùm cervisia novella, aut mustum vase diu inclusum tandem certo tempore ebullit, & vasis ora excedit.

Quod vero statis temporum intervallis accessiones plerumque repetunt, idque tam certo, ut automata horologica non exactius; ratio est, quia succus alibilis è visceribus sanguini in vasis confluens, æquali mensura & modo utplurimum suppeditatur; licet enim non exactè in pondere, & dimenso tantundem cibi & potus quotidie assumimus; tamen quia statis, utplurimum, horis ad appetitus satietatem edimus, ex comestis & chymi massa in visceribus congesta, per vasa lactea æqualis succi nutritii portio sanguini convehitur: quare si totidem horis tantum humoris nutritii cruoris infunditur, qui ad plenitudinem & turgescientiam accrescens hoc die paroxysmum inducat; certe hoc finito, ejusdem temporis spatio pro sequenti paroxysmo sufficiens materia congeretur: sin vero errata in victu committantur, & ægroti genio indulgentes plenius aut inordinate comederint, paroxysmi insultus solitam anticipat horam, propter sanguinem materia febrili citius saturatum; quod si abstemii fuerint ægri, & parcius alimenta ingerant, intermissio diutius protrahitur.

Si adhuc inquiratur, quare febrium intermittentium periodi non sint unius generis, & ejusdem distantiae, quin aliæ quotidie, aliæ tertio, aut quarto die repetant? in causa est diversa sanguinis constitutio, qua nimirum à debita temperie in diathesin modo acrem, modo acidam, aut austeram pervertitur. Pro diversa hujus dyscrasia succus alibilis recens advectus plus aut minus à maturatione desciscit, & in materiam citius aut tardius fermentescere aptam pervertitur. Quando sanguis diathesin acrem, calidam, & biliosam acquisivit, suppono quod pars quædam succi nutritii in humorem perfectum maturatur, & sanguini assimilatur, indeque in alimentum solidis partibus adponendum facessit, iisque affigitur; verum altera ipsius portio à sanguine nimium cocta & depravata, in materiam febrilem mutatur; & ex supposito, quod dimidia pars succi nutritii tali modo pervertatur, duplo istius temporis, quo in corpore nostro concoctio plenariè absolvi dicitur (hoc est, post horas quadraginta - octo) hujusmodi materia fermentativa ad plenitudinem, & turgescientiam assurgit, & tunc inducet paroxysmum febris *tertiana*. Quod si ob sanguinis degenerati naturam austeram & ponticam (in qua sal fixus cum fæce terrestri nimis exaltatur) ideoque segnius fermentari aptam, tertia solum pars succi nutritii corrumpatur, tunc triplo prædicti istius temporis spatio paroxysmus inducitur; hoc est, post horas LXXII. quibus solet concludi periodus *quartana*. Sin ob majorem sanguinis labem fere totum succi nutritii supplementum in materiam febrilem pervertatur, tunc isto temporis spatio, quo debuit coctio in vasis & habitu corporis plenariè absolvi, (hoc est, post horas XXIV.) materia hæc ad turgescentiæ motum assurgit, & *quotidianum* paroxysmum inducit. Atque hinc fit ut in febre *quartana* vires & robur non statim fatiscant; dum in *tertiana* ægri solito imbecilliores fiant; à *quotidiana* autem febre in languorem & summam imbecillitatem cito ducantur: nimirum in singulis quo plus aut minus succi nutritii in morbi pabulum abeat, tantundem etiam de viribus & corporis firmitate detrahitur. Verum de his plenius ubi de singulis

Singulis febrium intermittantium speciebus, earumque causis agemus.

Contra æquales harum febrium circuitus, arguitur: Quod paroxysmi aliquot horarum spatio statum diei tempus plerumque anticipant, quandoque etiam postponunt. Verum enimvero hæc objectio tollitur, si intermissionis tempora non diebus, sed horis computentur; sic enim intervalla quæ modo præoccupantia, modo diutius protracta videntur, ad hanc normam plerumque æqualia apparebunt; siquidem respectu diei dicitur febris tertiana quandoque duas, aut plures horas solitum accessionis tempus prævenire, aut postponere; interim singuli circuitus post totidem horas qualibet vice exacte repetunt. Quare prima febrium intermittantium discrimina solum in hoc consistunt, ut tempus accessionis in quadam febre celerius, in altera tardius adveniat, scilicet horis distet modo 24. modo 34. modo 70. aut similiter.

Ex prædictis (ni fallor) liquidò constat, qualis sit sanguinis effervescentia quæ febris intermittens paroxysmum constituat; unde frigoris & rigoris præludia; quæ denique sit intermissionis & statarum periodorum ratio. Quod autem hæc & pleraque alia hujus affectus phænomena à mala sanguinis diathesi, & propterea à succi nutritii depravatione, & non ab humore in minera quadam delitescente dependent, adhuc magis patebit à signorum & symptomatum collatione quæ in hoc affectu notatu digna occurrunt: tum *secundo* ex causis procathartice ritè perpenſis, quæ hunc affectum solent inducere; ac *tertio* demum ex criseos & curationum viis, quibus hic morbus aut sponte cessat, aut medicamentorum ope profligatur.

I. Primo, inter *signa* præcipuam considerationem merentur, *pulsus* & *urina*: *pulsus* ingruente frigoris paroxysmo admodum rarus est, & depressus; qui plane arguit calorem & spiritus vitales in sanguine à materia quadam cruda, & non facile combustibili velut obrui; non secus ac ignis in foco accensus, ac dein lignis viridibus obtectus lente admodum gliscit, & parum deflagrat, qui postea diffolato humore crudo in flammam apertam & valde intensam erumpit: sic etiam sanguis, materiâ crudâ, quæ in fluore est, aliquatenus subactâ aut dispersâ, plurimum accenditur; & quod in cruore residuum est, cum ipsius particulis fermentescens exurit, & calorem cum siti intensissimum inducit; quare sanguis impetuosè effervescens pulsu vehementi & velocissimo urgetur: secus in corde nimium congestus suffocationis periculum induceret.

Quoad *urinam*: ea (præcipuè in febre *tertiana*) colore saturato & velut flammeo, etiam cum defunt contenta, imbuitur: quod sanguinis affationem & temperiem nimis adustam innuere videtur. Porro in hoc affectu, secus ac in aliis, ut plurimum se male habet urina, quando cum ægrotis bene est: & contra, siquidem toto intermissionis tempore maximè à statu naturali distat, colore rubicundo saturata, & frigori exposita crassa evadit, sedimentumque copiosum, instar boli armeni, deponit: quod ideo fieri necesse est, quia toto *ἀπορροῆς* intervallo materia febrilis cum sanguine circulatur, & tacitis ibidem incrementis ad maturitatem assurgit: in medio autem paroxysmo cum calor & æstus quammaximè vigent, urina laudabilis existit, magisque ad naturalem accedit, scilicet materiâ fermentativâ ad circumferentiam corporis transmissâ.

Symptomata paroxysmum præcedentia hoc ipsum confirmant: pluribus siquidem horis antequam incipiat paroxysmus, sentitur humorum ac sanguinis perturbatio, cephalalgia, vertigo, oculorum coruscatio, somni inquieti, &c. quæ planè indicant sanguinem materia fermentescente prius infectum; & tantum eatenus differri paroxysmi insultum, donec cruoris massa hujusmodi materiâ ad turgescientiam saturetur. Paroxysmi statim ingruentis præludia sunt, modo in extremis manuum & pedum digitis, aut unguibus pallor, interdum spasmus, & stupor; modo in lumbis & femoribus frigus, & dolor; aliquando totum simul corpus rigor & tremor invadunt: quæ manifestè ostendunt sanguinem in arteriis & venis, necnon liquorem tenuem in partibus nervosis fermentationis motus primò concipere, & non à foco quodam, aut minera hanc effervescentiam concitari. Quod si objicitur, circa paroxysmum ægros sæpissimè vomitu infestari, unde videtur concludi, materiam noxiam potissimum in ventriculo & primis viis stabulari, præsertim cum affectus iste vomitorio tempestive sumpto potissimum curetur; fateor quidem in paroxysmo febris intermittens vomitus immanes sæpe concitari: hoc tamen sæpius contingit, quoniam in rigore febrili membranæ totius corporis convelluntur; quare & ventriculus cum sit pars valde nervosa, convulsione afficitur, & proinde spasmò contractus, quicquid in sinu suo fovet sursum ejicit. Quod si præterea vasa choledocha bile turgent, etiam eodem viscerum spasmò bilis meatu felleo in duodenum exprimitur, & in ventriculum exantlatur, ibidemque ferocia sua tetriorem adhuc vomitum provocat: quare ut plurimum qui ob hanc rationem excitatur vomitus, tantum in rigore succedit. Quod autem bilis antequam urgeret paroxysmus in stomacho non fuerit, sed tantum viscerum spasmò & motibus convulsivis meatu choledochò emulgetur, & in ventriculum effunditur, exinde constat, quod si vomitorium medio inter duos Paroxysmos intervallo exhibeatur, parum, vel nihil materiæ biliosæ eliciet. Porro humor iste amaricans istius ferociæ est, ut diu in ventriculo contineri nequeat, quin statim cardialgiam & vomitionem procurabit. Præter hujusmodi vomitum in rigore excitatum, quandoque in medio æstu aut sudore vomitio cietur: cujus causa est humoris biliosi in sanguine redundantia, cujus si uberior sit copia, quàm ut sero diluta per sudorem excernatur, multa pars ejus, dum sanguis per anfractus hepatis circulatur, in vasa choledocha seponitur: quæ cum ad distensionem fuerint repleta, se exonerant, & bilem intestinis & ventriculo dimittunt, ibidemque spasmò statim excitato, interdum vomitus provocatur, quandoque etiam alvi dejectiones liquidæ succedunt. Hoc anno 1657. observavi plurimos hoc modo affectos: cum enim post siccam æstatem & calidam, circa medium autumnii febris intermittens passim grassaretur, solebant ægri medio caloris paroxysmo, quandoque etiam sudore dimanante, derepente se male habere, atque sudore intus revocato, lipothymiâ corripì, brevi tamen cum vomitio biliosa succederet, alleviabantur.

Nec tamen signa & symptomata, sed & causa hujus morbi *procathartica*, plane indicant ipsum à temperie sanguinis immutata originem ducere: quippe febres intermittentes ea potissimum tempestate & locis increbrescunt, quibus sanguis maximam ab aëre alterationem suscipit, scilicet aut *Verè*, cum

calor vernus hybernū frigus excipiens, sanguinem prius torpidum & segniū moveri aptum, in vasis efflorescere & luxuriari facit, indeque temperiem calidam & biliosam nancisci: vel *Autumno*, quando sanguis ab æstivo calore torrefactus, ideoque spiritu ejus plurimum depresso, ac sale aut sulphure exaltatis, diathesin modo acrem & biliosam, modo stypticam & astringentem acquirit: quare hac tempestate febres modo tertianæ, modo quartanæ increbescunt; præterea quibusdam in locis ea est Cœli constitutio, ut hominibus quibuscunque febrem aut tertianam, aut (quod frequentius) quartanam brevi accersat; licet in primis officinis, ubi minera morbi hospitari vulgo creditur, nulla sit ob malam victus rationem humorum congestio, aut invaletudinaria dispositio. Imo in hunc morbum facillimè incidunt qui viscera habent firma, & robusta, & qui calore vegeto abundant: è contra quibus ob debilem coctionem cruditates in primis viis continuò congeruntur, ut sint in hydropem aut cachexiam proclives, plerumque ab hoc affectu immunes degunt; nimirum sanguis aquosior factus (instar vini in vappam degenerati) est omnino ad fermentescendum ineptus.

Nec minus hanc nostram assertionem comprobare videtur febrium intermittentium *curatio*, sive ea sit *naturalis* & critica, sive *artificialis* & medicamentorum ope perficiatur. Quoad *primum*, duplici modo solent febres intermittentes terminari: Primus est, cum ab ipsis paroxysmis sanguinis temperies alteratur, & non raro in naturalem reducitur. Cum enim in qualibet accessione plurimum sulphuris & salis adusti deflagraverint, & sudore exhalarent, liquor sanguinis inde temperatior & minus retorridus existit: quare sæpenumero sex aut septem periodis hic morbus judicatur, & sponte cessat: sin vero diutius protrahitur, & sanguis à temperie seu diathesi acri & biliosa non nil immutatus in naturalem non restituitur, quandoque in acidam & aquosam, aut etiam ponticam degenerat; unde febris tertiana diuturna in quoddianam, aut quartanam transit; sæpe etiam, quia sanguis à diuturna hujus febris mora valde depravatur, icterus, aut scorbutus, aut cachexia succedunt. Alter modus quo hic morbus terminatur, est cum cœli aut soli mutatio insignem sanguinis alterationem infert: sic enim febres æquinoctiis inceperunt circa solstitia finiuntur. Etiam ægri in alteram regionem migrantes sæpe convalescunt.

Quod verò attinet ad curam medicamentis instituendam, solet illa iniri dupliciter: scilicet Empiricè, & Dogmaticè; atque in hoc morbo remedia Empirica ab agyrtis, aut mulierculis petita pluris æstimantur, & non raro plus efficiunt, quam quæ juxta exactam medendi methodum adhibentur Medicorum præscripta.

Remedia Empirica, quæ dicuntur febres intermittentes curare, ejusmodi sunt, quæ sine quavis evacuatione paroxysmum ingruentem arcent: & vel intus sumuntur, vel exterius (ubi pulsus præcipuè micant) applicantur, scilicet vel regioni cordis, vel carpis manuum aut plantis pedum plerumque alligantur; hæc interdum prodesse adeo vulgo notum est, ut quidam sub mulctæ cujusvis pœna per ista remedia subitam hujus morbi curationem polliceantur. Quare inquisitu dignum est, quo modo hæc operentur, & qua ratione accessiones febriles sistant. Constat imprimis, eorum quæ exterius ad-

hibentur, vim & actionem sanguini & spiritibus immediate impertiri; & cum paroxysmus sine humoris aut materiae cujusvis evacuatione præcavendo arceant, necesse est ut hujus effectus ratio solummodo in hoc consistat, quod hujusmodi medicamentorum usu sanguinis cum materia febrili turgescencia, ac fermentatio inhibeantur: nimirum à pharmaco circa vasa colligato corpuscula quædam sive effluvia sanguini communicantur, quæ ipsius particulas valde figunt, & constringunt, aut etiam fundendo & exagitando velut præcipitant: utroque modo spontanea sanguinis effervescentia impeditur, non secus ac cum aqua frigida ollæ ebullienti instillatur; aut veluti cum acetum, aut alumen cervisiæ novellæ, & fermentescenti infunditur, illico fermentatio cessat, & liquor novum saporem & consistentiam acquirit, quo ad potum æque sit idoneus ac si longo tempore maturaverit. Quod autem ad hunc modum hæc febrifugia agant, constare videtur, quoniam quæ sunt præcipuæ notæ, vi styptica & adstrictoria, aut etiam præcipitatoria virtute pollent; hinc sal marinus nitrosus, gemmæ, succus plantaginis, Bursæ pastoris, herbæ quælibet adstringentes cum aceto contusæ, & similia carpis alligata, radix millefolii, tormentillæ, etiam camphora collo suspensa, perhibentur hunc morbum tollere: quin etiam quæ intris sumuntur, sunt ejusdem farinae, succus plantaginis, aq. rosarum rubrarum, alumen, quatenus sanguinem figunt & constringunt: decoctum piperis, sal Ammoniacus, aut absynthii, spiritus vitrioli: item passio subitanea iræ aut timoris, quatenus sanguinem fundendo, & exagitando præcipitant, non rarò accessionem febrilem impediunt: non secus ac liquoris cujuslibet concussio & exagitatio aut adstringentium infusio in ipso spontaneam effervescentiam & *ὀρρασην* impediunt. Quibusdam Empiricis pro curatione febrium intermittentium in usu est, nodulum ex lino aut charta involutis arcte compressum, carpis ubi pulsus micant, adeo strictim alligare, ut in ea parte sanguinis circulatio aliquatenus inhibeatur, atque hac ratione paroxysmus febrilis ingruens arceatur. Plures hoc ritu à diuturno morbo curatos certissimè novi: cujus ratio videtur esse, quod dum cruor in qualibet parte à motu præpeditur, in cæteris impetuosius tumultuatur, adeoque à perturbatione istac in toto sanguine concitata, liquoris ejus effervescentia spontanea paulo postea sequutura inhibetur. Quod autem hoc aliòve modo paroxysmus semel impeditus postea non facile redit, ratio est, quoniam si materia ista febrilis & depravata in sanguine diutius continetur, postea concoquitur, & aliquatenus maturatur: ideoque & hanc, & penum de novo succrescentem sanguis non (uti prius) omnino pervertit, sed digerere, & assimilare incipit: præterea cum paroxysmus semel sistitur, ejus consuetudo interrumpitur, cujus solius instinctu natura sæpe ipsos etiam errores suos repetit: ut enim cum semel deliquit, solet eodem modo sæpius perperam agere; ita cum delictum suum semel omittit, facile in melius assuescit.

Curatio Dogmatica medicamentis ut plurimum vomitoriis, & catharticis, necnon sanguinis missione instituitur, quibus miserè excruciantur ægri & rarò profligatur morbus, ut merito hic affectus, Medicorum opprobrium dicatur. Febres verò tertianæ quandoque à vomitorio paulo ante paroxysmum adhibito tolluntur: quod quidem accidit (ut opinor) ob rationem quam superius

superius innuebam : Dixi enim febris tertianæ causam esse malam sanguinis diathesin, qua in naturam acrem & biliosam transit : ideoque succum nutritium appositum non rite assimilatur, sed in materiam fermentativam commutat : quare si bilis copiose à sanguine emulgetur, intemperies ista calida, & biliosa ut plurimum tollitur, & vis ista fermentativa sponte cessat ; hoc autem imprimis præstant pharmaca Emetica : si enim fortiter operantur, non tantum ventriculi fundo spasmus inducitur, sed & duodenum motu inverso versus pylorum contrahitur, atque bilis è meatu choledochi protrusione continuâ expressa in ventriculum suffunditur, quæ statim vomitu rejicitur ; qui si copiosus succedat, vesica fellea ferè inanitur, & deinceps receptaculum evadit, quod humorem biliosum, sive salis & sulphuris adusti particulas sanguini ubertim suffusas emulgeat, & excernat. Paroxysmus mox sequuturus nonnunquam hoc modo præcavetur, non quòd minera morbi vomitu extirpatur, sed quoniam evacuatio & motus motui febrili contrarius excitatur, & proinde sanguinis effervescencia spontanea præcavetur. Etiam hac ratione quandoque in posterum morbus tollitur : quoniam hoc modo sanguis à bilioso humore plenius emulgetur. Est tamen observatione dignum, quòd vomitoria in febre quartana nihil prosunt, & raro in tertiana, nisi statim ab initio exhibeantur, quando febrilis diathesis adhuc levis est, nec plene confirmata.

Circa febres intermittentes in genere, adhuc earum *anomaliam* quædam, quibus à more solito deflectunt, explicandæ restant ; nisi enim inusitata hæc phænomena solvantur, hypothesis hæc nostra deficere, & aliqua ex parte claudicare videbitur. Primò itaque solent paroxysmi frigore aut rigore interdum carere. Increbuit hoc Autumno febris intermittens, cujus accessiones tantum cum calore, eoque intensissimo, ægros exercuere ; in plerisque adfuit vomitus immanis, minime verò frigus aut sudor, post 4. dein aut 5. periodos, ingruente paroxysmo, parum algere & postea aperte rigescere solebant ægri, & in declinatione sudare : hujus ratio erat, quoniam à præservida æstate sanguinis constitutio aeris, & plurimum retorrída evaserat : quare succi crudi particule ipsi confusæ torrescebant statim & præassabantur, ut non cum acore (instar novellæ cervisiæ) efferverent primo, ac dein postea deflagrarent : sed turgescencia concitata totum (instar ligni aridi foco superstrati, illico incendium caperet, & in flammam erumperet : postea vero liquor sanguinis quibusdam paroxysmis deflagratus minus retorrídus extabat : ut succus alibilis depravatus non statim torresceret, sed in materiam nitrosam & cum acore fermentescentem transiret, quæ primò turgescens frigoris sensum toti corpori induceret. Cum frigus paroxysmum inchoat, plerumque sudor ipsum concludit : quod revera contingit, quia sanguis aquosior factus cum materia febrili facilius in vaporem resolvitur, non secus ac liquor aquosus distillatione facilius prolicitur, quàm qui sit oleaginosus, aut consistentiæ crassioris.

Non raro accidit in declinatione hujus morbi, cum paroxysmi minorari incipiunt, ut frigoris & rigoris sensus paulatim minuatur & tandem evanescat, atque cum levi tantum calore accessio ægros molestat : cujus ratio est, quoniam isto tempore sanguis versus statum naturalem aliquatenus resti-

tutus succum crudum concoquere & maturare incipit, itaut plurima pars ejus assimiletur; quædam vero excrementa in cruore congesta levem adhuc effervescentiam pariant. Cum verò particulæ febriles de nitroso acore minimè participant, sine rigore fermentatio sanguinis inducitur, qua quod extraneum est, deflagrat, & vel subigitur, vel foras amovetur. Quandoque etiam in declinatione hujus morbi paroxysmi sine quavis incallescencia tantum levi constant frigore: cujus ratio est, quia materia morbifica nitrosa potius quam sulphurea, cum in fluore est, calorem naturalem aliquatenus obtundit, & deinde sine magna deflagratione dissipatur & evanescit.

Maxima adhuc dubitatio est de *periodorum intervallis*, quæ aliquando in eadem febre videntur esse duplicia, ut accessio prima respondeat tertiæ, & utraque eveniat forsan hora matutina: & rursus secunda quartæ, & ambæ obtinant vesperi, atque ita deinceps: quare febris hujusmodi typum gerens nominari solet tertiana aut quartana duplex, de quibus non facile constat quomodo fieri possunt si à mala sanguinis diathesi, & proinde à succi alibilis depravati ad turgescentiam congestionem paroxysmi dependent: quam ob causam à duplici foco, sive minera, duplicem hunc typum concitari, seu originem ducere vulgò statuitur; mihi autem verisimilius videtur quod in hoc casu aliquando accidit febrem esse simplicem, & unius generis: etiam typos esse consimiles, & omnes sibi invicem congruos; errorem vero præcipuè oriri, quia non horis, sed diebus computentur periodorum interstitia: cum enim non viginti quatuor exacte, sed vel 16. vel 30. horis in quotidiana; atque in tertiana non 48. sed 40. aut 56. plus minus, aut circiter, distent paroxysmorum initia, sicut ut alterni paroxysmi ante, & reliqui post meridiem eveniant. Cui etiam accedit quod dispar victus ratio qua utuntur ægri, magnas typorum inæqualitates sæpenumero producat; ut interdum bis in die paroxysmus replicetur, uti non raro observavi in hominibus cachecticis, & inordinate viventibus. Verumtamen non raro contingit ut febres intermittentes paroxysmos rejectant, qui nec eandem observent distantiam, nec prorsus ejusdem moris typum gerant. Multoties observavi in febre quartana, quod præter accessiones statas die quarto circa eandem horam redeunt, paroxysmi quidam vagi & incerti ægros infestarent; ut interdum die paroxysmum solitum præcedente, quandoque ipsum insequente, insuper de novo paroxysmus alter (levior tamen) cum rigore, æstu & sudore, typum febris intermittens exactè referens excitetur; & nihilominus accessio primaria tempore consueto rediret. Hoc ut plurimum evenire solet aut à victu male instituto, præcipuè à crapula & vini potu; aut à pharmacía perperam adhibita: cujus ratio (ni fallor) in hoc consistit. Sanguinis massa cum materia fermentativa statò tempore ad turgescentiam saturari solita sæpe ob errata quædam in victu, plus materiæ congerit, quàm quæ uno paroxysmo facile diffuari poterit: cumque eandem materiam fermentativam inæqualiter coquet, non raro accidit ut partem ejus superfluum aut tenuiorem, quasi velitatione quadam leviori, paroxysmo prius excutiat, aut crassiorrem (post accessionem primariam) adhuc in cruore residuam, fermentatione febrili de novo suborta dispellat. Et cum in febre intermittente paroxysmi hoc modo reduplicant, utrique se remissius habent, ut sit eadem in utroque materies, tantum divisa, & binis accessionibus eventualata. Præterea cum ma-
teria

teria hæc fermentativa, sive succus nutritius inter circulandum depravatus, continetur partim in arteriis & venis cum sanguine, & partim in genere nervoso & solidis partibus, evenire potest ut utrique humores haud simul fermentescant, sed uno paroxysmo diffletur maxima unius portio, & dein altero maxima alterius.

CAPUT IV.

De Februm intermittentium speciebus: & primò de Tertianâ.

AD hypothesin nostram de februm intermittentium natura & origine superiori capite traditam, facile erit singula quæ illuc spectant phænomena, eorumque rationes accommodare. Cum vero quæ sunt hujus generis non idem observant intermissionis aut recursus spatium, eorumque typi quoad signorum & symptomatum apparentias non prorsus ad eundem modum contingant: ideo juxta horum diversitates, & præcipuè à paroxysmorum distantia, februm intermittentium variæ assignantur species, & differentiæ. Potissima earum divisio est in *tertianam*, *quotidianam*, & *quartanam*: de singulis præcipua notatu digna hîc loci advertemus.

Dicitur febris *tertiana*, non quæ ad trium dierum distantiam peragitur; verum inclusivè à die quo incipit unus paroxysmus, dehinc tertio redit alter. Interim aliquando si paroxysmi sint diuturniores, scilicet ferè ad 24. horas protracti, simulque accessiones suas præoccupant, *ἀσπεχίας* spatium sæpe nyctihemero minus est. Vulgò distinguitur hæc febris in *exquisitam* & *notham*; febris *tertiana exquisita* est quæ incipit cum rigore vehementi, cui succedit calor acris, & mordax, qui in sudorem exsolvitur, atque intra 12. horas accessio finitur, sequiturque perfecta intermissio: in *tertiana notha*, frigus & calor se remissius habent, accessio vero suprâ 12. horas, imo sæpè ad 18. aut 20. extenditur. Differunt hæc quoad variam sanguinis diathesin, qui in priori magis retorridus & acris existit; ideo succum alibilem à cruditate versus adustionem pervertit, quare effervescencia vehementior excitatur, sed cùm materia æqualius deflagrat citius finitur. In posteriori, præter adustionem, sanguis humiditate serosa nimis scatet, quare succus nutritius in materiam crudiorē (ideoque subigi & deflagrare minus aptam) degenerat: quare ejus accessio est mitior, & inæqualior, & non nisi longiore spatio peragitur.

Essentia ergo febris tertianæ in eo consistit, quod sanguis (instar cervisiæ & brasio nimis tosto paratæ) plus satis acris & retorridus succum alibilem, qui è comestis crudus infertur, non cito subigit & maturat, sed plurimum ejus in materiam nitro-sulphuream pervertit, qua cùm sanguinis massa ad turgescenciam saturatur, instar cervisiæ novellæ utribus inclusæ effervescenciam concipit: à fluore istius materiæ nitrosæ, quæ calorem & spiritus vitales obtundit, partesque nervosas vellicat, primò excitatur frigus cum rigore:

rigore : dein, præpollente rursus spiritu vitali, materia hæc in sanguine efferves-
cens subigi ac in corde accendi incipit ; à cujus deflagratione calor intensus
per totum corpus diffunditur : dein reliquiæ ejus secretæ , ac sero involutæ per
sudorem amendantur.

Retorrida hæc sanguinis constitutio in hoc sita est , quod sulphuris & salis
particulis plus debito imprægnatur : quare quæ ad hunc morbum disponunt
causæ procatharticæ sunt temperamentum calidum & biliosum, ætas juveni-
lis , præfervida victus ratio , uti vini & ciborum piperatorum immoderatus
usus : præcipuè autem verna & autumnalis anni tempestas , quando sanguis
(non secus ac vegetabilia quæque) efflorescere, & sua sponte fermentari aptus
sit : Propter hujusmodi occasiones cruoris liquor perassari solet , ac in tempe-
riem biliosam verti : & cum à crasi naturali in tantum discessit , ut succum nu-
tritium in materiam planè fermentativam pervertat , hujus febris initium in-
ducitur, quod aliquando ab hac intemperie sensim aucta , & ad summum pro-
vecta contingit : frequentius vero hanc dispositionem causa evidens in actum
suscitat, & accidenti cuidam notabili hujus morbi originem ascribimus. Quare
humi-decubitus, à sudore frigus susceptum , aut quovis modo transpiratio im-
pedita : item crapula , aut ab inordinate comestis ventriculi perturbatio, quæ-
cumque demum effervescentiam immodicam in cruore cient , latentem hujus
morbi diathesin in actum ducunt : quippe à tali qualibet occasione succus nu-
tritius in sanguine congestus , & aliquatenus depravatus fluorem concipit ; & à
reliquo sanguine secedens cum acore nitroso fermentescit ; dein à spiritu
& calore vitali accensus , & exagitatus , cum æstu valde intenso *paroxysmum*
inducit.

Febris tertiana solet esse Vere frequentior , quo tempore sanguis vegetior &
opimior existit , ideoque ad diathesin hujusmodi febrilem magis idoneus. Fe-
bris incepta , si intra modicum tempus finitur , vulgò dicitur medicina potius
quam morbus ; quod ex parte verum est , quoniam hac ratione sanguinis im-
puritates deflagrant, viscerum obstructions expediuntur, & revera totum cor-
pus ventilatur, itaut materiâ quavis excrementitiâ, & nascentium morborum se-
minario prorsus liberetur. Sin vero diu protrahitur hic morbus , plurimum ægri-
tudinum & diuturnæ invaletudinis causa existit : Hinc enim sanguinis massa
spiritu vitali plurimum spoliatur , & (instar vini nimis fermentati) quodam-
modo vappescit : quare icteritia , scorbutus , aut cachexia hanc febrem serò
curatam excipiunt. A crebris enim *paroxysmis* spiritus vitalis plurimum eva-
porat , qui si quidem à comestis parum restituitur , cruor inde debilior & ferè
vappidus evadit. Interim salis & sulphuris particulæ evehuntur magis & exal-
tantur : unde sanguis fit acris & salsus , adeoque circulationi & *πυκνωσι*
ineptior.

Insuper hic morbus diu protractus non rarò typum commutat , & à febre
tertiana fit aut quotidiana , aut interdum quartana : dein aliquando ab utrif-
que in tertianam redit. Horum ratio est sanguinis diathesis variè immutata :
qui enim primò acris , & biliosus succum nutritium isto modo perverterat , ut
die tertio ad turgescentiæ plenitudinem assurgeret ; postea à crebra deflagra-
tione *minus acris* , verum aut *magis aquosus* , & quoad *crasin* ejus *longè debilior*
evadit , ita ut humorem alibilem parum aut non omnino assimilet & maturet,
proinde

proindeque citiora fiunt materiæ fermentativæ incrementa, & accessiones quotidie redeunt: aut etiam cruor ab intemperie acri & biliosa (alterationem hanc cœli aut anni constitutione promovente) in *austera* & *ponica* immutatur; ideoque succum nutritium tardius pervertit, & materiæ febrilis incrementis segnius congestis, non nisi die quarto *paroxysmos* concipit: sin ab utraque dyscrasia, pharmaci aut victus ratione, sanguinis temperies de novo versus biliosam reducitur, etiam periodi alterantur, & Tertianæ typum resumunt.

Febri tertianæ *Symptomata* quædam supervenire solent, quæ pro morbi hujus *crisibus* vulgo habentur; & revera aliquando istis apparentibus affectus aut plane cessat, aut de solita atrocitate remittere incipit. Sunt autem ejusmodi *συνεπιπλάκη* præcipuè hæc tria, scilicet *Erisipelas* seu pustularum eruptio in labiis, *Icterus*, & *Phlegmon* in hac aut illa parte corporis subito excitatus, sæpenumero accidit post tres aut quatuor *paroxysmos* ægrotantibus circa labia ulcuscula cum scabie crustosa erumpere, & licet nusquam præterea in toto corpore cujusvis materiæ abscessus fiant, tamen hinc præsagium desumitur febrem esse mox desitutam; quod interdum verum esse eventus comprobat. Veruntamen aliquoties observavi effectum speratum haud successisse, sed cum labiis ulcerosis febrem pertinaciter & diu afflixisse. Quod vero ad symptoma istud spectat, oriri videtur ex eo quod sanguis diaphoresi liberiori potitus recrementa non tantum tenuia & fuliginosa, sed etiam crassiora foras protrudat; & cum eadem in aliis partibus per poros apertiores facile exhalant, circa labia ob cutim magis constrictam in transitu hærent; & quia materies vaporosa particulis salis & sulphuris adustorum scatet, in cute defixa circulationem illic impedit, ideoque pustulas & ulcuscula inducit; huic forsan affectui halitus validior qui ore & naribus exspiratur nonnihil contribuit, quatenus sanguinem & succos illic confluos torret & exurit. Quare dicendum videtur quod ista pustularum eruptio tantum plenior diaphoresin in toto denotat, qua scilicet crassiora æque ac tenuia sanguinis adusti recrementa foras evaporant. Etenim in aliquibus à febre tertiana exanthemata in toto corpore, veluti si variolis afficerentur, erupisse novi; quod si uberiori hac ventilatione velut purgamento sanguis ita liberatur, ut crasin pristinam recuperet, febris judicatur: sin vero (uti interdum accidit) recrementa quædam licet crassiora erumpant, tamen alia intus manent, & diathesin febrilem adhuc foveant, ista ulcuscula tantum majorem sanguinis labem & morbi pertinaciam arguunt; idcirco observare licet quod quando scabies labia occupat, si febris non statim remittit, ea diuturna & gravis futura est.

Febri tertianæ interdum *icterus* supervenit, eamque solvit: (quod etiam Hippocrates annotavit) cujus ratio est quia cum sanguis diathesin acrem seu biliosam nactus sit, ut propterea succum alibilem pervertat, indeque materiam excrementitiam congerat, à dyscrasia istac sæpe liberatur, quando subita *εκκρίσις* recrementa salis ac sulphuris adustorum uberius expurgantur. Hoc vasa choledocha à pharmaco, aut sponte naturæ irritata, adeoque bilem è sanguine plenius elutriantia, non rarò præstant: quippe vomitus, purgatio, ac imprimis diarrhœa, hujusce morbi curationi plurimum conducunt,

quinimo interdum sanguis ipse sua sponte efflorescens, recrementa biliosa velut exuvias suas detrudit, ac inter circulandum in cute deponit, adeoque *ictericiam* inducens, hanc febrem judicat.

Quando *phlegmon* (uti interdum assolet) huic affectui supervenit, dicitur vulgo febrem in partem tumore affectam decubuisse. Quod verò à tali abcessu hic morbus judicetur, nihil mirum est; quippe sanguis hac ratione succi nutritii degeneris penum è sinu suo continuo seponit, & parti affectæ transfert; & propterea in cruoris massa materies degener & fermentativa ad turgescentiæ plenitudinem haud facile assurgit. Quare nonnullos alvus perperim soluta sensim liberavit, eo quod sanguis sarcinam suam modo succrescentem hoc ritu è vestigio eliminavit, nec ipsi plenum incrementum concesserit: quandoque etiam surditate derepente oborta, febris tertiana statim cessavit, scilicet ob continuam materiæ febrilis è cruoris sinu in caput metastasin.

Quod si *febris tertiana* intra breve tempus, nec sponte naturæ sensim declinet, ut intra 7. vel 10. periodos planè cesset, nec quovis à prædictis modo judicatur, nec pharmaciæ ope tollitur, quin post 10. aut 12. paroxysmos ægrotantes usque graviter affligat, curationis difficile admodum incumbit pensum: quippe sanguis à continua materiæ febrilis congestione, crebrisque incendiis adeo depravatus tandem evadit, ut nihil rectè coquat pro corporis nutritu, & ejus viribus sustentandis: nec impuritates & excrementa à sinu suo prorsus excutere valet, quod morbi crisin faciat: at verò eodem in dies præpollente, sanguis præter dyscrasiam ejus, in mixtione nonnihil lædi incipit; quare paroxysmi crebriores infestant, nec iis perfecta ἀνάρτησις intercedit, quin ægri valde imbecilles & languidi, cum siti & calore fere continuo febricitant. Quando res ad hunc statum deducitur, nisi remediis ab arte succurritur, aut soli & cœli ἡρώται tempestivè opem ferunt, non rarò hic affectus in mortem terminatur.

Quoad *curationem*, medendi methodus vulgo in unicum hunc scopum dirigitur, nimirum ut morbi minera extirpetur, & sine fomite residuo aut recidivæ metu materia febrilis è corpore nostro eradicetur; quare vomitoriis & catharticis diligenter insistitur, quæ cum nihil ad curam proficiant, quin plurimum frangantur vires, ægroti à medicis relinquuntur, & res tota naturæ committitur. Intentiones (uti mihi videtur) debent esse hujusmodi. Primò, sanguinis ad temperiem naturalem *restitutio*. Secundò, depravationis succi nutritii (quantum fieri potest) *præcautio*. Tertiò, fermentationis febrilis, ne paroxysmus suscitetur, *inhibitio*. Atque hæ indicationes non tantum in febre tertiana, sed in qualibet præterea intermittente locum habent: quæ tamen non iisdem modis, aut remediis, verum aliis & aliis pro diversitate morbi, conditionis ægri, & symptomatum maximè urgentium, sunt peragenda. Ut cunque in curatione hujus morbi plus naturæ & bene institutæ victus rationi, quàm pharmaciæ tribuendum est.

I. Circa primam intentionem, nimirum ut sanguis ad temperiem naturalem reducatur, vomitoria, venæ sectio, & purgatio magni sunt usus, præcipuè si in morbi principio celebrentur. Juvant *vomitoria* tum quatenus ventriculum expurgant, ut coctio primæva melius perficiatur, indeque chymus

nutritius pro materia sanguinis purior suppeditetur; tum præcipuè quatenus bilem è meatu choledochi copiosè exprimendo cystin felleam inaniunt, ut exinde bilis è massa sanguinis plenius elutrietur, adeoque sanguis à recrementis salis & sulphuris adustis depureretur. *Venesectio* sanguinem refrigerat & ventilat, ut propterea minus torrefiat, aut præassetur, atque liberius sine adustionis periculo in vasis circuletur. Item *purgatio* bilem è vasis felleis, & consequenter è cruoris massa ubertim emulget, & proritando exprimit. In hunc finem (scilicet cruoris reductionem) conferunt *digestiva*, acetosa, attemperantia, quatenus sanguinem fundunt, & alterant, ejusque fervorem attemperant. Quandoque etiam *solis* & *aëris* mutatio malam sanguinis constitutionem præ cæteris quibuscumque remediis insigniter emendat.

Secunda intentio, diætâ & exactâ victus ratione optimè perficitur; quæ in hoc morbo sit tenuis, & parca oportet. Quare vulgò dicitur Fames optimum hujusce ægitudinis remedium: & communi constat experimento, à parciori victu accessionem febrilem ultra tempus consuetum sæpissimè protelari. Duo sunt imprimis circa victum observanda: Primò, ut alimenta sint tenuia, nihil exhibeatur sulphureum aut spirituosum; sic enim conflagratio sanguinis minuitur; dein secundò, ut ingruente aut urgente paroxysmo, nihil alimenti ingeratur: quare in jejunis paroxysmus est levior, & citius finitur.

Quod *tertiò* erat propositum, accessionis febrilis inhibitio instituitur per remedia quæ sanguinis fermentationem sistunt. Licet autem hoc remedium Empyricum, amethodicum & valde infidum apud Medicos audiat, tamen mihi compertum est, has febres hoc modo sæpenumero curari, cum pharmaca non omnino prodesse. Qualia sint, & quo ritu, absque veneficii suspitione, pro curando hoc morbo juvamen præstent, suprà annotatum est. Hic solum advertimus, horum usum post pharmaca & venæ sectionem (si opus ea fuerit) esse maximè proficuum; & nisi hæc ritè præmittantur, istæc altera rarò paroxysmum inhibere. Vomitus autem, purgatio, & venæ sectio, nisi ab initio statim celebrantur, parum opis præstant, imo sæpius obesse solent: dum enim sanguis spiritu vitali pollet, ejus mala diathesis facili negotio corrigi aut emendari potest: quare si bilis circa initia copiosè emulgetur, aut cruor eventilatur, ad crasin naturalem reducitur: postea tamen in morbi hujus progressu (spiritu jam plurimum exhausto, atque sale & sulphure nimium exaltatis) si hujusmodi evacuationes adhibentur, sanguinis crasin plus debilitant: ideoque observatione constat, ab his remediis serò admotis febrem tertianam rarò aut vix omnino curari, & sæpè in quotidianam transire. Novi egomet verno tempore quosdam satis integra valetudine fretos, ab emetico fortiori præcautionis gratia sumpto & evacuationem violentam ciente, è vestigio in febrem tertianam incidisse; atque alios à febre hac aliquandiu curatos, cum purgationem pro exterminandis materiæ febrilis reliquiis fortiolem inirent, illico recidivam passos. In promptu erit dicere, mineram morbi prius sopitam, hoc modo à pharmaco exsuscitari, & in actum deduci: attamen si rectè hanc rem consideres, potius dicendum videtur, quod à pharmacia fortiori sanguinis crasis plurimum lædatur; cumque prius fuerit in dyscrasiam biliosam pronus, ut succum alibilem ægrè assimilet, à causa hac evidenti illico magis degeneret, ut protinus nutrimentum in materiam fermentativam perverterit, adeoque dia-

thesin febrilem suscepit. Vulgò increbuit opinio, febrem tertianam sine vomitorio vix sanari posse; quare solent nonnulli medicaſtri, ſub neceſſitatis prætextu, quibuſcumque hoc morbo laborantibus (languidis & infirmis licet) non ſine magno vitæ periculo pharmacum emeticum propinare: & quos tali remedio omnino impares cenſent, tanquam non facilè curabiles naturæ relinquunt. Verum (uti mihi ſæpius contrarium experto ſatis conſtat) huiusmodi praxis perperam inſtituitur: quin potius exiſtimo pro curatione febris tertianæ, niſi in corpore robuſto & ad vomitum facilè proclivi, & cum contigerit ventriculum materia excrementitia aggravari, rarò aut nunquam vomitoria requiri, ſed vice huius lenem purgationem, qua humorum ſaburra blande ſubducatur, rectius ex uſu fore: quippe purgatio in hoc caſu idem præſtat quod vomitorium; nimirum vaſa choledocha evacuat, ut bile è ſanguine uberius exhausta, dyſcrasia febrilis emendetur. Cum autem humor felleus in ventriculum exantlatus ſuſſum educitur, gravis inde noxa ſtomacho inferitur, ac inſignis perturbatio in toto corpore excitatur: ſi verò à leni cathartico humor iſte deorſum proritetur, ſine quavis moleſtia foras excernitur. Dein, ſi blandæ purgationi ſemel aut bis iteratæ victus admodum tenuis & carniū expers accedat, indicationi præſervatoriæ non rarò ſatiſfiet, ut pro cauſa morbi tollenda non aliis remediis opus fuerit; quin hiſ ritè præmiſſis in uſum adhibeantur quæ aut intus ſumpta, aut exterius applicata acceſſionem febrilem ſiſtant. Huiusmodi plano & facili medicinæ inſtituto, ſcilicet purgatione ex infuſo ſennæ & rhabarbari, victu tenui, & topico febrifugio pectori aut carpiſ adpoſito, ſine pharmaci cujuſvis alterius deleterii uſu febres tertianas brevi tempore ſapiſſimè curatas novi: quinimo gravidas, ſenes, item valde imbecilles, quorum vires purgationi non ſufficerent, ſolum tenuis diætæ cum periaptis tempeſtivè adhibitis perquam feliciter ſanavi. Iſtius methodi optatum ſucceſſum ita crebrò expertus ſum, ut minimè dubitem, febrem tertianam, ſi ab initio hoc modo tractetur, ſcilicet priuſquam malâ victus ratione, aut pharmaciâ perperam adhibitâ ſanguinis temperies plus lædatur, æque facilè ac alium quemvis morbum perſanatum iri. In huius verò rei fidem liceat ſequentem hiftoriam proponere.

Juvenis quidam nobilis, bilioſo temperamento præditus, febre tertiana intermittente corripiebatur; ingruente paroxyſmo plurimum bilis flavæ & virideſcentis evomebat, dein cum inſigni cardialgia, calore & ſiti intenſiſſimis, per plures horas graviter moleſtabatur. Huic, intermiſſionis die, quo fortè aderam, ex præſcripto meo ſanguis ad uncias octo fuit miſſus, & poſt meridiem clyſter emolliens injectus; etiam victu tenuiſſimo (ſcilicet tantum ex hordeatis) utebatur: cepit qualibet nocte hora ſomni hanc opiatam, ſcilicet Conſer. roſarum vitriolat. ſem. drac. diaſcordii ʒ. ſcrup. etiam quolibet mane ſalis abſinthii ʒ. ſcrup. è cochleari ſucci aurantii: ſed cum hæc non ſuccederent (redibat enim paroxyſmus nonnihil remiſſior, ſeu cum vomitu atroci ut prius) inſuper cum vomitorium hic æger valde perhorreſcebat (quoniam antehac non ita pridem ab emetico admodum leni ferè trigeſies evomuerat, uſquedum ſpaſmo & convuſionibus affectus in magnam virium proſtrationem cum vitæ periculo adduceretur) idcirco die prædictum paroxyſmum ſequenti potionem ex infuſ. Sennæ, Rhahabarb. & Santal. Citrin. cum ſale

absynthii in aq. fontan. exhibui, à qua decies purgabatur cum levamine : mane proximo ;. horis antequam paroxysmum expectaret, epithemata febrifuga carpis admovi, & sanguinem denuo misi ad 6. unc. ex quo accessione febrili caruit, & dein iterum eodem modo purgatus integrè convaluit.

Quod si *febris tertiana* ob malam ægotantis constitutionem, vel propter errata in victu, aut pharmaciâ commissa, alius radices egerit, ut post diurnam affectionem paroxysmi usque ingravescant, & cum viribus dejectis, siti, & æstu fere continuus, inappetentia, vigiliis, pulsu debili, urina rubicunda, & contentis valde saturata, laborantes summè oblanguescant; methodus therapeutica paulo aliter institui debet : in hoc casu primò enitendum erit, ut sanguinis dyscrasia tollatur; quare alimentis solum tenuibus, uti sunt juscula hordeacea, aut avenacea cum radicibus aperitivis incoctis (jure carniū omnino posthabito) ægri vescantur : enematum emollientium usu (si opus fuerit) alvus soluta servetur; insuper (catharticiis omissis) medicamentis solummodo digestivis, quæ sanguinem fundant, & serosas impuritates blande per urinas educant, necnon remediis confortativis, quæ viscera corroborant, & spiritus refocillent, præcipuè insistendum esse videtur. In hunc finem apozemata ex herbis & radicibus leniter diureticis concinne parata, item opiata ex conservis temperatis, cum sale nitri, aut herbarum fixo, cumque pulveribus testaceis, & spiritu Vitrioli admixtis, adprimè conducunt. Quando sanguinis crasis nonnihil emendatur, ut urina sit clarior & minus colorata, etiam somnus quietior, cum sitis & æstus remissione succedat; tunc remedia paroxysmum febrilem inhibentia utiliter adhiberi poterunt: quare Epithemata febrifuga carpis, aut plantis pedum applicentur, etiam pulvis è cortice Peruviano aut ex succedaneo ejus; aut etiam è corticibus fraxini, Tamarisci, vel gentianæ, cum salibus admixtis è vino albo propinetur: postquam accessiones tolluntur, & ægroti viribus constare, ac alimenta appetere, & aliquo modo concoquere incipiunt, purgantia lenitiva ex usu erunt; usque tamen à victu lautiori aut carniū participi ægroti abstineant: atque non dubitandum erit, quin absque catharsi violentiori, aut phlebotomia, ægotantes integram valetudinem propediem sint recuperaturi.

C A P U T V.

De Febre intermittente quotidiana.

F*ebri tertiana*, propter affinitatem & paroxysmi similitudinem, proximè succedit *quotidiana*, scilicet cujus accessio quolibet die redire solet. Quorundam opinio est, hujusmodi febrem esse solummodo tertianam duplicem; & à materia dispersa, & duplicem focum nata oriri; cui tamen non assentior, ejusque exortum peculiari sanguinis dyscrasiæ attribuendum duco. In hac frigoris & caloris symptomata sunt remissiora; verum accessio diutius protrahitur, & sæpè horas 18. aut 20. solet durare: hæc febris, ut pluri-

num tertianæ succedit; cum enim spiritus vitalis à crebra sanguinis deflagratione plurimum avolarit, atque (diathesi febrili adhuc manente) cruor debilior factus sit, succum nutritium minus coquit, aut maturat, & totum ferè in materiam fermentativam pervertit; quare citius ad incrementum pervenit, & sub duplo istius temporis, quo prius, ad turgescentiæ plenitudinem congeritur. Quoniam verò materia congesta cruditatis æquè ac adustionis particeps est, ideo effervescentiæ calor est remissior & inæqualior, atque (instar ligni viridis foco superstrati) lentius deflagrat; quare paroxysmus est durationis longioris.

Quandoque accidit febrem quotidianam sine prævia tertiana primò oriri, scilicet cum in corpus cacochymicum, & pravis succis refertum diathesis febrilis incidit; tunc enim sanguis spirituum inops, succum nutritium in majori copia pervertit, & breviori tempore ad turgescentiæ plenitudinem congerit: quæ autem quotidiana incipit, non rarò typum commutat, & tertiana evadit; non secus ac tertiana sæpe in quotidianam migrat, siquidem inter has febres, earumque causas magna est vicinitas; & constitutio sanguinis parum immutata, alterius in alteram μεταλλάσσει facit. Febris intermittens quotidiana non ita facile uti tertiana curatur; sive enim illa simplex primò advenit, sive alteri intermittentium succedit, utcumque à causa fortiori excitatur, & majorem arguit sanguinis dyscrasiam, quæ remediis haud statim cedit. Quin etiam hæc febris si diuturnior fuerit, aut morbo alii chronico supervenerit, præter sanguinis labem sæpissimè adjunctas habet viscerum infirmitates: nimirum sanguis labefactus impuritates suas sensim congestas visceribus, dum eorum anfractus pertransit, facile affigit; (hinc cum febre quotidiana ventriculi aggravatio, hypochondriorum tensio, modo hepatis, modo lienis, aut mesenterii obstructions, aut tumores conjunguntur) sunt autem hujusmodi affectus non causa febris (uti vulgò creditum) sed tantum ejus producta. Quare in hac febre præter simplicem curationis methodum, quæ in tertiana indicatur, quamplures aliæ intentiones, sive coindicantia, in considerationem veniunt: nimirum ut ventriculus humorum saburra expurgetur, viscerum infractiones liberentur, infirmitates corroborentur, atque unà cum his dyscrasia sanguinis emendari queat, & accessiones febriles inhiberi possint, omni ope niti decet; unde propter varias hujusmodi intentiones longiori via ad curationem proceditur; in hoc casu vomitoria (si vires ferant) erant præ cæteris ex usu: etiam purgantia, quibus assiduus materiæ excrementitiæ proventus eliminetur, sæpius iteranda: præter hæc, remedia digestiva, deobstruentia, quæ fermenta viscerum, & sanguinis restitunt, & dyscrasias corrigunt, erunt crebrò adhibenda. Quamobrem sales herbarum fixi, eorundem extracta, Spiritus mineralium acidi, ac interdum chalybis præparata apprimè conducunt: circa hæc media difficile incumbit pènsium, cum ob multiplex malum simul plura sint agenda, attamen ob paroxysmi febrilis assiduitatem paucioribus solum uti ægro vacat. In affectibus ita complicatis, licet methodi ratio postulet impedimenta primò amovere, & dein morbum sanare; tamen hujusmodi febrem in corpore cacochymico cum plerisque aliis affectibus stipatam sæpe ἀ μεθόδως & Empyrico modo curatam novi; scilicet, post levem totius provisionem remedia febrifuga

febrifuga exterius applicata accessionem febrilem primò sublevarunt, ut dein reliquis affectibus curandis tempus, & medendi occasiones felicius concederentur. Nuper invisi foeminam illustrem, quæ cachectico corporis habitu diu prædita, post mensem à puerperio languida, & imbecillis, febre intermittente quotidiana corripiebatur; à cuius sex, aut septem accessionibus vires in tantum erant prostratæ, ut lecto exsurgere, aut in eodem suscitari vix potuerit: alimenti, licet tenuissimi, ne tantillum capeßere, quin maximæ inde molestiæ stomacho cierentur; insuper regio ventriculi, & hypochondrii sinistri erat tumore duro, renitente, & immaniter dolente, per totam obsita. propter vires summe prostratas præter enematum usum nullus hic evacuationi fuit locus; etiam alia quæque remedia, nisi pergrata, & in exigua tantum quantitate, stomachus valde imbecillis averfabatur. In difficili hoc casu, atque intra angustos medendi limites circumscripto pauca hæc consului, nimirum ut bis in die sumeret hanc mixturam, scilicet Aqu. Magistralis lumbricorum, unc. 2. Elixir proprietatis g. ll. vi. Insuper fotum ventriculo adhibendum institui, ex foliis Absinthii Pontici, Centaurii, Abrotani, cum radicibus Gentianæ, vino albo in vase cooperto incoctis: etiam ut post fotum placenta ex pane tosto, & eidem liquori intincta, supra ventriculi regionem gestaretur; præterea Epithemata febrifuga carpis alliganda curavi: atque his solummodo remediis die tertio paroxysmo febrili caruit, & ab eodem postea immunis perstitit: dein remediorum chalybeatorum usu intra breve tempus integre convaleuit.

CAPUT VI.

De febre Quartana.

IN febre quartana, quàm in cæteris, periodus est longior, quæ nimirum inclusive in diem quartum extenditur. Etiam mora esse solet diuturnior, & curatio difficilior: quippe hic morbus ad plures menses, sæpe etiam annos protrahitur; & rarò, aut vix omnino medicamentis cedit.

Paroxysmus ut plurimum à frigore, & rigore incipit, quibus calor succedit satis molestus, sed remissior quàm in tertiana: sudor plerumque accessionem concludit. Quando morbus recens invadit, paroxysmi sunt graviores, & admodum infesti, ægrosque lecto affigunt, necnon de robore, & vigore corporis decidere faciunt: postea verò leviori absolvuntur plaga, ut accessiones extra lectum, quandoque in itinere, aut aliud quicquam agentes ferant. Longiùs si hæreat, affectionem scorbuticam, aut hypochondriacam inducit, hominesque statu invaletudinario implicat.

Causæ, quæ ad hunc morbum disponunt, sunt primò soli, & cœli constitutio; quippe tempus autumnale huic affectui ferè proprium est, ut rarò observetur febrem quartanam, nisi circa Autumnum oriri: etiam in quibusdam locis, præcipuè juxta oram maritimam, hic affectus solet esse Endemius, quosvis illic degentes, aut aliorum advenas confestim occupare. Huc etiam faciunt ætas declinans, quæ in *ægrum* constituitur; etiam melancholica temperies,

& quæ ob malam victus rationem affectioni hypocondriacæ obnoxia est ; in super febres aliis generis diurnæ , & morbi chronici non rarò in febrem quartanam transeunt.

His juxta positis , & ritè pensatis , dicendum videtur , quod febris quartana , æquè ac ceteræ intermittentes , à vitiosa sanguinis diathesi dependeat ; quia nimirum succus nutritius sensim in vasa delatus , in materiam fermentativam pervertitur ; atque hujus usque ad turgescentiæ plenitudinem congestæ effervescencia febris quartanæ paroxysmum constituit. Cum vero in hac febre nonnulla sint à cæteris peculiaria , inquirendum erit , qualis sit in hoc morbo sanguinis dyscrasia à reliquis distincta , & quo pacto symptomata præcipuè notabilia excitet.

Super hac re quæ vulgo perhibetur opinio à veritate multum recedit. Fere omnium consensu febris quartanæ essentia , & origo humori melancholico alicubi in primis viis coacervato , & periodicè illic putrescenti ascribitur. Viçe hujus , asserimus nos , quod in hoc morbo sanguinis liquor à natura dulci , spirituosâ , & balsamica in acidam , & nonnihil austeram , instar vini acescentis transierit : nimirum adest spirituum penuria , atque sanguinis pars Terrestris , seu Tartarea (quæ constat in primis Sale , & Terra) nimis exaltatur , & in fluorem evecta a corem cruoris massæ inducit : non secus ac cum cervisia à tonitru commota , & fæce turbidâ infecta acescit. Sanguis hoc modo ab indole nativa degener succum alibilem non rite coquit , & sibi assimilât , sed in materiam extraneam pervertit ; quâ cum ad plenitudinem in vasis saturatur , partesque nervosæ à succo illinc oriundo irrigantur , sequitur hujus materiæ fluor , & velut spontanea effervescencia , quâ nimirum accessio febrilis cum rigore , & calore , non secus , ac in tertiana , solet induci.

In febre quartana periodi longiora habent intervalla , quia cum sanguinis dyscrasia sit versus acidum , ideoque minus acris & calida , succum alibilem sine lucta & tumultu pervertit ; quare ejus nonnihil assimilatur , & reliqui depravatio non ita longè , ut in tertiana , à statu naturali recedit : atque hinc ejus congestio ad plenitudinem fit tardior , & ferè sesqui-altero istius temporis quo in tertiana ad turgescenciam assurgit : ideoque hac febre correpti mediocriter valent , & robusti sunt , quod indicium est succi nutritii minus depravati ; etiam paroxysmi sine immani incalescentia fiunt , quia sine magna adustione humor nutritius in materiam fermentativam pervertitur.

Cur autem hic morbus tam difficilis sit curationis , adeoque pertinaciter ægros infestet , in causa est atrabiliaria sanguinis constitutio , quæ non facile amovetur , & ferè nullis cedit remediis. Diathesis biliosa crebrâ sanguinis deflagratione emendatur , & sæpe sponte cessat ; non secus ac vina nimis opulenta propriâ effervescenciâ deprimuntur , & in debitum statum reduci solent. Verum melancholica hæc sanguinis dyscrasia , in qua cum spirituum inopia & defectu , Sal & Terra nimis exaltantur (veluti cum vina acescunt) difficillimè restituitur , & penè ejusdem laboris , & difficultatis est , ac in aceto vigorem , & spirituum vinosum redintegrare : etenim ut sanguis isto modo depravatus reducatur , opus erit , ut tota ejus massa volatilifetur , ac velut de novo spiritualescat. Quare in hoc casu evacuantia ne hilum prosunt , imò sanguinem magis depauperando , sine medela sæpe vires atterunt :
quin

quin opus est iis quæ quod fixum est exaltent, & volatilisent, & in tota cruoris massa πνευματω'σιν promoveant. Inde est quod in hoc morbo cœli solique mutatio præ cæteris quibuscunque remediis sæpissimè juvamen præstat: etenim febres quartanas circa autumnum oriundas, ver sequens non rarò tollit. Quod proculdubio contingit, quoniam immutata aëris conditio malam sanguinis diathesin in melius alterare solet: ob eandem rationem etiam & loci mutatio hunc affectum pharmaco cuivis inexpugnabilem sæpissimè curat.

Si adhuc inquiratur, quare hic morbus in Autumno potissimum oriatur, rarò autem Vere, aut Æstate; dico, tempus autumnale hujusmodi febrilem sanguinis diathesin aptissimè producere: cum enim ab æstivo calore plurimum Spiritus, & Sulphuris avolarit, & quod reliquum est, à frigore constipari incœperit; sanguinis liquor (veluti vinum à nimia effervescencia acescens) in naturam ponticam, & acidiusculam facilè degenerat. Hoc etiam aura maritima halitibus Salinis, & Spiritus figentibus inficiendo sanguinem, facile procurat. Quin etiam affinitas hujus morbi cum scorbuto, & affectione hypochondriaca planè indicat, in vitio esse malam sanguinis diathesin, qua nimirum falsus, & terrestris, cum πνευματω'τεως defectu evaserit.

Circa febres quartanas fuit novissimus annus observationum adeo abundè ferax, ut nulli non liceret quæcunque ad hunc morbum spectant, ἀυτοψία colligere; cum enim æstas calidissima præcesserat, circa finem ejus febris epidemica (cujus alibi habetur descriptio) insequuta est: dein vergente Autumno, cum morbus iste cessaret, febris quartana plurimùm increbrescere cœpit, ut pluribus in locis ferè quarta pars mortalium eadem corriperetur: nec tantum senes, melancholicos, lienosos, sed cujusvis ætatis, aut temperamenti homines, etiam infantes, pueros, juvenesque hic morbus passim infestavit: quod planè indicio erat, hunc affectum non ab humore atrabiliario ob lienis vitium congesto, verum à sanguinis dyscrasia propter anni intemperiem inducta, ortum traxisse: etenim sanguinis massa post nimios fervores non secus ac vina post immodicas effervescencias, nonnihil acescere, aut diathesin austeram nancisci habilis est: adeoque in hujusmodi febrem etiam proclivis, uti superius innuitur.

Quæ propter hujus curationem, tum à Medicis, tum Empiricis tentabantur remedia, si unà colligerentur, eorum descriptio in magnum volumen excresceret; verum multiplex licet medicinæ apparatus contra hoc malum institueretur, tamen pauci admodum intra Autumni terminum curati sunt. In nonnullis circa prima ægrotationis initia, priusquam morbus radices egerat, vomitoria opem contulere; in plerisque autem pharmaca quovis modo cathartica, centies licet repetita, ne hilum profecerunt: quibus altiùs infederat labes, à remediis excogitatissimis per totum Autumnum usurpatis ægroti nequicquam levaminis recepere. Cum verò hoc tempore vulgares medicinæ methodos incassum adhiberi cernerem, virgini cuidam perillustri curationem subitam quovis licet modo perficiendam exigenti, proposui ut si à pharmaco minerali per aliquot dies oris fluorem pateretur, inde morbum brevi profligatum iri speraret. Cum huic facilè assensit, pharmacum ei mitius, & omnino tutum exhibui; à quo sputatio tantum levior, eademque inter duodecim

dies finita, ciebatur. A quo salivatio incepit, paroxysmis statim caruit; quibus verò temporibus accedere solebant, perturbationem in toto corpore cum cordis oppressione, & lipothymia metu persensit; postea tamen sputatione finita, planè convaluisse videbatur: cumque iterum post bimestre spatium hujus morbi leviores quasdam accessiones pateretur, à pulvere emetico bis, aut ter exhibitio, sine recidiva integrè curabatur.

Post solstitium hyemale hic morbus non ita grassari, verum in nonnullis sponte sedari, in plerisque aliis pharmacorum usu faciliùs expugnari cœpit: quippe hoc tempore dyscrasia sanguinis ab æstivo fervore contracta, propter brumæ frigus sensim deleri, & cruoris massa inveterascens, velut exuvias suas deponere, & versus statum naturalem reduci solet. Qui vero temperamenti erant melancholici, aut viscera, & imprimis lienem, malè affecta habebant, aut qui malâ victûs ratione utebantur, nullam ab hoc Tropico mutationem receperunt, quin ad proximam anni periodum, scilicet ad æquinoxium vernale morbum tulerunt; & tunc in quamplurimis sanguine aut ex se redintegrato, aut intemperie ejus remediorum usu faciliùs emendata, hic affectus debellari visus est: interea tamen multi senes, cacochymici, & alia, invaletudinarii, toto hoc temporis tractatu ab hoc morbo passim interibant: etiam nonnulli supersunt, qui solstitio æstivo licet præterito, ejus jugum nondum excusserunt. Quanquam vero per totum ferè a nunc hac febre velut epidemia plures laboraverint, tamen nullus (quod scio) ipsam in vere primò contraxit, & pauci admodum durante Autumno ab eadem convalescebant, ut revera sanguinis dyscrasiam hujus causam esse, & in mutatione ejus curam consistere minimè dubitem.

Remedia, quæ sæpissimè opem contulerunt (uti nostræ saltem observationi constitit) fuerunt ejusmodi, quæ paroxysmum febrilem inhibent: etenim mala sanguinis diathesi à mutata tempestate nonnihil emendata, si modò habitualis paroxysmorum consuetudo abruptatur, natura se recolligit, & pristinum valetudinis statum proprio nisu faciliè recuperat. Atque hujusmodi intentio (scilicet paroxysmorum inhibitio) licet à vomitoriis paulò ante accessionem exhibitis interdum perficiatur (hæc enim motum sanguinis febrilem, motum alium huic contrarium ciendo, non rarò sistunt) tamen hæc indicatio longè certius, & quidem felicius peragitur ejusmodi pharmacorum usu, quæ non omnino è visceribus evacuant, verum sanguini aut fixationem quandam, aut materiæ febrilis præcipitationem pro tempore inducunt. Quare quos instante vere, & deinceps curandos suscepi, hac methodo (& in plerisque bono cum successu) tractavi: facta totius provisione cum pharmaco interdum emetico, interdum solutivo tribus horis ante paroxysmum, epithemata carpis admoveri, simulque pulverem febrifugum in vino generoso propinari, ac ægros intra lectum in levi diaphoresi detineri præcipere solebam: rarò evenit, quin prima, aut secunda vice hoc modo accessio febrilis inhiaberetur, & dein eodem remedio aliquoties iterato, tandem morbus integrè cessaret. Hujusmodi praxi! (præter experientiam nostram) fidem, & probationem nonnullam adstruere videtur usus pulveris è cortice quadam nuper ab Indiis petita, quæ hunc morbum certissimè curare perhibetur: hujus tamen virtus, seu operatio sine quavis evacuatione,

evacuatione solummodo in hoc consistit, quod paroxysmos febriles ingruentes inhibeat.

De *Cortice ista Peruviana*, quia nuper quotidiani usus esse cœpit, erunt hæc nonnulla quæ observationi communi prostant dicenda. Vulgaris exhibendi modus est ut hujus in pulverem triti drac. 2. vino aut tenui, aut generoso in vase cooperto per duas horas infundantur; at dein, ingruente *paroxysmo*, ægroto intra lectum composito liquor cum pulvere propinetur. Hæc potio non rarò accessionem imminuentem tollit, sæpe tamen isthac solito more habita, proximè succedentem præcavet: utcumque, sive prima, sive secunda, aut tertia periodo *paroxysmus* inhibeatur, atque morbus curari visus sit, intra viginti, aut triginta dies sæpissimè redire solet; dein pulvere hoc rursus exhibitò, pro temporis circiter ejusdem spatio, morbi insultus denuo protelatur, atque hoc ritu novi plures quartana laborantes, toto autumnò, & hyeme accessiones febriles tantum rariores pertulisse, hostemque ita in procinctu detinuisse, donec verè ineunte, tempestatis anni, & aliis pharmaciam ope sanguinis diathesis in melius alteretur, adeoque affectus iste sensim evanesceret: qui hac ratione crebras inducias quartanæ procurabant, alacres & vividi & ad negotia quævis expediti degebant, cum secus enerves, & pallidi in languorem, & vitiosum corporis habitum redigerentur. Vix unus è centum hoc remedium incassum tentavit, imò si in dimidia, aut minori quantitate, scilicet ad drach. 1. aut sem. pondus sumatur, accessiones sæpissimè tollit, ac breviori tantum spatio easdem suspendit: nec interest utrum in vino tenui, aut generoso propinetur, nisi cum respectu ad crases ægrotantium: quippe in temperie calidiori poterit in aqua destillata, aut sero lactis utiliter sumi. Etiam infusio ejus clara, substantiâ crassiori rejectâ, similem effectum, sed brevius duraturum producit: quibusdam hunc pulverem cum mucilagine tragacanthi in pilulas redactum, cum pari laborantium emolumento exhibendum curavi; quocumque modo sumatur, nisi nauseabundis, & quamvis pharmaciam horrescentibus nullam evacuationem manifestam infert, & ferè in omnibus *paroxysmos* tollit; nec tantum in *febre quartana*, verum in aliis intermittentium speciebus, quibuscumque nimirum *ἀνωσέξια* quædam intercedit, cum fructu adhibetur: vulgò præcipitur ut hujus usui purgatio lenis præmittatur: at in quibusdam valde imbecillis, & lecto affixis, sine prævia pharmaciam hic pulvis solitariè sumptus effectus laudabiles procuravit: interim ingenuè fatebor me nondum vidisse febrem intermittentem hac cortice semel exhibita penitus curatam: quinimo non tantum *quartana*, verum *tertiana*, & *quotidiana febris* paroxysmi aliis remediis faciliè in totum superabiles, hoc pulvere profligari visi, post breve tempus constanter redibant. Ob hanc rationem qui febres intermittentes aliàs faciliè curabiles, non urgente necessitate, hoc pharmaco tantum brevi supprimunt, medicinam dolosam instituere videntur, nec in rem suam magis, quàm qui ulceri cavo, & mox denuo erupturo cicatricem inducunt. In quibusdam revera casibus hujus usus sat erit opportunus, scilicet cum *paroxysmorum* assiduitate nimia, ægrotantium vires plurimum attruntur, induciæ hoc ritu procurentur, quo natura se recolligat, & deinceps hosti potentius adversetur: etiam ut febris quartana, durante Autumnò, & Hyeme, cum minori molestia transigatur, hic cortex commodè adhi-

betur : qui autem à febris istius incurfibus longiorem feriatiōem expetunt, pulverem hunc in majori quantitate, & crebriori vice assumere jubentur, fcilicet drachmas duas per tres continuò periodos capiunt, five accessiones redeunt, necne ; hac ratione diutius immunes perstant, usque tamen hostem licet sopitum intus latentem retinent.

Si de natura hujus corticis, ejusque in suppressendis febrium intermittentiū *paroxysmis* virtute inquiratur, non dissimulandum videtur, difficile esse hujusmodi effectuum causas, & operandi modos explicare ; quoniam in nullo præterea subjecto similem efficaciam adhuc reperire datum est ; singulari autem experimento ratio generalis non ritè adaptatur : utcumque è phænomenis diligenter collatis Theses quasdam ordine deducemus, quæ hujus rei veritatem si non assequantur, ad illam saltem gradum aliquem faciant.

Notetur igitur *primò*, quod hoc pharmacum intus sumptum in sanguinis massam vim suam, & energiam præcipuè exercet : quippe viscera non omnino irritat, neque excretionem quamvis, aut molestiam iis infert : insuper, dummodo sanguini virtus ejus communicetur, *δύναμις ἀποσωρευτική* non omnino exeritur : quare non semper *paroxysmus* proximè sequuturus, aut secundus, aut tertius, deinceps ab eodem assumpto præcavetur : atque ob hanc rationem, quo citius cruorem afficiat, usitatum est, ut una cum pulvere liquor eodem valde imprægnatus propinetur, sic enim in sanguinis massam ejus particulae faciliùs convehuntur. *Secundò*, Corticis istius virtus sanguini impressa aliquandiu in eodem manet, idque brevius, aut diutius, juxta quod major, aut minor medicamenti portio intus sumitur : etenim particulae hujus cruore confusæ, cum ipso circulantur, & quo plures adsunt, eo magis massam ejus afficiunt, & affectum diuturniorem produciunt. Nam licet *alimenta*, & alia quædam ingesta, in quantum à calore nativo statim subiguntur, quicquid habent virium intra paucas horas exerunt : hac dein assimilata, aut foras excreta operari cessant : tamen *pharmaca* nonnulla intus admissa, quia nec faciliè perdomantur, nec irritatione citata illico foras eliminantur, per plures dies valde activa perstant, atque sanguinem, & succos in hoc, aut illo fermentationis ritu dudum retinent : hoc observare licet de *medicamentis* quibusdam, item de *venenis*, & plerisque *alexiteriis*, quorum unica exhibitio per plures dies, eademque iterata, longiori tempore solet corpora nostra afficere : miratum enim est, à medicamentis catharticis, si quando per vomitum, aut sedem minus operantur, post plures hebdomadas pustulas, & exanthemata exteriùs erumpere ; quinetiam si à toxico epoto mors evitetur, diu admodum in sanguine, & succis virulentiam delitescere, nemo est qui nesciat. Pariter etiam hic pulvis, & fortassis alia quamplurima intus sumpta, in spiritus, & humores, quantumvis sopita videantur, etiamnum agere perseverant.

Tertiò, licet medicamentum istud immediatè in sanguinem, & humores agat, tamen dyscrasiam febrilem in iis sitam haud radicitus tollit : quamcito enim vis ejus absumitur, & particulae omnes à mixtione sanguinis avolant, affectus pro tempore solùm suppressus, denuo emergit, & solito more accessiones repetit : quatenus verò natura hoc cessationis spatio fortior eva-

serit, ideo post recidivam paroxysmi (non uti prius) sed die tertio aut quarto, juxta primum morbi typum, redire solent.

Quartò annotetur, quod hoc remedium non quemadmodum vulgaria febrifuga sanguinem *figendo*, aut etiam *fundendo*, accessiones febriles sistit; tunc enim paroxysmus semper ingruens, & non secundus, aut tertius postea sequitur caveretur.

Quibus juxta positis, ut corollarii vice de ipso operandi modo, quo hoc pharmacum agere videatur, quædam subnectamus; dicimus verisimile esse, quod cum particulæ ab eodem ingesto procedentes sanguini permiscuntur, ipsum in novam quandam fermentationem compellent, qua dum cruoris particulæ continuò agitantur, ne *materiam excrementitiâ* congerant, aut *turgescentias febriles* ineant, omninò inhibentur: quemadmodum enim post morsum canis rabidi, aut ictus venenatorum animalium, ipse sanguis, & succus nervosus diu venenatur; ne tamen magnas anomalias statim concipiant, *alexiteria* propinata eorum liquores in alia fermentatione detinendo prohibent; quorum usus si tandiu continuetur donec corpuscula virulenta penitus avolârunt, à labe isthac contracta nullum horrendum symptoma timetur; sin prius absumantur remedii nimis parcè exhibiti vires, illico venenum repullulat, & virus pristinum explodi visum, denuo in actum deducitur: non absimili iitu, quando sanguis diathesin vitiosam nactus, succum alibilem pervertit, eumque ad plenitudinem congestum, quo rectius expellat, turgescentias febriles concipit; cortex iste Peruvianus tritus, & exhibitus, particularum commercio sanguinem licet dyscrasia affectum, fermentatione nova concitata, adeo exagitat, alteratque ut succum alibilem aliquatenus coquat, ejusque recrementa continuo evaporet, ut in *paroxysmi* materiem non uti prius congerantur. Cum vero è sanguinis consortio hujus remedii particulæ penitus exhalant, totaque virtus absumpta fuerit, mala sanguinis diathesis prius contracta denuo emergit, ideoque *paroxysmi* febriles solito more redeunt: forsan aliquando accidit, ut dum usu istius pulveris accessiones supprimuntur, propter mutatam anni tempestatem, aut alius remedii ope, aut naturæ ipsius nisu ista dyscrasia sanguinis sensim emendetur, adeoque febris demum sponte dispareat; hoc tamen non nisi rarò contigisse novi, quoniam æquali ferè certitudine, qua ab isto pulvere *paroxysmos* febriles supprimi, eosdem postea redire expectes.

Quod attinet ad qualitates sensibiles quibus hic cortex insignitur, constat ipsum *amaritudine* cum *stipticitate* quadam pollere, ut gustu indice similem ferè saporem referat, qualis in plerisque *alexipharmacis*, uti sunt radix gentianæ, serpentariæ, contrayervæ, &c. reperiri solet: quæ enim sunt actu amara, in supprimendis fermentorum præternaturalium viribus maxima virtute pollent; quinimò *radix gentiana*, quæ optimè hanc corticem similat, olim pro curatione febrium quartanarum celeberrimi erat usus. Nunc autem licet hic pulvis Peruvianus sit unicum adhuc repertum febris quartanæ alexiterion, quod nimirum ipsius aliarumque intermittentium paroxysmos (licet solum pro tempore) inhibet: attamen dubitandum non est, quin alia in rerum natura extent medicamina, quæ sunt æquè febrifuga; atque sperandum erit, ut novi hujus inventi exemplo ducti ad explorandas her-

barum virtutes adhuc ferè ignotas excitemur : ita cum singularium tentamini insistimus , & Medicinæ rationali Empyrica adjungitur, procul dubio *quarta* & aliorumque *Herculeorum morborum* curationes felicius procedent : quod eo libentius seculo huic , aut saltem posteris spondeo , cum manu ducente corticis istius analogiâ , medicamentum ad profligandas febres non contemnendi usus ipse non ita pridem varia percurrrens adinvenerim ; quod etiam pauperioribus quibusque succedanei vice bono cum successu propinare soleo.

C A P U T VII.

De Febris continuis.

Febri*s continua* est , cujus accessio ad plures dies sine ἀπορροή protenditur : sua habet remissionis , & exacerbationis tempora , intermissionis verò nequaquam : exardescencia modo est remissior , modo intensior , usque tamen febricitant ægroti, donec à crasi , aut insensili convalescentia morbus in totum solvitur. Super hac inquirere oportet quæ sit sanguinis effervescencia quæ febrem continuam efficiat ; dein quot modis & quibus de causis excitari soleat ; item quo pacto ab illa quæ est in intermittentibus, differat. Atque his præmissis ad continuarum species descendemus.

Plures sunt modi , quibus sanguis effervescens febrem continuam inducit, quorum præcipui ad hæc capita revocari possunt : primus modus est cum *Spirituosior* & subtilis sanguinis portio nimis incalescit , & exardescencia quadam afficitur, quæ idcirco reliquas cruoris partes exagitat, & in orgasmum quendam incitat, adeo ut Sulphur, seu oleosa sanguinis pars plus dissolvatur, & magis in corde accendatur; etiam propterea adest inter omnes cruoris particulas σύγχυσις quædam, seu perturbatio, qua nimium confusæ & extra ordinem positæ denuo statim extricari, atque in priorem situm redigi nequeunt, quare in toto corpore fervor , & incalescentia solito major excitatur; cum verò Spiritus solummodo in culpa sint, eorum æstus & inordinatio intra breve tempus solent sponte sedari : idcirco hæc febris sæpè intra diem terminatur, rarò ultra triduum extenditur : adeoque febris *ephemera*, aut *synochus plurimum dierum* appellatur.

II. Secundus effervescentiæ modus, sive gradus est, quando pars *Sulphurea*, sive *oleosa* sanguinis , nimis excalefacta fervorem concipit : tunc enim & immodicè in vasis effervescit , & plurimum in corde accensa deflagratione sua calorem valde intensum in toto corpore producit. Equidem sanguis , quoad temperiem suam , à conditione Sulphuris maximè dependet ; quando ob cruditatem Sulphur minùs dissolvitur , fit cruor aquosus , & frigidus, ac in vasis pigrè movetur : sin ultra crasin naturalem sanguinis pars Sulphurea , seu oleosa incalescat , statim effera , & cum cæteris improporcionata evadit , ita ut fere tota à cordis fermento velut in flammam acta , sanguinis massam immodicè effervescere , & ebullire cogat. Quemadmodum enim cum vina fæce opulenta prædita , à Sulphure nimis rancido in fervorem concitantur , aut veluti fœnum nimis madidè repositum , ob ventilationis defectum particulis Sulphu

Sulphuris à mixtione solutis, sponte incendium concipit: pariter cum sanguis non ritè ventilatur, quin ab evacuatione cohibita, propter rei calidæ admixtionem, vel ἀμύτωρ uberiores, aut ob aliam causam, Sulphuris particulæ densius agglomerari incipiant, statim totus ejus liquor à Sulphure soluto, & in corde inflammato immodicè ebullit, & hujusmodi febris inducitur, quæ *synochus putrida* vulgo nominatur; quæ tamen appellatio, licet à pluribus rejicitur, eo quod sanguis quamdiu in motu est, minimè putrescat; quatenus tamen in hac febre, Sulphure nimis exaltato, sanguinis mixtio non nihil solvatur, ejusque liquoris massa à crasi naturali immutata versus putredinem tendat, ideo *febris putrida* vocabulum, prout antiquitus inolevit, adhuc bona cum ratione retineri poterit.

III. *Tertius* effervescentiæ gradus (qui & distinctam febris continuæ speciem constituit) à fermento quodam maligno & venenato excitatur, quo cum sanguinis massa imbuitur, & Spiritus, & pars Sulphurea unà fervorem concipiunt; eorumque excandescencia non prius sedatur, quam aut materia ista maligna absumpta sit, & foras eliminetur, aut etiam à veneno ejus corruptivo sanguinis coagulatio, & velut putrectio quædam inducatur; qua & circulatio impeditur, & Spiritus vitalis extinguatur. Oriri solet hæc malignitas vel à contagio quodam ab extrâ suscepto, vel à miasmate quodam intus in nobis genito; juxta hosce modos *febris maligna*, *variola*, *morbilli*, etiam *pestis* origines suas ducunt, & contagio suo latè in plures grassantur.

Sunt itaque tres effervescentiæ gradus, sive modi, è quibus febrium continuarum species determinantur. A subtili sanguinis effervefacti portione, seu Spirituum ebullitione oritur *Ephemera*, necnon *synochus* unius, aut plurium dierum: à Sulphurea, seu oleosa sanguinis parte nimis excalefacta, & accensa, *febris putrida* concitatur: dein tertio è miasmate venenato sanguinem inficiente, ejusque liquorem congelante, *febres malignæ* dependent. In singulis horum à succi alibilis recens in sanguinem congesti depravatione, seu potius corruptione varii paroxysmi, inæqualitates, & motus critici oriuntur. Verum priusquam singulas febris continuæ species aggrediar, expendere oportet, quo pacto effervescencia sanguinis in febre continua differt ab altera illa, quæ intermittentes constituit.

Dico igitur quod effervescencia sanguinis in febre intermittente unice dependet à materiæ cujusdam fermentativæ, & cum cruore non ritè miscibilis commixtione, ejusque ad turgescentiæ plenitudinem congestionem. Propter unius effervescenciam cum sanguine in vasis, & deflagrationem in corde, paroxysmus inducitur; ejus difflationem ἀνωρεξία sequitur, ut paroxysmorum interstitio neque Spiritus, neque Sulphur impetum faciant; verum integrè servato mixtionis vinculo, liquor æquabiliter, & sine tumultu in vasis circulatur: è contra in febre continua Spiritus aut Sulphuris, aut simul utriusque inordinationes propria ἐκδυμῶσις, etiam sine alterius miscela, sanguinis ebullitionem concitant; quare ad ἀνωρεξίαν, præter materiæ excrementitiæ difflationem, sanguinis accensi deflagratio, ejusque ad debitam crasin reductionem requiruntur.

Constitutio sanguinis in febre continua est ejusmodi ac vinorum, cum à face nimis opulenta effervescunt; nimirum & Spiritu pollent, & Sulphure exaltato.

exaltato turgescunt, ideoque sua sponte sine alterius mixtione fervorem concipiunt & immaniter ebulliunt. In *febre intermittente* commovetur sanguis eoritu, ac vina, cum propter aliquid non miscibile iis confusum effervescentias concipiunt: insuper in hac febre cruoris diathesis ejusmodi est ac vinorum, cum in casu & declinatione sua, mucilaginosa, rancida, aut etiam acida fiunt, in quibus nimirum Spiritus deprimitur, interim ut Sal, aut Sulphur aut utrumque simul ceteris emineat, & inordinatione sua totum liquorem afficiat. Febris intermittens periculo ut plurimum vacat, quoniam partes sanguinis constitutivæ licet crasin paululum mutarint, utcunque mixtionis vinculum servant; & dum sui juris sunt, æquabiliter in vasis circulantur; quin & succum nutritium in materiam non omnino præter naturam, sed plenitudine & turgescencia sua magis infestam pervertunt. In continua febre, præter intemperiem, sanguinis mixtio & liquoris compages nonnihil solvuntur, ut corruptio ejus facile sequatur: quare hic morbus sæpe in mortem terminatur; insuper succus alibilis in materiam penitus vitiosam, & omnino naturæ infestam depravatur.

CAPUT VIII.

De Febre Ephemera.

Dixi minimum effervescentiæ gradum qui *febrem continuam* inducit, in subtili & spirituosâ sanguinis portione nimis agitata & excalefacta positum; hæc enim instar Spiritus vini de levi quavis occasione ebullit, & fervorem concipit à nimio corporis motu aut animi perturbatione, à calore ambiente, putà solis aut æstuarii; à calidis intro sumptis, prout vini potu, ciborum piperatorum esu & similibus irritata. Etenim Spiritus cruoris facile excalescunt, & impetuosius commoti, non statim sedantur, quin alias sanguinis particulas exagitant, variè confundunt, in motum rapidiorem & inordinatum compellunt: Etiam ab hoc spirituum motu Sulphur, seu pars sanguinis oleosa magis excoquitur, aliquantulum plus dissolvitur, & in corde nonnihil uberius accenditur, unde calor intensus in toto corpore cietur. Quatenus verò Sulphur per minutas solummodo partes, & non per totum excalefit & inflammatur, iste spirituum fervor brevi compescitur & cessat. Quare febris quæ hoc ritu suscitatur, plerunque intra vigintiquatuor horas terminatur, ideoque *Ephemera* dicitur. Quod si ob majorem sanguinis spirituosæ æstum diutius prorogetur, rarè triduum excedit, diciturque *Ephemera plurium dierum*, sive *synochus non putrida*: sin verò ultra hoc tempus protendi contigerit, hæc febris facilè in *putridam* transit, scilicet à diuturna spirituosæ sanguinis ebullitione, tandem crassiores Sulphuris particule incendium concipiunt, ac totam sanguinis massam effervescentiâ sua involvunt: non secus ac Spiritus Terebinthinæ cucurbitæ inclusus, & balneo arenæ impositus, si calore modico urgetur, leniter ebullit, velut sanguis in febre Ephemera: sin verò calor intendatur, liquor impetuose effervesceat, donec in flammam erumpat, cui sanguinis inflammatio in febre putrida satis aptè confertur.

Febris Ephemera & synochus simplex sine causa evidenti raro incipiunt: eas solent inducere (præter modò dicta) labor immodicus , vigiliæ , passio animi subita , pororum constrictio , crapula, item bubo aut vulnus, in puerperis lactis proventus ; quæ ad has disponunt causæ procatharticæ , sunt temperies calida corporis , habitus athleticus , vita sedentaria, & exercitii desuetudo.

Prima hujus morbi initia à præsentia causæ evidenter dependent : vel enim caloris extranei corpuscula cruori confusa , instar aquæ super ignem effervescentis ipsum ebullire faciunt : vel à motu , aut ob transpirationem præpeditam febris inducitur , non secus ac cum vina motu excalefacta , aut dolio strictius inclusa in fervorem aguntur. Quocunque demum modo phlogosis primò excitatur , statim Spiritus impetum faciunt, & huc illuc conciti sanguinem ebullire, & cum spumosa rarefactione in majus spatium ampliari cogunt : quare vasa distenduntur , & partes membranosæ vellicantur. Hinc dolor præsertim in capite aut lumbis , lassitudo spontanea ac velut inflatio totius corporis sequuntur. Quod si cum Spiritu cruoris unà pars quædam Sulphurea aliquatenus accendatur , calor acris per totum diffunditur , pulsus fit vehemens & citatus, urina rubicunda ; etiam sitis , vigiliæ , & pleraque alia symptomata infestant ; quorum rationes inferius subjungentur.

Circa febris Ephemerae , & synochi non putridæ solutionem , sive *crisin*, tria sunt præcipuè requisita : scilicet *causa evidenter remotio* : secundò, *materia depravata*, sive *excrementitia* à sanguinis massa *secretio*, & *difflatio* : tertio, *partium sanguinis sedatio*, earumque ad motum , & situm naturalem ac æquabilem restitutio. Juxta quod hæc modo citius , modo tardius & magis difficulter succedunt , hic morbus brevi , aut longiori tempore finitur.

I. *Causa evidens* , quæ plerunque extrinseca est , facile amovetur , solentque ægri statim atque noxæ à re qualibet sensum percipiunt , istius rei præsentiam , seu assiduitatem vitare : nullus à vino febricitans , ejus potui adhuc indulget : quamprimum à balnei , aut solis æstu quispiam plus solito incalescit, iis diutius immorari tædet.

II, Quoad materiam excrementitiam , quæ à sanguine secerni , & diffilari debet , hæc vel ab extra confertur , ut cum à crapula , vini potu , insolatione, aut balneo calidiore, effluviis , seu corpusculis calidis & fermentativis cruor inficitur ; vel isthæc materies intus progignitur, ut cum à sanguinis deflagratione ejus liquor recrementis seu particulis adustis refertur. Utraque hæc materies à sanguine discerni, diffilari , & vel sudore , vel insensibili διαπνοή debet foras protrudi , priusquam febris sedetur : quare cum pori sunt constricti , & transpiratio impeditur , febris Ephemera diutius prorogatur , & nonnunquam à synocho simplici in putridam transit.

III. Causa evidenti remota, ac materia hac degeneri diffilata, ad ἀναρρίξιν requiritur partium sanguinis sedatio , & in ordinem reductio ; etenim motus rapidior , & inordinatus in sanguine inceptus non statim sistitur , sed paulatim compesci debet ; etiam diversæ sanguinis particulae hoc modo confusæ , & propter effervescentiam febrilem sursum deorsumque actæ, non statim reperunt priorem sitûs & positionis ordinem : quin eas sensim extricari , & æquabili mixtioni paulatim restitui opus est.

Licet hic morbus post amotionem causæ evidenter postea sponte naturæ
O utpluri

ut plurimum cessat, tamen remedia quædam medica bono cum fructu in usum adhibentur; præsertim cum periculum est, ne febris Ephemera in putridam transeat. Præcipuæ intentiones erunt, sanguinis fervorem compescere, & transpirationem liberam procurare; quibus conducunt imprimis venæ-sectio, victus tenuissimus, seu potius abstinencia, potus refrigerantes, sæcum alvi per enemata subductio: præ cæteris maximè juvant somnus & quies, quæ si deerint, opiatibus & anodynis tempestivè procurentur.

Quinimò licet historiæ & observationes febre Ephemera affectorum nihil oppidò rarum in se contineant: libet tamen hic exemplum unum aut alterum, quo hujus morbi hypotyposis aliquantum illustretur, subungere.

Juvenis quidam illustris, viginti circiter annos natus, habitu corporis athletico præditus, ab immodico vini generosi potu in febrilem intemperiem, cum siti, calore, & insigni præcordiorum æstu incidit; phlebotomiâ celebratâ, aquæ fontanæ ingentem quantitatem ebibit, indeque sudore copioso statim insequente, brevi convaluit: in hoc casu tenuior sanguinis portio à vini spiritibus effervescentia impetum fecit, totam cruoris massam exagitari, ejusque compagem solito plus laxari coëgit, atque id propter à cordis fermento istam plus dissolvi, & particulis activis è mixtione solutis velut accendi contigit; donec vasis à phlebotomia depletis, sanguis turgescens eventilaretur, & ab aquæ potu ejus fervor attemperaretur: dein calidis effluviis unâ cum materia adusta fero copioso obvolutis, & per sudorem amandatis, cruor debitam temperiem tandem recuperabat. Insuper Juvenis ingenuus vitæ sedentariæ, simulque rei literariæ studio plurimum addictus, cum nuper in æstivo Sole supra modum se exercuisset, de capitis dolore, inappetentia, præcordiorum æstu, & intemperie febrili per totum suffusa queri cœpit, cui (cum pharmaciam omnem averteretur) omnimodam abstinenciam, nisi à cervisia tenui & hordeatis præcepi: die secundo ac dein amplius tertio symptomata paulatim se remittebant, quarto demum sine quovis medicamine à febre immunis evasit.

C A P U T I X.

De Febre putrida.

H Actenus de febre continua, quæ simplicissimâ sanguinis effervescentiâ, sive infimo inordinati caloris ejus gradu concitatur; sequitur quæ à gradu superiore dependet, scilicet cum pars sanguinis oleosa, sive Sulphurea, nimis excalefacta supra modum turgescit, ac veluti in flammam adigitur; ideoque à similitudine qua humida putrescentia fervorem concipiunt, hujusmodi sanguinis ebullitio, quia calorem immodicum inducit, febris putrida appellatur: quod nomen sine injuria retineri debet, eo quod in hac febre sanguinis synthesis (quemadmodum liquoribus putrescentibus accidere solet) plurimum referatur. Quando Spiritus solummodo impetum faciunt (uti in ephmera) massæ sanguineæ compages nonnihil recluditur, ac laxatur, ut à fermento cordis plus solito dissolvatur, & particulae plures quàm naturaliter assolet.

affolet, exsiliant, & calorem intensiorem diffundant : adhuc tamen liquoris mixtio quoad partes præcipuas conservatur. Cum verò cruoris materies *Sulphurea* excandescens supra modum efferveret, mixtionis vinculum maxima ex parte solvitur, ut principia ejus à fermento cordis ferè in totum distrahantur, & particulæ activæ à misto solutæ velut in flammam erumpant. Quare sanguinis liquor hoc modo in corde rarefactus, & velut accensus, exinde motu rapidissimo per vasa deferretur, & deflagratione sua caloris effluvia quamplurima dispescit. Hinc tota cruoris massa (instar aquæ super ignem positæ) continuò ebulliens, vasa distendit, cerebrum & partes nervosas vellicat, in iis spasmos & dolores concitat, effervescentiâ suâ Spiritus vitales plurimum disperdit, viscerum fermenta destruit, coctionis & dispensationis munia impedit, succum alibilem nervoso generi destinatum sæpè depravat, ut exinde spirituum animalium maximæ inordinationes consequantur; imò totam ferè naturæ œconomiam pervertit.

Hujus morbi decursus ad hunc modum se habet; rarò incipit sine causa pro-cathartica, sive dispositione prævia: nimirum *Sulphurea*, seu oleosa pars sanguinis prius evehitur nimis, & supra debitum tenorem exaltatur, quæ postea aut sponte sua (instar foeni minus eventilati) effervescente incipit, aut causæ evidentis accessu in calorem præternaturalem adigitur. Cum primò autem turgescit ob crudi succi cum sanguine admixtionem, modo rigor, modo calor infestat, qui inæqualiter se habent, instar ignis, qui cum viridibus lignis coopertus est, modo fumum, modo flammam emittit. Tandem vero incendio latius gliscente, prout hîc victor latè se spargit Vulcanus, ita illic (dicto citius) tota cruoris massa inflammatur, simulque æstu & motu citatissimo urgetur: nec prius immodica hæc sanguinis effervescentia sedatur, quàm particulæ ejus activæ à mixtione laxatæ, & dein successivè in corde accensæ, penitus deflagrent, quod non nisi plurium dierum spatio contingit. Atque tunc demum hæc febris cessat, quando cruoris liquor residuus, Spiritu & *Sulphure* plurimum absumptis, ferè vappidus & pauperior factus, fermentationi tantum debili & minutæ aptus fuerit. Ab hujusmodi sanguinis ac unâ succi alibilis (eodem incendio ustulorum) deflagratione recrementa, seu corpuscula materiæ torrefactæ in cruore congeruntur, quæ fervorem ejus & ebullitionem adhuc magis promovent, ac intemperiem febrilem pro tempore adaugent. Postquam sanguis plurimum deflagravit, & ejusmodi corpuscula ad turgescentiæ plenitudinem congeruntur, Spiritus vitalis secretionem molitur, recrementa istæc adusta (quæ potest) subigere, & concoquere satagit, ac dein copiâ eorum in turgescentiâ actus, fluore oborto prorsus excludere nititur. Atque in hujus materiæ subactione & seclusione præcipuè consistit morbi eventus; si enim præpollente spiritu vitali humor sanguineus (cum satis deflagraverit, & particulis hisce adultis liberatus fuerit) pristinum tenorem recuperat, quo sit motui, & debitæ in corde fermentationi idoneus, æger in salutem tendit; sin vero à longa deflagratione, & inextricabili materiæ morbificæ confusione liquor sanguinis Spirituum, & Sulphuris purioris expers, aut iisdem (impura mixtione invalescente) veluti sub jugum missis, ita vappidus reddatur, ut à fermento cordis non amplius rarefiat, seu accendatur, sensim calor, ac motus ejus, unâ cum vita ipsa deficiunt.

Causa procathartica, quæ in hunc morbum disponunt, sunt temperies calida & humida, habitus corporis athleticus, ætas juvenilis, tempestas verna aut æstiva, victus lautus & opimus, insuper vinorum divitum potus assiduus, vita sedentaria & otiosa, corpus cacochymicum & vitiosis succis referrum: præ cæteris verò observatione constat, quod crebra sanguinis missio homines febri aptiores reddat: quare dicitur vulgò, quibus sanguis semel detrahitur, eos, nisi quotannis idem faciant, in febrem proclives esse. Hujus ratio (ni fallor) hæc est: crebra sanguinis missione *Sulphur* in massa sanguinea copiosius congeritur, interea Sal (quod ipsum frænare, & ab efferatione cohibere debet) hac ratione subducitur: etenim sanguis, quo magis inveterascit, eo evadit falsior. Sale nimirum præ cæteris elementis minimè evaporante. Quo verò Sale magis abundat cruor, eo minus *Sulphure*; Sal enim *Sulphur* atterit, absomit, & evaporare facit: quare qui sunt graciles, & cruore falso scatent, minus in febrem sunt proclives. Cum verò venæ-sectione pristinus sanguis detrahitur, ejus vice alius opulentior, & *Sulphure* imprægnatior substituitur; adeo ut evadat minus falsus, & plus *Sulphureus*. Hinc fit ut qui crebrò mittunt sanguinem, non tantum in febres sint proclives, verum & pinguescere solent, propter cruorem succo *Sulphureo* plus imprægnatum.

Causæ evidentes, quæ latentem hujus febris diathesin in actum deducunt, sunt ejusmodi, quæ febrem Ephemeram, ac synochum simplicem accersunt; in hunc censum præcipuè veniunt *diæta non impedita*, & *crapula*. Propter effluvia cohibita sanguinis massa mole aucta turgescit, ac veluti fermento quodam de novo inspirata fervorem concipit, & immaniter ebullit; inde statim pori effluviis infarcti plus obstruuntur, atque soluta liquoris compage *Sulphuris* in sanguine exuberantis particulæ à mixtione exsiliunt, & à fermento cordis, velut ignibus admotis, inflammantur, adeoque febrem valde intensam accendunt. A crapula autem tum fermentatio immodica sanguini inducitur, tum etiam materia *Nitro-Sulphurea*, adustioni & incendio apta, velut pabulum sanguini flagranti convehitur.

In hac febre licet quatuor observare tempora, quibus velut totidem stadiis ejus cursus peragitur: sunt autem hæc, *initium*, *augmentum*, *status*, & *declinatio*. Hæc in quibusdam citius, in aliis tardius, & longiori tempore solent absolvi. *Initium* computari debet, à quo sanguis fervere, ejusque *Sulphur* æstum concipere incipit, usque dum in totam cruoris massam ardores & incandescentiæ diffunduntur. *Augmentum* erit, à quo sanguis per totum fervefactus, & accensus, aliquo tempore deflagavit, ejusque massa recrementis, seu particulis adustis, quæ & fermentationem augent, aggravatur. Morbi *status* est quando (postquam sanguis satis deflagaverit, ejusque incendium jam remiserit) diu vexatus cruor, tanquam nobilis athleta, cedente aliquantulum adversario, vires omnes recolligens, materiæ istius adustæ, quâ ad plenitudinem saturatur, subactionem, & secretionem, necnon crisi semel aut sæpius tentatâ, foras expulsionem molitur. *Declinatio* post crisin succedit, in qua sanguis languente incendio minus effervesceat, & vel Spiritu vitali adhuc præpollente, quod reliquum est materiæ istius adustæ & extraneæ subigit, & paulatim excernit, donec pristino vigori restituatur: vel, eodem Spiritu nimis depresso, liquor sanguinis adhuc recrementis adustis inficitur, ideoque turbidus,

& depauperatus evadit : ut nec succum nutritium assimilet , nec circulationi , neque in corde accensione pro lampade vitæ sustentanda idoneus perstet.

I. Cum itaque febre putrida quispiam corripitur, primum insultum plerumque rigor , aut horror comitatur : quando enim sanguis effervesce incipit, fit succi crudi recens in vasis congesti fluor , ac turgescencia , non secus ac in paroxysmo febris intermittens rigori calor, & interdum sudor succedunt, quibus crudi istius succi materies accenditur & diffatur , postea caloris remissio quædam sequitur ; tamen ab incendio usque in sanguine gliscente lassitudo & perturbatio cum siti & vigiliis continuò infestant : dolor in capite aut lumbis viget, partim à sanguinis ebullitione , partim à succi nervosi motu præpedito : nausea aut etiam vomitus ventriculum laceffit , quoniam & bilis è vasis choledochis exundans ei suffunditur , & spasmus è vaporibus & succo acri per arterias advecto in stomacho excitatur. Interim calor licet auctior & inæqualis, nondum intensus est ; quia sanguis crudis adhuc succis scatens solum per partes accenditur , ideoque parum deflagrat, & dein cessat, denuoque redit, instar flammæ quæ paleam udam & madidam depascitur. In hoc statu per aliquot dies morbus perstat ; urina fit solito rubicundior, ob *Sal* & *Sulphur* magis dissoluta, ac sero incocta ; hypostasim adhuc retinet, quoniam coctio & assimilatio non omnino depravantur ; sedimento constat debito majore , quod tamen facile secernitur , & sponte subsidit. Hoc tempore licebit sanguinem mittere , & vomitu aut purgatione pharmaciam celebrare, modo sine magna sanguinis perturbatione fiant : non rarò accidit ab hujusmodi evacuationibus tempestivè adhibitis majora morbi incrementa præcaveri , febremque velut in ovo necari. Hujus stadii limites juxta ægri temperiem, & alia morbi accidentia variè determinantur ; quandoque intra diem unum aut alterum hujus febris prima rudimenta jaciuntur ; aliquando ad plures morbi initium extenditur ; si in corpore *Διάρρη* copioso Spiritu , succo & sanguine calidis referto , in ætate juvenili, & tempestate præfervida contigerit ; si dispositio ad febrem sit potens, & causa evidens fortis supervenerit , effervescencia febrilis semel incepta citò totum pervadit sanguinem, & die secundo aut tertio actis radicibus morbus ad incrementa assurgit ; sin verò in corpore minus calido , temperamento pituitoso, aut melancholico , in ætate senili , aut tempestate frigida indispositio febrilis inchoatur, longiori fruitur procemio, & vix ante sextum aut septimum diem primi hujus stadii limites excedit.

II. Hujus morbi *incrementum* computatur à quo tempore febris incendium totam occupavit sanguinis massam : hoc est, *Sulphur*, seu oleosa pars sanguinis diu excalefacta , & per partes effervescens , tandem instar fœni madidè repositi , post longam incalescentiam simul tota in flammam erumpit ; sanguis hoc tempore immaniter ebullit , & plurimum in corde accensus deflagratione sua calorem velut igneum in universo corpore , & præsertim in præcordiis diffundit : hinc ægri de siti intolerabili quæruntur ; insuper dolor capitis , vigiliæ pertinaces , sæpè etiam deliria , phrenitis , & motus convulsivi infestant : alimenta quævis fastidio sunt , aut vomitu rejiciuntur ; vel si fortè retinentur , nimio calore assata in materiam febrilem facessunt ; accedunt oris amaror , sapor ingratus , linguæ scabrities , pulsus vehemens

& citatus, urina summè rubicunda, plerumque turbida, contentis saturata, sine hypostasi, aut sedimento laudabili. Cum sanguis hoc tempore totus accenditur, deflagratione sua materiæ adustæ (velut cineris ab incendio residui) ingentem copiam progignit, qua & serum valde referrum urinam exhibet spissam, & contentis gravidam: item cruor, hujus saburra, ad turgescientiam impletus, in motus criticos irritatur, quibus materies ista febrilis (si fieri potest) subacta, & secreta, foras excludatur; atque hoc febris statum inducit, in quo inter naturam & morbum, lite velut ad examen revocata, judicium decernitur, ideoque quæ inde sequitur evacuatio, *crisis* appellatur.

Est itaque febris putridæ *status*, illud morbi tempus, in quo natura *crisin*, seu materiæ adustæ, & à deflagratione sanguinis residuæ expulsionem molitur. Ad hoc requiritur *primò*, ut sanguis jam maxima ex parte deflagraret; quippe in medio ejus incendio natura crisi non vacat; nec eam unquam prosperè molita est, neque verò ab arte bono cum successu procuratur. *Secundò*, ut Spiritus cruoris materiam hanc adustam, seu Caput mortuum prius aliquo modo subigat, ab utili secernat, & expulsionem peridoneam reddat, alias enim evacuatio licet copiosa eveniat, natura sarcina sua neutiquam libera erit. *Tertiò*, ut hæc materies tanta in copia congeratur, ut turgescientia sua naturam ad expulsionem criticam irriter. Si hæc ritè concurrant, morbi *crisis* plerumque perfecta succedet; in qua, non secus ac in paroxysmis intermittentium, fluore oborto, quicquid extraneum, & heterogeneum in cruoris sinu continetur, exagitur; dein secretum, & sero involutum foras propellitur. Quando aliquid istorum defuerit, crisis plerumque est irrita & infida, ac rarò morbum solvit. Si enim medio incendio, priusquam sanguis satis deflagraverit, evacuatio sive per sudorem, diarrhœam, hæmorrhagiam, aut alio quovis modo contingat, materies adusta haud tota secernitur, aut etiamsi magna ex parte in præsens detraheretur, cruor amplius deflagrans statim novam substituet, & febrem expugnari visam denuo redintegrabit: quod si materia ista nondum subacta, nec ad turgescentiæ plenitudinem congesta natura ad expulsionem irriter, crisis tantum imperfecta & partialis sequetur; & cum primus excretionis nisus irritus fuerit, raro perfectus & unica posthac vice judicatorius succedet.

Crisis in febre continua ferè idem est ac *paroxysmus* intermittentium. Nam veluti in hoc quando succi alibilis depravati, & maturationi inidonei particulis sanguinis massa ad turgescentiæ plenitudinem saturatur, fiunt istius materiæ fluor, secretio, & foras expulsio: ita in *febre continua* à deflagratione sanguinis & succi alibilis materiæ adustæ corpuscula quamplurima congeruntur, quibus cum cruor aggravatur, & paulisper ab incendio vacat, ea subigit, paulatim secernit, & dein fluore concitato foras eliminare nititur. Quare ut paroxysmi intermittentium non nisi statò tempore & post totidem horas eveniunt, sic etiam motus critici à die quarto in quartum, aut forsan à septimo in septimum contingunt; hujusmodi enim spatium sanguinis accensus deflagrat, & incendio suo materiæ adustæ velut cinerum congeriem facit, quæ naturæ molesta irritatione sua motus criticos inducit.

Quod itaque perhibent nonnulli, crises à Lunæ & siderum influentiis omnino

omnino dependere, eorumque aspectus quadratos, aut *συζυγίας* sequi, verum non est: quia tantum à materiæ adustæ congestione, & turgescencia evacuationes criticae determinantur. Quamcitò enim cruor à deflagratione vacat, & materiæ istius adustæ particulis saturatus eas aliquatenus subigere, & secernere valet, fluore statim, seu turgescentiâ obortâ eas quovis modo excludere nititur; quæ cum facilè à sanguine separari possunt, & satis patent cutis spiracula, sero involutæ cum *sudore* amendantur. Estque hæc optima criseos via, quæ si rectè succedat, non rarò semel, & una vice, sine recidivæ metu, morbum perfectè solvit: huic proximè succedit quæ per *hemorrhagiam* crisis tentatur: etenim materies hæc velut efflorescentia cum cruore commota (si ob *διαπρουν* minus liberam sudore non ejicitur) in partem aliquam à corde remotam transfertur, & frequenter impetuoso sanguinis raptu in caput trajicitur; ubi si è sinubus in nares dehiscuntibus patet exitus, materia morbifica unâ cum portione sanguinis foras exsilit. Secus autem, sæpe in cerebro defixa phrenitim, deliria, aut alios graves, atque diuturnos capitis morbos adfert. *Quin observare licet, quod in febribus quibuscumque firè continuis, si quando difficiè aut imperfectè judicantur, ita ut sanguis materiæ febrili, seu recrementis adustis per longum tempus inficiatur: exinde succo nervoso (uti videtur) labem contrahente, affectus pertinaces, scilicet vigilia, necnon deliria, tremores, motus convulsi, & diu hærentes nervosarum partium imbecillitates sequantur.* Sunt & alii criseos modi, quibus non simul & integrè, sed paulatim & per partes natura materiam febrilem expellere nititur, modo per urinas, modo per vomitum, aut secessum, modo per exanthemata, & bubones; quocumque modo, ut bono cum eventu fiat, requiritur ut sanguinis deflagratio præmittatur, utque materies adusta concoquatur, & secerni apta reddatur.

Est itaque morbi status, non unus & simplex, neque semper ad eundem modum contingit, sed cum vario symptomatum discrimine, & ad eventus longè diversos tendentia. A prudenti autem Medico prognosticum adhiberi expedit quo temporis spatium morbus ad statum pervenerit, & qualem habiturus sit exitum.

Si febris ab initio sit vehemens, & subitò totam sanguinis massam cum incendio pervadat, si cum symptomatum ferocia, sine remissione, constanter, & æquabiliter urget, plerumque intra quatuor dies sanguis in tantum deflagrabit, ut materies adusta crisi factura ad turgescentiæ plenitudinem assurgat. Quod si initia sint tardiora, & accensio sanguinis sæpe interrupta, circa diem septimum febris ad *ἐκμουν* perveniet. Si adhuc remissius incipiat, morbi status ad undecimum, aut decimumquartum protrahi solet. Interea notandum est, quod sicut paroxysmi intermittentium febrium statis redeunt temporibus, ita motus critici in continuis; (diem autem quartum, ut plurimum, observant:) nam licet crisis perfectè ad decimumquartum, vel decimumseptimum, aut forsan vicesimum diem prorogetur, quoniam citius omnia ad plenum morbi iudicium requisita non concurrunt; tamen intermedio tempore motus leviores contingunt, quibus materia febrilis ad incrementa sensim assurgens, parum depletur, & velut per partes amputatur, donec plenior ejus discussionem natura aggredi valeat: cum autem sanguine deflagrante intra quatuor dies ingens materiæ adustæ proventus in vasis cumuletur,

natura,

natura, nisi aliàs perturbata, quarto quovis die materiæ copiâ laceſſita, partem oneris ſui turgelcentiâ quadam excutere tentat: quare ut plurimum diebus *quarto, ſeptimo, undecimo, decimoquarto*, motus critici non planetarum directione, ſed ob naturæ neceſſitatem eveniunt.

Quoad eventum, num criſis bona futura ſit, necne, à viribus ægri, pulſu, urina, aliisque ſignis, & ſymptomatum concuſſu prænotiones quædam deſumuntur: ſi urgente febris incendio æger aliquatenus viribus conſtet, pulſum habeat fortem, & æqualem; ſi urina ſit conſiſtentiæ mediocris, cum aliqua hypotaſi, contentorum ſeparatione, & facili ſubſidentia; ſi abſque vomitu immani, vigiliis, phrenitide, motibus convulſivis, & malignitatis ſuſpicionem morbus progreſſum fecerit, erit ſtatus laudabilis cum bona criſi expectandus: ſi contraria hiſ accidant, ſcilicet ut ſtatim vires proſternantur, ſitque æger crebræ lipothymię, convulſionibus, aut delirio cum pulſu debili intermittente, aut inæquali obnoxius, ſi vigilię pertinaces, ſitis intolerabilis, & vomitus continuo inſeſtent; ſi urina ſit craſſa, & turbida ſine hypotaſi, aut partium ſubſidentia; ſi urgente adhuc incendio natura ad evacuationes criticas ſtimuletur, periculofus imminet morbi ſtatus, nec de criſi quid boni liceat ſperare.

Circa febris putridę criſin libet hic prognoficon particulare ſubjungere, in quo licet quę ab initio apparent, optatiſſimum eventum ſpondeant, valde funeſtus imminet. Sæpenumero obſervavi in febre putrida, quę tardè, & cum incendio diminuto incipit, ſi urina ſit rubicunda, ac cum redditur ſtatim turbida, ac opaca, quę neque à frigore præcipitatur, neque ſedimentum ſponte deponit; ac ſi eodem tempore per plures noctes ægroti jacent inſomnes, licet quieti, & minimè jaſtabundi fuerint, res eorum in magno periculo verſatur: eritque gravior ſuſpicio, ſi interea nec febre intenſa, neque ſiti, ac calore admodum inſeſtis urgentur; quippe ad hunc modum affecti circa morbi ſtatum plerumque in deliria, motus convulſivos, & non raro in maniam incidunt, è quibus brevi in mortem præcipitantur; & cum hæc ſymptomata emergunt, urina è craſſa & rubicunda in tenuem & pallidorem alteratur. Videtur in hoc caſu cruoris maſſa febre correpta, non ita *Sulphure* ad ſummum exaltato turgere, quemadmodum ſolent vina, ac cerviſia in illorum efferveſcentiis; verum (Sale, & fæce terreſtri unâ cum *Sulphure* commotis) eodem ritu affici, quo vina, & cerviſia à tonitru ſubito perturbata, & aceſcentia; quare licet ſanguis haud ſtatim à febre immodicum fervorem concipiat, tamen mutata ſua diatheſi ſuccum cerebro & nervoſis partibus deſtinatum omnino depravat, ideoque circa initium febris pertinaces vigilię accedunt, dein ſtatu urgente torius nervoſi generis œconomia pervertitur. Huiusmodi febribus melancholici ſunt maximè obnoxii, in quibus nimirum efferationes *Sulphuris* à Sale, & fœculentiis terreſtribus unâ commotis parum refrænantur; quę tamen omnia ſenſim eveſta poſtea cum majori clade erumpunt.

Quando morbus ad ſtatum pervenerit, vel uno conflictu res agitur, & exinde cum declinatione manifeſta ſit *potum* ad ſalutem, aut mortem; vel ſunt crebrę velitationes inter naturam, & morbum, & motus critici ſæpe tentantur priuſquam in alterutrius partes victoria cedat.

I. Quoad primum, si cum bona signorum, & symptomatum *αεθρονή*, postquam cruor satis deflagraverit, ejusque incendium remiserit, materies adusta æquabiliter subacta, & subtiliata, pleno incremento ad turgescentiæ motum assurgat, atque natura quovis impedimento aut depressione libera, viribus satis integris ad decertationem valet, uno ut plurimum efflorescentiæ motu materia febrilis exterminatur, & sanguis ejus labe, & consortio immunis factus pristinum vigorem brevi recuperat.

II. Sin natura ad motum criticum irritatur priusquam sanguis perfectè deflagraverit, aut materies isthæc adusta ad excretionem præparetur, licet quoad cætera res in mediocri sint statu; tamen hinc crisis non nisi imperfecta succedit, qua quidem aliquid sarcinæ, sive oneris, quo sanguis aggravatur, detrahitur; attamen ejus loco statim aliud à novo incendio repullat, & statis dein temporibus (forfan quatuor, aut septem dierum spatio) velut paroxysmi intermittentium, secunda forsan aut tertia vice motus critici repetuntur, priusquam lite dirempta in hanc aut illam partem res apertè inclinaverit.

III. Cum verò præcedente malo signorum & symptomatum apparatu, urgente adhuc sanguinis incendio, absque materiæ febrilis coctione quavis, aut subactione motus criticus provocetur, primo interdum conflictu natura prosternitur: nec denuo se recolligit, quin morbo victas manus cedens, in mortem præcipitatur. Nec multò melius res agitur, quando crisis primò imperfecta & irrita, sine quovis ægri levamine celebratur, & exinde huic proxima deterior succedit, indeque alio aut forsan alio conflictu morbus prævalet, donec viribus omnino fractis & prostratis de salute planè actum sit.

Haftenus de morbi *statu & crisi*, è cujus bono aut improspere successu morbi eventus dependet; hujus periodum febris *declinatio* excipit, de qua proximè agendum.

IV. Licet febris *declinatio* plerunque in meliorem partem accipiatur, ut denotet conditionem ægri à morbo convalescentis, in qua sanguinis effervescentiâ ferè immunis vires & spiritus labefactos sensim recuperat, & quod extraneum in sinu suo relinquitur, expellit; tamen significatu satis genuino usurpari potest pro eo statu, cum à crisi mala aut irrita sanguis depauperatus, & mixtione extranea & febrili infectus usque in pejus declinat, donec tandem (instar vini in vappam mutati) circulationi, & in corde accensioni omnino inhabilis factus mortem accersat. Igitur *declinationis* nomine hoc loco intelligo conditionem ægri, & morbi, quæ *statum* sequitur, sive in salutem, sive in mortem tendat; seu febris, aut ipsa ægrotantis vita hoc tempore declinet.

Quoad *declinationis* tempora erit operæpretium inquirere, quæ sit sanguinis temperies, & quas alterationum vices subeat, quoties à *crisi bona*, aut *mala* versus salutem, aut mortem fit morbi progressus. Nimirum primo quæ sit sanguinis & spirituum diathesis, seu conditio à *crisi bona*; & quibus alterationibus ejus liquor labefactatus pristinum vigorem recuperet. Secundò, quæ sit eorundem temperies à *crisi mala*, & quibus gradibus usque in pejus tenditur; quo denique pacto se habeant cum à *statu dubio*, & longa imbecillitate ægri vix tandem emergunt, & sanitatem recuperant.

Vitium, seu depauperatio, quam sanguis ab effervescentia febrili contrahit, in his consistit: *Spiritus* plurimum evaporat, & disperditur: *pars Sulphurea* nimis affatur, & à deflagratione multum absumitur, atque ab incendio ejus materies adusta (velut Caput mortuum) relinquitur, cujus particulis massa sanguinis aggravatur, & debilitatur: interim partes Salinae & terrestres nimis exaltantur; non secus ac in vino aut cervisia nimium fermentatis usuvenire solet. Sanguis his modis labefactatus succi nutritii penum malè assimilat; quin & in corde, ob *Sulphuris* affationem, aut defectum haud rectè fermentescens, aut inflammatus, spiritum vitalem perperam dispensat; interim à materia adusta ac Sale nimis exaltato plus debito effervescit, seque magis disperdit.

I. A *crisi bona* Spiritus, licet debilior factus, adhuc dominio potitur: quare quod reliquum est materiae febrilis, paulatim subigit, & expellit, succum nutritium (modo adhibeatur tenuis) concoquit, & assimilat: inde sanguinis massa Spiritu ac *Sulphure* de novo reficitur; quippe modo falsus & acris continuò effervescebat cruor, naturam dulcem & balsamicam denuo acquirit, & motu & calore vegeto citatus, vitae & sensus munia ritè peragit.

II. A *crisi mala* res aliter se habet; liquor sanguinis (instar vini nimis fermentati, ferè in vappam degenerat; *Spiritus* ejus valde diminuitur; quæ supersunt reliquiae materiae adustae particulis utplurimum intricantur, & velut obruuntur; unde continua effervescentia adhuc in cruore perstat, sine coctione tamen, succive alibilis assimilatione, aut inutilis ab utili secretionem: *Sulphur* benignum, & vitalis flammæ pabulum multum absumitur, itaut sanguis debito minus in corde accendatur; interim à recrementis adustis, necnon Sale & Terra nimis eVectis, cum siti & calore perpetim in vasis effervescit: & quoniam indies, *Spiritu* & *Sulphure* benigno absumptis depauperatur, atque Sale & fæculentiis terrestribus nimium exaltatis magis inficitur, ejus liquor brevi fit vapidus, circulationique & accensioni in corde pro sustinendo igne vitali inidoneus evadit: quare vitam perire necesse est, non secus ac Ellychnii flamma extinguatur, cum vice olei absumpti liquor tantum falsus & limosus suppeditatur.

III. A *crisi imperfecta & dubia*, quando ægri diuturna imbecillitate labefactati non nisi longo tempore convalescunt, res ad hunc modum se habet. Sanguinis partes *Spirituosa* & *Sulphurea* tarda deflagratione plurimum absumuntur; liquor residuus à recrementis adustis & fæculentiis non expurgatus valde impurus redditur; cum verò adhuc superest aliquid olei pro vitali lampade, neque Spiritus pro subigenda materia febrili omnino deficiunt, sanguis usque circulatur, & (diminutè licet) in corde accenditur; quin & paulatim se recolligunt Spiritus, ac materiam à febre residuam aggredi, & quæ possunt, subigere incipiunt: dein pertinaci coctionis assiduitate, instar flammæ inter ligna viridia vacillantem & semiextinctam, tandem victores emergunt, motuque & calore sensim redintegratis fermentationem in corde vividam vegetamque de novo restitunt.

De febre dicta *putrida* in genere hætenus: priusquam ad species & particulares ejus casus descendam, restat ut symptomata & signa in hujus febris decursu

decurſu præcipuè notabilia recenſeam, eorumque rationes, cauſas, & fiendi modos ſubjungam.

CAPUT X.

De ſymptomatis, & ſignis in febre putrida præcipuè notabilibus.

Symptomata febr̃ putridæ ſupervenientia, licèt totius corporis œconomiam ſplerumque depravatam, & nullius non partis, aut membri crases, & functiones læſas arguant: tamen accidentia, quæ Medicus circa morbi huius diagnoſin, ejuſque prognofin ritè inſtituendam præcipuè conſiderare debet, ad tres veluti claſſes, ſive locos communes referri poſſunt: ea nimirum reſpiciunt ad *coctionis viſcera*, ſcilicet ventriculum, & inteſtina cum eorundem appendicibus: ſecundò, vel *humores in vasis confluos*, ſcilicet *sanguinem* in arteriis & venis, & *liquorem tenuem* in partibus nervoſis, unà cum primis utriuſque ſcaturiginibus, ſcilicet corde & cerebro: vel denique ſymptomata iſta ſpectant *habitum corporis* cum varia *pororum* conſtitutione, & *partium ſolidarum* tenſitate, aut emarcentia. Qui morbi huius decurſum ad amuſſim obſervare, atque intentiones curativas velint aptè elicere, ad hæc tria ſymptomatum capita attendat, & quales in hiſce velut diſtinctis regionibus, juxta diverſa febris tempora, alterationes eveniant, ſedulò advertat.

I. Circa ventriculum, & primas vias in toto huius febris decurſu moleſtiæ, & inordinationes, uti ſunt naſea, vomitus, inappetentia, apepſia, diarrhœa, oris & linguæ ſcabrities, ſapor amarus, infeſtare ſolent: hæc ut plurimum humoribus in ſtomacho prius congeſtis, ibidemque putreſcentibus attribuuntur: at præterea quod chyli recrementa nimio calore perafſata in materiam noxiam degenerant, non rara ejuſmodi accidentia eveniunt, eo quod ſanguinis & ſucci nervoſi dummodo efferveſcunt, purgamenta, & ſordes introrſum feruntur, atque in viſcerum membranas depoſita ſpasmus cient; etiamque humoris vitioſi, & valde infeſti colluviem faciunt. Sæpius obſervavi, quod circa febr̃um initia ſanguis efferveſcens cum ægrotantium comodo recrementa ſua uſque interius deponeret, ubi licet magnæ moleſtiæ circa primas vias accreſcerent, tamen efferveſcentia propterea fuit mitior, pulſus moderatus, & urina laudabilis; atque hoc modo febricitantes cum victu tenui, & lenium *ἐκκοπρωτικῶν* uſu brevi convaleſcebant. Sin verò in hoc caſu pro exſtirpandis humoribus vehemens catharticum adhiberem, præpedita iſthac naturali cruoris purgatione, ſtatim febris intenſa cum urina rubicunda & turbida, pulſu alto, vigiliis, aliſque horrendis ſymptomatis evaſit: etiam non rarò poſt morbi ſtatum, huiusmodi luſtratione interiori materia aduſta, & excrementitia à cruore ſecernitur. Hinc aliquando diarrhœa, interdum cruſtacea oris & gutturi oblinimenta ſuccedunt: quare circa accidentia quæ in primis viis contingunt, cautione opus eſt, ne

dum iis occurrimus naturæ pervertamus motum : & dum has partes contra materiæ morbificæ incursum munimus , ne perperam in cruoris massa eandem occlusam servemus.

Symptomata circa massam sanguineam præcipuè perpendenda sunt calor in toto diffusus , præcordiorum æstus , sitis , pulsus inordinatio , urina rubicunda , lassitudo spontanea , syncope , è quibus ritè consideratis hæc sequentia innotescant ; scilicet quis sit caloris modus , seu quo tenore sanguis exardescens deflagret ; qualia remissionis , aut exacerbationis tempora ejus effervescencia observet inter deflagrandum ; an crasin suam , sive mixtionem integram retineat pro incendio ejus & accensi circulatione , cui cordis robur sufficiat , & vasa spatium concedant : quandiu exardescit cruor , qua copia recrementa adusta congerat ; quo ritu eadem subigat , secernat , aut saltem secernere nitatur ; qualem denique criseos viam molitur , & quo successu.

Accidentia , quæ ad liquorem tenuem cum cerebro , & appendice nervosa spectant , sunt inordinationes circa somnum & vigilias , debilitas totius corporis , tremor , rigor , dolores , motus convulsivi , viscerum spasmi , stupor , phrenitis : quorum observatio suggeret , quæ sit tenuis istius liquoris temperies , & constitutio ; quo ritu partes nervosas irriget , inflet , & per eas circuitus suos peragat ; quomodo Spiritus animales viscerum functiones obeant ; quis sit cerebri status , an ab incursum materiæ febrilis immunis perstet , an non propter criticam ejus metastasin obrui periclitetur.

Circa habitum corporis observare oportet , quæ sit diaphorescos ratio , ejusque modus ; an tantum per effluvia vaporosa , aut per sudores , aut etiam per exanthemata ? Utrum caro de solita sua mole citò decidat , vel an diu ipsam retineat ? Quis sit faciei color , & oculorum vigor , aut hebetudo ? Ex his ritè collatis febris decursum optimè metiri liceat , quo tempore ad statum pervenerit , utrum natura morbo prævaleat , necne ? quali *ἐκπύρεως* modo , & quo successu materiæ febrilis expulsionem molitura sit , hisce etiam signis ediscitur quibus gradibus sanguis effervescens , & sæpe congelatus versus putredinem , sive corruptionem tendat ? an succum alibilem ipsi confusum ullatenus coquat ? vel annon sudore totam ejus penum (prout in declinatione hujus morbi sæpe accidit) protinus foras ejiciat ?

E prædictis symptomatis & signis adhuc uberior *ορµέωσις* habetur , si priùs innotescat , à quibus causis singulæ eorum species dependent , & quo apparatu in corpore nostro excitari solent : quare operæpretium duxi præcipua horum particulatim recensere , eorumque rationes , & fiendi modos explicare : sunt autem *in synocho putrida symptomata præcipuè observanda* , calor in toto corpore , lassitudo spontanea , præcordiorum æstus , sitis intolerabilis , lingua ac faucium ardor ac scabrities , capitis & lumborum dolor , vigilie pertinaces , phrenitis , motus convulsivi , syncope , cardialgia , vomitus , neausæa , inappetentia , diarrhœa , dysenteria ; quibus non simul omnibus , sed modo his , modo illis , solet hic morbus stipari. Inter signa , pulsus , & urina maximam præferunt facem. De singulis pauca annotabo.

I. Calor , qui in toto corpore acris , & mordax sentitur , à nimia sanguinis effervescencia , ejusque in corde accensione dependet : etenim pars

Sulphurea, seu oleosa sanguinis, exaltata, & fervorem concipiens, proportionem ut minus dupla plus solito in corde accenditur; quare deflagratione sua caloris effluvia per totum corpus copiose diffundit. Quando Sulphur minus dissolvitur, ac in corde accenditur, uti in pica virginum, leucophlegmatia, &c. calor in toto deficit: in febre autem quando nimis exardescit Sulphur, æstus superabundat. Etenim calor non tantum ab actuali Sulphuris inflammatione, aut ignitione dependet; verum sine igne in mixtis quamplurimis, ubi particulae Sulphureae aut corrosione dissolvuntur, aut ob ventilationis defectum densius agglomerantur, calor intensus excitatur; quare cum ferrum à Spiritu quovis acido minerali corroditur, cum butyro Antimonii Spiritus nitri suffunditur, calor ingens cum fumo producitur: pariter cum finus, vel foenum madidè reposta à ventilatione prohibentur, summè incalescunt: eadem ratio est cur sanguis supra modum exardescit in febribus; nimirum Sulphuris particulae nimis exaltatae & effervescentiae densius agglomerantur in vasis, & plus dissolvuntur, ac velut accenduntur à fermento cordis; quare mixtionis vinculo solutae, & ubivis expansae, calorem circumquaque diffundunt.

I I. *Assitudo* spontanea in toto corpore sentitur: nimirum ob vasa cruore ebulliente distenta, etiam caro musculosa sanguine, & copioso halitu plurimum infarcitur, ut ad motum sit minus accommodata; veluti qui anasarca laborant habent artus minus expeditos, propter serosi humoris exundantiam: praeterea in febribus ob sanguinis phlogosin, succus qui nervoso generi suppeditatur, à debita temperie desciscit, ut sit actuandis corporibus parum idoneus.

I I I. *Præcordiorum æstus* fit ob sanguinem copiose in cordis foco accensum, qui exinde cum magna exardescencia in pulmones ebullit, quare quo propior est hæc regio isti caloris foco, eo maiore percellitur incendio.

I V. *Sitis ferè inextinguibilis* fit tum ab æstu in præcordiis gliscente, tum ob particulas materiae febrilis acres & calidas ventriculo à sanguine inter circulandum affixas; quæ quidem elui desiderant, non secus ac alimenta salsa, & piperata uberius comesta, aut etiam acria, ore vel gutture voluptata; huiusmodi enim affectus liberiores potus ingestionem appetit, prout membrum nimis incalescens aquæ frigida suffusionem suggerit.

V. *Lingua, ac faucium ardor*, & scabrities, sæpè etiam amurcæ cuiusdam albæ, aut flavæ, aut nigræ accretio proculdubio accidunt propter calorem, & fuliginem è ventriculo, & pulmonibus æstu flagrantibus exhalatam: lingua verò albescit quotiescumque humiditas illa (qua plurima naturaliter imbuta est) exaruit, & decoquitur, adeoque exterior linguae cutis à retorrido calore velut elixatur: hinc quoque scabra evadit; quod etiam in sanis cernitur, si quando linguam jusculo, aliove sorbili præfervido amburi contingit; pariter cum linguae animalium ad mensarum usum elixantur, earum cutis alba, & aspera evadit. Sive enim saliva è glandulis maxillaribus (prout è solertissimi *Vhartovi* doctrina primùm innotuit) sive alius quispiam humor à Tonfillis, aut aliunde proliciatur; quia tamen ob calorem, & siccitatem nimiam incrassescit, & viscidus evadit, etiam tunc quoque linguae tunica exterior albicat nihilominus; sed & mucoso quodam lentore obducitur, nimirum

quia humor iste præ crassitie linguam oblinere quidem potest, diluere tamen, & humectare non potest: si verò accidat linguam humore bilioso vel introrsum suffundi, vel extrinsecus tingi (ut in vomitibus *πικροχόλοις* usuvenit) tum villi ejus, utpote spongiosi, flavum virus imbibentes colorem quoque similem exhibent. Quod si denique calor adeo intensus fiat, ut sanguinem adurat, ignemque solito ardentior accendat, sequitur ut è cordis foco per pulmonum spiracula vix tanto incendio ventilando sufficientia, fuligines suscitentur, quæ ad palati fornicem allisæ linguam quasi reverberio feriunt, & nigrore inficiunt. Istiusmodi autem nigredo (ut & reliqua linguæ inquinamenta) in medianis ejus partibus magis conspicua est, quia scilicet exteriores ambitus frequentiori ad gingivas, & palatum attritu detergentur.

VI. Quandoque in febribus (ac præcipuè circa earum declinationes) contingit linguam, palatum, gingivas, imò totius oris, & gutturis cavitatem *materia viscosa, albicanti velut crusta* quadam obliniri: quâ sæpius deterfa statim nova repullulat; & ni diligenter os fricando, & colluendo *crustosa hæc materies* crebrâ vice abstergatur, suffocationis periculum ægri non rarò subeunt. Ejusmodi affectus infantibus recens natis sæpissimè excitatur; solent enim plerumque intra dies quatuordecim effervescentiâ externâ cum maculis latis, & rubris per totam cutim suffundi; quod si hæc ruboris suffusio minus liberè erumpit, aut debito citius evanescit, ut plurimum crusta isthæc albicans in partibus oris succedit. Hoc symptoma, quando hoc ritu infantes molestat, lactis vitio solet ascribi; utpote quod acre nimis affectionem oris ulcerosam inducat. In febricitantibus idem vaporibus crassis, & fuliginosis à ventriculo elevatis vulgo attribuitur: mihi autem verisimilius videtur, quod in utrisque hic affectus à totius sanguinis (& forsan aliquatenus humoris nervosi) impuritatibus circa has partes depositis oriatur: etenim quoties in utriusque humoris massa aliquid extraneum intimè confusum continetur, quod nec sudore sit diffilabile, nec per urinas facile amandetur, illud sæpissimè cum serosa colluvie circa os defigitur; unde affectus catarrhales, tumores, & sputationes molestæ cientur: cum enim pro masticatione ciborum humor salivalis hic loci ubertim suffundi debeat, per patentes, & hæc assuetas excrétionis vias natura sæpe quod superfluum est, aut aliàs molestum, foras amandare nititur. Hinc à Mercurio exhibitò, cum & cruor, & succus nervosus particulis ejus minutissimè divisis, abundè refertiuntur, easque sero involutas excernere moliantur; quia nec per sudorem, urinam, aut aliâ viâ, Mercurialia hæc corpuscula intimè confusa exterminare queant, quod reliquum est, per arterias, aliosque ductus, qui salivam ori suppeditant, eadem seroso latice obvoluta expellere nituntur. Pariter etiam in febribus, cum à longiori sanguinis deflagratione materies adusta plurimum congeritur, cujus non minima pars post crisin residua, adhuc cruori & succo nervoso confunditur, aut cerebro, aliòve loco defixa, ab iisdem denuo resorbetur; probabile est, quod isthæc materies diurnâ coctione perassetur adeo, & ferè glutinis instar crassescat; quare nec sudore, nec transpiratione insensili diffilabilis, nec per vias urinarias secerni habilis, sed demum arterioliis, aliisque salivæ ductibus in palatum dehiscantibus (utpote

(utpote usitatâ excretionis viâ) sensim exsudet , & protinus præ crassitie sua in lentorem istum concreascit. Eadem ratio tenet de infantibus , quorum sanguis à sordibus in utero contractis impurius factus , statim efflorescentiâ exteriorius factâ depurari satagit ; quæ si ob materiæ crassitiem haud ritè succedat , statim hac via , velut patentiori , impuritates viscosæ exterminantur. Novi quendam in declinatione febris , cui non solum hujusmodi lentoris incrustatio in partibus oris successit , verum salivatio copiosa , velut ab assumpto Mercurio , cum foetore anhelitus , item linguæ , & gingivarum intumescencia per plures dies ciebatur.

V I I. *Capitis dolor* in febribus excitatur propter meninges cerebri vaporibus , & sanguine acri , & effervescente vellicatas ; etenim sanguis impetuosè commotus , propter arteriæ magnæ directionem majori copiâ ad caput , quàm ad partes infernas defertur : quippe transitus è cordis sinu in caput rectus est , ex eodem in membra inferiora obliquus , & velut reflexus : quare cum cerebri membranæ sint valde sensiles ; ibidemque sanguis in cursu rapido sistatur , ac reverberetur , nihil mirum est , si immanes cephalalgia in febribus concitentur. Præter impetuosum hunc sanguinis affluxum , quo (velut arietatione quadam) capitis membranæ percussæ , & distentæ graviter dolent , etiam cephalalgia interdum oriuntur propter succum nervosum (qui à sanguine æstuante suppeditatur) nimis acrem , & pungitivum : quare cum eodem membranæ , & nervosæ partes irrigantur , acrimoniâ ejus vellicatæ , in dolores , & spasmos aguntur.

V I I I. Pariter & cæteri capitis affectus , ut *vigilia* , *delirium* , *phrenitis* , *convulsio* , &c. quandoque à sanguine impetum faciente , adeoque motus inordinatos in cerebro concitante , quandoque etiam à succo nervoso degeneri , ac idcirco spirituum animalium regimini improporcionato facto oriuntur : sæpissimè autem hujusmodi symptomata in febribus increbescunt ob materiæ febrilis è cruoris sinu in has partes metastasin. Etenim sanguis recrementis adustis à deflagratione residuis satur , ea (velut mustum efflorescens) omni modo subigere , & consortio suo excludere nititur ; quæ cum , fluore oborto , per sudorem , urinam , aut hæmorrhagiam expellere nequit , sæpe in cerebri substantiam transfert , ibidemque ea affigit : atque hinc potissimum prædicti effectus , quando fixi , & firmiter radicati sunt , originem trahunt : cum autem leviores , & facilè mobiles sint , à causis prius citatis non raro procedunt.

I X. *Motus convulsi* propter causas diversas in febribus contingunt ; quandoque ob materiam in primis viis congestam , quæ insigni pravitate sua partes ibidem membranosas vellicat , & dein consensu nervosi generis statim spasmus nervorum origini in cerebro communicatur , & exinde in partes modò has , modò illas retorquetur : qua ratione lumbrici in visceribus scatentes , humores acres commoti , & pharmaca deleteria convulsiones inducunt : vel *secundò* , quando febris malignitatis cujusdam sit particeps ; sic variolis , morbillis , aut pesti convulsiones frequenter accidunt : quia scilicet sanguis à temperie benigna , & naturali in deleteriam , & venenatam alteratur , qua nervi , eorumque principia percelluntur ac in spasmos aguntur. Non raro etiam absque malignitatis suspitione , in febre putrida propter materiæ febrilis

metastasin

metastasin ad cerebrum motus convulsivi inducuntur, prout modò innuitur: ita sæpius observavi, quod quando morbus crisi statim non solvitur, ægroti longa ægritudine decumbunt, & motibus convulsivis, & tremulis fiunt obnoxii. Tertiò denique in unaquaque utplurimum febre, quæ in mortem terminatur, motus convulsivi sunt tristes, lethi prænuntii: quod accidere puto non tantum à materiæ malignitate, qua nervo sum genus vellicatur, & percellitur; sed quia Spiritus plurimum exhausti, & debilitati non satis inflant, & distendunt nervorum corpora: quare à solita tensitate, & motu tonico relaxata, debiliori utcunque spirituum nixu in motum inordinatum agitantur.

X. *Syncope* pluribus modis solet in febribus concitari, potissimum verò ob has tres causas, nimirum aut *ore ventriculi affecto*, quæ pars cum sit multiplici nervorum plexu intexta, fit valde insensibilis: & quia ob eodem sexti paris ramo ad cor, atque ad ventriculum nervorum surculi derivantur, si ventriculi orificium ita nervis consitum magnâ molestiâ afficiatur, etiam cordi communicatur noxa, & in ipso aut sistitur motus, aut saltem inordinatus concitatur, quo æquabilis spirituum, & sanguinis affluxus ad tempus interrumpitur. Novi quendam in febre acuta crebrâ syncope correptum; qui tamen affectus, postquam lumbricum longum, & teretem vomitu rejecerat, omnino cessavit. *Secundò* etiam syncope interdum inducitur, quia *venenata materia* cum sanguine circulatur, quæ spiritus vitales repenti figit, & extinguit, ipsumque sanguinem congelat, ut in corde stagnare aptus sit, prout usu venit in peste, variolis, &c. de quibus inferiùs speciatim dicetur. *Tertò* accidere solet *syncope* ob *rariorem spirituum texturam*, qui cum valde teneri, & subtiles sint, motu, aut dolore quovis immodico facili exsolvuntur: ita novi quosdam, qui in lecto compositi satis bene se habuerunt; verum in hanc, aut illam partem commoti statim animo defecerunt.

XI. *Cardialgia* in febribus contingit, quando ventriculus, & imprimis ejus orificia, ob multiplices nervorum insertiones valde sensibilia, humore acri, & amaricante, aut etiam acido, & corrosivo obsidentur; hinc enim dolor ab acrimonia humoris, simili modo ac sphincter ani in dejectionibus biliosis, dolore & molestia afficitur.

XII. Ob ejusmodi causam *vomitus*, & *nausea* solent excitari: nimirum ventriculo à materia extranea, & sibi non congeneri obseffo, & ad spasmum irritato. Talis excrementitia materia *tribus modis* in ventriculo congeritur: aut enim alimenta partim ob defectum acidi fermenti, quo ritè coqui deberent; partim ob calorem ventriculi adurentem in talem putrilaginem exasfantur. Aut *secundò* hujusmodi materia ex arteriis in ventriculum terminatis in cavitatem ejus deponitur, prout usu venit in variolis, peste, & febribus malignis. Aut *tertiò* mera bilis è meatu choledochi in jejunum intestinum expressa, propter motum inversum, ac veluti convulsivum istius intestini in ventriculum suffunditur. *Inappetentia* etiam accidit ob ventriculum succis vitiosis scatentem, & quia fermentum acidum à calore torrefaciente omninò pervertitur. Hujusmodi ventriculi, & viscerum affectiones aliquando oriuntur à materia excrementitia (scilicet alimentosa, inter coquendum degeneri) diu ante febrem in primis viis congesta, quæ non rarò ipsius febris

febris causa occasionalis existit : interdum verò *nausea*, *inappetentia*, *vomitus*, *cardialgia*, &c. sunt immediata febris producta ; cum enim pridie ægrotationis affecti satis stomacho valuerunt, quamprimum immodica effervescentia sanguini inducitur, dum iste supra modum ebullit, tum effluvia, & recrementa exterius evaporari solita, tum humor biliosus è vasis choledochis exundans, ventriculo suffunduntur, quibus ipsius crasis evertitur, ac etiam chyli reliquiæ, aliaque in visceribus contenta insigniter depravantur, unde prædicti affectus originem ducunt.

XIII. Nec minus frequens symptoma in febribus est *diarrhœa*, sive *alvi fluxus*, qui aliquando circa morbi initia contingit ; oriturque (ut plurimum) aut à bile è vasis choledochis in duodenum exundante, aut à sanguinis & succi nervosi recrementis ex arteriis, & ductu pancreatis ad intestina suffusis. Singuli prædicti humores (præsertim verò biliosus,) quando in copia suppeditantur, cum massa à chymo residua non rarò fermentescunt, ut eadem spumosa rarefactione intumescens intestina irritet, & in excretionis motum stimulet : quandoque etiam circa morbi statum, & in declinatione ejus diarrhœa concitatur ; & sic vel natura victrice crassiora sanguinis purgamenta hoc modo criticè excernuntur ; vel eadem succumbente, viscerum omninò viribus, & firmo tenore exsolutorum alvi fluor effectus, & signum est. Interdum accidit in febre *alvum* esse semper *astrictam*, ut nisi à pharmaco proritata minimè solvatur ; & licet ægri per plures dies liquida tantum ingesserint, dejectiones usque sunt consistentiæ solidæ, & duriusculæ : hoc autem plerumque fieri videtur, quando sanguis acriter, & plurimum excandescens, humiditates ubivis scatentes velut ignis absumit, & copiosa halituum emissionem materiam aquosam è visceribus in se allicit, & statim exterius evaporari facit : quare pars crassior in intestinis relicta, à calore torrefaciente, velut Caput mortuum à destillatione residuum, inspissatur.

XIV. *Dysenteria* est affectus in febribus continuis adeo frequens, ut quibusdam annis epidemius evadat, & peste non mitior plures interimat : in causa esse solet non humor aliquis intus in visceribus productus, qui acrimonia sua intestina corrodit (uti nonnulli asserunt) sed miasma quoddam sanguini impressum, adeoque intimè ipsi confusum, ut sub vaporis, aut humoris sinceri forma à cruore divelli nequeat : quare intestina versus propulsum, arteriarum oscula referat, ulcuscula, & sanguinis exsudationes illic facit, veluti cum à sanguine febrili cutem versus efflorescente pustulæ, & phlegmones exterius erumpunt. Verisimile autem est, quod affectus illi dysenterici, qui febres malignas, aut epidemias comitantur, à sanguinis coagulatione quadam oriantur, uti postea plenius dicetur.

Atque hîc inter symptomata febrium recenseri poterunt etiam quæ exterius in superficie corporis apparere solent, ut sunt *macula*, *exanthemata*, *bubones*, *carbunculi*, &c. Quoniam verò hæc ad febrem malignam speciali modo pertinent, ideo ab eorum consideratione hoc in loco supersedemus, donec de peste, variolis, febre petechiali, & maligna dicetur.

Symptomatum, & signorum in febre putrida hîc agmen claudant, *pulsus*, & *urina*, quibus præcipuè attenditur pro dignoscendis tum morbi statu, tum ægri viribus : cum enim duo sint, quibus vita nostra innititur, scilicet calor

Vrinarum consistentia, contenta, & subsidentia, velut in eodem filo posita, simul dependent à materia adusta, & recrementitia, quæ à deflagratione febrili in sanguine residua est: hujus si copia adfuerit, urinæ consistentia nonnihil spissior evadit; & postquam steterit, à frigore turbatur: si autem hujus sit minor quantitas, aut aliò quàm ad renes derivatur (nimirum si vel sudore, aut critica in hanc, vel illam partem metastasi avocetur) consistentia sit tenuior, & liquor clarus persistit. Etiam hujus materiæ particulæ urinæ contenta elargiuntur, quæ se diversimodè habent, juxta quod succus nutritius à sanguine modò nonnihil coquitur & assimilatur, modò omninò pervertitur, & in putrilaginem facessit. Coctionis, & assimilationis signa quædam exhibent in urinis febricitantium modò hypostasis laudabilis, modò ejusdem vestigia quædam, & rudimenta: coctionem vitiatam denotant hypostaseos privatio, & partium urinæ confusio, & perturbatio. Prout autem hæc materies plus, aut minus in sanguine assatur, contenta sunt modò pallidi, modò ruffi coloris, instar ochræ. Pro ratione quâ recrementa sanguini confusa vel spiritu præpollente subigi, & secerni incipiunt, vel eodem nimis depresso separari minùs queunt, etiam contenta urinæ plus, aut minùs, citiùs, aut tardiùs à reliquo liquore secerni, & versùs fundum subsidere solent.

Quoad prognostica ab Urina desumenda annotamus, quod urinæ color nonnihil remissior, consistentia mediocris, contenta pauciora spontè subsidentia, aut facilè in nubeculam collecta bonum portendunt: è contra rubor intensus, consistentia spissa & turbida, contenta crassiora & opaca, quæ tardè, aut vix omninò versùs fundum subsidunt, effervescentiam magnam, materiæ adustæ copiam, ejusque subactionem, & secretionem difficilem, aut frustratam denotant.

Quoad directiones pharmaceuticas, res in hoc cardine versatur, ut crebrâ urinarum inspectione naturæ motum attendamus, eidemque obsequamur, nec catharsi, nec diaphoresi quidquam movendum, nisi cùm hypostasis quædam in urinis coctionis, & separationis signa exhibet. Super hac re plura hîc inserere supervacaneum duxi, quoniam alibi, proprio in loco, quæ ad urinas spectant, fusiùs tractantur.

C A P U T X I.

De synochi putridæ speciebus, & curatione.

ATque hæc dicta sunt de *synocha putrida* in genere, in quibus describitur ejus ratio formalis juxta accidentia, & symptomata, quæ in typo ejus vulgò observantur; sunt præterea hujus morbi (ne dicam species) varietates quædam, sive anomalix, quibus hæc febris à communi hac norma aliquando deflectit; & propter affectus quosdam accidentales nova sortitur nomina, & distinctiones.

Primò itaque dividi solet synochus putrida in *symptomaticam*, & *essentialem*. *Symptomatica* dicitur, quæ ab alio quodam affectu, sive morbo in corpore priùs excitato originem ducit, ita ut febris sit tantùm symptoma isti alteri morbo superveniens.

supervenienti : cujuscumque habetur , quæ ab angina , pleuritide , *πνευμονία*, à vulnere , ulcere , aut abscessu quopiam in parte principe , aut ejus vicinia dependet , de quibus nos paulò aliter sentimus , quod scilicet reverà nulla febris putrida sit merè symptomatice , nisi occasionaliter forsitan oriatur ab alio quodam affectu : fundatur verò immediate in Sulphurea sanguinis parte nimis effervescentia , & velut accensa : etenim sine *πυρεσσι* , seu præcedente sanguinis indispositione , prædictæ affectiones rarò , aut vix omninò febrem putridam accersunt.

Quod verò spectat ad anginam , pleuritidem , *πνευμονίαν* , ac similia dico , quod ista sunt febris producta , seu affectus ipsam consequentes , minime verò ejusdem causæ ; sæpissimè enim causa evidens præcessit , quæ sanguinis effervescentiam febrilem produxerit , utpote frigoris susceptio , evacuatio cohibita , &c. Dein licet non aperte statim febricitant ægri , tamen sanguinis ebullitio solito major concitatur , prout ex urina , pulsu , & inquietudine totius corporis licet facile conjicere. Post aliquot dies (modò citius , modò tardius) inflammatio in hac vel illa parte producitur ; cujus ratio satis probabilis hujuscumque assignatur : sanguis propter effluvia retenta (quæ se instar fermenti habent) mole augetur , & in vasis plus solito turgescit ; cumque ob ventilationis defectum , circulationis suæ spatio angustatur , facile quâ datâ portâ arteriis exsilit , & circulationis filo interrupto extravasatus in tumorem aggeritur : & quoniam ab ejuscumque tumore calor , & dolor in parte intenduntur , sanguis in motu suo magis perturbatur , adeoque febris primò accensa plus aggravatur.

Præterea in hujuscumque affectibus advertere licet sanguinis aptitudinem quandam ad coagulandum , quâ fit minus fluxilis , adeoque in vasis minoribus congelari habilis : non secus ac in lacte cernitur , cum acescere incipit ; tunc enim sine coagulatione non coquitur , nec super foco incalescit : pariter & in sanguine suspicari est diathesin quandam ad acescendum , cujus ratione coagulationi sit obnoxius ; facile enim constat , quod in pleuritide , peripneumonia , angina , & similibus morbis inflammatio seu cruoris extravasatio , non semper dependet à sanguinis exuberantia , & vasorum plenitudine , sæpe enim cum pulsu debili , & vasorum subsidencia sanguis in motu sistitur , & in latere , aut alibi extravasatus dolorem acutum infert. Imò ex una parte depulsus mox in alia defigitur. Quandoque in ipso corde stagnare incipit , ibidemque oppressionem sæpe lethalem inducit : quare solent pleuritici nonnulli , cum dolores evanuerunt , de insigni gravamine , & velut pondere circa cordis regionem defixo queri : cumque ex hujuscumque affectibus obeuntium cadavera aperuimus , in cordis sinubus , & vasorum circumcirca cavitatibus sanguinem in frustula & glomeres oblongos concrevisse vidimus. Quandoquidem autem hi morbi seorsum à febre tractari solent , ideo hîc plura dicere superfedemus.

Solummodò inquirendum restat , utrum febris quæ hos affectus comitatur , habenda sit ex earum censu quæ putridæ dicuntur , necne ? Cui referimus ; quod sæpissimè sunt synochi simplices , in quibus tantum subtilis & spirituosior sanguinis portio inflammatur : ideoque si à copiosa sanguinis detractio , aut vasis à sudore depletis cruor extravasatus circulationi reddatur , statim

effervescentia compescitur, & febris brevi sedatur. Quandoque tamen, cum prædispositio, velut in plethora, aut insigni cacochymia, accesserit, simul cum hujusmodi affectibus ab eadem prorsus occasione febris putrida accenditur.

Inter febres symptomáticas refertur quæ vulgò *lenta* appellatur: qui hac laborant, plus debito incalescunt, præsertim à pastu, motu quovis, aut exercitio: urina plerunque rubicunda est, spiritus sunt debiles, & vires dejectæ; circa appetitum, & somnum se mediocriter habent, tussi aut sputo copioso carent: verum indies (tabidorum instar) & sine causa manifesta emarcescunt. Vitium plerunque ascribitur obstructionibus in viscere quodam (putà hepate, liene, aut mesenterio) cujus culpâ alimentum non benè coquitur, nec ritè dispensatur. Videtur autem mihi quod hujusmodi affectio immediatè fundatur in mala sanguinis diathesi, quâ in temperiem nimis salisam, & acrem vergit, ideoque nutritioni, & æquali circulationi minùs aptus redditur. Etenim sanguis in corde, non secus ac oleum in lampade, si particulis salinis nimium redundet, non placidè & æquabiliter, sed cum crepitu & magna partium evaporatione accenditur; quo quidem citiùs dispenditur, & flammam non nisi languidam, & imbecillam exhibet. Quendam tali morbo defunctum olim aperui, in quo viscera coctioni dicata satis rectè se habuerunt; pulmones verò erant exsucco & aridi, necnon materiâ sabulosâ instar cretæ per totum obfusi. Non rarò item in hoc affectu mesenterium glandulis tali materiâ argillaceâ repletis obsidetur. Utrum verò sanguis salior factus ejusmodi viscerum affectiones primò intulerit, vel an viscerum dyscrasia sanguinem priùs infece-rit, incertum est? Probabile videtur quod alterutra affectio ab altera dependeat, & mali utriusque causæ reciproca fuerint.

Febris autem, quæ symptomática dici maximè meretur, ea est quæ in Phthisicis à pulmonum ulcere, aut contubescencia excitatur. Etenim sanguis, dum pulmones in circulatione sua totus pertransit, huic visceri plurimum morborum ideas sæpe imprimit, & vice versa ab eodem malè affecto easdem recipit. Quicquid impurum in cruoris massa continetur, arteriarum extremitatibus, velut musti efflorescentiâ, ejicitur: quare cum natura debilior facta in superficiem corporis recrementa sua nequit transferre, propiore lustratione eadem in pulmones deponit. Hinc insignis cacochymia & morbi plerique chronici frequenter in phthisin desinunt: pariter cum pulmonum caro contabescit, aut ichore ulceroso scatens semiputrida evaserit, sanguis pertransiens materia purulenta, aut tabido inquinamento inficitur, & proinde continua effervescentia ob rei non miscibilis confusionem concitatur; quare & febrem assiduam inducit, & succum alibilem omninò pervertit. Par ratio est de febris ab ulcere, aut abscessu sæpe in aliis partibus concitato: hæc enim, non secus ac tabida pulmonum constitutio, sæpe phthisin & febrem hecticam accersunt. Plena harum consideratio hujus loci non est; quare unde digressi sumus, ad febrem putridam propriè dictam, seu essentialem revertimur.

Synochus putrida *essentialis* dividi solet in putridam (qualis suprà describitur) in *Causam*, & præterea in *quotidianam*, *tertianam*, & *quartanam*. Synochus putrida modò delineata cæterarum regula, sive norma esse debet, ad cujus

typum

typum plerumque febres quæ sunt hujus generis componuntur. Quoad reliquas modò dictas, juxta quod speciem suam variant, breviter subjiciam.

Causa, seu *febris ardens*, ea est quæ cum majori æstu, siti ferè intolerabili, aliisque symptomatibus insigniorem sanguinis phlogosin arguentibus cursum suum peragit: ejus ratio formalis, quæ à cæteris discriminatur, in hoc consistit, quod temperies sanguinis eâ affectis sit calidior; hoc est sulphure concremabili magis abundat, ideo cum effervesceat, majori copiâ accenditur, & deflagratione suâ caloris intensissimi effluvia per totum corpus diffundit. Ejus motus est acutus, & citò ad statum pervenit: symptomatibus magis horrendis stipatur, crisin habet difficilem, & eventum periculosa alea plenum.

Quod verò spectat ad periodos istas, sive paroxysmos, quibus febris putrida statò tempore interdum exacerbari solet, & (veluti intermittens) diebus modò singulis, modò tertio quovis aut quarto febrilem quasi accessionem repetit; hujus ratio non facile explicabilis videtur, præsertim si *quatuor humores*, quorum spontaneo motui huic affectus vulgò ascribitur, ab hoc censu rejiciamus. Super hac re quod mihi verisimilius videtur, dubitans proponam. In febre continua duo sunt præcipua (prout superiùs annotavimus) quæ sanguinis effervescentiam ut plurimum inducunt, nimirum in cruore partis sulphureæ exaltatio & accensio; deinde consequenter materiæ adustæ, & à deflagratione sanguinis residuæ, ad turgescentiam congestio: à priori febris continuas, ab altero ejus status & perturbationes criticæ dependent: his aliquando tertium quiddam accedit, nimirum succi crudi ab alimentis recens congestis plenitudo & turgescentia; quæ statis temporum intervallis in febre continua (prout in paroxysmis intermittentium) majorem effervescentiam inducit. Cur autem non semper, nec eodem prorsus modo hoc contingit, ratio hæc est. Quando synochus putrida est valde acuta, & sanguis ferè totus citò inflammatur, & summè æstuat; quicquid succi nutritii cruori affunditur, statim aduritur & incendio absumitur: quare parum aut nihil ejus in paroxysmi materiem in massa sanguinea continetur. Sin verò hæc febris sit minùs acuta, & sanguis modicè & per partes solummodò deflagrat, succi crudi supplementum non prorsus adustione absumitur, sed mitiori incendio in materiam fermentativam pervertitur; quæ cum ad turgescentiæ plenitudinem in vasis assurgit, fluorem concipit, & effervescentiâ suâ calorem febrilem prius in sanguine gliscentem, velut novi pabuli accessu, intendit. Hujus materiæ efflorescentia non rarò cum levi rigore aut frigore incipit, & aliquando in madorem desinit: plerumque verò transpiratione insensibili exhalatur. In singulis paroxysmis præter succi nutritii degeneris penum aliquid è materia sanguinis adusta & concremata evaporat: quare morbi crisis diutiùs protrahitur, ut rarò intra dies 11. aut 14. judicetur; quin (ut plurimum) in febre hujusmodi paroxysmis & remissionibus intercalata, vix intra dies 20. perfecta morbi solutio contingit; atque aliquando sine manifesta diacrisi sensim remittit, & dein longa declinatione in mortem aut salutem terminatur.

Quod verò hujusmodi remissio & exacerbatio juxta typos febris intermittentis variantur, ut diebus modò singulis, modò alternis, & interdum non nisi intra quatrimum vices suas repetant, hujus ratio à doctrina febrium intermittentium superiùs tradita erit petenda; nimirum juxta quod sanguinis
dyscrasia.

dyscrasia diversimodè se habeat, succi nutritii degeneris supplementum citius aut tardius ad turgescentiæ plenitudinem assurgit, & proinde effervescentia sua modò crebriores, modò rariores in hac febre paroxysmos efficit.

Circa Therapiam febrium putridarum cujuscunque generis, *quatuor sunt intentiones generales*, quibus totius negotii cardo innititur. *Primò*, ut sanguis (si fieri possit) ab incendio vendicetur, & prorsus supprimatur flamma, sive ignis in sulphurea ejus parte accensus; quod circa prima hujus morbi initia non rarò fieri contingit. *Secundò*, ut cum sanguis incendio tactus protinus extinguere nequeat, saltem initiùs, & cum minori noxa deflagrationem suam peragat. *Tertiò*, ut deflagratione finita, materiæ concrematae & adustæ recrementis liquor cruoris expediatur, & postea ad crasin & vigorem naturalem restituatur. *Quartò*, ut symptomatis præcipuè urgentibus (quæ nisi tollantur, & naturæ & pharmaciae opera frustra erunt,) tempestivè occurratur.

Quoad remedia particularia, quibus intensiõibus istis satisfiat, varia sunt præscripta, & medicamentorum formulæ non solum apud Medicos, sed etiam mulierculas & Empyricos quosvis passim in usu; à quibus tamen, cum instar gladii in cæcutientis manu, sine discrimine, & exacta methodo medendi usurpentur, plus damni sæpius quam emolumentis aëris accrescit. Non opus erit hîc purgantium, cardiacorum, aliorumve pharmacorum formulas apud plerosque authores satis eleganter traditas hoc in loco repetere: præcipuas quasdam indicationes, & cautiones medicas, quæ in decursu hujus febris, juxta varia ejus tempora, & diversa symptomata observari debent, paucis subjiciam.

I. Circa *primum* hujus morbi *insultum*, danda erit opera, ut febris protinus supprimatur, atque sulphuris effervescenti inflammationi inhiberi possit, cui *venæ sectio* imprimis conducit; hoc enim modo sanguis eventilatur, & particulae calidae nimis agglomeratae, & incendio jam proximæ ab invicem dissipantur; veluti cum fœnum exardescere aptum, si aperto aëri exponatur, ejus accensio præcavetur. Insuper tenuis instituatür victus, in quo nihil spirituosum, aut sulphureum adhiberi debet. Viscera, & primæ viæ materiæ excrementitiæ saburra liberentur; quare enemata erunt usus necessarii, quandoque etiam vomitoria, & lenia cathartica, quibus aliquando tempestivè & cum judicio adhibitis, febris inter ipsa statim initia, detractò accensionis pabulo, extinguitur. Quod si non obstante hac methodo, incendium latius serpit, & sulphureas sanguinis particulas magis indies, & magis corripit; procuretur (quæ fieri possit) ut deflagratio sine magno tumultu leniter procedat.

II. Quare cum febris in *augmento* fuerit, si cruor nimis effervescat, & cum pulsu forti & vehementi vasa plurimum distendat; si vigiliæ, phrenitis, aut dolor capitis immaniter urgeant, sanguinis missio denuò repetatur, & transpiratio (quantum licet) libera procuretur: quare in lecto ut plurimum ægri decumbant; victus sit parvus, ex alimentis admodum tenuibus; item potus tenuis & copiosus, ut sanguis exardescens sero uberiore diluatur: enemata satis tutò, & reverà commodè adhibentur; pharmaca autem, sive cathartica, seu diaphoretica, & quæ sanguinem nimis exagitant, eadem industria vitentur, qua ventorum flamina ædibus incendio flagrantibus. Quin potius opiatae & anodyna,

anodyna, quæ sanguinem & spiritus figunt & constipant, erunt usurpanda: item julepia, & decocta quæ viscera æstuantia refrigerant, cruorem attemperant, & spiritus refocillant, erunt crebro exhibenda: liquores acetosi vegetabilium, aut mineralium, necnon nitrum purificatum, quia sanguinis æstum cohibent, & sitim extinguunt, ritè conveniunt. Aquæ ardentes, spirituosæ, pulveres cardiaci, & bezoartici (quamdiu morbus malignitate caret) procul habeantur: si modo sanguis inæqualiter circuletur, & magis impetuosè versus caput, quàm pedes feratur, conducunt Epithemata ex tepidis animalium carnibus, aut visceribus plantis pedum applicanda.

III. Quando *febris in statu est*, diligenter attendatur naturæ motus, num sit crisis factura, necne? Quare nihil temerè à Medico tentandum. Venæsectio, aut fortis purgatio omnino prohibeantur; postquam vero à sanguinis deflagratione aliquatenus remittitur febrile incendium, & signa coctionis in urina apparent, si modo segnior sit naturæ motus, diaphoresis aut lenis purgatio procuretur; quæ tamen melius & tutius à Medico peraguntur, cum prius natura motu critico materiæ morbificæ seclusionem fuerit aggressa. Quod si omnia sint cruda, & perturbata, urina adhuc turbida, absque sedimento, aut partium secretionem; si vires sint languidæ, pulsus imbecillis; si crisis nulla, aut tantum irrita præcessit, non sine manifesto vitæ periculo, aut sudore, aut cartharsi evacuatio quævis tentatur: quin diutius expectandum est, ut spiritus cruoris se recuperent, materiam excrementitiâ & adustam aliquo modo subigant, & dein paulatim secernant: interim cardiacis temperatis vires refocillentur, immodica sanguinis effervescencia (si adsit) inhibeatur, & debita ejus fermentatio sustentetur; quod revera à coralliis, margaritis & ejusmodi pulveribus optimè perficitur, quæ quidem à viscerum fermentis dissolvuntur, & dein cum sanguine fermentescunt, ejusque motum imbecillem & vacillantem valde restaurant. Interim (natura laborante,) obstacula quævis, & impedimenta removeantur, & præcipuè excrementorum proventus in primis viis congestus crebro enematum usu subducatur.

IV. Qua ratione aut methodo symptomata maximè urgentia tractari debent, non facile erit certis regulis præscribere; quoniam ipsamet eadem aliquando protinus compesci & sedari, interdum citatius promoveri postulant, ac quorum majus quiddam est, alio forsan tempore Naturæ erunt prorsus relinquenda. Horum nonnullis cum remediis demulcentibus & lenitivis, aliis vero cum pharmacia asperiore & irritativa occurri poterit. Interea tamen præceptum in omnibus tenendum sit, ut naturæ vestigiis religiosè instatur, quæ si perperam agat, ejus inordinatio reducenda; si rectè ac vehementer nimis, refrænanda; si vero rectè, ac debito segnius aut debilius operetur, è re erit ut ejus nixus ope medica incitetur, atque adjuvetur.

V. In *febris declinatione*, cum à crisi perfecta natura fuerit morbo superior, res in vado est, nec multum negotii Medico relinquitur: solummodo restat exactam victus rationem proponere, ut sine recidivæ metu cito vires ægri recuperent. Etiam leni purgatione materiæ febrilis reliquias exterminare conducit. Circa victum recidivæ scopulo sæpissimè alliditur, scilicet à præproprio carniū aut cibi fortioris comestū ægri in febrem relabuntur: cum enim viscera sunt debilia, & alimenta (nisi admodum tenuia) non facile coquunt,

cumque & sanguinis crasis sit imbecillior, ut succum nutritium fortio- rem non assimilet, si alterutri quid impropotionatum afferatur, iterum naturæ œconomia pervertitur, & omnia pessum eunt. Quare à carnibus conva- lescentes diu temperent, iisque demum utantur non nisi postquam urina fuerit sanorum similis, neque amplius à frigore turbatur: & quidem tum satius erit à diluto carniū juscūlo incipere, atque dein pedetentim ad alimenta for- tiora ascendere.

V I. Cū à crisi imperfecta res in dubio versatur, & adhuc sub iudice lis est, tunc Medico difficile incumbit pensum. Sedulò attendantur naturæ motus, & vires, num morbo prævalere incipiat, an eidem succumbat. Si cōstionis adsint signa, & vires constent, evacuatio lenis, & tantū per epicrasin erit celebranda. Interim symptomatis maximè urgentibus cum remediis idoneis succurratur, impedimenta quævis tollantur, cardiacis & recta victus ratione (quantum fieri possit) vires sustententur.

V I I. Cum à crisi aut mala, aut nulla omnia in deterius vergunt; cumque de morbi curatione ferè desperat Medicus, eventum ejus suspectum & valde timendum prædicat. Neque tamen nudo prognostico adeo fidendum, ut reli- qua omnia metus occupet; verū adhuc, quantum artis est medicæ, pro sa- lute, conclamata licet, consulatur: symptomatis maximè infestis remedia adhibeantur, spiritus cruoris ferè extincti cardiacis redintegrentur. Cum de sanitate despondemus, vita quamdiu potest proteletur, & saltem Euthanasia procuretur.

Juxta varios febris putridæ typos modò descriptos in promptu esset ægro- tantium historias, & observationes particulares circa curationem factas quam- plurimas subjungere, cum hujusmodi exempla in praxi quotidiana passim oc- currant, ita ut ingens volumen implere sufficerent: ex his tamen paucula quæ- dam singulas febris prædictæ species respicientia, quibus earum doctrina atque medendi methodus superius tradita elucescant, candidi Lectoris bona cum- venia breviter proponam.

Nobilis matrona 50. circiter annos nata, gracili corporis habitu, statura humili, facie rubicunda prædita, cum Junii die decimoquinto ob æstivum ca- lorem vestes solito tenuiores indueret, vesperi malè habuit; inde nausea, & oppressione ventriculi afficitur, dolores sentit vagos, modò in scapula, modò in dorso urgentes; sitibunda, sine calore tamen immodico: die secundo, & tertio ferè ad eundem modum; die quarto post vomitorium, scilicet infus. croci metal. i. unc. exhibitum, quater evomuit bilem flavam, ac ter alvo so- luta alleviari visa est; nocte insequenti aliquantò melius dormivit: die au- tem proximo, febre per totum accensa, de siti, præcordiorum æstu, & do- lore modò in latere, modò in dorso quærebat: protinus sanguis mittebatur: ad 8. unc. erat urina rubedinis valdè saturatæ, opaca, & turbida, sine hypo- stasi, aut contentorum subsidentia; pulsus inæqualis, & sæpe intermittens; nox insequuta insomnis: die morbi sexto, primo manè erupit sudor exiguus, unde calor nonnihil sedatior, qui vesperi iterum intenditur: die septimo calor valde acutus, cum siti, æstu, pulsu inordinato, & intermittente, necnon summa inquietudine & jactatione totius corporis. Octavo symptomata erant nonnihil remissiora; etiam in urina hypostaseos vestigia quædam. Cepit isto die

die serum lactis cum foliis ulmariae incoctis : copiosè sudavit , & febris judicata est. Toto ægrotationis tempore pro victu tantùm exhibebantur cervisia tenuis , serum lactis , decocta hordeacea , aut avenacea. Enemata erant crebrius ; potus & julepia refrigerantia pro libitu concedebantur.

Illustris hæc fœmina à πυκνώσει, seu transpiratione præpedita , in synochum putrem incidit : effluvia per cutim evaporare solita intus retenta (unà cum bile è vasis choledochis exundante) partim visceribus affixa eorum crasses everterunt , & imprimis stomacho molestias fecerunt ; partim musculis & membranis suffusa dolores & spasmos ciebant. Erat pulsus inæqualis & intermittens , non propter morbi malignitatem , prout in peste , verùm ob idio-crasiam quandam cordis , quâ nimirum fermento ejus non benè constituto , sanguis effervescens non statim æquabiliter accenditur , & totus exsilit , sed pars cruoris influentis primò exigua , dein major , & post aliquot vices maxima in sinibus cordis pro momento temporis restitans , pulsum inæqualem & intermittentem producit. Novi in pluribus aliis planè similem pulsus affectionem : quamdiu scilicet ab intemperie fuerunt immunes , pulsus erat omninò æqualis , & ordinatus ; sin verò subitâ animi passione aut corporis agitatione nimîâ solito intensiùs incalescerent , statim pulsu inæquali , & intra vibrationes forsan 4.7.10. aut 20. intermittente afficiebantur ; & quotiescunque febricitarent , pulsus irregulari modo ita se habuit. Cùm nondum habitualis ista circa pulsum anomalia experientiâ crebrâ mihi innotuerit , solebam usque malignitatem in morbo suspicari , & eventum funestum angurari , qui secus evenit.

Die quinto in hac ægra febris , licèt tardiùs accensa , ad augmentum pervenit , indeque celeriori motu reliqua pertransiit stadia : sexto materiæ adustæ ad plenitudinem assurgens diaphoresi obortâ , levis depletio , adeoque æstus febrilis quædam remissio insequuta est : die septimo materies ista adusta ad summum incrementum assurgens morbi *statum* fecit , cui demùm in octavo cum omnibus ad bonam *crisin* requisitis sudor copiosus successit , & febrim perfectè judicavit : quippe evacuationem hanc criticam (uti fieri debuit) hæc tria præcesserant. *Primò* scilicet sanguinis plena , & sufficiens deflagratio , uti constabat ex calore intensissimo , & planè igneo , per tres antea dies continuato. *Secundò* item materiæ adustæ ad plenitudinem congestio , prout colligere erat ex summa inquietudine & jactatione in nocte præcedenti ; ac *dein* ejusdem materiæ pepasmus quidam & secretio in sanguine incepta , quod symptomatum sedatio & in urina coctionis signa ostendebant : quare sudor copiosus πυκνώσει tam laudabili superveniens , quamdiu abfuerit malignitatis suspicio , nil nisi bonum portendit.

Sub initium æstatis *Anni* 1656. vir Clarissimus , habitu corporis athletico præditus , sine causa manifesta (nisi quod rei literariæ studio addictissimus nullo insuper exercitio uteretur) malè habuit. Primò de nausea , in appetentia cum immani cephalalgia querebatur : die secundo modò rigore , modò calore identidem reciprocantibus , siti insuper & præcordiorum æstu , cum linguæ scabritie , & sapore ingrato afficiebatur. Isto die sumpsit liquoris emetici 10. drach. à quo septies evomuit , rejecitque bilis flavæ copiam ingentem , & quatuor habuit sedes : nox inquieta , & ferè insomnis insequuta est,

in qua æger calore adauſto intenſius febricitavit. Die tertio cùm ſymptoma-
ta prædicta ingraveſcerent, ſanguis ad 10. unc. mittebatur: fuit urina ru-
bicunda, craſſa, cum ſedimento copioſo; pulſus citatus & vehemens: no-
ctu parum ſudavit, cum ſomno brevi, ſed perturbato: manè ſequenti pa-
rum alleviari viſus eſt; veſperi tamen omnia exacerbabantur, cum vigiliis,
calore ac ſiti intenſiſſimis. Die quinto à levi ſudore æſtus nonnihil remiſit,
qui tamen ſolitâ atrociâ paulò ante veſperam rediit: nox iterum inſomnis
cum jactatione corporis ferè continua; mane à diaphoreſi blandicula ſenſit
parum levaminis, veſperi rursus omnium exacerbatio ſequuta eſt: nox etiam
fuit valdè inquieta. Circa initium diei ſequentis ſudor uti priùs ſucceſſit, &
paulò in majori copia: hoc die fuit ^{potius} manifesta verſus ſalutem; calor &
ſitis paulatim deſerveſcebant; fuit urina minus rubicunda cum aliquali hy-
poſtaſi; deinceps per tres dies febris ſenſim declinabat: qualibet tamen no-
cte paroxyſmum quendam, remiſſiorem verò quàm priùs habuit: die 11.
uberius ſudavit, & perfectè judicatus eſt. Toto ægrotationis tempore victur
parciſſimo utebatur, utpote nihil alimenti capeſſens præter cerviſiam te-
nuem, & ſerum lactis cum ea paratum. Potus & julepia refrigerantia ex de-
cocto hordei, & aquis ſtillatitiis aliquoties ſumebat: quotidie ſi alvus non
ſponte ſolveretur, clyſter emolliens fuit injectus: nullo præterea pharmaco,
ſcilicet nec cathartico, nec cardiaco uſus eſt. Febre autem ſedata, fuit bis pur-
gatus, & dein citò convaluit.

Fuit hæc febris ſynochus putrida, prout ex rigore circa initia, & deinde
calore continuo, aut vigiliis, aliſque ſymptomatis per plures dies graviter
infeſtantibus conjicere licebit: quatenus verò intemperies iſta qualibet nocte
exacerbabatur, dicenda erit continua quotidiana. Sine cauſa evidenti hic
morbus primos inſultus fecit, quia ſanguis minùs eventilatus, veluti vinum
ſponte efferveſcens, à ſulphure exaltato ardorem conceperat. Bilis vaſiſcho-
ledochis exundans, unaque ſanguinis æſtuantis purgamenta interiùs ſuffuſa
(uti in febris plerumque aſſolet) ſtatim in primis viis magnas moleſtias,
& inordinationes ciebant. Propter materiæ excrementitiæ hac ratione ibi-
dem congeſtæ depletionem, mox ab initio vomitionem procuravi; quæ ta-
men evacuatio, uti & per alvi ſeceſſum fortior purgatio, ſi febre per totum
accenſa adhibeantur, quia ſanguinem nimis exagitant, & materiæ febrilis
aduſtæ coctionem valdè perturbant, exinde plus damni agris quàm commo-
di plerumque adferunt. Primum hujus morbi ſtadium, ſcilicet dum totus
cruor incendio corripereſceretur, ad diem tertiam extendebatur; atque deinceps
cum ſanguis deſſagrans recrementis aduſtis aggravaretur, major ejus ebul-
litio cum crebro per diaphoreſin expulſionis nixu inſequuta eſt. Die ſepti-
mo, quando cruor maxima ex parte deſſagraverat, & recrementa aduſta in
ſinu ejus ad turgelcentiæ plenitudinem congeſta moleſta eſſe cœperant, mo-
tus criticus ciebatur: quo tamen, materie iſthac nondum penitus ſubacta,
hec ad ſecretionem parata, morbus haud perfectè judicatus eſt; quin poſt
alteram periodum eadem denuò ſuccreſcens, & die undecimo commotâ ſan-
guini turgelcentiam alteram, & perfectè judicatoriam induxit. Diebus in-
tercalaribus, quia præter recrementa à deſſagatione ſanguinis reſidua, &
in criſin reſervata, etiam à ſucco nutritio haud ſtatim incendio correpto, ſed
peculiari

peculiari modo depravato altera in cruoris sinu materies ad turgescendum apta congereretur; idcirco à quotidiano hujus incremento, & fluore febris huic continuæ paroxysmi (quales intermittentium esse solent) statis diebus ac horis accesserunt.

Juvenis studiosus in ætate 25. circiter annorum, vultus luridi, & temperamenti melancholici, sine manifesta occasione, Augusto 1656. agrotare cœpit. Primo de intemperie febrili, cum siti, lassitudine spontanea, & inappetentia querebatur: die secundo insuper de dolore in latere dextro, & distentione utriusque hypochondrii, item vomitu ferè continuo, vigiliis & immani capitis dolore: die tertio Medico accersito, illico sanguis ad uncias 12. mittebatur; vesperi magis incaluit, & deliravit; postea sudore, licet exiguo, succedente, mane proximo melius habuit: die quarto iterum ingesta quævis statim rejecit, item continuo ferè vomendi nixu tentabatur. Vomitorii exhibitionem à Medico propositam, tum æger, tum amici periculo prius edocti renuerunt. Ab enemate injecto sex habuit sedes, & parum alleviari visus est; etiam nocte insequenti aliquantulum dormivit: die quinto iterum vomitio crebra cum siti intolerabili adfuit: intus æstuabat, sed caloris immodici sensus exterius haud tactu perceptibilis erat; quoniam cruoris effervescentis recrementa quæ per cutem exhalare debuerant, intus restagnare, & in viscera exundare videbantur. Ideo vesperi ad provocandam diaphoresin hic bolus exhibetur. Conserv. Rosar. vitriolat. 1. drach. pulv. Gasconici 1. scrup. Laudani soluti in aqua meliss. 1. gr. Ista nocte mediocriter dormivit, & à sudore copioso succedente symptomata mitigari visa: nihilominus die sexto cuncta iterum exacerbari; calor in toto, sitis & præcordiorum æstus immaniter urgere: die septimo & octavo pulsus erat inæqualis & inordinatus, plerumque delirè loquebatur: & si in lecto commoveretur, crebro in syncope incidit. Die nono eadem restabant symptomata; insuper tendinum in carpis contractione, aliarumque partium motibus convulsivis tentabatur, ut penè de salute desperaremus. Isto mane quoniam natura victas manus tradidisse visa est, quantum erat artis, succurrendum restabat: quare diaphoresin copiosam velut ultimum refugium intendens Sp. C. cervi 1. drach. in haustulo Julepii cardiaci una vice propinavi; exinde per quatuor horas valde inquietus & furibundus vix in lecto contineri potuit: postea tamen somno obrepente plurimum sudavit, & res extra periculi aleam subito constitit. Nocte insequenti pro continuanda diaphoresi, quibuslibet sex horis dosin pulveris contrayervæ exhibendam præcepi; & febris & affectiones nervosi generis brevi cessabant, & æger convaluit.

Hæc febris quoad typi rationem synochus putrida appellatur, quæ in hoc agro à sanguine instar fœni incaléscentis sponte effervescente, adeoque fermentationem immodicam concipiente originem sumebat: propter sanguinis temperiem melancholicam fuit calor minùs intensus, licet symptomata aliàs pejora, atque imprimis nervoso generi inimica obtigerint: etenim cruor deflagrans, velut ignis in fumo cespitibus cooperto, incendio potissimum intestino gliscebatur: idcirco de præcordiorum æstu cum siti intolerabili æger conquestus est, cum interim exteriora minùs incaléscent: ob hanc rationem, & quoniam corpus fuit minùs perspirabile, sanguinis recrementa adusta.

crisin factura, & quæ stasis temporibus exterius diffilari solebant, introrsum suffusa (naturâ scilicet valdè oppressâ & perpetuò irritatâ) vomitus immanes, & ferè continuos induxerunt; quare cùm materia febrilis ante plenitudinem aut coctionem ejus ita crebro expulsionis nixu ad primas vias derivaretur, crisis minimè insequuta est. Nec ab irregulari ista evacuatione æger se melius habuit, quinimò sanguis mixtione usque deterior factus, in se corrumpi, & liquorem nervosum omninò pervertere incœperat: unde præter vomitiones assiduas crebræ lipothymia, pulsus inæqualis, necnon deliria & motus convulsivi oriebantur: quatenus verò utriusque humoris mixtione & crasi nondum penitus solutis aut everfis diaphoreticum fuit exhibitum, quod pro insigni partium agilitate & cruorem, & liquorem nervosum certissimè trajece- rit, eorumque impuritates & extraneas mixturas, fermentatione vegetâ & festinâ de novo concitatâ, foras eliminavit, status morbi ad exitum tendens versùs salutem reducebatur, atque hoc modo in criscos naturalis vicem medicinæ ope succenturiatâ, æger velut ab inferis revocatus brevi sanitatem recuperabat.

Mulier in ætate 30. circiter annorum, corpore robusto, & temperamento atrabiliario (uti ex moribus valde austeris conjicere licebat) prædita, tertio post puerperium mense, cùm noctu infantem lactaret, stragulis discooperta frigus contraxit, & deinde statim in rigorem incidit; huic calor solito auctior successit, qui postea (diaphoresi leni obortâ) citò remisit. Die secundo & tertio erat sitibunda, ac cibi inappetens, sine æstu tamen immodico, ut vixdum se febricitare crederet: qualibet nocte quieta jacuit, verum somni omnino expers: urina erat intensè rubicunda, à contentorum multitudine nonnihil spissa & opaca, quæ tamen à frigore minimè turbata, sine hypostasi aut partium subsidentia usque eodem modo perstitit. Die quarto calor in toto accenditur; quare Medico tunc primùm accersito, sanguinis circiter 12. unc. è brachio detrahebantur: post sanguinis missionem, & alvum eodem die à clystere immisso copiosè subductam vesperi in sudorem incidit, à quo tamen minimè alleviata (medicamento licet anodyno exhibito) noctem (uti priùs) insomnem duxit. Die quinto ab enemate injecto tres habuit sedes, & levamen sensit: urina usque eadem perstitit, rubicunda & turbida. Cùm sanguinem è vena poplitis mitti in præscripto esset, ægrotâ obnixè renuit, se convalescere existimans: noctu insequenti cùm diu insomnis & inquieta jacuisset, tandem *paroxysmum*, qualis vulgò hystericus perhibetur, gravi modo passa est; & primò stupore quodam, sive punctiōis sensu extremas corporis partes (præcipuè pedes, crura & femora) occupante, simulque flatu intestina, ventriculum & hypochondria immaniter distendente afficiebatur: sensit in imo ventre velut molem quandam sursum obrepere; quæ cùm ad cor, indeque ad cerebrum ascendisset, ægra statim intellectu vacillabat, & per totam exinde noctem delira & absurda loquens jacuit. Die sexto post alvum à clystere subductam ad se rediit, rectè animo constabat, & mediocriter habuisse visa est. Vesperi autem, cùm in lecto commoveretur, ejusmodi (ut priùs) *paroxysmi* insultum persentiscere cœpit; nimirum in toto corpore habuit punctiōis sensum, veluti si urticis stimuletur, simulque in ventre velut globum convolutum, qui sursum obrepens intestina & ventriculum

ventriculum distendebat, ut exinde flatus & ructus copiosi ederentur. Levaminis gratia aquæ frigida potum postulabat. Insuper remedia in affectibus hystericeis usitata, uti castoreum, odor assæ foetida, suffitus è plumis ustis, ligaturæ, & frictiones crurum, & similia adhibita sunt, quorum usu in præsens videbatur affectu prædicto libera, & prorsus immunis facta per horas quatuor: cum autem supina in lecto decubuit, ut somno capessendo se accingeret, derepente totum corpus eadem symptomata simul pervadere conquesta est, & mox inde in delirium incidit: tota nocte insomnis ejulans & clamans delirè loquebatur; die sequenti oculis apertis sine motu aut loquela jacuit. Vespero iterum cum febre aucta fuit ægra furibunda, ut vix in lecto contineretur; atque ita per tres dies, modò delira, clamans & ejulans, modò velut stupida sine motu aut voce perstitit; usque tamen motibus convulsivis circa musculorum tendines percellabatur. Die decimo respirationem altam & anhelosam cum pulsu debili & velut formicante duxit, media nocte obiit.

Erat hæc febris è putridarum censu, quæ tamen ob diathesin sanguinis atrabiliariam (uti supra innuitur) haud multum incendio, seu calore ingravescerebat; attamen solutu difficilior, etiam cerebro & nervoso generi fuit plurimum infesta: sanguis ad effervesendum prædispositus à frigore suscepto facile intemperiem contraxit; verumtamen à sale & sæculentiis terrestribus unà cum sulphure commotis minùs apertè inflammabatur: nihilominus incendio intestino & velut clauso ardescens insigniùs depravabatur: hinc statim ab initio urina erat summè rubicunda & turbida; etiam omninò insomnis degerebat: die quinto sanguis deflagrans, & recrementis, seu materia adusta satur, plenitudine sua ad excretionem moliendam irritabatur; quare isthac nocte turgescencia oborta sarcinam suam sudore minus difflabilem in caput transfert, ibidemque cerebro & nervorum generi affigit: inde statim spirituum animalium irradiatione solita in ipso fonte perturbata, eorum inordinationes in extremis partibus primò sentiri accidit: quare punctio aderat in toto corpore, venter inflatus, hypochondria distenta, & velut moles quædam sursum ascendens & successivè ventrem, præcordia, & demum caput pervadens: hujusmodi enim symptomata non semper (uti vulgò creditur) à vaporibus ab utero elatis & sursum contendentibus oriuntur; verum non rarò à cerebro & nervorum principiis maximè affectis: cum enim labe ibidem infligitur, ut spiritus animales juxta originem suam in motu perturbentur, nec (uti prius:) corpora nervosa inflent ac distendant, statim spiritus alii in nervorum extremitatibus siti influxu solito privati, tumultuari incipiunt, & inordinate ac versus principia sua commoti, partibus quibus insident spasmos inducunt: hic motus irregularis & convulsivus in extremitatibus inceptus, continuò spirituum, & partium nervosarum ductu, mox in partes alias, & deinde alias usque cerebro propiores serpit; donec tandem (tota spirituum, velut militum, serie successivè in retrocessum acta) spasmi in ipsum motus fontem continuantur. Quod reverà hoc ritu motus convulsivi diffitissimè à causa, seu affectus loco aliquando incipiunt, hoc unico argumento planum fiet; quoties scilicet in crure aut brachio ligatura strictiori, aut incubatu influxus spirituum animalium inhibetur, punctiois sensus, sive spasmus cum stupore, primò in pede aut manu sentitur, qui

postea

postea successivè versus partem affectam altius ascendit : quare in hac ægra ob materiam febrilem (scilicet recrementa adusta) è cruoris sinu metastasi critica in cerebro defixam , atque illic nervorum principia obsidentem , symptomata ista affectionem hysterica imitantia ciebantur : propter nervos (qui mediante spinali medulla per totum corpus disperguntur) juxta originem affectos , punctiōis sensus in extremis inceptus mox in toto percipitur. Ob sexti paris similem in fonte læsionem , primo in furculis ejus dissitissimis (nimirum circa abdomen) spasmi & distentiones oriebantur : fuit iste velut molis cujusdam ascensus solummodo viscerum & musculorum abdominis à spasma successivè inflatorum tumefactio ; deinde eodem affectu (mediante ejusdem sexti paris ramo) superius usque & propius cerebrum perreptante, videbantur præcordia , & dein caput ipsum (velut à vapore quodam ab inferioribus sursum elato) corripī : die proximo , cum materia hæc febrilis primo leviter cerebro infixa à cruore denuo refarciretur , symptomata prædicta ad tempus cessabant ; dein brevi posthac (sanguine iterum efflorescente & incrementa sua rursus in cerebro deponente) ejusmodi , uti prius , affectionem ingruere hæc ægra persentiscit ; quæ tamen frictionibus, fœtentium odore , aliisque remediis in passione hysterica usitatis per quatuor horas ab insultu retardabatur ; quatenus nimirum spiritus animales ab externo objecto laceßiti, & in motum violentum irritati impedirentur , ne motus convulsivos ita subito conciperent : postea vero cum ista spirituum incitatio exterius adhibita cessaret, urgente adhuc causa morbifica , spiritus isti graviter obsessi non successivè ab extremitatibus incipiendo (uti prius) sed derrepente omnes tum in cerebro , tum in nervosa appendice unà in confusionem aguntur. Crisi ad hunc modum tentata , scilicet materiæ febrilis ad cerebrum translatione , morbi eventus tum in hac ægra, tum in aliis, quorum ægritudines diligenter observavi , plerumque funestus successit. Etenim sanguis , nisi valde depravatus & impeditus, depurationem suam tali crisi vix unquam molitur : & quotiescumque hoc modo excretionem satagit , cerebro & nervoso generali labem nec cito , nec facilè delebilem infligit : etiam ipsa cruoris massa rarè admodum talis efflorescentiæ motu à materiæ febrilis impura mixtione immunis redditur.

Juvenis eruditus, gracilis habitus , & pallidi vultus, ineunte vere , nullius errati circa victum conscius , queri cœpit de lassitudine & impotentia ad ambulandum , etiam de capitis torpore & somnolentia : die secundo insuper siti , inappetentia , & præcordiorum æstu torquebatur : die tertio Medico accersito vomitorium sumebat , à quo cum ter evomuerat , & quinquies biliosa & calida dejecerat , nonnihil alacrior factus est , & nocte insequenti mediocriter dormivit : die quarto fuit stillicidium sanguinis in exigua quantitate ; dein sitis & calor plurimum aucti : erat urina rubicunda cum sedimento copioso , & aliquali hypostasi. Quoniam autem post signa coctionis in urinis apparebat naturæ veluti oppressæ ad excernendum conatus sine evacuatione sufficienti , ideo sanguis ad 7. unc. mittebatur , & exinde plurimum alleviari visus est ; vesperi tamen omnia exacerbabantur , & exinde per tres dies febris que intendi videbatur. Die septimo de gravi torpore in capite , & caligine hyersante querebatur : post meridiem hæmorrhagia copiosissimè successit

cessit, ut præ immenso sanguinis dispendio æger ferè viribus exsolveretur, atque opis medicæ pro sanguine sistendo maxima incumberet necessitas: in hunc finem cum venæ sectio in brachio, ligaturæ, epithemata, tum capiti, tum imo ventri adhibita, & quamplurima alia remedia (urgente præcipiti medendi occasione) à quibuscumque præscripta incassum tentabantur; tandem mulieris illuc casu occurrentis suasu, nari stillanti ferrum ignitum admovebatur, & derepente à vapore sanguinis torrefacti in nares suscepto istius fluxus sistebatur; hoc medium postea in plerisque bono cum successu usurpatum novi. Copiosâ istâ hæmorrhagiâ febris continua judicata est; cui tamen intermittens *quotidiana* successit, quæ postea juxta medendi methodum superius traditam brevi curata est.

Hæc febris sine manifesta occasione incipiens, ac per plures dies cum siti & calore continuata, erit synochus putrida dicenda; quæ tamen sine quovis horrendo circa initium aut statum symptomate, facili decursu licet crisi demum periculosa, & difficili, judicata est: huic sanguinis verno tempore turgescencia, simulque in eodem ventilationis defectus originem præbuerunt: cruor incendio febrili deflagrans circa diem quartum aliquantulum materiæ adustæ congesserat, ut efflorescens motum criticum (hæmorrhagiâ licet exiguâ) tentaret: evacuationis plenioris defectum venæ sectio pro tempore supplevit; postea recrementis adustis in magna copia congestis, iisdem in corpore non benè perspirabili per diaphoresin minùs diffilari aptis, quo tempore natura erat crisin molitura, hæmorrhagia ingens sequuta est. Cum enim sanguis ob materiæ febrilis seclusionem motu critico agitur, ejus particulæ quamplurimæ à mixtione solvuntur, ita ut turgescentiâ majori citatâ quodvis extraneum ipsis confusum eliminant: si hoc tempore cutis spiracula minùs pateant, cruoris massa (velut mustum utri strictioris orificii inclusum) usque insigniùs turgescit; & quia materiam febrilem per sudorem excutere nequit, unâ cum ipso, quâ datâ portâ se foras proripit; quare cum per vasa in apertura narium dehiscencia sanguini ebullienti facillimus pateat exitus, è ductu isto (instar ejusdem musti quando vas aperitur) spumosa rarefactione ampliatus copiosè exsilit. Febre continuâ hoc modo solutâ, *quotidiana* intermittens successit, quia post longam sanguinis deflagrationem, ejusque ingens dispendium, qui residuus erat cruor spiritu plurimùm orbatus, ac sale cum relicto *sulphure* perassato ejusmodi diathesin facile contrahebat, quâ succum alibilem haud ritè coquere, sed in materiam usque fermentativam pervertere aptus fuerit.

Matrona sexagenaria cum linteis non satis à madore exsiccatis lecto instratis quadam nocte discubisset, malè habere cœpit: primò afficiebatur catarrho suffocativo, ut præ serosa colluvie in laryngem exsudante, vix ei respirare, nedum dormire licuisset: postridie nausea & inappetentia, cum aliquali siti & caloris excessu suborta est: die tertio dolor acutus in latere, cum tussi & febre aucta invasit: urina fuit rubicunda & clara, cum hypostasi laudabili; pulsus inæqualis, & intermittens. Medico vocato sanguis ad 10. unc. detrahebatur, etiam isto die ab enemate immisso alvus copiosè soluta est: sub noctem dolor evanuit, & mediocriter dormivit; urina tunc erat rubicunda, turbida, & contentis saturata: die quarto febris nonnihil

auctior : vesperi tussis valdè molesta, succedente mox dolore acuto (ut priùs) in eodem latere : urina iterum clara, cum hypostasi : dolor à sanguinis missione denuò celebrata brevi cessavit. Die quinto febris remissior, nox tamen inquieta, cum calore & jactatione corporis, verùm sine dolore. Mane proximo copiosè sudavit, & alleviata est; dein victu adhuc tenui per aliquot dies usa, & semel purgata, sine recidiva convaluit. Observatione dignum fuit, quod urgente dolore, urina erat clara, & cum hypostasi, nec à frigore turbata; quæ tamen, eodem sedato, statim crassa, magisque rubicunda, & contentis saturata evasit.

Hic morbus propter acutum lateris dolorem, velut symptoma pathognomonicum, pleuritis dicitur; verùm hîc febrem habemus dolori præcedentem, & minimè ipsius productum. Ægritudinis causa evidens fuit à pororum constrictione transpiratio impedita. Propter effluvia retenta sanguis effervescens, simulque seroso latice nimis scatens, plurimùm ejus ex arteriis in laryngem terminatis quasi evomens, catarrhi suffocativi sensum inferebat; etenim hujusmodi affectus (uti & tussis cum sputo copioso) minimè oriuntur, eo quod humor aquosus (prout vulgò perhibetur) è capite in guttur & pulmones depluit; sed quia latex serosus modò è vasis pneumonicis immediate in pulmones suffunditur, modò arteriis in laryngem dehiscenibus exsudans in pectus decumbit. Die tertio ab eodem humore seroso cum portione sanguinis in latere defixo dolor acutus oriebatur; etenim sanguis effervescere incipiens, cum adhuc in se materiam à succo alibili degenerem, crudam, & (uti videtur) acidiusculam contineret, eandem (quia foras per diaphoresin rejicere nequiret) lustratione propiori per arterias intercostales in membranam costas succingentem deposuit; atque illic (uti semper in pleuritide assolet) sive coagulatione, (quod suspicari fas sit) sive vasorum obturatione sanguis eadem materiâ implicitus in motu sistitur; dein novi usque sanguinis appulsu mole auctus solutionem continui, adeoque dolorem acutum inferebat. Quod in hac ægra ejusmodi materies sanguinis massam perturbans, cum portione ejus extravasati circa pleuram defigeretur, exinde constabat, quoniam urgente dolore urina erat clara & contentis minimè saturata: dein cum vasa propter phlebotomiam inanita materiam istam priùs è cruore exterminatam, in ejus massam denuò resorberent, urina statim turbida & contentis iterum gravida evasit: pulsus erat inæqualis & intermittens, propter idiocrasiam, quâ nimirum in qualibet intemperie ita se habere solebat: cum enim ante plures annos hanc mulierem febricitantem curarem, pulsus inæqualis & intermittens mihi aliisque circa morbi eventum tristis præsagii metum incusserat; qui tamen eo tempore (uti & in hac ægritudine) sine horrendo quovis symptomate prosperè cessit.

Juvenis robustus & *εὐταγής* circa solstitium æstivum post immodica exercitia, indeque frigus subitaneum calori superveniens malè habuit: primò inappetentiâ, nausæâ, sævo capitis dolore, necnon siti, & calore solito intensiori afficiebatur: die secundo dolor acutus in latere dextro cum tussi & respiratione difficili invasit: sanguine statim è brachio ejusdem lateris copiosè detracto, dolor iste nonnihil remisit; qui tamen vesperi, cum tussi & sputo cruento atrocior factus, rediit. Nox insomnis & valde inquieta successit. Die

tertio sanguis denuò mittebatur; insuper linimenta & fots lateri dolenti applicabantur; pulveres, julepia, & decocta antipleuritica intus sumpta: sub noctem dolor ferè in totum cessavit; dein mox cephalalgia immani cum vertigine æger afficiebatur. Die quarto fuit sanguinis stillicidium è nare dextra ad 2. unc. à quo affectus isti capitis planè cessabant: vesperi autem dolor in latere prius affecto cum majori atrocitate rediit; interim pulsus erat parvus & debilis, ut cum de sanguine mittendo consuleretur, periculum esset ne vires dejectæ tale remedium non admitterent: quare in exigua tantum quantitate phlebotomia celebrata, fotum & cataplasmata lateri diligenter applicari, insuper spiritus c. cervi guttas 20. in cochleari julepii cardiaci propinari, idemque sex horarum intervallo continuo repeti præscribitur: sudavit ista nocte copiosè, & dolor plurimum remisit; sputum erat parvum, cruore interspersum, quod intra diem (dolore etiam sensim evanescente) omnino cessavit. Cepit æger bis in die ejusdem spir. c. c. i. scrup. & sine recidiva intra paucos die integrè convaluit.

Fuit hæc febris synochus simplex à causa evidenti, scilicet pororum constrictione, excitata: quamcitò cruor recrementis adustis nonnihil saturari, adeoque magis turgescere cœpit, materies quæ secerni debuerat, propter peculiarem ejus labem in pleuram transfertur, ibidemque defixa sanguinem sibi adscitum coagulari, ideoque circuitu sisti, & cum à venis minus exciperetur, statim extravasari cœgit: hinc dolor acutus in latere, & sputum cruentum mox ab initio hujus morbi acciderunt: dein postea eadem materies foco isto quem adsciverat depulsa, & in cruoris massam resorpta in capite defigitur, atque illic similem cruoris stagnationem, & (uti probabile est) coagulationem inducens, vertiginem cum atroci dolore inferebat; qui tamen affectus (hæmorrhagia ob sanguinem extravasatum oborta) brevi solvebatur. Parte materiæ morbificæ hoc modo detracta, pars altera à sanguine resumpta denuo ad focum usitatum (scilicet latus prius affectum) convehitur, ubi deposita laticem suum (scilicet cruoris portionem) rursus coagulat, & extravasari cogit: etenim dolor iste cum sputo cruento die quarto renovatus, à sanguinis ebullitione nimia, ideoque è vasis exundantia provenire nequibat; quoniam isto tempore pulsus erat parvus & debilis cum vasorum concidentia, ut reverà cruorem vasis exsudasse putandum sit, eo quod à materia morbifica coagulatus (ideoque licet arteriis expulsus, à venis tamen referri minus habilis) in circuitu sisteretur. Huic dolor acutus succedit, quoniam sanguis crebro appulsu congestus, & in tumorem elevatus continui solutionem fecit. Etiam mox ab initio sputum cruentum supervenit, quia sanguis intus in corpore alicubi in motu cohibitus, ob tenerrima & facilè patentia vasorum oscula in cavitates exsudat; cum eidem exterius extravasato, propter cutim densiorem & obserata vasorum oscula, non nisi in abscessum facto & suppurato patefiat exitus. Venæsectio in pleuritide incipiente prodest, eo quod sanguinem alicubi in circuitu præpeditum à nimia effervescencia cohibet; præcipuè autem quia cum vasa hac ratione valde deplentur, humores quoscumque prius exterminatos, adeoque sanguinem in parte affecta stagnare inceptum denuo excipiunt, & fluxilem reddunt. Etiam remedia circa initium hujus morbi maximè juvantia sunt ejusmodi quæ sanguinis coagulationem impediunt, aut inter

coagulandum dissolvunt; qualia sunt quæ sale volatili aut alchalisato plurimum abundant, nimirum spiritus fuliginis, sanguinis, c. cervi; item spiritus & sal urinæ, pulvis è chelis aut oculis cancerorum, è dente aprugno, aut mandibula piscis lucii, egregii sunt usus. Inter vulgares mos est infusionem stercoris equini propinare; quod equidem medicamentum in casibus, ferè deploratis non rarò opem contulisse novi. Interim acida quæcumque, quia sanguinem plus coagulant, & expectorationem impediunt, in hoc morbo summè lædunt.

C A P U T XII.

De febre maligna, sive pestilentiali in genere.

PRæter febrem continuam, qualis supra describitur, quæque ob principium aliquod sanguinis nimis evectum, & cæteris improporionatum exoritur, datur altera hujus species, quæ propter sanguinem miasmate venenato tactum, ideoque varias coagulationes, & corruptiones subire habilem concitatur: in qua non solum spiritus & sulphur, velut in febre putrida, impetum faciunt, & sanguinem immodicè effervere cogunt, verùm insuper cruoris mixtio statim dissolvitur, ejusque liquor in partes facessit, adeoque horrenda symptomata cum manifesto vitæ periculo in hujusmodi affectione inducuntur. Sub hoc censu *febres malignas, pestilentes, pestem, variolas, & morbillos* comprehendimus, de quibus in præsentī agendum restat.

Morbi pestilentes adeo in tenebris grassantur, & ignotam ducunt originem, ut eorum causæ, & essentia sine recurſu ad occultas qualitates rarò explicentur. Unanimi omnium consensu horum vires & potentia in materia venenata collocantur; quoniam ab affectu pestilenti, non secus ac ab epoto veneno, vires subito prosterni, vitamque brevi profligatam cernimus. Ideoque pro explicanda pestilentia natura non abs re fuerit, primum inquirere de *veneno* in genere, & quo ritu corpora nostra afficiat; dein ostendere, quale venenum in *iste* & *morbis contagiosis* dispergatur: quibus præmissis de affectibus modò citatis speciatiim dicemus.

Veneni nomen meretur quicquid in corpus nostrum impingens, temperiem, & actiones cujusvis partis, aut totius occulto modo & vehementer lædit, spiritus profligat, aut eorum motus pervertit, liquorum mixtiones solvit, coagulationes, & corruptiones inducit, viscerum fermenta, & functiones destruit, adeoque subito, & latenter vitæ periculum adducit. Eorum quæ hoc modo nobis insidiantur, in rerum natura subest ingens copia, & proventus valde optimus: sæpe intus in corpore nostro gignuntur, exterius ab omni plaga è quovis terræ, aquæ, & aëris tractu abundè suppeditantur: è distinctis Mineralium, Vegetabilium, & Animalium familiis quotidie emergunt; adeoque alimentis, imò medicinæ nostræ sese immiscent, ut cum Plinio quæramur, *quod non sit facere, an rerum natura largius mala, an remedia genuerit.*

Sicut magna est venenorum varietas, ita quoad subjecta & lædendi modos non minor est eorum diversitas: nam licet plurima venenata tota substantia nobis perhibentur contraria, ut quodvis adoriantur, & feralis instar ignis, vi caustica velut in cineres redigant; tamen ex his nonnulla peculiari noxæ stimulo donata plus uni parti, aut substantiæ nocent, quàm alteri. Subjecta, quibus proximè, & immediatius veneni labes infligitur, duplicia assignamus: nimirum *spiritus animales*, seu liquorem spirituosum, subtilem, in cerebro & nervoso genere scatentem; & *sanguinem* in vasis & corde fluxilem. Quando obiectum alteri tantum, aut simul utrisque improporcionatum offertur, ut exinde liquorum, aut partium continentium crasis evertatur, quo functiones muniis vitæ & sensus obeundis necessariæ inhibeantur, idque latenter, ac velut ex improvviso fiat, hujusmodi effectus veneno ascribimus.

Corpora nervosa cum spiritu animali haud prorsus eodem modo à quibuscumque venenis impetuntur; modo enim cum stupore, modo spasminis & motibus convulsivis, iisque diversi generis, & moris tentantur. Morsus Tarantulæ choream infert; à torpedine per tridentem, aut retium funiculos vis transmissa manum piscatoris stupefacit. Pastinacæ sylvestris radices, aut lolii semina comesta homines insanire faciunt. Opium, Mandragora, Hyoscyamus, & similia somnum altum, & aliquando lethalem accersunt. Hæc, & pleraque alia sine insigni sanguinis perturbatione, aut noxa cordi illata, facultati, seu *spiritui animali* virus præcipuè imprimunt.

Sunt etiam toxica nonnulla, quæ *massæ cruoris* malignitatem suam potissimum insinuant. Quare à pharmacis quibusdam icteritia flava, aut nigra, modo elephantiasis, affectus leprosi, aut intumescentiæ totius corporis producuntur. Vapores à cryptis subterraneis erumpentes, etiam à carbonibus recens accensis, non raro Spiritus vitales suffocantes, unà sanguinem congelant, ac in motu sistunt, quominus in corde vitæ flamma perenneretur. Quanta cruoris massæ à miasmate *venoso* corruptio impertiatur, è maculis, & exanthematis (quæ sunt velut sanguinis siderati stygmata) cuiusvis perspicuum est.

Si noxa alterutri, scilicet *cordis*, aut *cerebri* regimini, primo inflictu sit levior, sine magna alterius offensa plerumque absolvitur. Quare motus convulsivi, stupor, lethargus, melancholia, affectiones paralyticæ, cum pulsu laudabili, & sine immodica sanguinis effervescentia non raro incipiunt; & deinde, si affectus non invaleseat, sensim finiuntur, ac cessant. Alia prostant venena, quæ sæpe cruorem depravant, ejusque mixtionem dissolvendo corrumpunt, interim ut functiones animales factæ rectæ persistent. Sin veneni fermentum sit fortius, & altiores radices egerit, statim ab uno in alterius provinciam virus dispergitur: cum enim partes nervosæ succo virulento turgescunt, veneni portio cum latice nervoso per vasa lymphatica in venas reduce, facile in cruoris sinum convehitur, ejusque massam lue qua tumet inquinat: etiam à sanguine veneno graviter tacto succus, quo irrigantur nervi, brevi labem contrahit; hinc rabiosi febricitant, & febre pestilenti correpti sæpissimè delirio, aut phrenitide tentantur. Super his considerare oportet, qualis sit alteratio, sive noxæ impressio, quæ *spiritui animali*, cum *cerebro*, & *appendice nervosa*; qualis item quæ *sanguini*, cum *corde*, & vasis annexis à veneno infligitur. Licet hunc

fiendi modum planè ostendere, ac velut digito monstrare penes humani ingenii solertiam non fit; tamen ratiocinatione, & facta cum aliis affectibus comparatione, hujus notitiam aliqualem consequi poterimus.

Circa prius observamus, quod liquor ille subtilis, sive Spiritus animales, quibus nervosa corpora instantur, & quorum expansione sensus, & motus reciprocas actiones edunt, à tensitate sua, & æquabili expansione facile pervertuntur: cum enim nervi sint mollis texturæ, & Spiritus, qui in iis scatent, substantiæ admodum subtilis, objecta quævis fortia, aut vehementia ferre nequeunt; quare cum aliquid violentum, aut improporcionatum ingruit, ab expansione, & excursu suo sæpe in fugam, & retrocessum, & non rarò in motuum anomalias coguntur: quare subitæ animi passiones eos distrahunt, & in spasmos, ac convulsiones adigunt; quando succus alibilis quo reparantur, nimis acris, acidus, aut austerus suppeditatur, modò paralyses, modò contracturas patiuntur: quod si objectum aliquod magis incongruum (quale venenatum statuimus) offertur, cujus particulæ tali sint ferocia præditæ, aut ejusmodi configurationis, ut cum nervoso liquore impetuosè effervescent, subtiliorem, seu spirituosam ejus portionem huc illuc exagitent, aut prorsus abigant, atque reliquum liquorem aut vi styptica figant, aut ebullitione in motus inordinatos cogant; hinc cerebri, & nervosarum partium malæ affectiones, scilicet modò convulsio, tremor, rigor, modò stupor, aut resolutiones, reliquaque gravioris notæ symptomata oriantur necesse est. Quæ hoc ritu succum nervosum veneno inficiunt, modo sunt crassiora, & solum quando in substantia valde corporea applicantur, noxam infligunt: modò sunt tenuia, & in vaporem aut halitum usque resoluta, è punctulo quodam veneni fermentum per totum nervosum genus suffundunt. Virus interdum rei noxiæ comestum primò in ventriculo tragœdiam inchoat; sæpius nudo contactu in superficie corporis miasma virulentum relinquit, quod facile & citò fermento suo Spiritus per totum dispersos contaminat. Labes extremitatibus nervorum ubivis, sive intus, sive extus inflicta, facili eorundem ductu larius dispergitur, illicò pluribus ejusdem rami furculis in mali consensum adductis. Non rarò levior rei venenatæ contactus è digito, aut membri cujusvis extremitate statim cerebro susceptam communicat labem, indeque in totum corpus, & membra dissitissima retorquetur. Hujus ratio est, quod tum succi nervosi, tum miasmatis cujusdam venenati particulæ sint ita agiles, & motus expediti, ut alterutræ per totam alterius massam citissimè, tanquam luminis radii per medium diaphanum, trajiciant.

2. Quoties sanguis è re venenata noxam contrahit, virus infixum est aut hebes, & minoris activitatis, quod non statim se prodit, nec in fera symptomata erumpit, donec à longo tempore cum tacita fermentatione maturetur, & prius totam sanguinis massam infecerit, uti observare licet in quibusdam venenis, quæ perhibentur ad distans, & non nisi post aliquot menses, aut annos occidere: vel inspirata cruori toxica stimulo multò acutiori imbuuntur, ut ab eorum contagio labes contracta in fera symptomata evestigio erumpat, indeque sequatur modo febrilis effervescencia, cum vomitu, siti & præcordiorum æstu; modo totius intumescencia, cutis discoloratio, sæpe exanthematum & bubonum eruptio, non raro item repentina virium prostratio,

stratio, ita ut subita mors sine tumultu, & ferè insensata obrepit: ubi obiter notandum, quod si Spiritus cruoris ab hoste laceffiti ipsum aggredi, & pro victoria decertare valeant, è conflictu hoc ebullitio febrilis in sanguine concitatur; sin veneni particulæ viribus longè potiores Spiritus cruoris subito profligent, ac vitam extinguant, statim corrumpitur massa sanguinea, ut nec in vasis circulari, nec in corde ritè accendi possit.

Si inquiratur adhuc, quas mutationes in substantia, aut consistentia sua sanguis veneno infectus subeat, ut propterea vitæ sustentandæ minùs idoneus reddatur? Respondeo in hunc modum; *venena* quædam *sanguinem fundunt*, ejusque serositatem nimis præcipitant, ut sunt pharmaca, quæ vel purgatione deleteriâ, aut urinæ profluvio, aut totius intumescentiâ, vel discoloratione, vel pustularum eruptione plurimam serosi laticis secretionem faciunt; interea magna ebullitio cruoris massæ inducitur, quâ Spiritus vitales valde disperduntur, Salis, & Sulphuris particulæ à coctione nimia exaltantur, & sæpe affantur, ut ideo icteritia aut flava, aut nigra inducatur.

Sunt aliis generis *venena* longè periculosiora, quæ *sanguinem congelant*, ejusque mixtionem destruendo corrumpunt, scilicet massæ sanguineæ primò *congelationem*, dein *putredinem* inducunt: cùm enim Spiritus cruoris à veneni contagio profligati dissipantur, liquoris mixtio aquabilis solvitur: quare particulæ crassiores se mutuò implicant, & (instar lactis ab infuso coagulo, aut spontanea acescentia) invicem coagulantur: hinc cruor in vasis grumescit, ut minùs promptè in iis circuletur: hujus portiones coagulatae, interius in cordis sinus delatae illic stagnare aptæ sunt, adeoque crebras synco-
pas & lipothymias pariunt: exterius advectæ, & inter circulandum in cutem defixæ, modò uberius congestæ, per totum nigredinis suffusionem inducunt, modò parcius dispersæ maculas tantùm, aut vibicum instar stigmata purpurea, cæteraque malignitatis phænomena efficiunt. Sanguinis autem coagulatio ipsum ad putredinem, seu corruptionem citò disponit, uti videre est in sanguine extravasato, qui citò nigrescere, & putrere solet. Et enim Spiritu exhalato, in cruore residuæ Sulphuris, & Salis particulæ à se invicem discedere, & mixtionis vinculum dissolvere, unde putredo sequitur, incipiunt.

His ita præmissis de veneno in genere, methodi ratio postulat, ut febrium, quæ omninò à miasmate venenato, & maligno originem ducunt, tractatum aggrediar: cumque sub hoc titulo *pestis* facilè principatum obtineat, ab ejus consideratione incipiam, postea de febribus malignis, variolis, & morbillis ordine dicturus. Priusquam tamen ejus definitionem proposuero, breviter inquiram de veneno pestifero, cujus sit *indolis* ac *natura*; unde etiam nascatur, & demùm quo pacto per *contagium* in alios propagetur.

Ad exprimendam pestis naturam solent Authores corpora quædam venenata eligere, & ab eorum nominibus Elogia teterrimi istius morbi conficere: quare in definitione pestis, virus Napellinum, Aconitale, & Arsenicale vulgò recensentur: quorum tamen vis lethifera cum in materia valde crassa consistat, & non nisi corporeo contactu sese exerat, luis pestilentialis essentiam non ritè imitatur: hæc enim in miasmate vaporoso, & spiritali fundatur, à quo effluvia quaquaversus diffusa se adedò potenter explicant, ut ex minimo
seminario

seminario feracem mortis & exitii segetem citò propagent. Ob insignem ejus activitatem veneni velut quinta quædam essentia hoc miasma dici meretur: hujus particulæ valde agiles, & subtiles quævis penetrant corpora, & fermento suo inspirant: sive enim per aërem dispersæ, vel in fomite quopiam reconditæ, corpori humano, leviter licet, & quasi per transennam impegerint, ipsum facile subeunt; Spiritus tum animales, tum cruoris citò inficiunt, & exinde labem venenosam in membra omnia brevi suffundunt.

Cùm halitus, seu vapor pestilentialis quempiam invasit, atque illud virus Spiritus animales, aut cruoris, aut etiam simul utrosque (quemamodum superius dictum est de venenis) primò corripuit, à subtili, & tenuiori horum substantia labes in materiam crassiolem citò derivatur: quippe totam sanguinis, aut succi nervosi massam, atque humores excrementitios ubivis scatentes brevi fermentat, indeque in partes solidas deducitur, iisque malum infigit. Si hæc lues *Spiritus animales* prius occupet, statim cerebro, nervosoque generi, ac imprimis ventriculo noxa communicatur, humorem in hisce gliscentem illico venenat, ejus mixtionem solvit, motum regularem pervertit, ipsumque teneriori partium continentium substantiæ omnino incongruum, & infestum reddit: inde mox spasmi, & motus convulsivi, vomitus immanes, cardialgia, necnon phrenitis, delirium, aut vigiliæ pertinaces circa primum morbi insultum concitantur; cùm interea, labe nondum per cruorem dispersa, ægri non febricitant, nec pulsu inordinato, aut syncope, aut stigmatum apparentiâ urgentur: quæ tamen symptomata quamprimùm sanguis inficitur, postea emergunt. Si quando *Spiritus cruoris* miasmate venenato aut cum aëre inspirato, aut per poros attracto primò occupantur, illico per totam sanguinis massam ejus fermentum dispergitur; hinc portiones infectæ statim ab æquali mixtione solvi, in partes secedere, & coagulari incipiunt; eademque in cordis sinus delatæ, ibidem stagnare, adeoque syncopen, lipothymias, & non rarò subitam mortem inducere. Exteriùs etiam advectæ, atque circa cutim defixæ, bubones, ecchymata, & cætera venenositatis stigmata inferre solent, interim ut satis animo constent ægroti, nec delirio, nec motibus convulsivis tententur. Quod si à causa fortiori simul *utrisque partibus* noxa infligatur, cum magis horrendo symptomatum apparatu, ac præsertim syncope, ac phrenitide unà infestantibus morbi cursus peragetur.

Quod ad ortum ejus attinet, quando pestis in regione, aut terræ tractu primò exoritur, ejus duplex assignatur causa, scilicet *primaria*, seu *metaphysica*; item *secundaria*, sive *naturalis*, huic subordinata: hunc morbum ubicunque grassaretur, pro castigandis hominum sceleribus primitus à Deo immissum ipsi agnoverunt Ethnici, ideoque pro extirpatione ejus precibus, & piamentis æquè ac medicamentis insistebatur. Quod verò ad causam naturalem spectat, variæ feruntur sententiæ. Pestilentiam recens exortam volunt nonnulli tantum à cœlo & syderum influentiis derivari: contrà alii solummodò ab interna humorum corporis nostri putredine suscitari statuunt: hujus affectus causam isti nimis procul, atque hi debito propiùs deducere nituntur. Nos mediâ incedimus viâ, & quod ratio suadet, & quod Authores quamplurimi asserunt, primum & præcipuum hujus veneni seminarium in aëre collocamus; quippe rationi consonum videtur, ut ab eodem fonte, quo vitæ com-

munis pabulum, etiam necis haud minùs diffusæ initia petantur. Eadem nobis respirandi aëris, ac piscibus in aqua degendi, incumbit necessitas: quare sicut piscium catervatim morientium aquis veneno infectis lues ascribitur; ita homines sine causa manifesta è clade epidemica occumbentes, nil præter aëris communiter inspirati labem interimere poterit.

Constat enimverò aër, quem pro vita ducenda necessariò inspiramus, halituum & vaporum congerie, qui perpetim è terra exspirantur; quibus Salium & Sulphuris exhalationes commistæ corpusculorum ἀλμυρὸς οὖν hic densam quasi nebulam constituunt: horum motus & perniciosissimus, & irrequietus figuræ sunt multiplicis, & plurimùm diversæ; quare alia continuò aliis occurrant, & juxta varias eorum configurationes cum his cohærent, & mutuò combinantur, ab istis abiguntur, & aufugiunt: hinc sympathiæ, & antipathiæ cujusque rationes potissimùm dependent. A diversis hujusmodi atomorum agitationibus prope terræ superficiem hic, aut iste tractus aëris diversas alterationes subit, quibus corpora imprimis viventia variè afficiuntur; quippe motus intestinus particularum cujusvis animalis à motu & temperie particularum aëris plurimùm dependet; hæc siquidem istas perpetim exagitant, consopitas exsuscitant, avolantium dispendia reparant, nitrositate sua flammam vitalem exagitant, eique pabulum nitro-Sulphureum suppeditant, continuis accessuum & recessuum vicibus accensam eventilant, & fuligines auferunt. Quamdiu pro motu, & configuratione in utrisque apta contemperatio intercedit, vitâ & sanitate integris animalia fruuntur: sin verò corpuscula aëri innatantia sint ejusmodi figuræ & potentiæ, ut spiritibus animalium insitis planè adversentur, horum à cæteris quibus colligantur elementis mixtiones solvunt, & motus pervertunt: hinc rerum crases perduntur, vita profligatur, eaque vixdum extinctâ corpora putredinem subeunt: hinc arborum aut segetum culmi sideratione percussi derepente emarcescunt, hinc inter pecora lues sæpenumero grassatur, quæ simul totas interficit greges. Propter hujusmodi causam pestilentiae semina se primò exerunt, & humano generi internecionem intentant: nam sicuti venenata corpuscula in terræ visceribus, aut ejus superficie concreta mixta Arsenicalia, aut Aconitalia producant; ita hæc in vaporem usque resoluta, & in aëre agglomerata auras perniciosas creant, è quibus morbi maligni & pestilentiales oriuntur. Inquinamentum quod hoc modo aërem contaminat, *Diembrochium*, solertissimus hujus morbi explorator, contendit solummodò (velut Ἀπολλωνος οἷον χαομένειν) ab irata Dei dextra immediatè demitti: verùm hoc esse absque necessitatis prætextu multiplicare (ne dicam entia, sed) miracula, & in qualibet peste novæ substantiæ creationem asserere; cum interim materiæ venenatæ in hanc rem satis idoneæ copiam in terræ visceribus delitescere, mineralium, ac vegetabilium virulenta producta, quæ quotidie emergunt, nobisque (uti pestis) totâ naturâ adversa planè testentur. Etenim corpuscula, quæ materiâ terrestri obvolutâ mixta venenata in telluris gremio constituunt, eadem in vaporem resoluta non minùs noxia futura sunt, & afflatum pestiferum aëri cui observantur imprimant. Quare pace tanti viri dixerim, non improbabile videri, quod quæ alicui auræ tractui pestilentiae seminarium primò affigunt, sint Salium, ac Sulphurum efferatorum, ac è terræ visceribus (divino instigante nutu) expiratorum venenata effluvia, quæ modò ex

specubus & cavernis prius diu inclusa sensim exhalantur, modò ob terræ motus, aut hiatus confertim erumpunt; cujusmodi item à militum castris squalore immundis, è cadaveribus insepultis, vel à locis cœno stagnanti & fœtido obfitis passim exspirantur; corpuscula verò hoc modo exhalata longâ putredine miras *δυνάμεις*, & *ἀκρότητας* adsciscunt, ut propterea sint aliis quibuscunque incongrua, & heterogenea; adeoque in aërem suscepta ipsum (velut liquoris massam) fermentent, ac à natura salubri, & benigna in perniciosam, & tetram pervertant.

Malignam auræ pestilentis tincturam corpora quædam facilius, alia non ita promptè suscipiunt. Quibus ex mala victûs ratione ingens subest cacochymia, quique ob plethoram habent sanguinem sulphure concremabili refertum, his venenatæ auræ levior afflatus virus pestilentielle infigit, præsertim si metus & tristitia accedant, quæ levissima contagii spicula, velut *ἐπατλήσῃ* quadam intus convehunt, & ad cor deducunt. Econtra qui viscera habent munda, & sanguinis massam benè temperatam, quique animo forti, & intrepido præditi sunt, luem hanc non ita facile recipiunt, & aliquando receptam denuò exterminant.

Hactenus de *pestilentie ortu*, & *divulgatione*, juxta primos sui fontes, indeque deductam aëris infecti scaturiginem: restat dicendum de *propagatione* ejus per *contagium*, quatenus velut ex traduce, ab aliis subinde ad alios derivetur.

Per *Contagium* intelligimus vim istam, sive actionem, quâ affectus quispiam residens in uno corpore sui similem excitat in alio. Cum verò hoc accadat vel *immediate* per contactum, ut si aliquis in eodem lecto cum altero peste correpto accumbens eundem morbum contrahat; vel *mediate*, & ad distans, ut si ab una domo in alias remotas labem transferri contigerit, aut etiam si quempiam post aliquot dies, aut menses, forsan annos, vestem, aut supellectilem à domo infecta petitam contrectantem statim pestis adoriatur; ideò ut contagii natura, & diversi ejus modi planè innotescant, expendamus *primò*, quid sit illud, quod ab infecto corpore dimanat; *secundò*, quomodo se habeat per transitus sui medium; *tertiò*, quo ritu affectum sui similem in alio corpore progignat.

I. Quod ab unoquoque corpore, fixioris licèt naturæ, atomorum effluvia constanter avolant, & excurrunt, quæ circumcirca velut nebulam, seu halonem constituunt, & instar lanuginis in pomo Persico, quasi vestiunt, adeo receptum est inter saniores Philosophos, ut nihil magis. Quo verò plus activis aliquid constat particulis, eo corpuscula insignioris virtutis, & energiae à se dimittit. Hinc quæ ab Electricis decedunt effluvia, valent alia corpora locomovere: à Sulphureis emanationes procedunt, quæ totam viciniam odoribus replent. Cum itaque venenum pestilentielle, uti superius dictum, in minima licèt mole, sit maximæ efficaciae & operationis, hinc ubicunque defigitur, à corporibus ipso imbutis emanationes quædam procedant necesse est, quæ ejusdem veneni, & malignitatis indolem referant, & quaquaversus pro activitatis suæ sphaera diffundant. Quum verò hæc corpuscula, quæ pestilentie contagium retinent, quum ab uno manarunt corpore, non statim excipiuntur ab alio, inquiramus quomodò se habeant respectu transitus sui per medium.

Ubi statim occurrit eorum ab aliis plerisque discrimen; siquidem effluvia quæ

quæ passim evaporant, corporis à quo dimanant, indolem non diu retinent, quin aut tenues evanescunt in auras, aut aliis corporibus impacta, iisdem assimilantur: quæ verò à miasmate pestilentiali decedunt particulæ, non facile ab aëre, aut ab alio corpore absorbentur, adeo ut prorsus dispereant; verum inter varias atomorum confusiones, & aliorum corporum allisiones sese illibatas servant. Etenim hoc virus indomitum ferè, & ab aliis insuperabile usque idem perstat, & minima licet constet atomorum congerie, non statim evanescit, quin fermento suo proxima imbuit corpuscula, adeoque sibi novas adsciscit copias, & vires acquirit eundo: unde in fomite quovis diu delitescit, atque post longum tempus, cum idoneo subjecto impegerit, sese exerit, & veneni sui labem alteri impertiens, pestilentia morbum prius explodi visum de novo resuscitat, & ex minimo licet seminario lethale virus longè latèque spargit.

Etenim Pestis adeo certissima prodit contagii sui signa, ut nonnulli Authores contendant, eam solummodo hac ratione inter mortales superesse, & nusquam de novo ortam esse, quin à fomite tantum conservari, & ab una regione subinde in aliam deferri. Referunt Historiæ hujus semina in veste aut stragulis per plures annos sopita jacuisse; ab iisdem postea commotis emicuisse, & pestilentia morbum de novo succrescentem cum ingenti hominum strage concitasse. Cum ratione fomitis pestis hoc modo ad distans propagatur, quæ in miasmate supersunt venenata corpuscula, commota statim exsiliunt, & virus suum quaquaversus velut irradiatione quadam explicant. Si qua humano corpori impingunt, Spiritus statimprehendunt, eorumque vehiculo intus convehuntur, atque dein facili negotio sanguinem, & humores quoscumque in vasis confluos fermento suo inficiunt, iisque brevi coagulationes & putredinem inducunt. Atque ad hunc modum per subtilissima effluvia fit morbi pestilentialis velut transmigratio quædam, non secus ac cum surculus ab arbore quadam abscissus, atque ad tempus sepositus, & postea alteri trunco insertus, ex minima licet gemmula valet arborem ejusdem speciei & naturæ producere.

C A P U T XIII.

De Peste.

HActenus edisseruimus de veneno in genere, item de pestilentia, ejus exortu, & per contagium propagatione: restat modo ut pestis descriptionem, ejusque naturam, juxta accidentia, & symptomata maximè notatu digna explicemus: dein quæ ad therapeiam ejus spectant, nonnulla subjungentur.

Pestis in hunc modum describi potest, quod sit morbus epidemicus, contagiosus, humano generi summè infestus, ex miasmate venenato ab aëre primum suscepto, dein per contagium propagato ortum ducens, qui occultè & latenter homines aggressus, spirituum extinctiones, cruoris coagulationes, ipsius & partium solidarum syderationes & *venæ portæ* infert, cùmque apparentia exan-

thematum, bubonum, aut anthracum, necnon aliorum symptomatum horrendo apparatu ægros in vitæ periculum adducit.

Licet pestis sit unicum morbi genus, ejusque differentia specificæ, aut essentialis minimè reperiantur; tamen propter accidentia diversimoda, quæ ipsi superveniunt, ejus diversitates & anomaliam quædam observantur, quæ typum morbi nonnihil variant, etsi speciem non immutent. Etenim primò hic affectus quandoque est universalior, ut per plures simul vicos & urbes passim grassetur: interdum verò angustioribus terminis circumscriptus, tantum uni regioni seu terræ tractui minatur. Secundò pestis aliquando simplex & aliis affectibus impermixta advenit, quare clam & velut ex insidiis, ferè sine febre, aut symptomatum vehementia internecionem secretam ægris adducit. Quandoque cum symptomatum aliorumque morborum Iliade complicatur, ut cum tumultu & crebris inter naturam & morbum velitationibus res geratur. Tertiò malignitatis gradus insigne discrimen constituit; est enim pestis quibusdam locis & temporibus longè mitior, ut decumbentium plurimi evadant; quandoque summè exitialis est, ut plurimi correpti intereant, & ex centum ægris vix unus convalescat.

Quoniam verò hic morbus sagittas suas abscondit, & ex improvviso homines adortus eos repente interimit, ideo danda erit opera, ut signis quibusdam, velut positis excubiis, clandestinum hunc hostem adventantem dignoscamus, licet à longinquo venientem prospicere non valeamus. Plurima occurrunt signa, quæ pestilentiam brevi adfuturam prænunciant; nimirum si annus temperamentum non fervet, verum immodicos & valde intempestivos habeat caloris, aut frigoris, siccitatis aut squaloris excessus; si morbilli, aut variolæ in magna copia passim grassantur, si phlegmones, aut bubones febres regnantes comitantur. Insuper solent Astrologi ex siderum aspectibus, aut cometarum apparentiis pestem imminuentem prædicere: verum hoc potius inanis conjectura, quàm certa præscientia appellari debet. Ex fame præcedente certissimum pestis secuturæ præsagium desumitur, ut in adagio sit Μετὰ λιμῆς λοιμός. Etenim similis anni constitutio, quæ plerumque ob segetes sideratas annonæ caritatem advocat, apta est & pestem producere. Etiam mala victus ratio, qua utuntur famelici, quævis insalubria sine delectu comedentes, ad labem facilius suscipiendam eorum corpora disponit. Quin etiam terræmotus, cryptæque, & cavernæ dehiscence solo recens apertæ, propter malignæ, & venenatæ auræ eruptiones pestilentiis non rarò initia dedere. Enimverò sicut magna opus est diligentia pestem imminuentem velut è specula prospicere, ita non minoris erit solertiæ eandem recens exortam, & prima intentantem spicula animadvertere: sæpè enim solliciti nimis etiam febres vulgares, si forsan in mortem desinant, pro hac lue perhorrescimus; ac interdum nimis securi pestilentiam ratione symptomatum febris communis æmolam contemnentes, pericula nostra non nisi serò deprehendimus: quare ad plenioram hujus morbi notitiam signa ejus, & symptomata, tum communia, tum pathognomonica subiciemus, eorumque causas, rationes & modos fiendi obiter describemus.

Præter signa superius tradita, quæ ἐνδεΐξις quædam à priori, pestis adventuræ suspicionem incutiunt, dantur alia, quorum αὐτοσπειρὴ ejus præsentiam in corpore ægrotante planè indicat: ex his quædam pesti cum febre putrida communia,

munia, quædam huic affectui sunt magis propria. Etenim pestilentia impressio sanguinis effervescentiam sæpissimè concitat, & febrem ita crebro adjunctam habet, ut à nonnullis in definitione pestis, loco generis habeatur febris: quare ob sanguinis ebullitionem, & noxam visceribus illatam, statim incallescunt cum lassitudine spontanea, sitis, præcordiorum æstus, vomitus sæpe immanes, cardialgia, intestinorum tormina, linguæ scabrities, aut nigredo, dolor capitis, vigiliæ, phrenitis, cordis palpitatio, syncope, & subita virium prostratio sequuntur: hujusmodi symptomatis licet febres vulgares sæpissimè stipentur, tamen si eodem tempore in vicinia pestis increbrescat, & ejusdem metus animis hominum insederit, hinc major hujus mali suspicio incutitur; potissimum verò quia regnante pestilentia cæteri quivis morbi propriam relinquunt indolem, & in ipsam migrant: quare si affectibus modo citatis accedat ejusdem ægritudinis in plures communicatio, & funerum frequentia, ut prorsus valde lethalis usque per contagium latius serpat; & si præterea Bubones, Carbunculi, Exanthemata, aut alia luis pestiferæ stigmata appareant, res extra dubium ponitur, & non minori fiducia hinc pestilentiam denuntiamus, quàm cum ædes per tabulata erumpente igne flagrant cernimus, incendium proclamamus. Quoniam autem *bubonum, anthracum*, aliorumque symptomatum (quorum superius, ubi de febribus putridis dictum est, meminimus) hinc mentio facta est, restat ut eorum causas, & modos fiendi breviter perstringamus: sunt autem hæc, *Carbunculus, Bubo, Exanthemata, Ecthymata, & Pustula maligna*.

Super his in communi asserimus, quod sint omnia sanguinis, & succi nervosi veneno pestifero tactorum, & per partes in circuitu coagulatorum, & putredine variè affectorum producta; siquidem spiritus in utroque liquore, præsertim in sanguine residui, non citius malignæ luis afflatu profligantur, quin liquori residuo non secus ac lacti acescenti, aut succo acido perfuso coagulatio inducitur: quare portiones ejus veneno gravius tactæ citò grumescunt, & instar sanguinis extravasati cum nigredine corruptionem patiuntur; unde statim in vasis, & corde sanguinis reliqui motum præpediunt, ipsumque ratione fermenti sui plus coagulant; quidquid verò congelatione in grumos concrevit, ni statim foras ejicitur, cruoris circuitum inhibendo brevi mortem accersit; atque extus ad ambitum corporis protrusum inter angustos vasorum anfractus in motu sistitur; & vel spiritu prorsus destitutum, velut sideratione percussum, ~~venæ~~ sua vibices, & stigmata nigra, aut purpurea producit; aut propter Sal, & Sulphur à fermento pestilentiali exaltata, & novas res affectantia, in tumores variis generis concrevit.

Carbunculus, sive *Anthrax*, est tumor igneus cum pustulis circum se acerrimis, & ardentissimis, doloreque acuto ægros infestans, qui variis in locis indiscriminatim emergens minimè suppuratur, verum latius in ambitum serpens carnem exurit, ejusque corruptæ tandem lobos excutit, & ulcus cavum velut escharotico inustum relinquit.

Anthracum generatio videtur ad hunc modum fieri; cum in sanguinem sua natura retorridum miasmata venenata impingunt, portiones ejus congelatæ in superficie corporis defiguntur; ibidemque loci, quia sanguinis motus paulum impeditur, tumor primò exiguis inducitur; qui postea, fermento maligno se statim latius explicante, sensim adauctus, in viciniam serpit:

suppuratio minimè succedit, quoniam materia extravasata, & stagnans haud leni calore coquitur, & digeritur, verùm ob particulas Sulphuris efferati unà cum Sale evecto in tumoribus hisce congestas, & propter stagnationem à mixtione statim exsolutas, adustio excitatur, veluti si cauterium esset parti affixum. Carnium velut eschara obducta exesarum frustra, & lobi decidunt, quia venenum corrosivum musculis impactum, non tantum superficie tenus, verùm ipsos transversim per totam substantiam corrodit: quare priusquam tota absumatur caro, membranis quibus involvuntur exesis, frustum aliquod à reliquo velut abscissum decedit. Carbunculus sæpe unus, sæpe plures oriuntur: interdum solitarii sunt, aliquando Bubonem habent comitem.

Bubo pestilens in locis tantum adenosus profilit, in cujus molem non tantum sanguis à veneno congelatus, & per arterias advectus, verum & succus nervosus illic congestus, & in venas regerendus cedit. Quoniam hic tumor ex succis minus retorridis, & in parte frigidiora contingit, ideo suppurationis particeps est. Etenim materia sensim congesta, cum (spiritu vitali ob stagnationem deceduo) sanguinis formam amiserit, à particulis Salis, & Sulphuris exaltatis, & in tumore cohibitis diuturna concoctione in pus convertitur. Quod verò in adenibus tantum hi tumores contingunt, ratio est, non quod destinatione quadam naturæ morbi fomes ad has partes defertur, sed cum miasmatis virulenti particulae ubique passim in cruore, & succo nervoso scatent, illic promptius, velut in communi foco, aggeruntur, ubi & sanguis ad Arteriolarum extrema delatus difficulter, & non ita promptè suscipitur, ac refertur à venis; & unà succus alibilis à nervis in venas referendus deponitur: horum utrumque circa Adenes fieri experientia, & nuperis Anatomicorum observationibus liquidò constat: quare cum in his partibus utrique humores contagii pestilentis seminibus referti simul convenerint, propter virulentiam ab utrisque hinc depositam malignitatis velut nidus conflatur.

Exanthemata, ecthymata, necnon maculae purpureae, respectu venenositatis sunt ejusdem farinae cum tumoribus modo descriptis: verum in his virulentiae productae in minori consistunt mole, cum majori tamen periculo, ob veneni semina magis dispersa. Cruoris coagulati portiones exiliores in cute defixae phaenomena hæc minora constituunt; quare ex his nonnulla in papulas aucta suppurantur, alia propter sanguinis corrupti νέκρωσιν quandam, sive siderationem, in vibices, & maculas purpureas concresecunt.

Licet pestis ob perniciem ægris & secretò, & valde celeriter intentatam, prognostico vix locum, aut tempus cedat; cumque ob occultos nocendi modos hic morbus nihil non suspectum in se contineat; tamen crebra observatione constat, in hujus decursu nonnulla apparere signa, à quibus salutem, aut mortem augurari solemus. Res plena timoris est si lues citò in epidemiam transierit, & violentos fecerit insultus; si hæmorrhagia, aut sudor tantum exiguus in morbi principio succedant; si urina sit crassa, & turbulenta, pulsus inæqualis, & debilis; si convulsio, aut phrenesis statim sequantur; si vomitus, aut dejectiones sint lividae, nigrae, aut summè foetentes; si Exanthemata prius rubra postea livorem contrahant, si carbunculi sint plures, si Bubones prius extumescerent dispareant, si vires subito dejiciantur, facies sit

horrida

horrida, aut livescat; si cum rigore extremorum adsit viscerum æstus, præsertim si in corpore valde cacochymico, aut tempestate insalubri hæc aut eorum pleraque eveniant. Econtrà bono esse animo jubentur ægri, si pestilentia status sit levior, & minùs exitialis; si in corpore sano, & robusto, cum animi fortitudine morbus contingat; si remedia tempestivè adhibeantur priusquam morbus totam occuparit sanguinis massam. Item si cum virium constantia, pulsus robore & æqualitate, Bubonum suppuratione, & larga puris profusione, cumque symptomatum horrendorum absentia morbi decursus peragatur. Interim quanquam hîc omnia bona sperare liceat, tamen securos esse non conceditur, quia nonnunquam cum laudabili signorum apparentia clam vitæ struuntur insidiæ, & tanquam à reconciliato hoste gravissima patimur, qui ferocientis minas evasisse videbamur.

Circa plurimarum ægritudinum curationes potissimum opus naturæ committitur, cujus necessitati obstetricatur *ἰατρικὴ*; atque Medici officium, & scientia præcipuè in his versantur, ut idoneas huic laboranti suppetias ferendi occasiones præstoleretur. Verùm pestis hoc peculiare habet, quod ejus curatio minime sit naturæ relinquenda, quin omni modo conscriptis ab arte remediis occurrendum. Nec de magis opportuno, & quasi molliore tempore solliciti sumus, verùm citissimè comparentur medicamina, atque nullis non horis, & tantùm non minutis iis insistamus. Quia tamen regnante pestilentia non minori opus est curâ, ut contagium procul arceatur, quàm ut lues impressa sanetur; ideo Medico duplex incumbit pensum, nimirum ut maligni hujus morbi *prophylaxi* æquè ac *curationi* prospiciat. De utrisque methodum conscribere esset opus plenum tædii, & cramben ab Authoribus millies coctam apponere; quare hîc præcipuas quasdam indicationes, earumque rationes tantùm obiter perstringamus, ad alia festinantes.

Cautiones *prophylacticae* vel respiciunt Rempublicam, & ad Magistratum pertinent; vel privatas personas, quibus docetur quid singulis hominibus quando pestis timetur, sit agendum.

Cura publica tempore pestis præcipuè in his consistit, ut cultus divinus ritè observetur, ut omnes putredinis fomites rescindantur, sordes, sterquilina, & foetida quævis è plateis amoveantur, & contagii quævis occasio diligentissimè evitetur, commercia cum locis infectis prohibeantur; & ut victus ratio salubris à civibus constanter observetur. In quam rem fructuum, aliorumque insalubrium usus interdicator; pauperes, quibus haud suppetit alimentorum copia, aut delectus, sumptibus publicis nutriantur. Si pestilentia etiamnum grassari incoeperit, venenata vis aëris, quantum fieri potest, corrigatur, quod sulphureorum crebrâ accensione optimè procurabitur; infecti à sanis separentur, ab eorum cadaveribus, aut supellectile recedatur; denique Medici, & ministri in sanorum usus, & ægrotantium necessitates habiles, & idonei comparentur.

Ratio prophylaxeos privatae solet his tribus concludi, scilicet *Dietâ*, *Pharmacîâ*, & *Chirurgiâ*. Diæta respicit sex res non naturales, inter quas majoris momenti sunt *aër*, & *animi passiones*: quoad reliqua sufficit Hippocratis præceptum, scilicet *labor, cibus, potus, somnus, Venus, omnia sint mediocriter*. Aër pestilens vel evitetur, migrando in alium locum; vel castigetur sulphureis ritè

ritè accensis, vel inter respirandum curetur per suffumigia, & odorata prope nares crebro gestata. Quoad animi passiones, metus, & tristitia, pestilentia grassante, velut altera pestis sunt; his enim venenati contagii semina, quæ in superficie corporis velut in extrema vorticis ora collocantur, cum impetu quodam intus rapiuntur, & cordi traduntur: quare hilaris, & confidentis esse animi, exquisitissimæ præstat Antidoto. Plures cognovi, qui (& verbis Helmontii dicere solebant) *vino & confidentiâ fortificando Archeum*; nec aliis præterea Alexipharmacis usi, inter infectos sine contagii noxa versabantur: & è contra quidam terrore perculsi, cum procul ab omni contagio degerent, pestilentia semina velut ab astris derivata imbiberunt.

Inter Chirurgica præservationis gratiâ adhibenda commendari solent, *Vena sectio, Cauteria, & Amuleta*. Ubi adest plethora cum magna sanguinis turgescencia, aut quibus longa consuetudine sanguis solenniter mitti solebat, iis venam secari convenit: quo enim sanguis minus effervesceat, & sine tumultu in vasis circulatur, eo tardius lue pestifera contaminatur. Fonticuli à cauteriis excitati adeo omnium penè suffragiis præservationis gratiâ contra pestem usurpantur, ut eorum usus vulgò receptissimus existat: hi enim constanti *διαδοχῇ* assiduum superflua, & excrementitia materiæ proventum elutriant; & si qua intus admissa sint pestilentia miasmata, hac velut portâ apertâ foras ejiciunt.

Amuleta collo suspensa, vel carpis gestata, adversus pestilentiam mirabilem vim obtinere creduntur: ex his præstantissima à quibusdam habentur, quæ ex Arsenico, Hydrargyro, pulvere bufonum, aliisque venenatis constant. Eadem in hoc casu prodesse, præter Medicorum observationes, hæc ratio non nihil suadere videtur. Effluvia, seu corpuscula atmoidea è corporibus modò his emergentia, modò super illis residentia, per totam aëris regionem circumvolitare superius innuitur: hæc cum diversimodè sint figurata, eorum alia cum aliis optimè cohærent; sin verò in quædam aliâ formæ impingant, eadem oppugnant, & evertunt. Hinc pestilentis miasmatis particula, quæ spiritibus nostris adversantur, cum istis veneni corpusculis juxta positis optimè conveniunt, iisque promptè affiguntur. Quare hoc faciunt amuleta è veneno conflata, scilicet pestilentia semina nobis occurrentia propter similitudinem partium in se excipiunt; etiam à corpore nostro eadem in amplexus suos alliciendo, infectos quodammodo à malignitate liberant.

Prophylaxis Pharmaceutica in duplicem fertur scopum: primò, ut assiduus materiæ excrementitiæ, seu humorum proventus leni purgatione (quoties opus sit) tollatur: secundò, ut Alexipharmacis quotidie sumptis, spiritus, & corpus nostrum contra veneni incursum muniantur: à priori pabulum, & fomes, quæ putredinem à veneno inductam adaugent, detrahuntur: ab altero pestiferæ luis, feralis tanquam ignis, prima accensio inhibetur. Alexipharmaca enim videntur sub duplici hac ratione contra pestis contagium juvare; tum quòd sanguinis massa, & viscera horum particulis referta, necnon spiritus iisdem priùs occupati, venenati miasmatis consortia non facile admittunt; tum quòd sanguis leni harum orgasmo citatus à coagulatione vindicatur.

Hactenus de *præservatione*; sequitur modò de *curatione* pestilentia agendum.

Cujus

Cujus doctrina est vel *generalis*, & complectitur remedia quæ in hunc finem ex Diæta, Chirurgia, & Pharmacia desumuntur; vel *specialis*, quæ tradit usum, & cautiones circa ista remedia exhibenda; & quo ritu symptomatis variè emergentibus occurrendum sit.

Diæta sex rerum non naturalium usum comprehendit; præcipua tamen cura, & curationes Medicæ circa victum adhibentur: hujus primariæ indicationes non simul, & eodem tempore consistunt; sed pro re nata vicissim, & juxta naturæ exigentiam suppleri debent. Respectu malignitatis, & virium dejectarum, alimenta quæ spiritus valdè refocillant, & uberiorem nutricatum præstant, desiderantur: respectu intemperiei febrilis, victus tenuior, refrigerans, & sanguinem attemperans requiri videtur. Medicus utrique prospiciat, sed contra malignitatem potius quàm febrim remedia intendat.

Auxilia quæ ad Chirurgiam spectant, sunt venæ sectio, quæ rarò, & admodum cautè in hoc morbo celebrari debet, quia sanguine nimis exhausto, & vasis concidentibus, diaphoresis non adeo faciliè procuratur; hujus vicem meliùs supplent Cucurbitæ cum scarificatione. Etenim hæ, & vesicatoria pro veneno foras educendo rectè adhibentur: insuper contra Bubones, anthraces, atque ulcera maligna ab iis producta, cataplasmata, fœtus, emplastra, illitus, & pleraque alia exterius applicanda è Chirurgia petuntur, quibus venenata quædam, prout veneni Electrica, admisceri à nonnullis præscribuntur; quare præparata Arsenici, scilicet oleum, & balsamum ejus, in hoc casu, prout egregii usûs, & efficaciæ, à plurimis commendantur.

Pharmaca, circa pestis curationem, sunt vel evacuantia, vel Alexiteria. Priorum intentio est, ut latex serosus in sanguine, & humores excrementitii, qui scatent in visceribus, foras deturbentur; & unà cum iis plurimæ venenati miasmatis particulæ ubivis in corpore dispersæ. Hæc autem præstant tum vomitoria & purgantia, quorum usus est rarior, & tantum in morbi principio; tum diaphoretica, quæ nullo non tempore, quoad vires sufferre valent, à peste indicantur; hæc enim plenius & à toto simul corpore evacuant, quin & sanguinem exagitando, à coagulatione vindicant; & cum à centro usque ad circumferentiam movent, fermenta venenata, necnon humorum, & sanguinis corruptelas procul à corde arcent, & hostem extra castra propellunt. Vomitoria autem, & purgantia minùs universaliter evacuant, & materiam malignam sæpe concentrando intus deducunt, & visceribus affigunt. Hæc autem medicamina, sive catharsi, sive diaphoresi operentur, ejusmodi sint oportet, quæ particulas habent miasmati venenato potius quàm sanguini, aut spiritibus nostris congeneres: tale enim pharmacum varios corporis nostri anfractus, cum viribus integris, & illibatis pertransit, & ob utriusque similitudinem virulentam morbi materiam certiùsprehendet, illamque mutuâ partium adhæsione, quâ natura irritata ducit, secum foras rapit: quare medicamenta, sive cathartica, sive sudorifica, præcæteris commendantur, quæ ex *Mercurio*, *Antimonio*, *Auro*, *Sulphure*, *Vitriolo*, *Arsenico*, & similibus parantur; quæ cum à calore nostro minimè subigantur, aut superentur, contra virus luis *pestilentialis* optima evadunt remedia:

hæc enim non modò superflua potenter evacuant, sed cum particulas valde fortes, & indomitas exerant, & quaquaversus in corpore explicent, veneni fermenta hinc inde gliscentia dissipant, & à maturatione impediunt; & cum ipsa remedia à natura insuperabilia necesse habeant per patentes corporis exitus amandari, quidquid extraneum, & hostile occurrit, unà foras educunt.

Quoad Pharmaca alexiteria, quæ absque sensibili evacuatione hujus morbi veneno resistere perhibentur, sunt ea ejusmodi ut plurimum, quorum particulae naturæ nec sunt valde congeneres, ut pro alimento cedant; nec ita diversæ, ut excretionem stimulent. Eadem intus sumpta, & quoad minima refracta, cruorem, & succos in vasis, & visceribus confluos corpusculis suis, velut novo fermento inspirant; eosdem leniter movendo, & in æquabili mixtione servando, à coagulatione, & putredine vindicant; veneni particulas agglomerari cœptas eadem blandâ agitatione ab invicem dissipant, & à maturitate impediunt; denique sanguinem, & spiritus præoccupando, eos à characteris pestilentis impressionibus tuentur. Ex his remedia quædam simplicia commendantur, ut sunt *Ruta*, *Scordium*, &c. tamen longè potissima æstimantur, quæ sunt compositiora; quare *Theriaca*, *Mithridatium*, & *Diascordium*, quorum aliqua quinquaginta utminùs simplicibus constant, medicamina adeo omnibus numeris completa habentur, ut piaculum habeatur in eorum confectionibus vel plantam unicam, aut ipsius drachmam omittere: ratio fortè est, quòd plurima simul posita massam exhibent, cujus diversimodæ particulae longa digestionem exaltatæ majorem in sanguine, & humoribus nostris fermentationem cient.

Recensitis hoc modo remediis, quibus pro curanda peste instructi esse debemus, jam proximè dicendum esset de curationis methodo, scilicet quid primùm, & quid deinceps ordine sit agendum: nisi quod hic morbus adeo in præcipiti versatur, ut nec deliberationi sit locus, nec Medicus præ contagii metu ægris frequenter interesse velit: quare non pluribus hic opus est præscriptis, aut longa indicationum serie: res hæc citò peragenda est, & paucis comprehendere potest. Cum itaque regnante pestilentia quispiam hujus morbi contagio afficitur, Dei omnipotentis auxilio precibus impetrato illicò ad remedia confugiendum est: si in corpus minimè perpurgatum, ac in vomitum proclive pestis inciderit, statim vomitorium sumatur, cujus operatione finitâ, diaphoreticis confestim adhibitis sudor provocetur; idem pro virium tolerantia continuetur, postea sæpiùs repetatur. Insuper alexipharmacis quovis ferè momento utendum, donec Exanthematum, Anthracum, aut Bubonum eruptione venenum prorsus totum foras eliminetur: interea tamen symptomatis maximè urgentibus remedia respectiva, & propria opponantur: præcipuè autem pro Bubonum, & Anthracum curatione auxilia idonea ex Chirurgia petantur. Totius negotii cardo intentionibus hisce duabus innititur, ut virus pestiferum omni modo ab intus foras expellatur, ac dein expulsi recursus aquâ diligentia præcaveatur.

De Peste non adeo in promptu est exempla, & ægrotantium historias cum exactis symptomatum diariis conscribere: quippe hujusmodi ægritudines haud quotannis eveniunt, nec quando increbrescunt, cuivis licebit Medico propriam

propriam salutem curanti ægros crebrò invisere, aut iis diutius commorari, quò singula accidentia diligenter annotet, eorumque rationes sedulò perpendat; quod tamen pensum Cl. *Diemerbrochius* adèd accuratè præstitit, ut post illum licitè aliis ab hoc opere supersedendum fuerit. Cùm olim in hac urbe, scilicet Anno 1645. pestis (licet haud immanis) grassaretur, Dominus *Henricus Sayer*, Medicus perquam eruditus, & in praxi felix, plerisque aliis hanc spartam renuentibus, laborantes quoscumque pauperes æquè ac divites audacter invisebat; iis pharmaca quotidie propinabat, Bubones, & ulcera virulenta propria manu tractabat, adeoque sedula, licet periculosa opera ægrotantium plurimos sanabat. Ut seipsum à contagio muniret, antequam domos infectas adibat, solummodo vini generosi haustum pleniorè ingerere; dein perambulatione sua circa ipsum mortis limen, & tantum non ipsius Orci fauces peracta, idem Antidoton repetere solebat. Postquam in hac urbe, tanquam à peste inviolabilis, res ægrotantium sine noxa quavis suscepta diu curasset, ad castrum *Uvallingfordia*, ubi hæc lues atrocius grassabatur, velut alter *Æsculapius* à Præfecto illius loci accersebatur: illic autem intra breve spatium cum Duce quodam (cujus societatem intimè colebat) à peste correpto in eodem lecto discumbere ausus, ejusdem morbi contagium suscipit: nec profuere tunc Domino, quæ omnibus aliis emolumento fuerunt artes; quin cum magno ibi degentium luctu, nec citra ingentem in scientia Medica jacturam ex eo morbo desiderabatur. Circa alios pestilentia affectos hujusmodi medendi methodum instruere solebat: si priusquam Exanthemata, aut Bubones exterius apparerent, vocaretur, ut plurimum vomitoria exhibuit, quorum præscripta erant ex Infus. Croci metallorum, cum vitriolo interdum albo, ac interdum Romano: vomitione finita, à diaphoreticis statim exhibitis in sudorem conjiciendos præcepit; & deinde intervallis quibusdam pro refectioe virium concessis, usque ad morbi declinationem diaphoresin continuandam: sin post stigmata apparentia ad affectos accerferetur, vomitione posthabita, tantum sudorificis insistebat.

CAPUT XIV.

De Febris pestilentibus, ac malignis in specie, aliisque Epidemicis.

Post explicatam *pestis* naturam, ordine tractatus nostri procedere debemus ad affectus, qui proximè ipsius indolem referre videntur; quales sunt præcipuè *febres dictæ pestilens, & maligna*; etenim vulgò notum est, febres interdum populariter regnare, quæ pro symptomatum vehementia, summa ægrotorum strage, & magna vi contagii pestilentia vix cedant; quæ tamen quia putridarum typos imitantur, nec adeo certò, uti *pestis*, affectos interimunt, aut alios inficiunt, haud *pestis*, sed diminutiori appellatione, *Febris pestilentis* nomen merentur. Præter has dantur alterius generis febres, quarum & pernicies, & contagium se remissius habent: quia tamen supra putridarum

vires infestæ sunt, & in se aliquatenus τὸ θεῖον Hippocratis continere videntur, tentioni adhuc vocabulo *Febres malignæ* appellantur.

Differunt hæc febres tum à peste, tum à se invicem juxta contagii, & perniciæ gradus, & vehementiam: ut sit *pestis* morbus summè contagiosus, & humano generi exitialis: *Febris pestilens*, quæ cum minori miasmatis sui diffusionem, & funerum frequentia communiter grassatur. Cum infectio tantum suspecta est, & *crisis* supra vulgarium febrium eventus tantum infida, aut minus tuto contingit, pro *febre maligna* perhibetur. Adhuc plenius describantur sic:

Quando febris vulgò increbrescit, quæ pro symptomatum varietate *putridæ* sic dictæ indolem refert, cui nimirum adsunt Sitis, Ardor, Lassitudo, Anxietas, linguæ Asperitas, Vigiliæ, Phrenitis, Vomitus, Inappetentia, Syncope, Lipothymia, Cardialgia, aliorumque terribilium accidentium *Κυδρὸς*; si præterea accedant maculæ aut exiguis pulicum moribus similes, aut vibicum instar latæ, ac lividæ, hunc morbum mali moris existimamus: super his, si solito febrium ritu non judicatur, quin ægrorum vires sine causa manifesta prosternuntur, & contra Medici prognosticon mors sæpè improvisa, & insuspecta advenit, adhuc major ingruit *malignitatis* suspicio: sin verò ægrotantium plurimi intereunt, ac qui ægris conversantur, ejusdem morbi labem contrahunt, ut per totos sæpenumero vicos, aut civitates idem morbus grassetur, supra malignæ appellationem, *febris pestilens* dicetur; cujus adhuc probationem facit, si communi quodam symptomate passim in plurimos desæviat, ut cum angina, dysenteria, aut sudor funestus, qualis olim in *Anglia* increbuit, hujusmodi febres comitantur.

Quod si febris exoritur, quæ plures in eadem regione degentes ferè eodem ritu simul afficiat, quæ tamen decursu suo putridæ vulgaris leges observet, & ferè simili modo judicetur (nisi quod in aliquibus insigni cacochymia laborantibus, Bubonum, aut macularum apparentia, crisi interdum funesta, & contagio in alios serpente, malignitatis quædam signa prodit.) hæc minimè pestilens, sed tantum *febris maligna* dicetur.

Si inquiratur cuinam supradictarum febrium classi hujusmodi *pestilentes*, ac *malignæ* accenseri debent, eas solummodo *continuarum* censui adscribimus; intermittentes eximimus, quoniam per intervalla adeo firmas naturæ concedunt inducias, & dein regulariter, ac ad amissam suas observant periodos: quod cum diathesi venenata minimè consistet. Etiam heclicas à malignitate excipimus, quoniam secus non ita diu protelarent funera; quin veneni participes citius jugularent: è continuis, licet synochos simplices haud immunes, tamen rarius hac labe tactas asserimus. Sæpissimè autem febris, quæ pestilitatis, aut malignitatis notas exhibet, ejusmodi est, quæ putridæ sic dictæ typum mentitur: cum enim in his febribus, præter virulentiae phaenomena continuam sanguinis effervescentiam advertimus, quæ velut in putridis, principii, incrementi, status, ac declinationis stadia pertransit, merito hinc *Sulphuream* cruoris partem excalefactam, & accensam fuisse, atque incendio suo febrem induxisse statuimus: quare in hujusmodi febribus duo sunt imprimis notanda, scilicet sanguinis *effervescentia*, & *malignitas* huic conjuncta, quarum modo hæc, modo illa est potior. Etiam in utrisque magna

est latitudo, & plurimi sunt intensiōis gradus, juxta quos febris evadit magis aut minus acuta, aut maligna.

Effervescētia ad eundem modum peragitur, ut superius de putridis dictum est; nimirum sanguinis pars Sulphurea supra modum incalescens fervore suo, velut incendium concipit; inter deflagrandum materiæ adustæ copiam ingentem in cruore accumulatur, à cujus subactione, & seclusionē solito febrium more status, & crisis dependent: super his verò sanguis venenato quodam *miasmate infectus*, inter deflagrandum, ratione fermenti maligni, per partes coagulari, ac putrescere incipit: quare præter usitata febris vulgaris symptomata, propter sanguinis portiones quasdam congelatas, aut necrosi affectas, syncope, & spirituum dejectio, necnon macularum, ac stigmatum apparentiæ succedunt: insuper effluvia venenata, quæ ab ægrotis decedunt, vi contagii similem affectum in aliis concitare valent: quare ob perniciem, & contagium, & varios eorundem gradus, febris pestilens, aut maligna appellatur.

Dum sanguis effervescens etiam fermento maligno, & venenato inficitur, non tantum propriæ ipsius massæ coagulationes cum dispositione ad putredinem inducuntur, verum & *liquor nervosus* facilè hujus labem contrahit; unde cerebro, & spirituum animalium regimini improporcionatus factus, in iis magnas anomalias concitat: quare hujusmodi febribus non solum maculæ & exanthemata, verum sæpius delirium, phrenitis, sopores, artuum tremores, spasmi, & motus convulsivi superveniunt. Non rarò observavi, quibusdam annis febres malignas increbrescere, quæ sine stigmatum apparentia virulentiam suam, præcipuè circa genus nervosum ostentarunt: quippe in nonnullis mox ab initio somnolentia cum insigni capitis torpore, in aliis vigiliæ peritines, animi perturbatio cum tremore, & motibus convulsivis, in plerisque verò crisis aut nulla, aut tantum infida, ejusque vice materiæ febrili ad cerebrum translatio sequuta est. Has insuper febres contagio in alios serpsisse, ab iisque plures interiisse animadversum est, ut propterea malignæ dici mereantur.

Hujusmodi autem febres nonnunquam à venenato miasmate primò inchoantur, & sanguis particulis veneni tactus spontè effervescētiā concipit, ac incenditur; ut cum à contagio, aut maligno aëre inspirato quispiam sine causa evidenti aut prædispositione in febrem malignam inciderit. Interdum verò intemperies febrilis à causa propria inducitur, ac dein sanguini effervescēti malignitatis semina aut intus in corpore latentia sese exerunt, aut aliunde ex aëre contaminato, velut pabulum flammæ prius accensæ, adveniunt; etenim crebra observatione constat, tempore quo febris epidemica grassatur, alias quocumque modo ortas in ipsam migrare.

Febres malignæ, ut & pestilentes, plerumque sunt populares, ac plures simul invadunt: verum aliquando privatæ, ac sporadicæ, ut forsan unum, aut alterum in tota regione solummodò corripiant: in tali casu suspicandum est, eas non ab aëre maligno, aut causa epidemica, sed à morboſo corporis apparatu provenire: nam sæpius observavi, quod cum vere, aut autumnō febris satis vulgaris in urbe, aut vico quodam grassaretur, è qua ægroti plurimi evaderent, forsan aliquis, cui prædispositio mala, & causa evidens

fortior febrem induxerit, cum symptomatis magis horrendis, & insignibus malignitatis notis decumberet: in quo casu ista malignitas non febris communis dicenda, sed tantum sporadica, & accidentalis.

Licet maxima discriminis ratio, qua hujusmodi febres ab invicem, & ab aliis distinguuntur, in earum pernicie, & contagio consistit; tamen aliquando symptomate quodam peculiari insigniuntur, è quo tum malignitatis nota, tum nominis appellatio pro isto tempore desumuntur: hinc quibusdam annis febris epidemica regnat, quæ plerisque affectis anginam, alio tempore peripneumoniam, pleuritim, dysenteriam, aut alium quendam affectum, eumque periculosum sæpe, & contagiosum induxerit: adeo morborum semina non solum à parentibus ex traduce derivata fructus suos, velut designatione quadam, in eadem parte, aut membro excitant; verum etiam ex miasmate communiter grassante suscepta ejusdem modi ac typi affectus in omnibus producant: quod tamen accidere puto, non quia venenati miasmatis semina hanc, aut illam corporis regionem virtute quadam peculiari respiciunt; verum hæc sanguinis massam simili ritu ita in omnibus afficiunt, ut necesse sit istius labis eluendæ gratia eodem modo crisin in omnibus tentari. Cum enim absque malignitate sanguis ob coagulationem, aut forsan alias causas extravasari aptus fuerit, loca usitata, in quibus ejusdem extravasati portiones defigi solent, sunt guttur, pleura, pulmo, & intestina: quare nihil mirum est, quando à causa maligna sanguinis congelatio, atque id propter extravasatio inducitur, si morbus in assueto naturæ foco niduletur.

Circa causas hujusmodi *februm* non multis opus est: respectu *malignitatis*, ut plurimum à vitiosa aëris constitutione; respectu *effervescentiæ febrilis*, à morbofo corporis apparatu erunt deducendæ. Utraque ex iis quæ superius de *febre putrida*, & *causis pestilentia* dicta sunt, facile elucescunt: si malignitas sit *febre* validior, eamque induxerit, ipsius impressio erit, vel auræ inspiratæ, vel contagio ab aliis suscepto imputanda: si *febris* sit prior, ejus accensio transpirationi prohibitæ, crapulæ, aut alicui causarum evidentium suprâ enumeratarum ascribetur.

Quoad *signa*, præter contagium, & perniciem, *febris* malignitatem ostendent subita virium dejectio, pulsus debilis, & inæqualis, cerebri, & partium nervosarum mala affectio subitò inducta, vomitus immanes, linguæ nigredo, atredinis per totum corpus suffusio, præsertim verò Macularum, Bubonum, aliorumque stigmatum apparentiæ.

Pro *curatione februm*, tum *pestilentium*, tum *malignarum*, quàm in cæteris quibuscumque majori opus est judicio, & circumspectione: cum enim duo sint primaria indicantia, scilicet *malignitas*, & *intemperies febrilis*; cùmque alteri sine alterius detrimento vix prospicere liceat, utri prius sit occurrendum, & potius consulendum, non facile erit discernere. Respectu *febris*, purgatio, venæsectio, & refrigerantia imprimis conducunt: dum vero hæc celebrantur, *malignitas* plerumque augetur, & neglecta venenum latius diffundit: contra *malignitatem* alexipharmaca, & diaphoretica requiruntur; verum hæc febrem valde intendunt, sanguinem, ac spiritus prius accensos velut folium explosu plus exagitant, & totos quasi in flammam adigunt: quare hic magna opus est solertia, ut hæc ritè inter se conferantur, & unde plus periculi immineat, illinc

illinc intentiones curativæ immediatius designentur ; ita tamen ut dum alteri consulitur , alterius neglectus non habeatur. Verùm in his casibus , præter Medici cujusque privatum judicium experientia potissimam medendi rationem suppeditat : cùm enim hæ febres primò grassantur , singuli ferè singula tentant remedia , & ex eorum successibus unà collatis facile ediscitur , quali demùm methòdo innitendum erit , donec ultimo crebro tentamine , seu transeuntium vestigiis , via quasi regia & lata ad hujusmodi affectuum rationem teritur , variisque observationibus monitisque munita.

Præter hujusmodi *febres* , quæ simul in plures grassantur , & propter *contagium* , perniciem , & conspicuas virulentia notas , *pestilentes* , aut *malignæ* dici merentur , dantur aliæ quædam *epidemicæ* , seu populares , quæ singulis ferè annis , aut vere , aut autumnò in quibusdam regionibus deserviunt , à quibus incolæ quamplurimi ægrotare solent , & non pauci , præsertim è senioribus , occumbere ; in quibus tamen nulla *pestilentia* , aut *malignitatis* signa apparent , nec tam contagio videtur morbus ab aliis subinde in alios grassari , quàm ob prædispositionem ferè omnibus impressam unà plures corripere. Hujusmodi autem affectus à prægressa anni constitutione potissimùm dependent ; si enim tempestas , propter excessus frigoris , aut caloris , siccitatis , aut humiditatis , valde intemperata præcesserit , adeoque diu perstiterit , sanguinem nostrum ut plurimum à debita temperie immutat , quâ postea effervescentias febriles concipere aptus sit ; atque hinc febris modò hujus , modò illius typi , ac ideæ producitur , quæ statim epidemica evadit , quoniam à causa communi , quâ simul omnium quodammodo afficiuntur corpora , originem ducit : tales verò febres , quatenus à sanguine diathesin modò acrem , modò austeram , aut aliùs generis , propter anni temperiem nato dependent , ut plurimum sunt de intermittentium censu : proprio tamen symptomatum apparatu , juxta peculiarem cujusque anni constitutionem insigniri solent. Has sub communi quadam norma , seu ratione formali , quæ singulis hujus naturæ quadret , comprehendere non licet ; quoniam ipsæ juxta pleraque accidentia quotannis variant. Utcunque tamen hujusmodi febrium nuperis annis in hac regione grassantium descriptiones tum temporis habitas in aliquale cæterarum specimen dabimus , & sub finem hujus operis coronidis loco subjiciemus.

Restat adhuc malignarum censui febres quasdam alias privatas , & nullius contagii participes ascribere ; cujusmodi sunt in primis quæ foeminis puerperis , ob partum difficilem , & laboriosum , vel propter lochia detenta accidere solent. Siquidem has valdè periculosas , & non rarò lethales esse , observatione communi satis constat : nam si læsis uteri partibus , aut frigore admissio , aut aliâ forsan causâ lochia sistantur , & qui excerni debuerat humor sanguinis massæ confusus fuerit , ipsum veluti mixturâ quadam venenatâ pessimè inquinat , ut exinde statim febris excitetur , quæ malo symptomatum apparatu , scilicet calore , & siti immani , vomitu , cardialgia , & vigiliis ut plurimum stipatur , & plerumque crisin aut nullam , aut valdè difficilem obtinet : quippe , nisi solitâ viâ lochiorum fluxus denuò restituatur , post sanguinis effervescentiam per aliquot dies habitam labes cerebro , & nervoso generi communicari solet ; unde mox delirium , phrenitis , convulsiones , aliæque pessimæ affectiones sæpissimè inducuntur , quæ non rarò in mortem terminantur.

terminantur : verum hujusmodi febres considerationem peculiarem merentur, quam inferius, discursu in hanc rem appropriato, plenius habere statuimus; subit interea febrium superius traditarum, scilicet *pestilentis*, ac *maligna*, instantias, seu exempla quædam proponere.

Febris *pestilentis* nuperis annis rarius quam pestis ipsa in his regionibus grassata est : hujus generis unicæ, quæ nostræ observationi constitit, descriptionem brevi subjiciam. Anno 1643. cum ineunte vere *Essexia* Comes *Redingham* præsidio Regio defensam obsidione premeret, in utroque exercitu morbus admodum epidemicus exoriri cœperat; utcunque tamen operi insistente illo, donec inclusi ad deditionem cogerentur, affectus ingravescebat adeo, ut brevi postea utrinque discessum, & deinceps per plures menses non cum hoste, sed morbo pugnatum fuerit, ac si exitiali ingruente lue, in aliud mortis *genus*, districtis jam, & velut huic uni incumbentibus fatis, divertere non esset otium. *Essexius* castra movens *Thama* locisque adjacentibus confedit, ubi magnam suorum partem brevi requisivit. Rex verò *Oxonium* rediit, ubi militibus primò in campo aperto, dein postea per oppida & vicos dispositis, non multò leviora passus est : pedites enim ejus (quos præcipuè invasit) gregatim in arctis contuberniis collocati, cum omnia squalore, tetra immunditie, & foedis odoribus complevisset (ut ipsum aëra inquinasse viderentur) catervatim, & quasi per manipulos ægrotabant. Tandem febris jam plus quam castrensis inermem, & imbellem turbam, militum nimirum hospites, aliosque quoslibet passim invasit, qui primò (lue adhuc mitius inflicta) licet gravi, & diuturno languore obsessi, plerique tamen evaserunt. Circa solstitium æstivum febris hæc cum peiori symptomatum apparatu etiamnum increbrescere, & plurimos colonos, aliosque ruri habitantes occupare cœpit. Dein postea in hac urbe nostra, & universa vicinia per decem utminùs milliarium spatium grassabatur. Interim qui in aliis regionibus procul hinc degebant, velut extra contagii sphaeram, noxæ immunes perstiterunt. Hic verò morbus iste in tantum epidemicus evasit, ut maxima pars mortalium eodem inficeretur : quamcunque domum intraverat, statim totam adoriebatur, ut vix è sanis superessent, qui malè habentibus ministrarent. Advenæ, aut conductitii in agrorum ministeria vocati, mox eadem corripiebantur lue; ut demùm præ contagii metu, ex hac febre decumbentes ferè ac peste laborantes à sanis vitarentur.

Nec minima quidem pernicies, aut mortalium strages hunc morbum comitata est; quippe senes, cachectici, phthisici, aut aliàs invaletudinarii quamplurimi hoc fato interiere, etiam puerorum, juvenum, maturæ, & robustæ ætatis hominum non pauci. Memini in quibusdam villis seniores ferè omnes hoc anno vitâ abreptos, ut vix superessent qui traditionibus antiquitus acceptis Parœciæ mores, & privilegia tueri potuerint.

Quando hæc febris primò incoepit, synochi putris typum nonnihil referebat; erat tamen judicatu difficilior; & cum sudore, aut diarrhœa solvi videretur, statim recrudescere solita erat: plerumque verò post sanguinis deflagrationem per sex, aut septem dies continuatam, hac remittente, & criseos vice, materiâ adustâ in cerebrum translata, cum furore nonnunquam, sæpius cum torpore, imbecillitate magna, & aliquando motibus convulsivis ægri longo

longo tempore decumbentes vix tandem evaserint. Circa mediam æstatem præter contagium, & funerum frequentiam, signis apertis, scilicet axanthematum, & macularum eruptione hic morbus vim suam malignam, & pestilentialem prodidit: quippe sub hoc tempus multis sine magno febris incendio pulsus inæqualis, debilis, & plurimum inordinatus, etiam sine manifesta spirituum expensa vires statim languidæ, & valde dejectæ evaserunt: aliis simili ritu decumbentibus papulæ modò exiguæ, rubræ, modò latæ ac lividæ apparebant: in multis bubones (uti in peste) circa adenes. Ex his nonnulli sine magna spirituum lucta, aut excandescencia febrili in cruore citata tacitè, & improvisò emoriebantur: interim alii mox furibundi quoad vitæ participes fuerant, spirituum animalium distractiones horrendas perpessi sunt. Ex hoc morbo evasuri, sine crisi laudabili (nisi sudore ab arte provocato citius liberarentur) cerebro demùm, ac nervoso genere affectis, cum sensuum stupore, tremoribus, vertigine, membrorum debilitate, ac moribus convulsivis, non nisi post longum tempus convaluerunt. Durante Caniculâ hic morbus usque infestus, non uti febris, sed velut mitior pestis tractari, & remediis tantùm Alexipharmacis expugnari cœpit: phlebotomia huic usque fatalis credita est; vomitoria, & purgationes interdum, licèt non ita crebro, usui fuerunt; potissima autem medendi ratio in Alexiteriis, & diaphoresi tempestivè procuranda statuebatur. In hunc finem præter Medicorum præscripta è pharmacopolis petita, remedia quædam Empirica laudem non exiguam meruere. Tunc primùm in hac regione pulvis Comitissæ Cantii magni nominis esse cœpit: etiam non minimæ notæ fuit pulvis alter cineritii coloris, quem Aulicus quidam in hac urbe fortè diversatus bono cum successu pluribus exhibuit, aliisque ejus usum probantibus, magno pretio venalem exposuit. Solebant ægri ab hujus semidrachma in quovis liquore propinati in sudorem copiosissimum incidere, adeoque à morbi virulentia liberari. Fuit diaphoreticum illud (cujus præparationem ab Authoris consobрино postea edidici) solummodo Bufonum Sale expurgatorum, dein vino optimo lotorum, & in olla fictili leviter calcinatorum pulvis. Vergente Autumno hic morbus de solita atrocità sensim remittebat, ut pauciores ægrotarent, & eorum plurimi convalescerent; donec incumbente hyeme, febre istâ ferè in totum evanidâ, status denuo salubris in hac urbe, & rure circumcirca insolidum reddebatur.

Liceat hîc febris ab initio tantùm *castrensis*, demùm *pestilentialis*, ac epidemica factæ *exortum*, *progressum*, & postremò *exitum* intueri. Quod primò in militum castris morbus incœperit, non tantùm eorum squalori & tetrìs odoribus, verùm aliquatenus communi aëris vitio imputandum videtur: cùm enim hæ febres non quotannis eveniant, earum origo peculiari constitutioni anni nonnihil adscribenda est. Quippe exinde contracta levior auræ intemperies, licèt salubriter degentes haud malè afficiat; in exercitu tamen, ubi *παρατάξις* isti generali causæ evidentes, scilicet errores in sex non naturalibus, quamplurimæ accedunt, ejusmodi ægri tudines facilius concitari necesse est. Fuit autem hujus anni constitutio verna imbribus ferè continuò madentibus valde humida; cui dein Æstas calidior succedens contagii febrilis miasmata hîc prius gliscentia usque in pejus evexit, & corpora quævis ad suscipiendum ista

magis disposuit. Quare quod hic morbus ferè huic regioni proprius, & hoc tempore epidemicus extiterit, ejus seminario ab exercitu circumcirca confidente primitus oriundo debetur. Inquantum verò pestilentialis, & valde epidemicus postea factus mortalium hîc degentium plurimos infecerit, & non paucos interfecerit, in causa erat mala aëris affectio, qui propter anni intemperiem minùs salubris, insuper halituum terrorum à militum castris, & ægrotantium contuberniis expiratione continuâ ita demùm vitiosus evaserit, ut in eo dispersa hujus febris miasmata exaltarentur valde, & ferè ad pestilentiae virulentiam assurgerent. Refert *Diemerbrochius*, ab hujusmodi febre castrensi *Noviomagi* in æstate excitatam postea aliam malignam, & pestilentialem, ac dein pestem ipsam accrevisse. Etiam febrem hanc nostram ultimò ipsius pestis fuisse æmulam, præter magnam vim contagii, & funerum frequentiam, indicio erant ab eadem in omnibus *cruoris*, & *liquoris nervosi* affectiones pessimæ statim inductæ; quippe vires subito dejectæ, pulsus debilis, intermittens, formicans, papularum, & bubonum eruptio sanguinis coagulationem, & dispositionem corruptivam arguebant: insuper delirium, mania, phrenitis, torpor, somnolentia, vertigo, tremores, motus convulsivi, aliique diversimodi capitis affectus insignem cerebri, & nervosi generis læsionem ostendebant.

Ut febris malignæ typus, sive idea ad vivum depingatur, observationes, seu ægrotantium historiae quamplurimæ satis ad manum prostant: è pluribus hujus morbi exemplis libet hîc pauca tantum inferere, quæ ante aliquot annos in domo venerabilis viri ut cum clade luctuosa, ita non sine admiratione quadam obtigerunt.

Circa solstitium hyemale, anno 1655. puer in ætate circiter septem annorum, sine causa manifesta malè habens, gravi capitis dolore, somnolentiâ, & insigni torpore afficiebatur: simul aderat febris, licet minùs intensa, cum incendio mediocri; quæ tamen paroxysmis vagis, modò semel, modò bis in vigintiquatuor horarum spatio exacerbabatur: mox ab initio morbi ferè continuo dormiebat, etiam in somnis ejulare, incongruè fabulari, & sæpius lecto exsilire solitus. Excitatus, ac interdum sponte evigilans, statim animo constare, & potum constanter requirere solebat. Urina fuit rubicunda, & contentis saturata; pulsus æqualis, & satis robustus; tendinum in carpis contracturæ leves; in collo aliisque partibus corporis maculæ quædam rubræ pulicares apparebant. Primis diebus lenis purgatio, & (enematum usu) crebra alvi subductio instituebatur; julepia cardiaca cum Alexiteriis quotidie sumebantur; vesicatoria collo, aliaque emplastra pedum plantis fuerant adhibita: die sexto sanguis parum è naribus stillavit; septimo sine manifesta diacrisi febris plurimum remisit; calor tantum mitis fuit tactu perceptibilis: etiam urina pallida, tenuis, sine quovis sedimento. Attamen somnolentiâ, & capitis torpore longè gravius molestabatur, ita ut urina, & excrementa alvi involuntariè effluerent: utcunque voce interpellatus adstantes novit, & interrogatis respondit. Affectiones istæ non obstantibus remediis indies ingravescebant: circa 14. diem æger adeo stupidus evasit, ut nec intelligere, nec loqui potuerit; usque tamen ori ingesta (licet inscius) deglutivit, fuitque pulsus satis laudabilis: sub hoc tempore diarrhoeam sponte naturæ excitatam per quatuor dies passus

passus est : qua demum cessante , crusta albicans , & velut cretacea totam oris , & gutturis cavitatem oblinire cœpit , qua sæpius in die deterfa , nova statim erupit. Cum deinde per quatuor dies hoc modo laborasset , circa intellectum , & sensationem melius habuit , ita ut parentes , & amicos dignoscere , dictis annuere , & jussa aliqua exequi potuerit. Prout verò facultas sensitiva restitui , ita circa loquelæ , & deglutitionis organa malum ingravescere cœpit , proculdubio materia è cerebro in nervorum principia , & ductus prolapsa. Torpori ac stupiditati paralysis in lingua , ac gutture successerat ; qui affectus brevi in tantum accrevit , ut postea ægrotus non omninò deglutire potuit , quin ore ingesta statim effluerent , nec quidquam in ventriculum illaberetur. Cum præter morbi atrociam periculum esset , ne hic fame enecaretur , instrumentum parabatur ex pinna cetacea in virgunculam flexilem efformata , ejusque apici nodulo bombycino adaptato ; atque hoc gutturi intrusum clausuram ejus pro tempore tenebat , quo alimentis ingestis transitus patefieret. Post hujus usum die uno , aut altero iterum deglutire , & dein satis alimenti ingerere potuit : atque intra paucos dies loqui , quidvis discernere , atque mirabiliter eluriens totis diebus esculenta cujuscumque generis postulare , & oblata quævis avidissimè vorare cœpit. Interim præ diuturna ægritudine , & partibus nervosis graviter læsis in tantum emaciabatur , ut demum ossibus vix cuti cohærentibus , sceleton vivum exactissimè repræsenteret. Postea tamen matris sedula , indefatigabili , & prudenti circa victum cura sanitatem perfectam recuperavit , & adhuc sanus vivit.

Dum hic puer ægritudinis suæ vix ἀκμήν transegisset , frater ejus binorum circiter annorum ætate major , Idibus *Januarii* ferè simili ritu decubuit. Primò torpore , & capitis gravitate , perendie febricitans somnolentia , & stupiditate afficiebatur : in somnis delirè fabulari , dein evigilans vix animo constare cœpit ; post quatuor , aut quinque dies symptomata hæc ingravescebant : parum intelligere , nonnisi titubanter , & vix articulatè loqui potuit. Urina fuit crassa , opaca , sine hypostasi , aut contentorum subsidencia : maculæ rubræ , exiguæ , pulicum morfui similes , prout in fratre apparebant. Excrementa tum alvi , tum vesicæ involuntariè effluebant. Pulsus verò adhuc robustus , & æqualis constabat. Hypochondria erant tensa , & inflata cum tumore abdominis ; circa diem octavum stillicidium sanguinis exiguum erupit : die ægrotationis undecimo in diarrhœam incidit , qua intra quinque horas septeis dejecit biliosa , tenuia , & summè putida , unde spes aliqua conditionem ægri meliorem fore : postridie tamen fluore alvi cessante , dolor , ac tormina in ventre immaniter infestabant , ut clamans , ac ejulans die ac nocte quærelas gravissimas misceret : hypochondria , & abdomen instar tympani erant tumida & valde distenta. Cum à nullis remediis plurium Medicorum opera exquisitissima tentatis quidquam levaminis recipere potuisset , die decimaquarta in his cruciatibus convulsus obiit.

Paulò post hujus mortem , scilicet 16. Idus *Februarii* , frater ejus senior , circiter undecim annos natus , spei optimæ puer , febricitare incoepit , torpore , & gravitate capitis , uti priores , licet minus intensè , affectus : verum in sanguine , qui temperamenti erat calidioris , major effervescencia , & perturbatio apparebant , ut primis sex diebus præter calorem & sitim , continuo excre-

tionis nixu, modo per sudorem, modo per alvi fluxum molestaretur. Urina erat rubicunda, & turbida: maculae quaedam rubrae, prout in cæteris, eruperunt: die septimo hæmorrhagia ad quinque uncias obtigit, quâ cessante torpor ingens successit, ut per totum istum diem, & noctem sequentem vix oculos elevare potuerit. Die octavo hæmorrhagia narium iterum copiosissima insequuta est, ut periculum esset, ne unâ cum sanguine animam effunderet: cruor copiosè adeo è nare sinistra exsiliit, ut pelvi exceptus casu suo in bullas ingentes efformaretur. Cum supra duas libras sanguinis amiserat, & sudore frigido per-fusus viribus exsolvi incœperit, remediis demum adhibitis difficulter admodum fluxus sistebatur. Hæmorrhagia sedata puer altum dormivit, ac toto isto die somnolentus evasit: crebrò tamen evigilans, satis animo constabat, eratque sensu, & intellectu vegetis: de valetudine interrogatus, se mediocriter habere dixit. Urina, quæ prius erat rubicunda & turbida, tunc pallida, tenuis, & cum hypostasi laudabili apparebat, ut videretur æger (præsertim quia sitis, & immodici caloris expers) perfectè judicatus, & febre immunis. Mane sequenti, die febris nono, adhuc torpidus mansit: excitatus verò, sine intemperie, & alacriter degens in convalescentiæ statu videbatur, nisi quod loquela parum vacillare cœperit. Vespero cum res minus essent suspectæ, febre denuò accensa, derepente in lethargum incidit, ut ægrè à somno excitari, vellicatus vix quemquam noscere, aut articulatè loqui valeret. Licet adeo immanis sanguinis jactura præcesserat, pulsus fuit denuò citatus, altus, & vehemens, etiam urina rubicunda. Post remedia derivantia, & revellentia tota isthac nocte usurpata, egregius hic juvenis paulò in meliori statu visus est, ita ut manè proximo diutius à somno continere, oculos huc illuc deflectere, & se parum exigere incœperit, sine loquela tamen, aut adstantium notitia. Ante meridiem oculis denuò clausis, cujusque facultatis animalis usum penitus amisit: cum pulsu alto & vehementi, palpitatione cordis, respiratione anhela, & suspiciosa, triduo velut apoplecticus jacuit: pulsu demum sensim diminutiore facto, die febris decimotertio mortuus est.

Decimoquarto Calendas *Martii* hujus soror minuscula, cum intemperie febrili & siti, quæri cœpit de dolore, & torminibus in ventre, tremore in manibus, & tensione dolorifica in musculis colli: ultimo *Februarii* apertius febricitans lecto abstinere nequivit; insuper calore vago, modo in facie, modo circa partes inferiores afficiebatur: item torpida, & somnolenta evasit; è somno evigilans haud statim animo constitit. *Martii* primo cum expressione *Rhabarbari* fuit leviter purgata, cum levamine: urina crassa, & rubicunda fuit; etiam maculae rubrae petechiales (prout in cæteris) erant conspicuæ. Huic deinceps per quatuor dies crebris vicibus, nimirum sex horarum intervallo, exhibuimus sp. c. cervi guttas 10. è cochleari julepii *Cardiaci*: symptomata prædicta postea sensim remiserunt, & sine manifesta diacrisi hæc ægrotans salutem, licet tardè, recuperavit.

Sub eodem tempore fraterculus horum ætate minimus ferè simili ritu ægrotavit; qui tamen diarrhœa sponte naturæ oborta, per plures dies biliosa & viridia dejiciens, facilius absolvebatur. Etiam in eadem familia plerique alii domestici, atque advenarum administrantium nonnulli, velut labe per contagium propagata, ex eodem morbo decubuerunt: qui tamen omnes difficiliter demum,

demum, & lenta convalescentia sine crisi regulariter facta evaserunt.

Hanc febrem fuisse malignam, ex contagio, pernicie, macularum pulicarium apparentia, multisque aliis indiciis constare videtur; licet miasma illud inficiens, quo ab alio subinde in alium grassata est, torpidum & minoris efficaciam extiterit: quippe inter singulorum agrotationes plures dies, ac sæpius hebdomadæ intercesserunt, ut morbi hujus, etiam si acuti infectio, ac in plures disseminationis vix intra quadrimestre spatium in eadem domo finiretur. Febris circa prima initia visa est mitis, & blanda, haud multum incendio terribilis; attamen materies à sanguinis deflagratione congesta, statim indomita, exterminatu difficilis, item cerebro, & nervoso generi inimica evasit: quare in singulis morbi initia torpore, & somnolentia, potius quam fervore, & aestu erant dignoscenda. Etiam crisis, licet variis modis, scilicet per sudorem, diarrhoeam, hæmorrhagiam, tentata haud feliciter successit, quin plerumque sanguis motu critico turgescens materiam febrilem è propriis finibus in spirituum animalium domicilia transferre cogebatur; nec tamen ipse hoc ritu depuratus evasit, quin circa febris statum utrique humores (nimirum & cruor, & succus nervosus) impura inmixtione simul vitiiati, & graviter tacti, morbi eventum aut funestum, aut valde periculosum constituerunt.

CAPUT XV.

De Variolis, & Morbillis.

Febrium pestilentium & malignarum censui proximo in loco referimus. *Variolas*, & *Morbillos*, qui reverà sunt mixti affectus, simul juxta, & adversus naturam nostram consistentes. Quoad originem suam seminarium habent nobis connatum; quoad effectus verò, symptomata præternaturalia producant; & (sicut pestis ipsa) venenata adeo peculiare quoddam febrium genus constituunt, hominibus quidem proprium, verum alio modo, quàm *Porphyrius* assignavit; convenit enim homini *omni, soli, & semel* variolis, aut morbillis affici: si fortè quispiam in tota vita immunis degerit, aut alius in hos affectus sæpius inciderit, sunt hæc rara & inusitata naturæ eventa, quæ communi observationi minimè derogant: quin omnino rarum est, quod nimirum *cuncti & soli* homines sint variolis & morbillis obnoxii, atque *unica plaga* iis absolvi soleant. De *variolis* seorsim à morbillis trademus quæ sit earum *causa*; dein qualia habeant *signa & symptomata*; ultimò quæ pertinent ad *crisin & curationem*.

Circa causas considerare debemus, primò quæ sit causa *αρχαία*, quæ nimirum *prædispositio naturalis* homines quidem solos, & omnes, idque semel huic morbo obnoxios reddit. Secundò inquirendum erit de *causis evidentibus*, scilicet quibus, & quot modis latens, & occulta hæc diathesis modo citius, modo serius solet in actum deduci. Tertiò dicetur, quæ sit *causa conjuncta*, quali nimirum sanguinis motu, & alteratione hujus morbi typus producat.

1. Quoad *primum*, ista diathesis, seu naturalis prædispositio, quæ genus humanum ad hunc morbum inclinât, videtur esse labes quædam, seu impuritas sanguinis, inter prima fœtus rudimenta in utero concepta: hanc Authores ferè omnes sanguini menstruo ascriptam volunt; quæ sententia non omninò improbabilis videtur: quippe in utero muliebri (secus ac in aliis plerisque animalibus) generatur fermentum quoddam, quod sanguinis massæ communicatum, ipsi vigorem, ac *πυκνότητι* conciliat, ac dein statim periodis turgescit, & sanguinis superflui excretionem procurat. Tempore autem conceptus, cum omnino desistant menstrua, plurimum hujus fermenti fœtui impenditur, ejusque particulae cæteris quibuscumque heterogeneæ, velut extraneum quoddam, humorum ac sanguinis massæ confunduntur; cui involutæ, & ab invicem separatæ, diu delitescunt: postea tamen aliquando à causa evidenti commotæ cum sanguine fermentescunt, ipsique *ebullitio*, ac deinde *coagulationem* inducunt, è quibus plurima hujus morbi symptomata oriuntur.

Fermentativa hæc semina modo sunt pauca & mitiora, aliisque corpusculis ita obvoluta, ut non facilè emergant, & in actum deducantur: quandoque sunt plura, & fortiora, ita ut levi quavis occasione in hunc morbum maturentur: hinc quidam citiùs, & primis annis variolis corripuntur; alii tardiùs, & non nisi provecta ætate: etiam aliqui contagium facilè suscipiunt, alii verò sine periculo sæpè cum ægris conversantur. Quo citiùs hoc morbo afficitur quispiam, eo securiùs se habet: quare pueri sæpissimè evadunt; senes, aut ætate grandiores plus periculi subeunt, scilicet in pueris, aut juvenibus transpiratio facilior est, etiam corporis habitus firmior, & salubrior. Licet autem venenata hujus morbi semina utplurimum semel, & unica ægritudine solent diffillari; quandoque tamen accidit, ut parte miasmatis adhuc relicta, bis, aut ter ægri in hunc affectum inciderint.

2. *Causa evidens*, quæ hæc semina fermentativa commovet, & sæpissimè in actum deducit, triplex assignatur, scilicet *contagium* aliunde susceptum, *dispositio aëris*, ac immodica *sanguinis & humorum perturbatio*. *Contagio* hunc morbum in alios serpere, latèque grassari, quotidiana experientia manifestum est: scilicet à corpore infecto continuò decedunt effluvia, quæ ab aliis corporibus suscepta statim, instar veneni, cum sanguine fermentescunt, & semina ejusdem affectus latentia, ipsisque homogenea suscitant, & in hujus morbi ideam disponunt: nec solum contactu, sed ad instans miasma communicatur. Qui intra easdem ædes, aut in ægrotantium vicinia degunt, facilè labem suscipiunt; necnon & vestium interventu fovetur, longius dissipatur, & ad remota transfertur loca. Qui sunt consanguinei, alterutros citius inficiunt: etiam qui sunt timidi, & maximè hunc morbum perhorrescunt, in eum promptiùs incidunt; timore enim miasmatis particulae à superficie corporis intus convehuntur. Quo tempore increbrescit contagium, & variolæ sunt epidemicæ, ferè alii quivis morbi in hunc degenerant. *Secundò*, peculiaris quædam *aëris dispositio* Variolas insigniter producit; hinc sæpissimè popularis evadit, ac per totas regiones, urbes, vicosque passim desævit: hinc etiam verè, & autumnò crebrior existit; quippe in aëre tunc temporis imprimis diversimoda, atque exinde tumultuantia innatant corpuscula, quæ cum

aura vitali inspiramus, indeque variæ humorum ac sanguinis effervescentiæ, & morborum idæ suscitantur. Nec tantum hic affectus ob has causas crebrior, & epidemicus evadit, sed & multiplicem adipiscitur naturam, ut Variolæ quandoque sint lethales & velut pestiferæ, quandoque mitius & benignius se habeant, prout nimirum plus aut minus malignitatis ab aëre contractæ referunt. Hinc etiam pustulæ interdum nigræ & lividæ apparent, & multum de natura pestilentiae habent. *Tertio*, interdum verò, licet deerit contagii fomes, nullaque maligni aëris constitutio præcesserit, tamen ob sanguinem, & humores immodicè perturbatos variolæ oriuntur: ita novi quosdam à crapula, aut exercitio immodico in hunc morbum incidisse, cum præterea nemo circumcirca in tota regione ægrotavit: nimirum sine prævio miasmate latentia hujus mali semina à nimio sanguinis fervore commota, & invicem associata agglomerantur, facileque totam inquinant sanguinis massam, & fermento suo inficiunt.

3. Haftenus de causis *αἰτιῶν*, & evidenti; quoad conjunctam verò, scilicet quæ sit hujus morbi ratio formalis, seu modus fiendi, res paulò intricatior videtur. Vulgò comparari solet effervescentiæ musti, aut cervisiæ, cum in dolio depurantur; istis enim liquoribus si aliquid fermenti adjicias, eorum particulae, cum sint heterogeneæ & miræ activitatis, illico per totam se diffundunt liquoris molem, crassiora ac impura, quibus impinguntur, corpuscula variè exagitant, invicem deducunt, & obvolvunt, donec efflorescentiâ factâ, eadem ab intimo reliquorum consortio ad extremam superficiem propellunt. Pari modo heterogenea hujus morbi semina sanguinem fermentare, & dein pustularum eruptione, velut efflorescentiâ quadam depurare creduntur. Verum enimverò, si rem strictius consideremus, magnum hîc discrimen apparebit: quippe miasma variolarum habet se uti fermentum, sed corruptivum; & sanguinem non versùs perfectionem, sed depravationem effervesce cogit: cum enim venenatæ hujus miasmatis particulae subjecto capaci impinguntur, alia statim corpuscula sibi ipsis similia, & nobis connata exsuscitant, quibus associatæ totam pervadunt sanguinis massam, eamque insigniter turgescere, & ebullire, ac post aliqualem effervescentiam in partes secedere, ac coagulari faciunt: scilicet dispersa veneni semina cruoris mixtionem solvunt, spiritus puriores statim profligant, dein crassiores ejus particulas sibi consciscunt, & adhæsu suo velut congelatas reddunt. Portiones ita coagulatæ unâ cum implexis veneni seminibus à reliquo sanguine in circuitu ejus intervallorum extremitates derelictæ cuti affiguntur: quò pacto si natura satis robusta cum gelato sanguine totum virus eliminarit, reliqua cruoris massa, licet pauperior facta, utcunque salubris & vitæ prorogandæ habilis existit; sin cruor nimium coagulatus hoc modo depurari nequit, vel si portiones sanguinis cum veneno coalescentes non plenè erumpunt, aut denuò intus restagnant, & sanguinis liquorem penitus corrumpunt, aut etiam visceribus, & imprimis cordi affixæ, eorum crasin ac robur destruunt.

Sanguinis cum veneno congelati portiones circa diem quartum (modò citius, modò tardius) erumpere incipiunt: quippe non statim, sed post aliquod tempus, quo venenum se explicat, & effervescencia cruorem fermentat, coagulatio inducitur. Primò leves portiunculae sanguinis inquinatæ, eaque

eaque numero paucae, instar pulicum morsus in cute defiguntur: citò post-hac plures apparent; & primò eruptae novae materiae accessu, & cruoris congelati continuo appulsu accrescunt, & in tumorem elevantur: dein hae moleculae primò rubrae, sensim auctae tandem albescunt: scilicet sanguis cum veneno extravasatus, propter calorem & stagnationem in pus mutatur. Circa septimum ab eruptione diem alibi tumores in scabiem siccam incrustantur; tenuiore enim materiae parte evaporatâ, reliqua indurescit, quae dein cuticulâ exesâ & abruptâ, à cute decedit.

Cum variolarum miasma spiritibus & cruori semel imprimitur, rarò admodum medicamentis, aut venae sectione deleri, aut diffilari potest, quin diathesis latens in actum erumpat: quare primò se paulatim diffundit, & sanguinis massam velut fermento inspirat. Hinc ebullitio & effervescentia in toto corpore producuntur, vasa distenduntur, viscera irritantur, membranae vellicantur, donec contagii semina sanguinem fundendo & coagulando, tandem congelatis ejus portionibus obvoluta foras protruduntur. Hujus morbi essentia melius patefcet, si modò signa, & symptomata, quae in toto ejus decursu observantur recenscam, eorumque rationes, & causas, è quibus dependent, ordine subjiciam: sunt autem ista, vel quae morbum praesentem indicant, vel quae statum, & eventum ejus praenuntiant.

Quoad diagnosin hujus affectus, quâ innotescat, num quis primò ægrotans variolas habiturus sit, necne, perpendenda sunt eo tempore contagii vis, & symptomatum primò apparentium (αυδρομή: si enim ob malignam aëris constitutionem hic morbus latet, & passim grassatur, nemo tunc febre corripitur sine suspitione variolarum, praecipue si ipsis totâ vitâ prius caruerit: sin rarior sit hic morbus, & absit contagii metus, tamen improvisus ejus insultus brevi hujusmodi signis, & symptomatis se prodit.

I. Adest febris incerta, & vaga, modò intensa, modò remissior, nullam observans incrementi aut ἐπακμῆς rationem, adeò ut ægroti nunc summè incalescant, mox sine causa evidenti ἀπυρέτως degant; cujus causa est, quod semina fermentativa non æquabili motu agitentur, sed instar ignis semiobruti, nunc magis gliscant, nunc ferè sedentur, & expirent; donec incendio latius serpente, flamma ubique erumpat.

I I. *Dolor in capite, & lumbis* adeo peculiare est signum in hoc affectu, ut ferè solus in febre continua variolas imminentes significet; cujus ratio, vasis majoribus à sanguinis effervescentia plurimùm distentis vulgò imputatur: veruntamen haud constat, cur non æquè in aliis partibus, propter similem vasorum distensionem eadem molestia inferatur, & quare in variolis potiùs quàm in Causone, aut aliis febrilibus, ubi sanguis plus effervesceat, ejusmodi dolores increbrescant. Quin observare licet insignes modò in capite, modò in lumbis cruciatus urgere, quando sanguine parum turgescente, vasa minimè ampliantur, scilicet in morbi principio, quando febrilis intemperies nondum conspicua est, dum ægroti adhuc foras obambulant, & stomacho valent, variolae ingruentes primò hisce doloribus se produnt. Quare videtur potiùs in nervoso genere hujusmodi ἀλγυμμάτων causam subsistere: scilicet in cerebro, & spinali medulla, propter membranas, & partes nervosas à veneni particulis vellicatas istos dolores oriri. Etenim verisimile est, quod innata
variolarum

variolarum semina in partibus spermaticis potissimum recondantur, & quod primum miasmatis contagium plerumque Spiritus animales corripiat. Hinc in succo, quo cerebrum, & partes nervosæ, præsertim verò medulla spinalis irrigantur, primam effervescentiam concitari, & exinde cruoris massæ labem communicari: quare incipiente hoc morbo, caput & lumbi dolore atroci urgentur, postea veneno in sanguinem translato, effervescentia febrilis in toto concitatur.

III. Magna *anxietas*, & *inquietudo*, interdum & *syncope* ægrotantes infestant; scilicet ob perturbatum sanguinis motum, necnon æquabilem ejus mixtionem à fermento venenato solvi inceptam, cruor hinc in corde stagnare, & in circuitu suo præpediri aptus affectus modò citatos infert.

IV. Vomitus immanis, etiam quando ventriculus impurâ humorum saburra vacuus est, sæpissimè hunc affectum comitatur: cujus ratio est, quia semina fermentativa in motum concita, arteriolis in ventriculi tunicas dehiscen- tibus, ad singulos appulsus sanguinis deponuntur, & vomitum non secus ac stibii particulæ deglutitæ concitant: postea tamen quamprimum diaphoresi procuratâ venenum extra propellatur, symptoma hoc cessat, & sine quavis expurgatione noxiæ materiæ stomacho valent ægri.

V. His accensentur symptomata, quæ juxta varias corporum habitudines se vario habent modo, ut sunt somnolentia gravis, terrores in somno, deliria, tremores & convulsiones, sternutatio, calor, rubor, pruritus, tumor faciei, vehementia symptomatum ab initio, ut morbus statim vigorem attigisse videatur: quorum omnium ratio, si quæ superius de febrium symptomatis dicta sunt, observentur cum respectu ad diversas ægrotantium temperies, habitum, ætatem, necnon anni conditionem, facile elucescet.

2. Quoad *prognosin* hujus morbi, ipsum aut salutarem, aut lethalem, aut dubii eventus fore, signis *επισημειωτοῖς* indicatur.

I. Res in vado esse videtur, quando hic affectus circumstantias habet benignas; nimirum cum accidit in bona constitutione aëris, & anni, quo tempore variolæ sunt minùs malignæ, & pestilentes, prout Anno 1654. Oxoniæ circa Autumnum variolæ latissimè grassabantur; tamen plurimi evaserunt: olim verò circiter Annum 1649. rarior erat hic morbus, tamen plures ex eo interibant. Etiam minùs subest periculi, si in ætate puerili, aut infantia, si in temperamento sanguineo, & habitu corporis bono, si in familia contigerit, cujus antecessoribus variolæ non fuerunt exitiales: præterea si in toto morbi decursu symptomata eveniant laudabilia; si primo insultu febris adest lenis, sine immani vomitu, syncope, delirio, aut aliis horrendis affectibus. Circa diem quartum si febris cum symptomatis maximè urgentibus sedatur, & tunc maculæ quædam rubræ apparere incipiunt; si die exitus secundo maculæ ejusmodi rubræ longè plures sunt conspicuæ, quæ postea sensim in moleculas accrescunt, & in pus maturantur. Circa decimum plus minus ab eruptione diem, si tumores alibi incrustari, & dein paulatim decidere incipiunt: si à quo primò eruperunt, variolæ sint molles, distinctæ, paucae, rotundæ, fastigiatae, solummodo cutim, & minimè partes internas occupantes, res ægroti in bono esse statu confidere licet.

II. Phenomena quæ in variolis rem suspectam & periculi plenam significant, sunt hujusmodi: si adest maligna aëris constitutio, ut hic morbus pestilentior evaserit, eoque plures interierint; si homines provectæ ætatis eo corripiuntur; si in temperamento frigido & melancholico, aut in corpore impuro, & cacochymico acciderit, ubi sanguis non expeditè circulatur, nec transpiratio rectè peragitur, vel hypochondria, aut præcordia sint obstructa, viscera quævis infirma, aut ulcere affecta, aut si habitus corporis sit nimium obesus, variolæ non sine magno vitæ periculo eveniunt: nec minus timendum est quando statim ab initio febris ingens, vomitus immanis, syncope, virium dejectio, phrenitis, aut delirium ingruunt, neque variolis plenè eruptis desistunt; hæc enim nimiam in sanguine, & humoribus perturbationem significant, ac materiæ morbificæ confusionem, & contumaciam, quæ nec subigi, nec à cruoris massa facile secerni, aut æquabiliter extrudi poterit: si adsit anxietas, & magna inquietudo, cum inordinata humorum effervescentia, & ebullitione, etiam sitis ingens, & difficultas spirandi, necnon alvi fluxus, aut dysenteria, indicant diaphoresin præpeditam, & humores malignos versùs interiora restagnare. Variolæ tardè erumpentes materiæ cruditatem, effrænationem, & naturæ impotentiam arguunt: multò magis duplices, & continuatæ, quantitatis nimie, confusionis, necnon expulsionis inordinatæ, & irregularis materiæ istius (cum non certis foraminulis, sed indiscriminatum quaquaversus ejicitur) indicio fuerint. Variolæ duræ ejusdem materiæ incoctibilitatem; depressæ expulsionem debilem significant, eoque deteriores sunt, si in earum medio maculæ nigræ appareant; aut si maculæ feбри purpuratæ, seu pestilentiali familiares variolis interspergantur, malignitatem insignem, & sanguinis putredinem indicant, qualis nimirum in peste reperiri solet. Denique variolæ nigræ, lividæ, aut virides malè ominentur, quia præter sanguinis coagulationes, ejus *καρσίνες*, & corruptiones, prout in gangræna, aut anthrace pestilenti, arguunt. Si ubi egressæ sint variolæ confestim marcescunt, & tumor partium remittitur, indicat malignæ materiæ, sive sanguinis cum veneno congelati retrocessum, & ad interiora restagnationem: unde ni statim diaphoresi liberius excitatâ denuo foras eliminetur, cito mors ut plurimum succedit; hinc enim sanguis plus coagulatus putredinem subit, ac etiam in motu præpediri, & in corde & vasis stagnare aptus est. Si post eruptionem variolarum alvi fluxus, aut hæmorrhagia supervenit, mali indicium est, quoniam hac ratione venenum extrâ propulsum denuo intus revocatur. Interdum verò hæc symptomata cum magno ægrotantium levamine contigisse observavi, scilicet natura priùs gravata & oppressa hoc modo, velut parte oneris detractâ, sublevatur; quare se operi diaphoreseos accingit, & noxiæ materiæ expulsionem promptius expedit.

Quod ad *Therapeiam* attinet, cum morbi hujus stadium, sive decursus tria habeat tempora, velut totidem metas invicem distinctas; etiam curativæ intentiones singulis horum accommodari debent: quare circa variolas docet *methodus therapeutica*, primò quid agendum sit quamdiu sanguis materiæ fermentativæ motu intus ebulliat, & effervescat, ac valoris nondum appareant; quæ periodus ut plurimum quatuor, aut quinque diebus solet absolvi. *Secundò*, quæ victus & medicinæ ratio instituenda sit à variolarum

eruptione,

eruptione usque ad morbi statum, scilicet dum pustulæ ad summum pervenerint, & plenè suppuratæ exarescere incipiunt. Tertiò denique, quid in morbi declinatione, usquedum variolæ exsiccatae planè deciderint, observare debeamus.

I. Quoad primum intentio sit, ut naturæ impedimenta quævis auferamus, quo sanguis variolarum fermento inquinatus, & coagulari aptus adhuc motum æquabilem in corde, & vasis sine stagnatione retineat, ac effervescentia portiones cum veneno gelatas foras expellat. Interim cautio sit, ne fermentationis, seu effervescentiæ opus ullatenus cohibeatur, aut nimium proritetur; hoc enim cruoris massa plus debito in portiones congelatas agitur, isto restringitur nimis in motu, nec particula venenata cum cruore gelato foras amandantur. Natura à secretionis & expulsiõis opere impediri solet nimia excrementorum congerie in visceribus, aut sanguinis exundantia in vasis: quare primo statim morbi insultu danda erit opera, ut evacuatio per vomitum, aut sedem, si opus fuerit, tempestivè procuretur; unde pharmacis tantum mitioribus & blandis utendum est, quæ nimirum non irritent, aut humores perturbent: quare hoc tempore interdum emetica, purgantia, aut enemata, modo hæc, modo ista locum habent: etiam sanguinis missio, si plethora adsit, bono cum successu celebratur.

Durante hac sanguinis effervescentia victus instituaturs tenuis & modicè refrigerans, scilicet ex hordeatis & avenaceis, liquore posseti, cervisia tenui, & similibus: vitentur caro & juscula ejus, quibus sanguis ob nimiam pabuli *Sulphurei* copiam plus debito accenditur. Etiam frigida & acida quævis nocent; hæc enim sanguinem magis congelant, & astrictione vasorum oscula contrahunt, ut variolæ minus liberè erumpant. Etiam calida & cardiaca cautè adhibeantur; his enim sanguis & humores agitantur nimis, & in confusionem aguntur.

II. Cum variolæ apparere incipiunt, tria sunt quæ regula constanti quibusvis ægrotantibus agenda præcipimus; nimirum ut lenis & blanda *diaphoresis* usque in sanguine continuetur; etiam ut *guttur*, ac *oculi* à nimia variolarum eruptione præserventur. Quo sanguis leniter effervescentia variolas emittat, decocta ficuum, florum calendulæ, & rasuræ Cornu cervi in liquore posseti vulgò præscribuntur, & eorum usus à longo tempore ferè inter omnes increbuit. Propter eandem intensionem cardiaca moderata aliquoties in die propinare solemus; calida autem & fortiora sedulò vitentur: purgatio & venæ sectio hîc pessimè audiunt, & cogente licet necessitatis prætextu, propter opprobrii metum hæc Medici vix audent celebrare. Pro tuendis gulæ, & gutturis partibus exterius scutum croco intersutum, & lacte muliebri intinctum apponimus; hæc enim poros aperiendo venenum ab intimo gutturis exterius alliciunt: etiam in hunc finem adhibemus gargarismos, & oriis collutiones, quæ restrictione sua variolas intus erupturas cohibeant. Oculos epithematis ex aqua rosarum, lacte muliebri, croco, & similibus crebro iteratis ab incurso variolarum munimus. Præter hæc symptomata quædam horrenda quandoque urgent, quibus cum idoneis remediis tempestivè occurratur: adsunt modo vigilæ, phrenitis, hæmorrhagiæ, vomitus, diarrhææ, variolarum recursus: his & quibuscumque aliis pro re n'ta

prudens Medicus novit prospicere; in quibus tamen magna cautione opus est, ne dum exiguis consulimus, nimia pharmacorum molestia magnum naturæ opus interturbetur. Etenim toto hoc tempore una & continua est crisis; quare nihil temerè movendum est. Maxima requiritur Medici, & ministrantium sedulitas & circumscriptio, quando hic morbus in statu est; scilicet ne cum variolæ plenè eruptæ, & ad summam molem evectæ sint, transpirationem impediant; tunc enim de febre redintegranda, & de materiæ malignæ intus restagnatione ægri periclitantur, quorum alterutrum dum præcavere studemus, sæpe alterum inferimus.

III. Cum morbus in declinatione fuerit, & variolæ emarcescere, & incrustari inceperint, res ut plurimum extra periculum sita est, nec multum negotii Medico incumbit: victu adhuc tenui, & carniū experte ægrotus, licet valde esuriens, contentus sit: si pustulæ tardiùs deciderint, linimentis, & epithematibus earum casum maturare solemus, à quibus ne altiores relinquantur foveæ, præcavetur. Postquam æger variolarum exuviis per totum depositis, lecto exsurgere, & in cubili obambulare potest, purgatione bis, aut ter iterata sordes, & materia excrementitia in visceribus, & sanguine relicta auferantur, & dein victu lautiori uti permittatur.

Variolis adeo affines sunt *morbilli*, ut seorsim ab illis tractari apud plerisque Authores non meruerint; quin utriusque affectus simili modo, & methodo rationes unà traduntur. Essentia, & curatio quoad magis, & minus, sive accidentaliter saltem differunt; quia in morbillis exanthemata non adeo in molem attolluntur, neque suppurantur: quare citius, & cum minori periculo ægritudo finitur. Solet hic affectus sæpissimè inter pueros grassari; rariùs ætate grandiores, aut senes corripit: etiam qui variolis prius laborarunt, non sunt adeo morbillis postea obnoxii; in plerisque verò affectus sunt cognati: scilicet in *morbillis* labes ab utero contracta homines *solos*, *omnes*, & *semel* disponit; diathesin latentem maligna aëris constitutio, interdum & crapula, sæpissimè contagium solent in actum deducere. Adsunt malignitatis notæ, & cum pernicie, & contagio ægritudo sæpe epidemica existit.

Ut rei summam breviter contraham, videtur quod *morbilli* sint fermenti extranei ab utero contracti levior quædam efflorescentia, qua particulæ nonnullæ in motum concitæ sanguinem leniter effervesce, & parum coagulari faciunt: quare stigmata inde prolata, sine cuticulæ disruptione, sola evaporatione diffiantur: variolæ autem sunt ejusdem fermenti plenior, valida, & secundum omnes particulas agitatio, quæ majorem ebullitionem, & coagulationem sanguini inferens exanthemata longè plura, eademque mole grandiora, & non nisi suppuratione dissolubilia producit. Quando variolæ præcedunt, non tantum ejusdem affectus, sed plerumque morbillorum exinde sequitur immunitas. Morbilli, quia fermenti particulas solum aliquotas absumunt, adhuc diathesin ad variolas relinquunt: quare senes, aut ætate grandiores morbillis non ita promptè inficiuntur, quoniam aut variolis prius infecti contagio absolvuntur, aut leviori hujus affectus miasmati eorum spiritus robustiores faciliè resistunt.

Doctrinam de *Variolis* præmissam faciliè esset ægrotantium historiis & observationibus

servationibus illustrare : quippe circa nullum præterea morbum uberius suppetit exemplorum copia, aut accidentium varietas : è numerosa, quæ hujus farinæ est, supellectile paucos solummodo casus, eosque anomaliis quibusdam insignes hoc loco proponam.

Usitatum est quosvis variolis affectos simili, aut prorsus eadem medendi methodo, ac victus ratione tractare : quare apud vulgares Medicus raro accersitur, verum mulieribus quibusdam clinicis, quæ hanc Jatricen se optimè calere venditant, res tota committitur : atque istæ solent jusculis, & quibusvis ægri sorbilibus flores calendulæ, rasuram c. cervi, & interdum ficus incoquere ; item quavis nocte bolum ex diascordio exhibere. Qui tali regimine non convalescunt, minimè neglecti, sed præ morbi atrocità incurabiles pronunciantur. Verum enimverò hujusmodi praxin non ex æquo omnibus convenire, nec quibuscumque indifferenter adhibendam esse, duæ sequentes historiæ palam facient.

Juvenis viginti circiter annos natus, corporis gracilis, & temperamenti calidioris, ineunte vere febricitare cœpit. Primis diebus vomitus atroces, cordis oppressio, æstus & rigoris vices crebræ, dolor in lumbis, phantasiæ perturbatio, & vigiliæ infestabant : die tertio variolis apparentibus symptomata ista remiserunt, usque tamen febris cum siti & calore perstitit. Huic non solum decocta in hoc morbo assueta, verum & Julepia eleganter propter gratum saporem parata adeo nauseæ & molestiæ fuerunt, ut eadem sine magna molestia nedum pitissare licuerit. Quoties hora somni diascordium, aut aliud temperatius cardiacum ad diaphoresin continuandam, vel in exigua quantitate sumeret, nox insomnis, cum jactatione plurima, & dein primo mane hæmorrhagia insequuta est ; qua quidem variolis plenè eruptis, propter hanc occasionem semel & dein rursus contingentem ægroti salus insigniter periclitata est : quare cum sanguinem huic à levi irritatione immodicè effervere aptum observatione comperiissem, pro re nata hanc methodum institui. Pharmacia prorsus omni posthabita, pro siti restinguenda cervisiam tenuem, & Amygdalatum simplex ad libitum sumebat : pro victu, quoniam juscula avenacea & hordeata quævis respuebat, solummodo erant poma ad teneritudinem cocta, & dein saccharo & aqua rosacea condita, quæ aliquoties in die comedebat. Natura tenui hoc regimine contenta, ac ab alio quovis perturbari visa, opus suum feliciter peregit, ut sine gravi postea symptomate, variolis sensim maturatis, & dein sponte decidentibus, æger convalesceret.

Medio autumnio superioris anni, adolescens perillustis, sanguine acri præditus, & hæmorrhagiis narium crebrè obnoxius, variolis ægrotabat : sanguis sponte sua immodicè effervebat, ut pustulæ per totum corpus confissimæ erumperent : huic serum lactis cum floribus calendulæ, aliisque usitatè incoctis, item julepia, aut cardiaca quævis (temperata licet) diaphoresin leniter promoventia, sanguinis fluxum certissimè concitabant : quare similem ac in ægro prius citato victus rationem præcepti, qua quidem melius habuit : utcumque in ipso morbi statu (cum variolis plene eruptis, ob difficiliorem transpirationem solet febris in omnibus nonnihil redintegrari) hic ægrotus in hæmorrhagiam copiosam incidit, ut post largam sanguinis pro-

fusionem variolæ flaccescere inceperint. Postquam remedia pro sistendo sanguine quamplurima incassum tentarentur, tandem à sacculo (cui inerat buto in Sole exsiccatus, & contusus) circa collum suspenso, primo ac immediate levamen sensit; etenim hæmorrhagia hinc statim sedata, & ea (cum epithema ad hoc constanter postea in sinu gestaret) non amplius redeunte, ægrotus noster usque victu tenuissimo & infrigidante usus integrè convaluit; ut reverà hinc constare videatur, quod licet sanguis in hoc affectu insigniter ad coagulandum aptus fuerit, tamen quamdiu spiritus vitales fortes & robusti satis regimine potiuntur, ipsi propriis viribus innixi portiones cruoris congelatas velut discretionem quadam sagaci optimè secernunt, & eliminant; atque hoc opus maximè perturbatur, cum iidem spiritus à cardiacis aut victu calidiore irritantur nimis, & in confusionem aguntur. In *peste* autem secus accidit, quoniam in hac, si mora conceditur, spiritus ipsi statim à veneno profligantur; quare hinc aperto Marte illico dimicandum est, cum in *variolis* Medicus *cunctando potius restituat rem*.

Circa *missionem sanguinis* instante variolarum eruptione valde ambigitur. Olim inter nostrates hæc res sacra audiebat, neque sub ullo necessitatis prætextu phlebotomia admitti solebat: nuper autem experientia duce in quibusdam casibus sanguinem mitti omninò utile & necessarium esse comprobatur; quæ tamen evacuatio si in quavis constitutione indiscriminatim adhibeatur, aut quando isthac opus fuerit, in quantitate nimis larga peragatur, magna sæpe incommoda exinde sequuntur.

Ante aliquot annos fœminam illustrem, juvenem, vultus floridi, & temperamenti calidioris, post quartum ingravidationis mensem valde febricitantem invisi: vomitu immani, lumborum dolore atrocissimo, insuper calore ac siti intensissima urgebatur: erat pulsus celerrimus, cum vibratione forti & vehementi. Licet variolæ illic loci nusquam increbrescerent, tamen hujus affectus symptomata isthæc suspicionem non levem incutiebant: utcumque sanguinem mitti debere, ejus effervescentia valde immodica indicabat; quare circiter uncias sex illico detraxi: exinde calor nonnihil remisit, usque tamen vomitus cum dolore atroci in lumbis perstabat. Hora somni bolum cardiacum cum laudani nostri gr. sem. exhibui, unde somnus quietus cum placida diaphoresi, & symptomatum omnium sedatione successit. Mane proximo variolæ eruperunt, quibus licet ægra consitissimis afficeretur, tamen sine periculosa ægritudine, aut abortus metu convaluit, & gravidationem integrè complevit.

Novissimo autumno vir robustus, habitus corporis athletici, vultus tamen pallidi, & temperamenti frigidioris, in febrem incidit: die secundo cum calore & siti, doloréque in lumbis immanissimo torquebatur. Cum sanguinem in exigua quantitate mitti præscriberetur, pseudo-Chirurgus accersitus ipsum ferè ad sesquilibram detraxit: paulo post æger sudore frigido perfundi, viribus subito collapsis, rigore, pulsu debili, inæquali, & crebra lipothymia tentari cœpit: hoc tempore accersitus cardiaca temperata crebra vice sumenda exhibui. Inde cum pulsu & spiritibus restitutis febris redintegrata est, quæ postea per plures dies, imò hebdomadas irregulari admodum modo ægrum exercuit; etenim per tres aut quatuor dies valde incallescere, etiam

etiam siti, vigiliis, cephalalgia, aliisque symptomatis infestari, dein sudore copioso, & velut critico per totum suffundi solebat, quo quidem semidiurno spatio se melius habuit: exinde verò febris denuò recrudescens materiam usque novam crisi aliâ, ac deinceps aliâ diffilandam crebro congerebat. Postquam per viginti utminus dies *ἀνωρύτως* ita febricitarat, tandem variolæ in singulis partibus corporis sparsim erupere; & tunc primò febris in totum remitti cœpit. Intra paucos tamen dies, propter errores in victu commissos pustulæ quamplurimæ rursus subsidebant, paucis tantum ad maturitatem perductis: utcumque variolarum subsidentium vice bubo ingens ponè aurem dextram accrevit; quæ brevi suppuratâ, & disruptâ, puris magna copia per plures dies effluxit; & ita tandem corruptelæ sanguinis, aliàs diffilari inhabiles, sensim eliminabantur, & ægrotus salutem integrè recuperabat.

CAPUT XVI.

De Puerperarum Febris.

Puerperarum febres supra communium aliarum indolem valdè periculosas esse, vulgaris experientia abundè testatur: etiam easdem, quoad essentias, à *syncho* tum *simplici*, tum *putrida* plurimum differre, è signis & symptomatis earum ritè perpenſis liquidò constat. Quapropter non abs re fore duxi, post febres malignas, *acutos puerperarum morbos*, utpote ob perniciem ipsis summè affines, tractare. Priùs tamen quàm affectus ipsos explicare aggredior, earum subjecta, scilicet puerperarum corpora, quali modo sint prædisposita, & quo apparatu ejusmodi ægritudinibus fiant obnoxia, considerare oportebit.

Circa hoc primò occurrit, quod sanguinis menstrui fluxum pati, humano generi, itidemque foeminis omnino conveniat; de cujus natura & origine non erit hujus loci inquirere: at adnotare sufficiet, quod in istis cruoris periodicè excernendi particulæ sint valdè fermentiscibiles, quæ si præter solitum naturæ morem in corpore retinentur, sæpiſsimè plurium ægritudinum causa existunt; excepto tamen si mulier utero conceperit. Toto enim in gravidationis tempore sine magno incommodo menses subsistunt, atque interea pro nutritu foetus lac, sive humor alibilis, in magna copia circa placentam uterinam deponitur: post partum verò ista diuturna mensium suppressio copioso lochiorum profluvio compensatur, atque lac intra triduum, utero penitus relicto, ubertim in mammas profilit; quo tempore puerperæ solent febriculâ tentari. Quod si lac è mamminis propellitur, versùs uterum denuò restagnat, & unâ cum lochiis sub forma humoris albicantis excernitur. Interim à partu uterus ipse varias affectiones subit; sæpe enim ejus tonus læditur, unitas solvitur, & alia plurima accidentia inducuntur, quæ puerperas periculosa alex subjectas reddunt. Quare ut acuti earum morbi ritè explicentur, de tribus hisce considerationem præcipuam habere convenit: scilicet primò de foetus nutritu, sive de generatione *lactis*, tum in utero, tum in mammis, deque metastasi ejus ab alterutro in alterum. Secundò de sanguinis materni purgamento, sive de *lochiorum profluvio* post menstrua diu suppressa.

Tertiò.

Tertiò de *uteri* post partum *statu*, ejusque in alias corporis partes *influxis*. Atque his præmissis, de febribus puerperarum, scilicet tum *lactea*, tum *putrida* dicta, quæ ob perniciem maligna dici meretur, verba faciemus.

Primò *Lac*, & *Humor nutritius* in uterinis partibus pro foetus nutritu congestus, sunt naturâ consimiles, licet consistentiâ aliquantùm differant: *Lac* est revera crassius, quoniam ore excipiendum in ventriculo digeri, ac postea tenuior ejus portio massæ sanguineæ convehi debet. *Humor* alter *alibilis* tenuior est, & velut aqua lactis stillatitia, quia per vasa umbilicalia, sine prævia digestionem, embryonis sanguini immediatè infunditur. Uterque succus è chylo in stomacho materno recens confecto constare putatur: qui in mammis reponitur, crassior, & albidior est, propter colorem rarius, & in glandulis majoribus coctionem; contrà accidit in utero, ubi percolatio est strictior & glandulæ sunt perexiguæ. Inter Authores autem valdè disceptatur, quibus ductibus iste humor, tum in mammas, tum in placentam uterinam deferatur. Contendunt alii lac tantùm è sanguine uberius in glandulis cocto progigni; quod tamen propter immensa lactis dispendia, quæ cum sanguine non consistunt, haud probabile videtur. Statuunt alii, chylum, sive humorem lacteum, è coctionis visceribus per meatus occultos sine alteratione quavis in utraque receptacula immediatè convehi. Veruntamen tantisper, dum isti ductus patefcunt, mihi quidem verisimilius videtur, quod à cibis stomacho materno ingestis chyli inde confecti portio statim in venas absorbeatur, qui sanguinis vehiculo potitus, priusquam ipsi assimiletur, in glandulas hic illic eidem excipiendo destinatas per arterias advectus, à cruoris massa denuò secretus deponatur; cùm enim constet quod potus copiosè ingestus citò totam sanguinis massam trajiciat, & sub lymphæ forma per urinam reddatur: cùmque ulcera perantiqua mediante cruore humorem nutritium à toto corpore deprædentur, ipsumque sub specie putridi ichoris profundant, quidni pariter succus alibilis glandularum colo secretus, priusquam sanguinis colorem induat, in humorem lacteum faceffat? Hoc equidem probabilius videtur, quia dum lac ab utero in mammas, & è contra fertur, sanguinis massam pertransiens perturbationem in toto cum intemperie febrili concitare solet; insuper primis à partu diebus, quando glandulæ secretionis officio minùs rectè defunguntur, jumenta, quæ lochia non excernunt, lac cruentum (hoc est, sanguini præ copia simul exundanti commixtum) uberibus emulgendum præbent.

Secundò, quod ad *menstrua* ingravidationis tempore *suppressa*, & *lochiae* à puerperio copiosè dimanantia spectat; dicimus, quod à foetu concepto menstrua designatione divina suppressi oportuit, eo quod eorum fluxus sæpe abortum inferat: dein quoniam vasa succi alibilis in partes uterinas exsudatione continuâ deplentur, sanguinis massa in turgescencias fluxu menstruo sedandas non facillè assurgit. Ob eandem rationem mulieribus, quamdiu infantes lactant, catamenia ut plurimum sistuntur. In quibusdam forsan sanguine calidiori præditis menses, tum ingravidationis, tum lactationis temporibus fluunt; verùm id rarius, & non sine incommodo evenire solet. Interea tamen menstrua durante ingravidatione suppressa, quoniam longè minùs humoris nutritii tunc temporis pro lacte impenditur, multò magis sanguinem depræ-

vant, quàm eadem sub lactatione cohibita solent. Quinimò ex istis in priori statu diu suppressis labes quasi venenata cruoris massæ imprimitur, quæ nisi statim à puerperio diuturno lochiorum fluxu expurgetur, affectus graves, & ferè malignos producit. Quare ut de lochiis fluentibus sententiam feram, dico quod hæmorrhagia ista à vasis, quibus placenta utero cohæret, disruptis immediatè procedat, quodque hac viâ sanguis & humores excrementitii, partim circa uterum durante ingravidatione congesti, & partim è tota cruoris massa fluxiles evacuentur; scilicet dum uterus priùs mole intumefactus statim à partu concidit, & in minus spatium contrahitur, sanguis è vasis in eo patentibus copiosè exprimitur. Præterea autem inquantum durante catameniorum suppressione massa sanguinea particulis valde fermentativis imbuitur, quamprimùm à partu ora vasorum aperiuntur, illicò, velut instante largiori mensium fluxu, totus effervescit cruor (non secus ac mustum utre aperto) & particulas maximè fermentiscibiles lochiorum dimanatione, tanquam efflorescentia, è sinu suo expurgare nititur: ideoque præter sanguinem, qui primis diebus, propter vasa recens aperta, sæpe purus effluit, postea ichores valdè discolores, scilicet lividi, aut virides, illique valde foetentes excernuntur. Hujusmodi fluor per quatuordecim utminùs dies, imò in quibusdam per mensem durare solet; atque si ob errata quævis priùs sistatur, quàm tali efflorescentiâ satis depuretur cruoris massa, illico febris valde periculosa cum tetro symptomatum apparatu induci solet; de qua inferiùs proprio in loco dicetur.

Tertia consideratio ad doctrinam de puerperarum febribus prævia, præcipuè circa ipsum *uterum* versatur: quomodo nimirum à puerperio afficiatur, & qualem in alias corporis partes influentiam habeat. Quoad *primum* duo sunt præcipuè accidentia, è quibus acuti puerperarum morbi multùm dependent. Primò scilicet *uteri concidentia*, sive ab ingravidationis mole ad naturalem situm & magnitudinem reductio. Secundò, intra cavitatem ejus, propter disruptam placentæ connexionem, *unitatis solutio*. Quando foetus cum involucris deponitur, statim latera ipsius uteri priùs valde ampliata mutuò concidunt, & fibrarum ope sese in spatium angustius sensim contrahunt. Hujusmodi propter contractionem sanguis & ichores è vasis & poris uterinis copiosè exprimuntur, & cum lochiis excernuntur: interdum verò accidit, ob res præternaturales in utero contentas, uti sunt pars secundinæ, mola, grumi sanguinis, &c. etiam si à partu laborioso contusio aut magna dilaceratio accidant, quod uterus haud ritè se contrahit, sed fibrarum motu inverso sursum ascendit, & in molem attollitur; necnon membranis spasmo affectis, ipse torminibus, quasi adhuc urgeret partus, usque tentetur; cujusmodi affectiones si aliquandiu persistent, propter orificium uteri motu convulsivo constrictum sæpe etiam lochia sistuntur: hinc gravia symptomata succedunt, & sæpenu-mero febrem vel primò excitari, aut ob aliam causam inductam longè periculosiorem reddi contingit. Secundò, quoad unitatem à placenta disrupta solutam, partus aut legitimo tempore, aut præcipiti, & festinato nimium evenit: dein secundina vel integra rejicitur, vel divulsa, parte ejus ponè relictâ, quasi dimidiatè abscedit. Si puerperium justo tempore succedit, atque foetus cum involucris ab uteri cavitate, quasi fructus ab arbore maturus, integer,

& sine violentia decidit, vasorum ora nonnihil referantur, ut lochia moderate fluant; hinc verò nullum symptoma gravius timetur: si fœtus nondum partui maturus, quasi vi abrumpitur, licet placenta cum membranis integra divellatur; tamen vasis dilaceratis, major hæmorrhagia, & demùm vasorum osculis ichorem fœtidum exsudentibus, dispositio ulcerosa succedit. Quod si pars, aut tota secundina uteri lateribus post partum adhærescant, illic putrescunt, ichores valde fœtidos exsudent, & tetros affectus provocant. Sæpe orificium uteri occluditur, & intrus retinet grumos sanguinis, membranarum, aut carniū frustula; quæ ob calorem putrescentia, sanguinem, & humores per circuitus è toto corpore illuc confluos venenant; etiam pruritacione molestæ partes uterinas, utpote valde sensiles, in spasmos cient.

Cùm itaque à puerperio modis prædictis noxa utero infertur, eadem aliis partibus, non sine totius corporis molestia, citò communicatur: quod quidem duplici ratione fieri solet. *Primò* enim hoc contingit, quia lochia excerni prohibita statim in cruoris massam restagnant, ipsamque velut miasmate virulento inquinant: insuper è contentis in utero putrescentibus, aut ipsa ichoris substantia, aut particulae à re cadaverosa discedentes, sanguini & succo nervoso illac pertranseuntibus commiscentur, eorumque liquores brevi totos inficiunt. *Secundò*, affectiones hystericae latius extenduntur propter insignem consensum, qui inter uterum & cerebrum cum totius corporis fibris & membranis, mediante nervoso ductu intercedit: cùm enim nervorum extremitates circa partes uterinas confitæ, ob humoris noxii præsentiam in spasmos & motus convulsivos adiguntur, convulsiones illic susceptæ statim superiùs latae, per nervorum nixas, atque *αἰσολὰς* cerebrum versùs perreptant, adeoque viscera successivè inflari, & immaniter convelli, & cerebrum demùm ipsum percelli, ejusque functiones velut obrui contingit: hinc à motibus convulsivis circa uterum exorsis, ventris & hypochondriorum inflatio, rugitus, vomitio, singultus, præcordiorum angustia, respiratio difficilis, præfocationis sensus, & sæpe stupor, & *ἀφασία*, aut saltem ex his aliqua concitantur: nec ita planè cessat tragœdia, quin cerebro per continuationem affectûs etiamnum læso, exinde in alias partes noxa retorquetur, ut sæpe totum nervosum genus in motuum anomalias compellatur. Quod enim per vapores fieri vulgò dicitur, & affectus qui ab infra ad superiora perreptans, *vaporum ascensus* vocatur, nihil aliud est, quàm membranarum, ductuumque nervosorum partes successivè in spasmos adactæ. Porro in hujusmodi affectibus actio læsa non semper incipit, aut primò sentitur in ea regione, aut loco, ubi noxia infligitur, neque passionēs quæ dicuntur hystericae, solummodò ab utero procedunt; namque interdum molestia immediatè infertur *cerebro*, spasmi autem & contractiones in *extremis partibus* incipiunt, atque aliquando nervorum extremitates alicubi in visceribus, putà stomacho, liene, renibus, non minùs quàm in utero vellicantur; in quibus exortæ anomaliae in viciniam, indeque in cerebrum continuantur; è quo rursus in alias partes, & non rarò in totum corpus convulsiones reflectuntur. Rem ita se habere in fœminis puerperis, aliisque febricitantibus, sæpius adverto: nimirum nonnullæ propter uterum malè affectum, aliæ verò ob materiem febrilem critica metastasi in cerebro defixam in passionēs hystericarum æmulas incidunt. Atque his de

apparatu puerperarum febribus prævio ritè perpensis , non est quod ulterius in limine hæreamus , modo adnotetur , quod parturientium (præcipuè quæ sunt imbecilles , & tenerioris constitutionis) corpora maximè à partu laborioso & difficili debilitantur , adeo ut propter hanc solam occasionem intemperies febriles faciliè concipiant , atque hoc aut alio modo inductas ægrè ferant. Jam proximè de febribus ipsis , quibus puerperæ laborare solent, dicamus : quorum affectuum *tres* veluti *species* vulgò recensentur ; scilicet *febris lactea*, *putrida*, aut istiusmodi, quæ *symptomate* quodam mutuatur , præcipuè autem *pleuritide*, *angina*, aut *variolis insignita* est : de quibus ordine differemus.

Febris Lactea.

Superius diximus adhuc in incerto esse , ex qua materia lac immediatè conficitur , & quibus ductibus in mammas feratur ; insuper quando *anatomia* anatomica hac ex parte omnino cessat, me in ea esse sententia, quod chymus lactescens ex alimentis in visceribus confectus , indeque pro succo nutritio sanguini confusus, denuo statim è massa ejus , ope glandularum in utero , aut mammis, non secus ac serum in renibus magna ex parte secernatur , ut nutrimentum foetui, aut in ventre, aut sinu materno gestato suppeditet. In gravidationis tempore, licet maxima hujus portio ad uterum derivetur, tamen ultimis mensibus ejus aliquantulum in uberibus deponitur ; circa tertium verò , aut quartum à puerperio diem, lac in mammas uberius , & velut cum impetu quodam fertur, ut citò eas ad tensitatem impleat , & aggravare incipiat. Hoc tempore puerperæ (licet non omnes , pleræque tamen) intemperie febrili, cum siti , calore, & inquietudine totius corporis affici solent ; queruntur de dolore gravativo in dorso & scapulis, de mammarum plenitudine , & æstu : & ni lac diligenter emulgeatur, nimis congestum, sæpe inflammationem cum subsequenti abscessu in mammis parit. Hæc febris , dummodo lochia se rectè habent , vix ultra triduum perdurat, quin circa illud spatium sudore copioso sponte oborto sedari solet : hæc tamen intemperies à lactis preventu excitata nonnihil intenditur, & diutius immoratur , si quando lac mammis ubertim ingressum non emulgetur, ac illinc denuò repellitur ; etenim decessu ejus, non secus ac adventu, perturbatio in toto corpore cum siti ac æstu contingere assolet ; quod etiam certius evenit , si topicis repellentibus illud violenter abigi contigerit : ex uberibus autem eorundem ope propulsum , aut sponte abscedens , cum lochiis sub humoris albicantis forma excernitur , atque sudor, aut plenior diaphoresis morbi reliquias exterminat. Quod si hujusmodi intemperie propter lactis commotionem inducta lochia sistantur , vel errata in victu admittantur , aut causa evidens alia quæpiam accesserit , ut cruoris effervescencia intendatur , non rarò febris lactea pejora statim symptomata asciscens , in putridam , seu potius malignam migrat.

Febris prædictæ *causa*, seu *ratio formalis* (donec lactis innotuerit iter) tantum ex *hypothesi* , & quasi augurio quodam proponi poterit : *supposito* enim, quod humor lacteus peculiari ductu è visceribus coctionis sine ullo sanguinis commercio immediatè ad mammas feratur , intemperies ista febrilis orietur, eo quod mammis lacte repletis , & valde distentis , vasa sanguinea compri-

mantur adeo, ut cruorem illac confluum non facile transmittant; unde cruor in circuitu suo præpeditus juxta totam ejus massam tumultuari incipit, & spiritibus inordinate commotis, & penitus confusis, effervescentiam concipit, qualis à *πυκνότητι*, crapula, phlegmone, aut vulnere inducta, synochum simplicem passim constituit; sin verò lactis materia (uti non improbabile est) sanguinem trajiciat, hæc puerperarum febris hinc nata videbitur, quod cum utero relicto ad mammas latex iste transferatur, magna ejus portio in cruoris massa subsistat, quæ si quidem debitum succi nutritii penum excedat, adeoque tota assimilari nequeat, insuper partibus heterogeneis scateat, velut extraneum quoddam, & non miscibile sanguini molestiam creat, proque ipso eliminando & foras excernendo effervescentia febrilis triduana impenditur: cum enim chylus lactescens circa uterum secerni assuetus, mox à puerperio ista excretionis via præpediatur, in sanguinis massam restagnans, primò illic uberius congeritur, quàm aut totus in nutrimentum facessere, aut in mammas excipi poterit: hinc vasorum plenitudo, & turgescencia, necnon propter superflui subactionem & exclusionem immodica sanguinis fermentatio oritur necesse est: quare lac non tantum in itinere ad mammas, sed etiam inde versùs uterum reditu, scilicet propter utrumque sanguinis trajectum, febri- culam parit.

Utrumque verò hujus morbi *causa* statuatur, circa *curationem* parum aut nihil intererit: hæc enim naturæ omninò committitur, & quamdiu lochia se rectè habent, sine ope medica ut plurimum sat feliciter procedit: quippe post effervescentiam sanguinis per 3. aut 4. dies peractam, aut sudor copiosus, aut transpiratio liberior hunc affectum solvit; nimirum aut particulae humoris lactei inter assimilandum degeneres, aut recrementa adusta à sanguinis deflagratione residua, aut simul utraque fomitem febris suppeditantia paulatim subiguntur, & foras evaporantur; quibus exclusis, sanguis extranea mixtura liber factus, cito pristinum statum recuperat; interea tamen quædam regulæ vulgares circa *lactis admissionem*, aut ejusdem ex uberibus *propulsionem* observari solent. Si lac copiosè nimis in mammas profilit, ut earum inflammatio, necnon immodica sanguinis effervescentia præcaveantur, tunc temporis victus tenuior & parcior, nimirum ex jusculo carniū experte, & in minore quantitate imperatur; etiam ubera suctu crebriori depleantur. Si matri infantem lactare minus commodum fuerit, usitatum est primo, aut tertio à puerperio die ceratis modicè adstringentibus (utpote ex emplastro de minio, &c.) totas mammas obtegere, sic enim spongiosa glandularum substantia nonnihil constringitur, quo humorem lacteum illuc scaturientem minus promptè suscipiant. Hoc tamen remedii genus cautè adhiberi debet, ne si lac omninò excludatur, aut nimis confertim è mammis abigatur, in cruorem subito restagnans, ejusdem inordinationem, febris putridæ, sive malignæ prodromam inducat: de qua proximè dicendum restat.

Puerperarum Febres putridæ.

Puerperæ ex malè affecti corporis vitio, tanquam auræ pestilentialis contagio tactæ, *febris putrida*, seu potius *maligna*, quamnimum obnoxia reperiuntur: hujusce verò morbi labem haud omnes ex æquo suscipiunt; etenim pauperes

peres, *μυοθάραι*, rusticae, aliaeque duris laboribus assuetæ, necnon viragines, & meretrices, quæ clandestina agunt puerperia, sine magna difficultate pariunt, & deinceps brevi à lecto excitatæ, ad solita redeunt opera: mulieres autem ditiores, tenellæ, & pulchræ, pleræque vitam sedentariam degentes, quasi maledicti divini graviore modo participes, *in dolore pariunt*, indeque mox à partu difficiles, & periculosos subeunt casus; cujus ratio videtur in hoc sita, quod quæ multo exercitio utuntur, sanguinem continuò exagitant, & eventilant, ideoque à suppressis mensibus miasmata pauciora in morbi materiam congerunt. Porro mulieres laboriosæ, & agiles, cum partes nervosas habeant firmiores, ideo motibus convulsivis, & affectibus vulgò dictis hysteris minus subjiciuntur: è contra delicatulis, & otiosis ingravidationis tempore sanguinis massa valde impura, & fermentiscibilis evadit; insuper quia cerebrum, & nervorum systema molle & imbecillum habent, à levi qualibet occasione spirituum animalium distractiones, partiumque nervosarum motus inordinatos perpetiuntur. Atque hic obiter notandum, quod fœminæ præ viris, aliaeque ejus sexus præ aliis, affectiones dictas hystericas sentiunt, non tam ob uteri ipsius vitia, quàm propter debiliores cerebri, & nervosi generis constitutiones: taliter enim affectis passiones iræ, tristitiæ, metus, necnon objecta quævis acria, aut fortiora partium istarum crases, & functiones faciliè pervertunt, quæ cum semel læsæ fuerint, iisdem anomaliis postea ferè semper assuescunt. Verùm unde digressi sumus, revertamur. Febris modo proposita puerperas quidem variis temporibus, & propter diversas occasiones infestare solet; modo statim à partu, præsertim si difficilis, & laboriosus fuerit; modò prima, modò secunda, tertia, aut quarta septimana exoritur: quo tamen serius incipit, eo tutius absolvi solet. Typus verò affectus istius ferè hunc ad modum peragitur. Post præviam indispositionem aperta febricitatio, plerumque cum rigore, aut horrore primum insultum constituit, quem statim calor subsequitur, postea sudor succedit: die uno forsan, aut altero, caloris, & frigoris varii reciprocantur paroxysmi; dein sanguine per totum accenso, lochia, si non prius suppressa, aut minutè fluunt, aut prorsus subsistunt. Si morbus sit acutus, & celeris motus, die tertio, aut quarto ad *ἀκμὴν* pervenit; tunc calor intensus cum siti valde molesta, pulsus vehemens, & citatus, vigiliæ pertinaces, magna inquietudo totius corporis, ut huc & illuc continuò in lecto decumbentes sese jactitent, urina crassa, & rubicunda, aliaeque gravia symptomata increbescunt: dum febris hoc modo in statu est, crisis minimè expectetur; nunquam enim sudore critico hunc morbum solutum vidi; quin res admodum in præcipiti versatur, ut postquam sanguis aliquantisper efferbuerit, materia adusta statim in cerebrum translata, ipsius, & totius nervosi generis inordinationes periculosæ, & gravissimæ evestigiò ingruunt; namque tendinum motus convulsivi, circa viscera distensiones miræ, & inflationes passionum hystericarum æmulæ sæpissimè concitantur; dein aliquando phrenitis, aut delirium, non rarò stupor, & *ἀσπασία* etiam subsequuntur; ferè in omnibus sine causa manifesta vires subito prostratæ jacent; pulsus debilis, & inæqualis evadit, & ægrotantes citò in mortem præcipitantur: siquæ forsan evaserint, aut restituto lochiorum fluxu, aut diarrhœa superveniente, post longam ægrotationem ægrè, & vix tandem emergunt. Novi in quibusdam maculas pur-

pureas apparuisse : certè in plerisque symptomata, quæ aut sanguinem, aut succum nervosum spectant, malignitatem non levem arguunt.

Hujus febris *causas* vulgari more in *procatarticas, evidentes, & conjunctas* distinguere libet. Istæ prioris generis, è quibus morbi malignitas, & summa pernicies dependent, præcipuè sunt duæ, scilicet *primo* à longa mensium suppressione *prava sanguinis diathesis*; *secundo* (à partu) *mala uteri affectiones* ex periculosis mulierum puerperiis (quæ maledictionem divinam ratam faciunt.) A menstruis diu suppressis non modo turgescit sanguis, ejusque partes sulphureæ nimis evehæ incendio aptiores redduntur, verum insuper cruoris massa particulis valde fermentativis imbuitur, adeo ut (quemadmodum prius innuitur) veluti miasmate venenato tacta, effervescens statim versùs putredinem, & inordinationes corruptivas ipsa disponatur, & præterea liquorem nervosum illico venenet, ipsumque cerebro, & toti nervoso generi infestum reddat. Hujusmodi labes sanguini impressa copioso lochiorum fluxu expurgari debet: sin verò à partu uterus malè habeat, non modo sistuntur lochia, adeoque totius sanguinis depuratio impeditur; verum præterea ichores foetidi illinc cruori traduntur, ipsumque graviter inficiunt; necnon ob motus convulsivos circa uterum inceptos, indeque aliis partibus continuatos, in sanguine, & succis inordinationes concitantur, quæ sæpè in febris aut productionem, aut exacerbationem conspirant.

Causa evidentes, quæ aut sanguini dyscrasiam nactæ effervescentiam actualem inducunt, aut uteri vitia in totum corpus invertunt, diversimodæ existunt. Huc faciunt partus laboriosus, circa uterum unitas soluta, contusio, rerum præternaturalium retentio, dispositio ulcerosa, & pleraque alia accidentia, quæ necessitate quadam inducuntur. Occasiones autem in arbitrio patientium sitæ, & facillè evitabiles, quæ hujusmodi febrem excitare solent, præcipuè sunt *duæ*, scilicet *mala victus ratio, & frigoris susceptio*. Usitatum est foeminis à puerperio imbecillis, primo, aut secundo die carnes animalium, aut eorum jùscula consummata, aliaque esculenta earum crasibus valde improporcionata exhibere; unde statim in visceribus indigestio, & magnæ molestiæ, atque in sanguine ob succum nutritium debito opimiorum turgescentiæ febriles oriuntur. Præter errata in victu sæpe noxa infertur, eo quod earum corpora, utpote tenerima, etiam ob partus labores, foetusque exclusionem meatibus undequaque apertissimis prædita nimis incautè frigori exponuntur; pleræque enim lecti impatientes intra diem unum, aut alterum, aut citius quàm oportuit, vestibus induuntur, lectoque exsurgunt; inde statim poris cutis subito constipatis, & aëre in partes uterinas admissio, transpiratio cohibetur, & non raro lochia derepente sistuntur, quorum utrumvis febrilem effervescentiam excitare suffecerit.

Causa conjuncta, sive *ratio formalis* hujusce ægritudinis potissimum hæc tria complectitur; adsunt nimirum *Primò*, sanguinis insignis dyscrasia, ut à febre occasionaliter inducta exardescens haud æquabiliter deflagret, nec recrementa adusta paulatim subigat, eademque postea criticè excernat: quin cruor effervescens statim in mixtione laxatur, & reserata ejus compage versùs corruptionem vergit, & deflectit. Hinc quando parum deferbuit, spiritus dominio excussi in confusionem aguntur. Interim particula Sulphurea in-

domitæ,

domitæ, & efferatæ evadunt; quare vires sine causa manifesta concidunt; pulsus fit debilis, & inordinatus. A deflagratione sanguinis licet recrementa adusta plurima congerantur, tamen nihil ritè coquitur, aut secernitur, quin laborantes, naturâ valdè oppressâ, licet continuò sudent, sæpe nihil levaminis inde capiunt: materies autem febrilis, quæ excerni debuit, in caput, & nervosum genus transmissa ibidem regiminis animalis perturbationes gravissimas inducit. *Secundò*, hujus morbi tragœdia haud minimâ ex parte debetur succo nervoso statim acri, ideoque cerebro, ejusque appendici improporcionado facto; hic enim labe à sanguine contracta inquinatus subjecta sua haud leniter irrigat, & blandè inflat: verùm teneras istas partes (veluti cùm vitrioli infusio lumbrico affunditur) insigniter vellicat, ac in spasmos, & quasi trepidationem, ac subsultuum motus irritat, eorumque functiones interdum prorsus obruit: hinc contracturæ, convulsiones graves, delirium, vigiliæ, quandoque stupor, & affectus comatosi puerperas incessunt. *Tertiò*, dum hæc aguntur, non rarò tertia symptomatum cohors laborantes infestat, nimirum eo quod uterus noxâ quadam læsus se inordinate movet, & secundum has, aut illas partes spasmò percellitur, inde mox per membranas & ductus nervosos motus convulsivi totam abdominis regionem pervadunt; quare viscera, & hypochondria inflantur, ructus, & vomitus graves cientur, dein affectus superius perreptante, partesque thoracis nervosas occupante, respiratio difficilis, & inæqualis, cordis palpitatio, præfocationis sensus in gutture ob musculos ibidem retractos, aliæque symptomata per totum corpus, eadem noxâ cerebro demùm illatâ, excitantur.

Puerperarum febres ferè nunquam periculo vacant; ipsas verò aliquando circa prima initia victu tenui, & restituto lochiorum fluxu sanari contingit; sin verò intemperies febrilis altius radices egerit, ut totus accendatur cruor, & immodicè effervescat, prognosticon non nisi lævi ominis habere oportet; eritque major periculi ratio, si præter calorem in toto suffusum laborantes crebro rigore tentantur: si magna inquietudine, & vigiliis, cum subitis corporum concussionibus, aut tendinum contracturis afficiantur; si tertio, aut quarto die de tinnitu aurium; cum magna capitis repletionem queruntur, gravius illico malum ingruere colligas, scilicet materiæ febrilis, & noxiæ in cerebro metastasin. Nec minùs metuendum est, si præcordiis oppressio, & gravamen incumbant, ut non liceat ægrotantibus liberè respirare, nec anhelitum altè, & à profundo thoracis, sed tantùm à summitate, eunque crebrum, & suspiciosum ducere; interim ut laborantes cogantur erectè sedere, seque huc illuc inquietim commovere: hoc enim arguit sanguinem in circuitu circa cor & pulmones stagnare, necnon grumescere, & coagulari aptum: quod si pejores adhuc cerebri, & nervosi generis affectus succedant, atque pulsus debilis, & inæqualis evaserit, rem ferè deploratam pronunties; sin verò (uti interdum, licet rariùs, contingit) à febre accensa, & graviter minante aut repetat lochiorum fluxus, aut diarrhœa cum levamine succedat, spes aliqua salutis, licet in profundo, eadem admitti debet.

Circa *curationem* hujusmodi febrium Medico difficile admodum incumbit pensum, quoniam puerperis pharmacia quævis non modò inutilis, at insuper noxia admodum apud vulgus habetur: quare Medici rarò accersuntur, nisi

cum remediis nullus relinquitur locus, & utilis operæ omnino præterit occasio. Quod si fortè circa prima morbi initia adfuerint, non facile erit vulgaribus remediis laborantibus salutem procurare; quodcunque verò tentaverint, ni istud opiferum fuerit, à mulierculis, & adstantibus exitiale, & unica mortis causa perhibetur: ut revera circa nullius morbi curationem minùs commodi, & plus opprobrii nobis obvenire soleant.

Methodus autem medendi (non secus ac in morbis contagiosis) duplex institui debet: nimirum *prophylactica*, & *therapeutica*. Prior harum tradit præcepta, & cautiones, quibus puerperæ à febrium incurſu præſerventur: altera intentiones curativas suggerit, quibus laborantes (si modò fieri poterit) salutem denuò recuperent.

1. Licet hæc febris, quantumvis maligna fuerit, contagio minimè accersatur, & decumbentibus nullus venenati miasmatis ab extra suscipiendi incumbat metus; attamen puerperæ omnes indigenam habent virulentia mineram, & ab hujus noxa, tanquam summæ malignitatis fomite, cavere debent: quapropter iis exacto regimine opus est, quo nimirum à partu sine febris periculo *impuritates sanguinis*, & humorum ritè *expurgentur*, necnon *uteri mala affectiones sanentur*, atque *vires à partu fractæ, & debilitatæ* debito modo *restitui* possint. Propter hos fines erunt hæc *tria* præscriptis Medicis potissimum inculcanda. *Primo* exactissimam victûs rationem puerperis imperari necessarium duco; nimirum ut jusculis avenaceis, modò ex cervisia, modò ex aqua vino albo admixto paratis, necnon panatella, aliisque levioris nutritatûs, per septimanam utminùs omnino vescantur: sed quia multum inaniuntur, ideo crebriùs eis sorbere licebit; at nihil solidi, aut fortioris alimenti exhibeatur. Etenim diligenter observavi, quod has febres sæpiſsimè induxit præpropera carniûm, aut esculenti lautioris comestio. Quippe puerperæ non solum uti graviter vulnerati, verum sicut indispositionem febrilem ex perturbata sanguinis crasi, & temperie nacti tractari debent: apud ipsas enim cruor pridem nimium evectus, & velut impuro miasmate tactus, pabuli cujusvis Sulphurei citissimè flammam concipit. *Secunda* post victum erit cura, ne à frigore externo incautiùs admissio constipentur pori, aut sistantur lochia: etenim à levissima occasione, immutato *διαπνευσ* modo, sanguis priùs effervescentes inordinationes concipit, necnon uterus auræ afflatu tactus se contrahit, & vasorum ora, quò lochia minùs fluant: quapropter per quinque utminùs à partu dies mulieres in lecto detineri omnino velim. Scio, quod vulgi mos sit quasvis die tertio è lecto exsuscitare; verum exinde plures in febres incidisse novi: & reverà si puerperas extra periculi aleam consistere cupiamus, tutissima erit ratio, ut diutiùs se lecto contineant. *Tertius* circa præſervationem restat scopus, ut puerperis, facta leni sanguinis proritatione, lochiorum fluxus continuetur: in hunc finem solent obstetrices (si quando à partu difficili id malum timetur) sperma ceti, pulverem regulæ Hibernicæ, aut crocum vino albo intinctum exhibere: porrò juscula avenacea, ut sanguinem magis fundant, ex aqua vino albo, aut Rhenano admixto parare, quibus, aut etiam sero lactis, flores calendulæ, folia pulegii, aut artemisiæ incoquunt. Extant pleraque alia administrationum genera circa puerperas habenda, quæ utpote vulgo nota hîc libens prætereo.

Febris puerperium subsequens *Therapeia* à methodo in putridis usitata longè

longè recedit: enimverò in ista non expectandum est, ut sanguis incendio febrili tactus gradatim deflagret, dein recrementa adusta in sinu ejus sensim congesta subigat, eademque crisi secernat: quin potius (uti in maligna fieri amat) quamprimùm immodicè effervescit cruor, à remediis blandè diaphoreticis ipsum exagitari, ejusque mixtiones heterogeneas, & impuras foras eliminari convenit: quare inter vulgares (idque haud perperam) in more est puerperis febricitantibus statim sudorifica exhibere: hoc ritu sanguine ventilato, ejus effervescencia sedatur; necnon propter agitationem ejus lochia cohiberi apta in effluxum proritantur. Inter authores plurimùm disceptatur, unde hujusmodi febrium initia computari debent, scilicet an ab ipso partu, an à primo febricitationis sensu? Attamen parum intererit, si hoc aut isto modo hujus solutio statuatur: nam si quidem hæc febris solita putridarum stadia haud æquabiliter decurrat, nec crisin habitura sit, neque remedii cathartici usum omninò admittat, non est ut de periodo ejus, aut mensuratione quoad dies omninò solliciti simus: at verò circa indicationes curativas solum ex usu erit distinguere de agendis in morbi hujus *principio, augmento, & fine*; quid etiam, dum vires nonnihil constant; etiam quid in iisdem oppressis, & valde dejectis moliri debemus.

Cùm itaque hac febre puerpera quæpiam primò afficitur (cujus insultus à lactea dignoscitur, quia cum rigore ut plurimùm incipit) protinus danda erit opera, ut sanguini flagranti uberius detrahatur pabulum, & ut superiùs monui, animalium carnes, aut juscula ex iisdem procul amendantur: interea tamen frigida quævis, & virtute stypticâ pollentia æquâ sanctione arceantur: hæc enim sanguinem figunt, & constipant nimis, ejusque expurgationem valdè requisitam tum per lochia, tum per transpirationem cutaneam, impediunt. Quin potius, febre licet urgente, decocta, pulveres, aut confectiones è moderatè calidis exhibeantur: hujusmodi sunt (prout jam dictum) decocta, aut aquæ destillatæ florum calendulæ, foliorum pulegii, artemisiæ, radic. scorzonæræ, necnon pulveres Bezoartici, spir. Cornu cervi, Sales herbarum fixi, &c. Si lochia sistantur, ut eorum fluxus denuò cieatur, omni modo enitendum erit: huic promovendo conducunt frictiones, & ligaturæ circa femora & crura, interdum cucurbitulæ, aut vesicatoria circa femora, aut coxas, necnon in plantis pedum; quandoque etiam venæ sectio in talo convenit; interea fons ex decocto hysterico circa pubem applicetur, vel omentum vervecinum calidè exemptum imo ventri imponatur. Pessaria, & injectiones uterinas aliquando prodesse experienciâ constitit: si alvus non respondeat, glande violaceo dicto, aut clystere emolliente blandè subducatur. A proritatione fortiori cavendum erit, quoniam in puerperio, non secus ac in febre maligna, à copiosa dejectione cum spirituum deliquio vires subitò exsolvi constat. Si quando cum lochiorum suppressione sanguinis perturbatio insignis cum vomitu, siti, & vigiliis adfuerit, sæpe *laudanum croco admixtum* felici successu exhibitum novi. Vice julepii refrigerantis hujusmodi mixtura convenit, scilicet: Recipe *Aq. pulegii, melissæ, an. unc. 3. hystericae unc. 2. Syrupi Artemisiæ unc. 1. sem. tinctura croci drach. 2. Castorei in petio ligati, & suspensi scrup. 1.* Misce. Hujus cochlearia tria, aut quatuor aliquoties in die propinentur.

I I. Si non obstante hujusmodi remediorum usu, febris usque ingravescat,

& cum peiori symptomatum apparatu sensim augeatur, ut præter sanguinis inordinationes cerebrum, & nervosæ partes percelli incœperint, medicamina, licet plurima cujusque generis tentantur, sæpissimè minus profunt: quinimò in hoc casu indicationes cum istis in ipsa peste adhibendis ferè cœcidunt; siquidem lochia aliquandiu suppressa haud facillè, aut vix omninò, in magna sanguinis, & humorum confusione reduci poterunt, ideo diaphoresin citatius movere convenit; nimirum ut corruptelæ sanguini, & succo nervoso impressæ, & ab utero restagnantes per sudorem & transpirationem insensilem quodammodò eliminari possint. Quare hîc *pulveres*, & *confectiones Bezoartica*, *spirit. Cornu cervi*, aut *fuliginis*, *tinctura è coralliis*, aut *margaritis* condunt. Vidi aliquoties hujusmodi medicamentorum ope in casu deplorato, cum pulsu, aliisque symptomatis paulisper meliùs se habentibus aliquantulum spei affulsisse; curatio tamen rariùs successit, quin cum iste cardiacorum usus remitteretur, cum pulsu debili, & diarrhœa statim oborta laborantes in lethum præcipites ivere.

III. Cùm adhuc in deterius res ægrotantium vergant, ut cùm febre auctâ pulsus debilis, & inæqualis fuerit, ac crebri horrores, & motus convulsivi in toto corpore cum delirio, aut stupore infestent; tunc Medicus factò priùs lethi prognostico, remediis paucioribus, iisque ferè tantùm cardiacis insistat: & à sanguinis missione, scarificatione, vesicatoriis, aut cucurbitularum usu omnino abstineat; tales enim administrationes solum odium, & opprobrium accersunt, ut propterea à fœminis quibusvis malefici, & crudeles habeamur.

Febres puerperarum symptomaticæ.

Acuti puerperarum morbi non modò juxta febris prædictæ typum se habent, sed nonnunquam symptomate quodam insigni, scilicet *anginâ*, *pleuritide*, *peripneumoniâ*, *dysenteriâ*, *variolis*, aut aliis generis stipantur; & tunc temporis affectuum istorum appellationes sortiuntur. Non erit opportunum quæ ad naturas, & essentias singulorum latè pertinent, hoc in loco repetere: quid verò ægritudines istæ cum puerperii affectionibus complicatæ, circa causas, aut curationes peculiare habent, breviter subjiciam.

Cuncta isthæc symptomata à sanguinis coagulatione quadam, & exinde ejus extravasatione procedere arbitramur: dum verò sanguis extravasatur in una parte, ejus effluxus quilibet naturalis, & criticus cohibetur in alia: quare periculum est, ne dum cruor aut in particulari assuetoque congelationis foco, aut universim in tota ejus massa coagulari incipiat, protinus lochiorum dimanatio sistatur; quod reverà ut plurimum accidit, ideoque affectus isti puerperis sæpissimè lethales existunt: attamen exitii causa cum aliquo discrimine plerumque evenit, scilicet in *variolis* lochia fluentia malignitatem exterius eliminari cœptam intus revocant, ejusque labe sanguinis massam, & cor ipsum prorsus venenari cogunt; ideoque in variolis purgamenta isthæc uterina sisti convenit: in *pleuritide* autem, *anginâ*, & *cæteris*, cùm morbi stimulus hîc, aut illic particulari loco defixus, impuritates sanguinis per lochia secerni debitas sibi accersat, & prorsus ab utero derivet, propter istam rationem cruoris inquinamentum adauget. Lochia in variolis cohibita universaliori excretionis modo cum particulis morbi venenatis foras excludi poterunt;

poterunt ; quod quidem in cæteris ob minutulam , & parciorem *influxum* viam non succedit.

Ex his *Angina, Pleuritis, & Peripneumonia*, propter magnam & causæ similitudinem , & curationis analogiam , unà considerari poterunt. Cum puerpera qualibet harum afficitur, putandum est quod præter miasmata ingravidationis tempore congesta accedit sanguinis diathesis quædam acidiuscula, cujus ratione, dum ipse febriliter effervesceat, ejus particulæ quædam acore perfusæ in hoc, aut isto loco congelationem, instar lactis acescentis, & proinde coagulati, subeunt ; cruor ibidem gelatus, & in circuitu præpeditus reliqui transitum inhibet : sanguis autem motu obstructus in obicem suum arietat, adeoque circumcirca congestus, & extra vasa propulsus in tumorem accrescit : inde statim quidquid in ejus massa heterogeneum, & secernibile continetur, in partem affectam velut cloacam deponitur ; quare sanguinis corruptelæ per uterum expurgari debita illinc versus morbi hujus focum derivantur, quæ cum hac via satis expurgari nequeant, & cruoris liquor insignius corrumpitur, & affectus istius particularis, scilicet *angina, pleuritidis, aut alterius* judicium redditur difficilius.

Pro curatione complicatarum hujusmodi ægritudinum à primis statim initiis enitendum erit, ut sanguis alicubi defixus, & extravasari cœptus circulationi restituatur, nec apostema faciat, quoniam rarò admodum puerperæ febribus istis symptomaticis correptæ, materiæ *abscessu*, aut *sputo* sanantur : quapropter remedia interna, quæ sanguinem fundunt, & à coagulatione liberant, erunt usurpanda, cujusmodi sunt imprimis Diaphoretica Sale volatili referta, ut sp. c. cervi, fuliginis, urinæ, necnon Sales ipsi : item pulveres testacei, & Bezoartici, lapis prunellæ, decocta, & julepia è vegetabilibus menses, aut urinam moventibus : quibus omnibus admisceri debent quæ experientia duce, uterinis affectibus appropriata reperiuntur. Insuper parti affectæ remedia discutientia, quæ materiem impactam abigant, & dispescant (cujusmodi sunt linimenta, foci, & cataplasmata) sedulo erunt applicanda. Interim sanguinis impetuosior motus, & effervescencia immodica procul inde amendantur, & purgamenta ejus, quibus fieri possit modis, usque inferius transferantur. In hunc finem frictiones, ligaturæ, epispastica, & (si opus fuerit) cucurbitulæ circa pedes, & crura adhiberi poterunt. Si affectu plurimum ingravescente sanguinis missio indicatur, nisi ingens plethora in toto corpore, & inflammatio valde acuta in parte affecta adfuerint, venam in pede secari, aut vasa hæmorrhoidalia hirudinum suctu aperiri præstabit ; sin verò necessitas urgeat, ipsam in brachio fieri. Post isthac habitam phlebotomiam, altera (si admitti poterit) in crure subsequatur : verumtamen monendum erit, venæ sectionem cautè admodum in his casibus institui debere ; nisi enim juvamen præstat (quod rarò contigisse novi) statim pulsu debiliore facto, res ægrotantium in pejus ruit.

Dysenteria à simili ferè causa cum prædictis affectibus ortum ducit ; verum in hac, quia sanguis extravasatus illicò profunditur, nec in corpore retentus illic molestiam facit, & plus adhuc corrumpitur ; cumque hæc *influxus* via prope uterinum effluxum fiat, eumque postea non alio derivat, hinc minus ab hoc morbo, quàm ab aliis prædictis periculi timeretur : sæpenumero tamen

hic affectus puerperis lethalis est; eo quidem potius, quoniam à dysenteria sanguinem attemperantia, & modicè astringentia indicantur; hæc verò lochiorum fluxum inhibere nimis apta reperiuntur: quare in hoc casu, donec puerperæ diutino fluore ferè satis expurgantur, alterius morbi curatio omittatur, & tantum demulcentibus symptomatum ferocia compescatur.

Variolarum indicationes non modo ab istis supra descriptis dissident, at verò sibimetipsis contrariis stipantur; etenim lochiorum fluxus modicè cohiberi (quemadmodum dictum est) postulant; interea tamen ut sanguinis efflorescentia, & blanda diaphoresis continuari debeant: cum enim in hoc morbo fermentum venenatum duplex exstiterit, & particulæ sanguinis corruptæ in duplicem extrinsecus ferantur viam, cavendum est, ne minor, & angustior porta materiam aut totam, aut plus quam extra mittere poterit, ad lienem suum attrahat: itaque ne lochia copiosius fluentia venenum exterius efflorescere aptum intus revocent, erit ratio victus nonnihil immutanda; atque imprimis ægrotantium jusculis, quæ vi alexiteria, simulque adstringenti pollent (uti sunt radix tormentillæ, & bistortæ) incoquantur: etiam pulveres, julepia, & opiatas tali virtute præditas debitis intervallis exhiberi convenit; quinetiam in hoc casu nullo modo fœminis indulgeatur, ut carnibus, earumque jusculo vescantur, aut lecto exsurgant: verum quiete (quo fieri possit modo) tum animi, tum corporis procurata, & diæta ex iis quæ sanguinem minimè exagitant imperata, res fere in totum Deo & Naturæ committatur.

Quæ superius de *acutis puerperarum morbis* dicta sunt, facile esset historiis & observationibus illustrare: verum exempla, quæ hac in re adduci possunt, maxima ex parte luctuosa, & mali ominis erunt; quippe febres istæ in mortem ut plurimum cedunt. Hujusmodi verò ægritudines describere nec Medici confirmabit operam, ac Medicinæ methodum in iis usurpatam omnino probatam reddet; utcumque siquidem harum notitia ad meliorem morbi istius diagnosin facit, libet hic puerperarum singulares quosdam casus, & symptomatum varietates proponere; in quibus licet curationum formulæ, & rationes parcius occurrant, saltem præcautionis regulæ quædam non contemnendi usus habebuntur.

Clarissima mulier in ætate viginti sex circiter annorum, sexti fœtus partum difficulter admodum, nec sine vitæ discrimine enixa est; postea tamen statim se mediocriter habuit. Die secundo carnem totius pulli comedit; tertio lecto excitata per quatuor horas in cathedra sedit: nocte insequenti se malè habuit, quo tempore lac in mammas profilit; quod tamen emplastris è diachylo applicitis citò disparuit. Mane proximo de lassitudine, & dolore velut ulceroso totius corporis, necnon de vomitu, nausea, ac plenitudine circa ventriculum, & hypochondria querebatur: nox valde perturbata sequuta est. Die quinto apertius febricitavit; modo rigorem, modo æstum undique gliscentem persensit: erat nauseabunda, stomacho aggravata, insuper irrequieta, & insomnis: lochia minutè fluebant, humor verò albicans (vulgò lactis fluor dictus) emanabat. Vespero circa frontem & tempora velut somnolenta gravamen habuit, & parum dormire cœpit: post sesquihoram cum phantasmate perturbato, evigilans, quæta est de capite velut in molem ingentem aucto, etiam de maxillis obseratis, ut dentes recludere nequiret, & pugnīs arctè contractis

porro stuporem in toto corpore quasi pungitivum sentire visa est. Ventriculus, & hypochondria usque tensa, & inflata perstabant. Huic frictiones, ligaturæ, cucurbitulæ, aliaque remedia tum interius, tum exterius adhibebantur, quæ lochia revocarent, & sanguinis recrementa à capite derivarent. Venæsectionem pulsus debilior & inordinatus non admittebat: pulveres, & julepia quæ diaphoresin blandè moverent, sanguinemque & succum nervosum funderent, & à restagnationibus impedirent, diligenter fuerant adhibita: quin etiam foci imo ventri modo ex pannis laneis decocto emollienti intinctis, modo ex tepidis animalium visceribus applicabantur: interim foetida (uti in hystericis asfolet) naribus admota erant, quæ spirituum & sanguinis impetuosum in caput raptum arcerent: his verò, aliisque per plures horas sedulo peractis, quiddam levaminis sentire visa est; usque tamen oculos claudere, aut somno se accingere verebatur: etenim palpebris obductis, cum sonitu & tinnitu in toto capite, mille phantasmata animo incurfabat: noctem ferè insomnem ducebat. Quamprimum dormire cœperat, statim perterrita, & in præcordiis aggravata expergiscebatur. Die sexto circa meridiem rigorem magnum, seu potius horrorem cum totius corporis concussione valida perpeffa est; cui velut in febris intermittentis paroxysmo, mox calor, & dein sudor copiosus succedere: inde verò nihil levaminis laboranti advenit; quippe statim à sudore febrilis calor redintegratus est, & affectus convulsivi ipsam plus infestabant. Nocte insequenti cum & reliqua symptomata ingravescerent, primò in lingua, dein mox in gutture paralysis excitata est, ut minimè loqui, & vix omnino deglutire potuerit. Die septimo circa eandem horam iterum rigor cum calore, & sudore; inde pulsus longè debilior, & inæqualis; item respiratio difficilis cum anhelitu crebro, & pectore elato invaserunt: adstantes non agnovit. Die octavo emoriebatur.

In illustris hujus fœminæ perniciem propter ingravidationem in febrem prædispositæ multiplex armabatur occasio, morbique malignitatem impendio auxerat: nam & uteri à partu difficili læsio, lactis subitanea à mammis exclusio, carnis comestio, & cita nimis è lecto exsuscitatio in majorem noxam velut conjuratione facta convenere. Sanguis febrili incendio tactus statim inordinationes concepit; lochia, aliaque forsan uteri inquinamenta in se rapuit, indeque labem majorem, & diathesin planè venenatam acquisivit. Viscerum membranæ, sive succo nervoso degeneri perfusæ, sive spasimis iis ab utero continuatis, motibus convulsivis percellebantur: etenim ejusmodi circa abdomen inflationes, & distensiones reverà convulsionum effectus sunt; nam licet fibræ directæ membrum contrahentes sæpe illud cōprimunt, tamen cum fibræ simul rectæ, & transversæ, alioque vario situ positæ in membrana cavitatem ambiente unà convelluntur, pars tanquam vesica inflata intumescit, in cujus vacuitatem aër rarefactus secundariò se proripit: tantum abest (quod vulgò fertur) aërem, sive flatum ibi primò congestum distensionis causam esse. In ægrotante nostra sanguis effervescens, atque cito materia adusta atque maligna satur, ipsam subigi, & per sudorē secerni inhabilem, protinus in cerebro defigere conabatur. Prima ejusdem materiæ in caput suffusio propter spiritus animales semiobrutos sensum intulit magnitudinis ipsius capitis plurimū auctæ: quod simili ritu accidit, ac cum pes stupore correptus seipso longè major persentiri videtur. Quod verò post levamen quoddam

in dormitatione, & oculorum clausura affectus recrudesceret; ratio est, quia vigilia, & sensuum excitatio materiem cerebrum & nervos obsidentem aliquatenus excutiunt, & à se amovent; quæ tamen prope, & in procinctu sita, irrepente somno, ab ipsis quasi imbibitur, eorumque corpora unà cum succo alibili penitus subit. Cruor autem, licet recrementa cerebro copiosè suffuderat, haud tamen ipse immunis evasit; quin impura saburra usque impletus efflorescentiam velut criticam concepit, & cum rigore, subsequentibus calore & sudore (prout in magna *ἐκρίσθαι* assolet) semel, atque iterum sarcinam suam excutere tentavit: quo tamen nisu nihil ultra proficiebatur, quàm quod materies cerebro adhærescens altius ipsi impingeretur, nervorumque surculis quibusdam infixæ loquelam, & deglutitionem, dein postea sensationem adimeret; atque sanguinis massa sensim magis, magisque depravata, tandem vitæ sustentandæ inhabilis evaserit.

Fœmina perillustis paulò infra vicenarium ætatis annum nupta, uterum gestans, cum durante ingravidatione victu parvo, & exercitio ferè nullo uteretur, in partu labores, & tormina, cum intermissione tamen, & crebro levamine per duodecim horas passa, filium enixa est. Fœtus cum secundina abscissit, omniaque rectè circa uterum constitere: diebus primo & secundo mediocriter habuit, tertio autem post levem rigorem de siti, & incalescentia queri coepit; quibus diarrhœa successit, ut isto die quatuor sedes habuerit; nox ferè insomnis sequuta est, intemperies febrilis deinceps per biduum eodem modo perstitit. Quotidie alvum ter, aut quater dejecit, lochiis adhuc modicè fluentibus. Die sexto cum mulierum suasu ad moderandum alvi fluxum quiddam adstringens cepisset, purgamenta uteri ferè in totum sistebantur: quo tempore febris intensior evasit, & symptomata velut hysterica emergebant; etenim in præcordiis oppressiones habuit magnas, & crebras, atque in gutture præfocationis sensum perpessa est. Die septimo erat calor intensus, & respiratio difficilis, ac laboriosior: tum verò ex præscripto Medici tum primò accersiti sanguis è pede ad unc. 3. erat detractus, è quo per quatuor horas se melius habuit: etenim somnus placidus cum sudore copioso successit; lochia in exigua licet quantitate denuò apparebant: vesperi iterum omnia exacerbabantur; vires plurimum exsolutæ, pulsus debiliior, & inæqualis evasit: quæsta est etiam de sonitu, & tinnitu aurium, cum plenitudine capitis. Porro tendinum in carpis subsultus, necnon totius corporis subitas concussiones habuit; usque tamen diarrhœa ipsam exercuit: huic cardiaca, aliaque remedia, & administrationum genera ex plurimum Medicorum præscriptis sedulo adhibita ne hilum profuere; pulsu debiliiori facto, & viribus sensim diminutis die nono à partu obiit.

Hæc febris à vitioso corporis apparatu, velut causa præcatartica plurimum dependebat: etenim sæpius observavi, quod malè sit puerperis, quæ cum gravidæ fuerint, fructus, & cibaria quævis insalubria ingerunt, atque sine motu, ac exercitio degentes, tantum otio, & quieti indulgent. Sanguis ob præviam *ναχέζια* sine evidenti occasione, velut sponte incendium concepit: effervescens autem recrementa sua, & impuritates usque interiùs deponens, diarrhœam intulit; nec tamen ab ista ferè continua excretionem ejus massa depuratio facta est, quin mixtione, sive crasi ejus usque magis depravata, tandem

à propria indole omninò descivit cruor, & ad fermentescendum in corde, quo calor, & spiritus undique disspescantur, inhabilis evasit. Diarrhœa naturæ motu excitata perperam erat cohibita, præsertim adstringentium usu; hæc enim non impunè tentari sæpius observavi. Quippe alvi fluor nonnullas malè habentes sanavit, atque in ista Domina plurimisquæ aliis (uti experientia nostræ abundè constitit) etiamsi febrem non sustulerit, tamen à gravioribus cerebri, & nervosi generis affectibus eas liberavit: unde hæc ægotans delirio omninò caruit, nec motibus convulsivis, donec ferè ad extremum redacta, percellebatur.

Materfamilias non ignobilis, triginta sex, aut quod excurrit, annos nata, decimumseptimum foetum gestans fuit mœsta admodum, atque anxia, ne ab instanti puerperio interiret; sed (Deo favente) sat feliciter filium enixa est, & per tres inde dies alacriter habuit: die quarto cum ex carne pulli plus debito comedisset, paulò ante noctem in febrilem intemperiem cum vomitu, & lochiis cohibitis incidit: tota nocte insomnis, & irrequieta jacuit; mane proximo spatio unius horæ quatuor habuit sedes, & alleviari visa est: circa meridiem (quo tempore adveneram) rursus de calore, & siti, necnon palpitatione cordis, & molis cujusdam in guttur ascensu conquesta est: pulsus erat celer, & parvus, urina erat rubicunda, lochia vix apparebant: huic julepia, cardiaca, & purgationem uterinam moventia exhiberi, insuper fœtus imo ventri adhiberi, etiam crura, & pedes pannis excalefactis sæpius confricari præcepi: horâ somni laudani gr. i. cum croci pul. scrup. sem. in cochleari aquæ Theriacalis propinabam: placidè dormivit, & lochia ubertim descenderunt, indeque victu tenui, & fluxum uterinum modicè proritante paucos dies usa planè convaleuit.

Huic sine magno apparatu, aut prædispositione multum vitiosa immoderatus carniū esus, velut causa evidens, & sola ferè sufficiens, febrem induxit: lochia in massam sanguineam restagnantia ejus intemperiem auxerunt, atque nervoso generi statim molestias intulere: interea tamen cruor, licet effervescebat, corruptionem haud magnam subibat; quin cum recrementa à crapula congesta diarrhœâ excernerentur, atque sanguis, fluxu lochiorum restituto, rursus solito more expurgari cœperat, febris ista fermento adhuc plurimum maligno carens citò disparuit.

Fœmina prænobilis, juvenis & venusta, filiola secundæ partum satis facilem obtinuit; & per sex dies circa lochia aliaque accidentia rectè habens, cujusvis intemperiei suspicione omninò caruit: carnibus quotidie vescebatur, & lecto excitata in cubili alacris versabatur. Die septimo sine causa manifesta rigor supervenit, cum febre, & lochiis diminutis, verum non suppressis: ad diem verò à partu decimum modicè tantum febricitans, cum purgamentis uterinis adhuc fluentibus, symptomate quovis graviore immunis degebat: tunc verò licet valde febricitans, solito hilarior, & de salute sua confidentior visa est. Nocte parum, aut vix omnino dormivit; mane sequenti (quo tempore eam primò invisi) apertè deliravit, lochia sistebantur, horrore etiam totum corpus concutiebatur, tendines in carpis non vellebantur, adeo ut vix liceret pulsum dignoscere, qui interea debilis, inæqualis, & valde creber fuit. Hanc, nisi divina manus insperatò, & quasi è machina intervenerit, brevi emorituram pronunciaui: utcumque Bezoar Orientalis g. 6. in cochleari julepii cardiaci exhibita.

exhibita sudorem copiosum cum pulsu meliori inducentia, dein alia cardiaca debitis intervallis propinata spem salutis aliqualem, dubiam licet, sibi que minimè constantem fecere. Post quatuor horas à quo intraveram, languida sponte naturæ sedem ingentem habuit; inde statim omnino conciderunt vires, atque intra sesquihoram mortua est.

Huic Dominae, cum circa partum, aut uterum nihil mali contigisset, sine magna atque insuper maligna sanguinis & humorum *αποκρίξις* febris ita perniciosa, & subito lethalis obvenire non potuit: utrum plenior victus, an frigus susceptum, aut alia quæpiam causa evidens huic originem præbuerit, incertum est: quippe mulieres & nutriculae ministrantes nullam manifestam ægritudinis occasionem agnovere. Febre accensa, sanguinis labes purgatione uterinâ etiam diu continuatâ haud in totum eliminari potuerat; licet propterea symptomata tetriora haud statim ingruerent: usque tamen malum intus latitabat, atque morbo valde acuto, ejusque motu celeri existente, die quarto, cum natura crisin moliri debuisset, materia febrilis commota, necdum verò subacta, cerebrum & partes nervosas semel & quasi momento obruit, ipsamque sanguinis crasin subito pessundedit, unde mors inexpectata, atque præceps subsequuta est.

Mulier eximia vicesimum vitæ annum vix prætergressa, vultus floridi, & gracilis corporis, post partum cum lochia immoderate fluerent, remediis quibusdam adstringentibus ex ministrantium consilio usa est, unde omnino sistebantur: fluxus verò alvi successit, qui cum per tres dies incrudesceret, mulieres alia propinant remedia ad sistendam diarrhœam; nec quidem successu frustratæ sunt: interim febrem periculosa, & affectus quasi hystericos in prioris mali locum advocavere: etenim siti, & calore cum vigiliis, dein crebrâ vice syncope, & sudoribus frigidis infelix puerpera afficiebatur. Hoc tempore accersitus remedia cardiaca, & purgationes uterinas moventia hauriri, atque insuper clysterem immitti præcepi: alvi fluxu denuò provocato, etiam lochia descendunt, atque ægrotans nostra prædictis symptomatis, & graviore morbo, scilicet nutricularum remediis libera, citò à febre convaluit.

Huic fœminæ fluxus uterinus copiosior contingens, morbi graviore procatarxin amoverat: quare cum tot errata circa regimen ejus committerentur, scilicet primò in sistendis lochiis, dein (quo istorum defectus compensari debuit) in cohibendo alvi fluxu, febris tantum levior sine miasmate venenato sanguini impresso accersebatur: simile huic frequenter accidisse novi, nimirum si quando primis diebus purgationes uterinæ admodum copiosæ dimanant, postea cum pariori earum profluvio, ac interdum defectu puerperæ evadunt. Atque hoc in loco obiter notetur, periculosum omnino esse quemvis naturæ motum licet anomalus incitatus, aut inhibere, aut saltem deflectere, atque in transversum agere.

Illustrissima mulier viginti & circiter annos nata, habitu corporis pleno & toroso prædita, intra anni spatium bis abortum passa est: cum postea utero conceperat, ex præscripto Medici sui, semel in mense sero lactis copiosè epoto vomitum provocavit, quo multum pituitæ crassæ, & tenacis rejicere solebat: etiam gravidationis tempore quinquies sanguinem misit. Gestationis spatio transacto, cum difficili admodum partu puerum enixa est: secundina integrè

abscellit

abscessit, & egregiè purgabatur. Die secundo, dum in lecto super pedes erigebatur, ut linthea, atque stragula meliùs componerentur, frigus suscepit, indeque lochia sanguinea omnino sistebantur, & tantùm aquæ serosæ parum dimanavit. Die tertio queri cœpit de dolore acuto in latere dextro: quæ aderant mulieres, admovent sacculos ex camomilla cum lateribus excalefactis; veruntamen affectus plurimùm exacerbabatur, cum sputo cruento. Die puerperii quarto dolor acutissimus cum respiratione difficillima & valdè laboriosa invasit. Ex præscripto Medici tunc primùm ex vicinia adventantis sanguis à basilica ad unc.6. detrahebatur, & levamen subitò persensit, & per horas decem melius habuit: media nocte dolor pungitivus cum solita atrocitate rediit. Tandem Medicis aliis in consilium vocatis, venæ sectionem in brachio lateris affecti denuo necessariam esse communi omnium suffragio pronuntiatur. Sanguine ad unc.4. misso dolor remisit, & ægrotans meliùs respiravit: dein à remediis diaphoreticis in sudorem copiosum cum somno quieto incidit; pulsus verò crebrior, & debilior factus est; etiam in carpis tendinum contracturæ emicuerunt: postea statim incongrua loquebatur, atque intra vigintiquatuor horas è quo sanguis ultimò mittebatur è vivis excessit.

Quod hæc Domina à lochiis suppressis unà cum febre in pleuritidem incidit, in causa aliquatenus fuisse videtur sanguinis missio gestationis tempore ita crebrò adhibita: etenim hac ratione sanguis in brachio eventilari assuetus, postea effervescens, utero relicto versùs solitum extramissionis locum rapitur; ubi cùm exitum non invenerit, in latere vicino, velut proximo extravasationis foco defigitur: quinimò præter usitatum pleuritidis morem huic morbo malignitas haud minima accesserat; nam sanguis ab extravasatione vindicatus statim in crasi sua corrumpi incœpit, atque tertio febris die in tantum depravabatur, ut in corde ulteriùs fermentescere, adeoque vitam prorogare nequiret.

Non ita pridem uxor cujusdam fabri ferrarii parturiit, quo tempore in eadem domo nati ejus variolis afficerentur; atque ipsa, uti videtur, ejusdem morbi contagium suscepit: namque secundo à partu die cum incallescencia febrili, & dolore in lumbis pustulæ erumpere cœperunt, quæ quidem per triduum, lochiis moderatè fluentibus, in moleculas ritè assurgebant. Tametsi purgatio uterina eo tempore copiosa obtigisset, variolas in toto corpore consitissimas habuit; nec tantùm in cutis superficie, verùm etiam oris, & gutturis cavitationem implerunt, adeo ut vix loqui, aut deglutire potuerit: die puerperii sexto lochia immoderatè fluebant, unde statim cum variolis flaccidis syncope, convulsiones crebræ, aliaque mali moris symptomata ægram incessèrunt, quæ mortem brevi minabantur. Accersitus præscripsi pulveris hujus semidrachmam è cochleari julepii sequentis trium horarum intervallis constanter assumendam, scilicet *℞. Radic. tormentillæ pul. drach. 2. boli armeni opt. drach. 1. specierum de hyacintho drach. sem. F. pulvis. ℞. Aqu. scordii composit. Dracontii, ulmarie an. unc. 3. Aceti Theriacalis unc. 1. Syrupi è coralliis unc. 2. Cornu cervi usti drach. sem. F. Julepium.* Insuper jusculis, & potulentis quibusvis radices tormentillæ incoqui præceperam: his remediis purgatio uterina mox in totum sistebatur, & variolæ sine graviore symptomate sensim maturatæ excidebant.

Casus hic fuit reverà difficilis, & magno cum discrimine absolvebatur: scilicet aut lochia, aut variolas intus cohiberi periculosum erat; & tamen

alterutrius plenior eruptio alterius motum impediēbat: quamdiu utraque moderatè procedebant, res naturæ ductui permissa moderatè se habuit: cū verò alterā invalescente, artis opera requirebatur, *lochis* frēna, *variolis* autem stimulos adhiberi ex usu fuerat.

C A P U T X V I I.

De Febris Epidemicis.

Hic ultimam dissertationi nostræ de Febris manum imponere animo statueram; commentarium potius, quàm integrum tractatum meditatus. Quatenus verò febres quædam epidemicæ non rarò grassantur, quæ nullas observant leges, neque ad certam doctrinæ normam revocari possunt, verùm anomalæ prorsus quotannis variant, & propterea quoties earum aliqua increbrescat, statim *morbis novis* appellatur: idcirco operæpretium duxi, quoniam de his febribus generalia præcepta non sunt tradenda, historias particulares de quibusdam hujus farinæ subungere; etenim ex vario symptomatum apparatu quo insigniri solent, *natura* & *tota formalis ratio* hujusmodi affectuum nonnihil elucescet. Cū itaque nuperis annis intra brevem temporis tractum tres morbi populares in his regionibus grassati sint; singulas eorum descriptiones temporibus quibus febres ipsæ ingravescēbant, olim factas huic operi coronidis loco subjiciam.

Febris Epidemica circa autumnum Anni 1657. increbrescentis descriptio medio Septembris habita.

Dum febris hoc tempore immaniter grassantis descriptionem meditamur, æquum est ut Hippocratis exemplo ducti, prægressam anni constitutionem, ejusque intemperies, & qualitatum excessus prius expendamus. Etenim morbi epidemici, & communiter inter populum excitati erit causa communis, qualis Anni habitudo, & exinde contracta sanguinis nostri diathesis (quæ pariter complures afficiantur) assignanda. Ut autem ab initio rem deducamus, Ver novissimum, atque exinde succedens tempus usque ad finem Æstatis, scilicet totum hoc semestre spatium impensè calidum, siccumque fuerat: præcipuè verò post solstitium Æstivum fervores adeo intensi per plures hebdomadas insequuti sunt, ut dies & noctes nullus non quereretur de aëris calore, & ferè continuo sudore, quo maderet, quodque liberè respirare non liceret: circa calendas Sextiles hæc febris primùm sporadica in quibusdam locis erumpere cœpit, ut forsan unus, aut alter in Urbe, aut Vico eadem corripere: in plurimis tertianæ intermittētis typum imitata est, scilicet diebus alternis paroxysmi redierunt: qui tamen sine frigoris, aut rigoris procēmio cum calore intensissimo agros infestant. Vomitus, & dejectiones biliosæ in plerisque copiosè venerunt, sudore non nisi difficili, & sæpe interrupto succedente, quo febrilis accessio rarò in ἀπυρεξία solvebatur: quin toto interstitii tempore cum siti & inquietudine languidi, & imbecilles Ægri transeunt: in quibusdam cū res in melius vergeret, post tres, aut quatuor paroxysmos frigus & rigor

rigor accessionem inchoabant, & febris exactè tertiana intermittens facta est: in plerisque autem morbus usque in deterius cessit, & statim mali moris, & difficilis solutionis cum pravo symptomatum apparatu evasit; cum enim aëri in paroxysmis summè incalescerent, & difficulter sudarent, errores committi solebant, qui morbi vires quotidie intenderent: quippe ob aërorum impatientiam, & ministrantium imperitiam, sudore qui accessionem febrilem finire debuerat, interrupto, post unum paroxysmum vix finitum statim alter successit, indeque morbus periodos vagas & incertas, sine ἀναρρώξιας intercessu habere, & postea in febrem velut continuam transire solebat; cujus status aliquando valde periculosus cum mala cerebri, & nervosi generis affectione fuerat, ut non rarò lethargus, aut delirium, sæpe autem spasmi, & motus convulsivi excitarentur. Circa mensem *Augusti* hæc febris longè, latèque in populum grassari cœpit, ut in nulla non regione, & vico plures ex eadem decumberent; erat tamen ruri, & in villis minoribus longè frequentior, quàm in urbium, aut oppidorum confiniis. Usque febris intermittens typum referebat, nisi quod paroxysmorum atrocitas, & intermissionis brevitatè solito infestior visa sit; ideoque morbus novus passim vocabatur: insuper malignitatis cujusdam subibat notam, & certa satis contagii atque pernicipis suæ documenta dederat. In quantum de domo in domum serpebat, plures ejusdem familiæ, & præsertim cum aëris familiariter versantes eadem labe infecit: quinetiam senes, ac maturæ ætatis homines passim è medio sustulit.

Affectus naturam ac essentiam si spectes, erit hæc febris propriè in *intermittentium* censum referenda; etenim paroxysmi statis temporibus redeunt: nec non ut plurimum cum frigore, & rigore, sæpius cum vomitu incipiunt, & mox calore intensissimo procedentes demum sudore finiuntur. Urina in plerisque apparet coloris flammei, in paroxysmo tenuis, cum aliquali hypostasi: extra hunc crassior, cum sedimento subruffo. Sudore licet copiosissimo, & sæpius iterato, morbus non judicabatur, quod in febre continua expectare liceret: quin per plures dies, aliquando & menses affectus diutissimè perstat, licet plurima evacuatio per vomitum, & sudorem quotidie fere contingat: quod in febre intermittente frequenter, in continua rarò accidere observamus. Extra paroxysmum, quovis morbi tempore purgatio commode instituebatur, quod in syncho ante signa coctionis esset nefas moliri. Præterea esse hanc febrem de intermittentium genere, vel hinc constare videtur, quia plurimi ex eadem convalescunt, ut ægrotantium vix millesimus intereat, quod de syncho Epidemica vix auditum censeo. Circa prima hujus morbi initia tertianæ intermittenti perquam similis apparet, licet postea in aliquibus ob vitiosum corporis apparatus, & errores in victu & diaphoresi commissos, in continuam migrasse videatur: quibus enim paroxysmi non ritè concluduntur, nec in apyrexiam desinunt, propter materiam morbificam non penitus difflata, iis sanguis jugiter effervesceat: unde factum est, ut accessiones celerius redeant, & diutius infestent; donec tandem ob materiæ copiam, & naturæ languorem cruor debiliior factus, non amplius turgescere, & statis horis materiam febrilem secernere potis sit, quin ipsam paulatim, & continua effervescencia subigere nitatur.

Circa causas hujus morbi inquirendum erit, quæ sit causa ἀρχαία, *evidens & conjuncta*, scilicet cujus ratione adeo nunc passim grassetur, ut per totam

Angliam Epidemicus evaserit ; quibus modis, & ob quas *περὶ αἵματος* in quibussibet hominibus soleat primò excitari : ultimò demum, qualis alteratio sanguini & humoribus inducta hujusmodi febrem cum tali symptomatum apparatu pariat, & in actu conservet.

Scio in promptu esse hujus morbi adeo popularis causam in maligna aëris constitutione omnino collocare; quod nimirum auræ qua vescebamur, particulæ miasmæ quodam extraneo, & naturæ nostræ minus congruo infectæ fuerant ; cujus miasmatis corpuscula intus admissa cum sanguine & humoribus fermentescebant, adeoque in plurimis cum eadem ferè symptomatum apparentia hanc febrem induxere. Quis enim morbi adeò communiter grassantis originem à minus publico fonte deducere audebit : aut aliunde morborum causas acceptas referre, quàm fomiti isti vitalis auræ quem universi jugiter depascuntur ? At mihi rem attentius consideranti, paulo altius ejusdem stemma, & prima quasi rudimenta repetenda videntur. Quod nimirum hæc febris nata sit, non contagio quodam ab aëre communicato, & immediatè hominibus labem infigente ; sed potius à diathesi, seu prædispositione quadam febrili, propter anni intemperiem antehac corporibus nostris impressa, quæ demum maturitatem adeptæ, levi occasione in actum deducitur, & in hanc febrem non erumpit adeo, quàm excrevit.

Cum enim circa Julii Calendas æstu intensissimo per plures dies aër immodicè incalesceret, facile sanguinem nostrum versus calidam & biliosam intemperiem alteravit, quia nimirum (uti in vino plus debito effervescente) pars dulcis, & spiritiosa multum absumitur, interim salina & Sulphurea nimis evehitur, ut exinde rancorem, aut acorem liquor facile contrahat : hujusmodi sanguinis diathesin, qua quidem à temperie dulci, & spiritiosa, propter nimiam assationem in biliosam vergit, ad febres intermittentes aptissimam esse alibi ostendimus ; hinc succus alibilis, qui in cruoris massam continuò defertur, non ritè coquitur, nec in sanguinem assimilatur, sed in materiam velut extraneam & fermentativam pervertitur : quæ in ipso sanguinis sinu ad plenitudinem assurgens, juxta incrementa sua statis periodis turgescens, quemadmodum suprâ docuimus, febris intermittens paroxysmos inducit : cum itaque à retorrido hujus æstatis fervore sanguis ferè omnium plus debito incalescens plurimum exassaretur, nihil mirum est, si exinde ad febres intermittentes maximam aptitudinem contraxerit : cur autem non urgente adhuc cœli fervore, sed paulò postea hic morbus increbuerit, ratio est, quoniam hæc indispositio non semel & una vice, sed paulatim, & non nisi longo tempore cruori nostro imprimitur : ideoque morbi, velut fructus, post prægressum æstatis calorem potissimum in autumno maturantur.

Hanc aptitudinem, seu diathesin febrilem haud omnes ex æquo contrahunt : illi quorum sanguis à natura calidior plus sulphure abundat, & proinde citius assationem patitur, etiam qui laboribus dediti, aut sub dio morati, æstatis fervorem magis perpeffi sunt, ob cruorem insignius torrefactum facilius in hunc morbum inciderunt : quare inter colonos, & ruri potissimum primò defæviit : ex his qui à sanguine perassato aptitudinem ad hanc febrem acquisiverant, forsan alii in hanc sponte inciderant, diathesi febrili sensim ad maturitatem evecta ; alii ob levem occasionem, seu causam evidentem,

quæ aliàs febrilem effervescentiam solet concitare, uti à frigore suscepto, crapula, vini potu, & similibus: atque alii ægrotarunt propter contagium ab aliis susceptum, siquidem ab ægrotis effluvia constanter emanant, quæ cum in corpora ad similem affectum prædisposita impingunt, *δυναμεις* latentes facile in actum suscitant.

Quod erat tertio propositum, nempe ut hujus morbi *causa conjuncta*, ejusque ratio formalis innotescant, in memoriam revocanda sunt, quæ de febrium intermittentium natura alibi habentur: supponimus nimirum hujus affectus velut basin, constitutionem sanguinis retorridam & biliosam, propter quam succus alibilis, velut in dimenso quotidie suppeditatus, non rite coquitur, sed assatione in materiam fermentativam, & cum cruore non miscibilem faceffit. Quando hac materia sanguis ad plenitudinem saturatur (quod statis temporum intervallis contingit, quia succus alibilis in stata velut mensura suppletur) sponte turgescientiam concipit, & effervescentia hujus materiæ eliminandæ gratia citata paroxysmum febrilem infert, qui eò usque perdurat, donec hæc materia febrilis in corde accensa, & velut combusta cum sudore penitus diffletur.

Ex hisce præmissis palam fiet, nonnulla esse quæ in hoc, de quo agimus affectu, à communi intermittentium genere peculiari ritu contingunt, ideoque febris novæ appellatione eam non immerito insigniri; cujusmodi sunt primo quod circa morbi initia paroxysmi sine frigore, aut rigore incipiunt, sed cum vomitu atroci, siti, & calore intensissimo ægros diu affligunt; quibus sudor ægrè plerumque, & partialis, ac sæpe interruptus succedit, quo accessio non nisi longo tempore finitur. Quorum ratio unice poni debet in diathesi sanguinis valde biliosa, & supra modum perassata: hæc enim à sulphure præpollente procedens solitum sanguinis acorem, qui turgescientiam ejus sequitur, & rigorem aut frigus solet concitare, omnino inhibet; atque ob hujusmodi temperiem sanguinis succum alibilem nimis assantis, & velut comburentis, cruor unà cum succo isto turgescens, & in motum concitus, plus solito in corde accenditur, & deflagratione sua calorem cum siti intensissimum, & ægris molestissimum inducit. Vomitus biliosi non tantum ab initio, sed & medio paroxysmo contingunt ob illius exundantiam, qua vasa choledocha subinde nimis oppleta ipsam intestinis suffundunt; quæ dein, spasmo in visceribus concitato, facile in ventriculum exantlatur. Sudor ægrè succedit, quoniam bilis plus sero abundat: quare materia febrilis combusta diaphoresi non facile secernitur, quin vel cruori commissa effervescentiam diuturnam infert, aut versus intestina delata vomitum aut diarrhœam producit. *Secundo* differt hæc febris à vulgari intermittente, quia post finitum paroxysmum non datur plena intermissio usque ad *ἀπορροήαν*: quin ægroti usque manent languidi, & sitibundi, quoad appetitum, somnum & cætera accidentia se malè habentes: quod reverà accidit quoniam ab intenso paroxysmi calore plus sanguinis, & materiæ febrilis accenditur, quàm ut recrementa à deflagratione ejus residua possint cito diffilari: præsertim quia sudor ob materiæ siccitatem ægrè admodum succedit, nec satis materia febrilis excernenda seroso latice diluitur: quare sanguis ab ejus contagio paroxysmi tempore haud perfectè liberatus, adhuc effervescit, neque accessione finita à morbo plenas inducias sortitur: interea

dum cruor effervescentia ferè continua hoc modo urgetur, à synocho differt; quoniam in hac pars sanguinis Sulphurea nimis evecta velut inflammatur, & deflagratione sua febrim facit: continua autem ebullitio, quæ hoc modo febris huic intermittenti supervenit, à materiæ non miscibilis confusione, ejusque à sanguine agra secretionem omninò dependet. Synochus instar vini ob opulentiam suam sponte effervescentis contingit; altera instar ejusdem, propter heterogeneum aliquod confusum, orgasmum concipit: quare advertimus cum febris nostra jam in continuam migrasse visa est, eam tamen nec sudore, nec alvi fluxu, copiosè licet & crebro obvenientibus, judicari; quia à sanguine depauperato potius quam inflammato dependens diutissimè perstat, ægrosque versus cachexiam disponit.

3. Erit *tertia* discriminis ratio, qua hæc febris à communi intermittentium censu discrepat, in hoc sita, quod facile per contagium in alios subinde propagatur; cujus ratio est, quoniam corpora hîc plurima sunt eodem modo ad eundem affectum prædisposita, quod alio tempore minimè contingit: quare mera effluvia à corpore morbofo in subjecto facile capaci similem effectum concitare valent; non secus ac flammæ radii quidam in materia valde combustibili flammam accendunt: interim hujus febris labem haud omnes pariter contrahunt: quin aliqui minus ad ipsam parati impunè cum ægris conversantur.

4. Occurrit aliud symptoma huic febris haud constans, sed aliquibus tantum locis contingens, quod ipsam non tantum à communi discriminat, sed proprium sui ipsius typum variat: nimirum aliquando accidit, affectus dysentericos hunc morbum comitari; in quibusdam ad modum cholerae, vomitus & dejectiones biliosæ plurimum infestant; ac in aliis sedes cruentæ cum atroci dolore ac alvi torminibus succedunt. Prius in nostra hac vicinia sæpius adverti; ejusque ratio à temperie sanguinis insigniter biliosa deduci potest: propter hanc enim materies adusta diaphoresi minus diffilabilis copiosè in jecore seceratur; dein ob vasa choledocha ad exundantiam repleta ventriculo & intestinis demandatur. Alter dysenteriae affectus in quibusdam tantum locis reperitur, ibidemque sporadicus potius quam communis nonnullos solum ægrotantes occupavit. Ejus origo ad peculiare quorundam corporum crases, aut vitiosos apparatus, necnon locorum situs, aut auræ conditionem referri potest. Dein morbum, non sine miasmatis cujusdam communicatione subinde ad alios translatus suspicari est.

Circa hunc morbum *duplex prognosticon* haberi debet. *Primò* ipsius febris in genere, qualem & quando habitura sit finem: quid Terræ nostræ minetur; an non pestem, aut ægritudines λοιμώδεις (quod vulgò timetur) præcedat. *Secundò* poni debent signa, quibus salutem aut periculum in variis ægrorum casibus præfigere solemus.

Quoad *primum*, quoniam hujus affectus originem non ab aura contagio, aut venenato miasmate infecta, nec à maligno vaporum seminio per aërem diffuso petendum ostendimus, sed tantum à temperie, seu diathesi corporum nostrorum insigniter biliosa cum sanguine adusto, & ob æstivos fervores summè præassato; puto hic nullam subesse metus rationem, qua vereamur ne febris hæc vitio aëris in pejus evecta, tandem in malignam aut pestilentem excrescat. Quin potius (quod mutata anni tempestas, & sanguinis nostri

altera

alteratio expectanda pollicentur) timere debemus, ne febris hæc, quæ modò tertianæ intermittentis typum imitatur, postea sanguine atrabiliscente in quartanam transeat: quod quidem in aliquibus jamjam contigisse adverto; & ne posthac autumno ad finem vergente in pluribus obveniat, præcipuè metuedum duco.

Quoad particulare prognosticon, signa, quæ in hujus febris decursu maximè notabilia occurrunt, ejusque statum & eventum quodammodo prænuntiant, sunt hujusmodi: si morbus in corpore firmo, benè temperato, & facile perspirabili contingat: si vomitio cum euphoria succedat, sitque alvus soluta: si paroxysmus cum levi rigore incipiat, & post calorem moderatum cum sudore finiatur, sitque intervallum cum ἀνυψία vel tolerantia: si pulsus sit fortis, urina coloris flammei, pellucida, cum hypostasi laudabili, morbum citra periculum brevi desitutum prædicimus. Sin hæc febris in corpore pingui & habitus vitiosi excitetur, si cum vomitu molesto calor efferatus & sitis intolerabilis ægrotum diu exerceant, si calori sudor difficilis, partialis, sæpe interruptus, & crebris vomitionibus intercalatus succedat, ac minimè in apyrexiam desinat, morbum hîc longum & periculosa aleæ subjectum pronunciamus. Sin tamen viribus æger constet, & urina signa coctionis exhibet, de salute minimè desperamus; præsertim si post quatuor aut quinque periodos morbus, quod fieri solet, de solita atrocitate remiserit. *Tertiò* observamus, si morbus hic in corpore senili aut aliis ægritudinibus fracto, aut debilitato excitetur; si præter vomitiones horrendas, & caloris atrociam, crebra syncope, lipothymia, deliria, aut affectus lethargici accedant; si post plures accessiones, prostratis ægri viribus, morbus nihil remittat, quin effervescencia continua sanguinem exercet, ac spiritus vitales plurimum disperdit: si appetitus dejectus, vigiliae pertinaces, motus convulsivi, cum pulsu debili, urina turbida, aut crassa obveniant, rem periculo plenam judicamus: nec tamen æger velut deploratus relinquatur, quia morbus hic minimè præceps haud citò & affatim jugulat: sed diu protrahitur, & naturæ se recolligendi, & Medico remedia exhibendi tempora & occasiones concedit.

Indicationes therapeuticae, quæ in curatione hujus febris locum habent, sunt præcipuè *quatuor*. *Primò* ut sanguis jam retorridus, & nimis biliosus factus ad debitam temperiem reducatur. *Secundò*, ut succi alibilis depravatio, ejusque in materiam fermentativam alteratio inhibeat, aut saltem minuatur. *Tertiò*, ut circa morbi declinationem sanguis crebrâ deflagratione depauperatus, & materiæ morbificæ seu adustæ confusione impurior factus restauretur, atque uti par est, volatilis reddatur. *Quartò*, ut symptomatis, quæ in morbi decursu maximè infestant, cum remediis idoneis tempestivè succurratur: quò his intentionibus satisfiat, methodo sequenti utendum consulto.

Circa prima morbi initia, si humore bilioso è vasis choledochis exundante, & in ventriculum suffuso æger sit in vomitum proclivis, instante paroxysmo uberior ejusdem evacuatio leni emetico proritetur. Venæsectio, & purgatio non nisi paroxysmorum interstitio debet adhiberi: dum enim sanguis immaniter effervescit, aut in sudorem exsolvitur, natura ab opere incepto non debet avocari, nec molimina ejus à Medicorum præscriptis inturbari: quare post accessionem præteritam, & sudorem integrè finitum, leni cathartico purgatio

purgatio instituat, eademque postea simili occasione aliquoties repetatur: hac enim methodo non solum materiæ excrementitiæ proventus primis viis subducitur, sed præcipuè vasis choledochis inanitis, è massa sanguinis bilis copiosè emulgetur, indeque versùs crasin naturalem cruor restituitur. Sanguinis missio si indicatur, statim ab initio celebretur; sic enim liquor ejus nimis turge cens eventilatur, quo & succum nutritium minùs pervertat, & urgente paroxysmo mitiori incendio unà cum materia morbifica deflagret: secus autem si post longam ægrotationem vena secatur, quando sanguis depauperatus, & aquosior factus plus materiæ morbificæ congerit, ipsamque minùs rectè coquit & excernit, multum de naturæ viribus detrahitur, de morbi potentia nihil. Accessionum intervallo, cum nec venæ sectioni, nec purgationi locus sit, constanti enematum usu alvus soluta servetur: etiam remedia digestiva ex liquoribus & pulveribus acetosis, aut salinis exhibeantur: cujusmodi sunt cremor Tartari, sales herbarum fixi, Tartarus vitriolatus, Cornu Cervi ustum, Spiritus Vitrioli & Salis, &c. hæc enim viscerum fermenta amissa, aut consopita restaurant, sanguinem fundendo depurant, necnon materiam morbificam secernunt, ac velut præcipitant: etiam hoc tempore intercalari, si quando vigilæ pertinaces infestant, & ægri vires atterunt, liceat remedia anodyna, & blandè narcotica exhibere: in accessione verò nequaquam; tunc enim febrilis materiæ subactionem, & secretionem valdè impediunt, & paroxysmum citiùs desitutum diu protelant.

Hæc de agendis circa accessionum interstitia: urgente autem paroxysmo, licet ægri potissimùm accersunt ac inclamant Medicos, attamen eorum præscripta hoc tempore breviori limitantur scopo. Si Vomitus (licet emetico priùs adhibito) usque infestet, à liquore posseti, aut simplici, aut cum herbis amaris incoctis, liberiùs provocetur: potissima autem juvaminis ratio sit in contemperandis calore & siti, quæ in hac febre solent ægros graviter torquere: dum enim sanguis cum materia morbifica effervescebat, ac in corde accensus in pulmones exsilit, immanissimam illic phlogosin concitat, quæ frigidi humoris veluti pro flamma extinguenda perfusionem exigit: quare potum sine modo & mensura ingerere appetunt, quo destituti præ nimio fervore ægri exsolvuntur, eorumque sanguis ferè totus, velut in flammam & fumum rarefactus circulationis filum haud facilè continuat; quare potus febricitantibus omninò concedi debet: qui tamen, si largâ nimis quantitate ingeratur, sanguinem æstuantem primò magis exagitat, & materiæ febrilis secerni inceptæ denuò confusionem parit; ut proinde subactionis & secretionis opus diutiùs pertrahatur, & paroxysmus fiat longior: præterea item magna potûs ingestio ventriculo molestias facit, ipsumque perturbando, & sæpe vomitum ciendo diaphoresin impedit, & sudorem erumpentem, aut forsan eruptum intus revocat: quare accenso primùm febris calore, ægri licet sitibundi, solum pitissando bibant, & quantum licet se contineant: postea cum materia combusta, & subacta sudore incipit diffilari, genio hac ex parte liberiùs indulgeant; sic enim diaphoresis valde promovetur, & paroxysmus citiùs finitur: quoad naturam potûs, modò liquor posseti, modò cervisia tenuis, aut aqua hordei propinetur: quandoque aqua fontana, aut simplex, aut succo limonum acidulata: in hoc casu meritò laudatur usus Salis prunellæ

in quovis liquore exhiberi ; hic enim nitrositate sua sanguinem æstuantem mirè compescit , & sudores potenter movet : sæpiùs observavi , medio paroxysmo ægros in lipothymiam , aut syncopem incidisse , ubi quæ statim infundi solent , cardiaca & liquores ardentes , febris violentiam plurimùm adaugent , & solito majores molestias pariunt , ut paroxysmus difficiliùs finiat : verùm hæc deliquia ut plurimùm contingunt , vel ab humore bilioso in ventriculum suffuso , vel propter sudorem derepentè abruptum : & contra hæc remedium præsentissimum semper expertus sum , ut vel plurimùm gutturi inditâ vomitus provocetur , vel liquore tenui ubertim epoto sudor denuò suscitetur. Etiam in toto hujus febris decursu nulla omninò cardiaca aut alexiteria exhibere soleo.

Victus in hac febre solummodo tenuis , & minimè opimus institui debet ; edulia quævis ex carnibus animalium parata omnino vitentur : hæc enim Sulphure cum abundant , sanguini effervescenti , seu accenso pabulum (velut oleum flammæ suffusum) uberius præstant : nihil præterea spirituosum , ut sunt aquæ ardentes , cerevisia fortis , aut vinum , concedatur ; quin decocta aut juscula avenacea aut hordeacea herbis refrigerantibus alterata in maximo sint usu : item liquor posleri , & cervisia tenuis aut serum lactis pro ægrorum libitu propinentur : etenim hac ratione , cum succus alibilis admodum tenuis & aquosus sanguinis massæ convehitur , solutæ *Sulphuris* particula citiùs , & cum minori tumultu deflagrant : etiam materiæ adustæ recrementa è cruoris sinu faciliùs eliminantur : sin è contra ditior & uberior nutritus adhibetur , effervescencia cruoris inde plurimùm augetur , & materiæ adustæ confusione sanguis magis inficitur.

Postquam à crebris paroxysmis sanguine plurimùm deflagrato , febris in declinatione posita de fervore ac atrocità remiserit , cavendum est ne ægroti tandem adhuc convalescentes in cachexiam aut affectum scorbuticum impingant : etenim læsâ viscerum crasi , & cruore valdè depauperato , quamvis succus alibilis , licet non uti priùs , exassetur ; haud tamen ritè coquitur & in sanguinem perfectum maturatur : quin ob ob *πνευματώσεως* defectum excrementa serosa Sale fixo imbuta valde congeruntur , & modò in visceribus , modò in extremis partibus defixa varios effectus pariunt. Quare in diuturno ægrorum languore , aut aliàs , citioris convalescentiæ gratiâ exhibeantur remedia quæ sanguinem volatilisent , viscerum infarctiones aut inhibeant , aut factas referent , eorumque fermenta velut extincta restituant : huic usui imprimis conducunt remedia , & præparata , quæ vulgò digestiva & antiscorbutica appellantur ; quibus tempestivè adhibitis , novi plures imbecilles , pallidos , & quasi exsanguis citò vim vegetam , & vigorem recuperasse.

Febris Catarrhalis , Anno 1658. medio Vere Epidemica descriptio , prid. Calend. Junii habita.

Novissimæ æstatis calorem immodicum , hyeme insequente æquè intensum gelu excepit , adeo ut similem huic annum , propter utrumque , tum æstus , cum frigoris excessum , haud quisquam modò viventium facile meminerit. Ab Idibus Decemb. ferè ad Æquinoctium vernum erat tellus nive

obtectâ, & Borea jugiter sufflante cuncta sub dio posita constanter obrigescebant: etiam postea ab initio Veris ferè ad Calendas Junii eodem vento adhuc spirante tempestas erat brumæ quàm veri similior; nisi quod interdum die forsan uno aut altero præfervido intercalaretur. Durante hyeme inter nostrates (nisi quod febris quartana in Autumno contracta quosdam infestaret) status erat mediocriter salubris, & populari quovis morbo immunis. Ineunte Vere, febris intermittens tertiana, (uti quolibet præterea anno assolet,) nonnullos incessit. Circa finem Aprilis derepente emicuit affectus, qui velut afflatu quodam à sideribus immixtus quamplurimos unâ corripuit; ut in quibusdam oppidis unius septimanæ spatio plusquam mille homines simul decumberent. Symptoma hujus morbi pathognomonicum, & quod primò ægrotantes invasit, fuit tussis molesta cum sputo copioso, necnon catarrho in palatum, gulam, & nares decumbente: adest etiam intemperies febrilis, quæ cum calore & siti, inappetentia, lassitudine spontanea, & dolore gravativo in dorso & artubus ut plurimum conjungitur: quæ tamen febris in nonnullis erat remissior, ut foras obambulant, & circa consueta vitæ munia toto ægrotationis tempore occuparentur, interim de virium defectu & languore, cibi fastidio, tussi, & catarrho querentes: in quibusdam verò calida intemperies plurimum emicabat, ut lecto affixi ardore & siti ingenti, vigiliis, raucedine, ac tussi ferè continua molestantur: interdum hæmorrhagia narium in aliquibus sputum cruentum, & non rarò dejectiones sanguinolentæ huic affectui supervenerunt: qui corpore infirmo præditi, aut propectæ ætatis homines hoc morbo corripiebantur, haud pauci interibant; robusti autem & constitutionis sanioris ferè omnes convalescebant: qui huic morbo succumbentes interibant, plerumque ob vires sensim labefactatas & colluviem serosam magis in pectore coacervatam, cum febre adaucta & respiratione difficili, instar febre hectica laborantium emoriebantur. Circa hunc morbum inquirere oportet, qualem habuerit causam procatacticam, ut medio vere derepente emergeret, eodemque infra mensis spatium ferè tertia pars hominum afficeretur: dein signis & symptomatibus sedulò collatis, assignari debent hujus morbi ratio formalis, item criseos & curationis modi.

Ventum Borealem producendis catarrhis aptissimum esse, præter Hippocratis testimonium experientia communis suffragatur: cur autem non toto hyemis ac veris tractu catarrhi, saltem sporadicè increbuisse; sed tantum unius mensis spatio, & tunc cum febre conjunctus hic affectus epidemice grassaretur, ratio haud planè constat. Scio plures causam deducere ab inæquali (pro isto tempore) æris intemperie: qui licet plerumque frigidior, tamen aliquando remittente Boreâ die uno aut altero præfervidus extabat: quare ab hac ἀποφύξις, velut à frigore post incalescentiam suscepto, homines communiter ægrotare poterant: hujusmodi causa evidens forsan pro nonnullis hac ægritudine afficiendis sufficeret; at verò pro excitando affectu ita derepente exorto, & communissimè grassante, præter talem occasionem magna procataxis, seu prædispositio requirebatur: namque supponi debet, quod cuncti ferè homines ad hunc morbum suscipiendum fuissent proclives, secus nulla causa evidens vim suam ita potenter in plurimos exerceret: quare verisimilius videtur, quod ab anni intemperie, & maxima inordinatione

hic morbus originem duxerit : & sicut febris intermittens Autumnalis superius descripta fuit productum immodici caloris præcedanei, ita hæc febris catarrhalis ab anni tractu succedente nimis impensè frigido omnino dependeret : enimverò sanguis ab æstate præfervida jam retorridus, & in febrem superius descriptam proclivis, dein urgente autumno acetosior factus, & in febrem quartanam aptus, postea ob intensum brumæ frigus parum eventilatus, & à debita perspiratione prohibitus dyscrasiam adhuc retinuit, eandemque pro data occasione luere in promptu habuit : quare cum medio vere sanguis (uti vegetabilium succus) vegetior factus, necnon efflorescere, & luxuriari inceptus, ob πύκνωσιν adhuc continuatam, inter circulandum angustaretur, in febriles effervescentias erat facilè proclivis : cumque latex serosus in cruore redundans, propter poros usque à frigore strictos extus evaporare nequiret, intus restagnans & præcipuè in pulmones (ubi ὑγρότης externæ aliquid succedaneum peragitur) decumbens tussim ita crebram & molestantem excitabat.

Hujus itaque morbi origo, & formalis ratio in duobus præcipuè fundantur : quod nimirum unà contigerint *sanguinis effervescencia solito major*, à tempestate verna inducta ; simulque πύκνωσις, sive *magna pororum constrictio*, à tractu temporis præcedaneo nimis impensè frigido excitato ; ut propterea sanguini in vasis efflorescenti haud liberum concederetur spatium. Res ita se habuit, ac si vinum effervescente inceptum, vasis strictim occlusis imponeretur ; namque hac ratione, tum vasa, tum liquor disperdi periclitantur.

Quare ut rei summam brevi contraham, quod hic morbus medio verè exortus statim latissimè grassatus quamplurimos occuparet, in causa fuit haud maligni aëris afflatus, quo velut sideratione percussi ægri afficiebantur, prout nonnulli volunt ; verum quod hoc tempore sanguis à constitutione verna inspiratus, adeoque luxuriari, & effervesce aptus in motu coarctaretur, ac effluviis intus cohibitis non satis eventilari potuerit. Quolibet anno, licet temperato, usitatum est vere & autumno morbos quosdam epidemicè regnare ; quoniam scilicet hoc tempore sanguis redintegratus veluti de novo efflorescit, ideoque febres intermittentes, ac interdum variolæ hac tempestate passim increbrescunt : quare nihil mirum, post anni constitutionem maximè inæqualem, & à naturali dissitam, cum hoc Vere sanguis vegetius intra vasa ebulliens propter ὑγρότην impeditam liberè circulari, & satis eventilari nequiret, si exinde magnæ inordinationes sequantur, & à communissima hac causa affectus valde epidemicus excitetur.

Quoad symptomata huic morbo adjuncta, intemperies febrilis, quæque huic appenduntur, præcordiorum æstus, sitis, lassitudo spontanea, dolor in capite, lumbis aut artubus gravativus, à sanguine plus effervescente, nec satis eventilato inducebantur : hinc in plerisque tenuioris cruoris parte excalefacta, ac reliquo liquore solummodo in confusionem acto, synochus simplex, sive plurium dierum inducebatur, atque hæc intra paucos dies plerumque cessabat : in nonnullis autem vitiosa sanguinis diathesi, aut malo corporis habitu præditis hujusmodi febris propter eandem causam exorta, cito in putridam valde periculosam, & non raro lethalem transit.

Tussis cum catarrho hanc febrem comitata ab humore seroso, propter

transpirationem præpeditam diu in sanguine coacervato, & dein effervescen-
tia oborta, arterioli intus dehiscunt magis exsudante originem traxit:
cum enim pori constringuntur, serositates in sanguine superflue exteriori
evaporari solite, propiori sanguinis lustratione in pulmones suffunduntur:
quare à frigore (uti vulgò dictum est) suscepto, hoc est à transpiratione
extus præpedita tussis ut plurimum concitatur; atque in præcatarxi ad hunc
affectum feri in cruoris massa exundantia locum ferè primum obtinuit: nam-
que à frigore diuturno sanguinis assationem, seu bilis proventum impe-
diente, atque laticis aquosi διαπνοήν prohibente necesse erat plurimum serosi
humoris in sanguine coacervari: quare cum sanguis à Vere efflorescens effe-
vescentiam concepit, feri exundantia, ejusque in partes interiores suffusio
primo tussim, velut proprium hujus morbi symptoma, inferre solebat: ac in
quibus sanguis à feri mixtione dilutior factus tussi, & affectioni Rheuma-
ticæ fuit maximè obnoxius, ipsi ab intemperie febrili cum leviori plaga ab-
solvebantur.

Hujus morbi *prognosis* circa privatas personas plerumque facilis est, ut à
primo statim insultu eventum prodatur: nam si in corpore robusto, & prius sano
hæc ægritudo excitetur, sitque intemperies febrilis moderata, & sine gravi, &
horrendo quovis symptomate, res periculo vacat, & affectus ita levis momenti
reputatur, ut vulgò tantum *frigus contractum* audiat; & plerumque nec Medi-
cus consulatur, nec remedia, nisi trita, & facile parabilia adhibeantur. Sin
verò hic affectus in corpore imbecillo, & invaletudinario cum malo apparatu
contigerit, sitque aut febris in putridam evecta, aut tussis ingravescens respira-
tionem difficilem, & constitutionem velut tabidam inducat, morbi eventus
plurimum suspectus est, & non raro in mortem terminatur. *Prognosticon commu-
ne*, quod hinc circa anni statum futurum desumitur, nihil valde timendum con-
tinet, aut insigniter malum ominatur, ut propter inæqualem anni intemperiem,
ac magnos æstus, ac dein frigoris excessus morbos à dyscrasia sanguinis oriun-
dos liceat timere; verumtamen à præsentī statu neque auram insigniter depra-
vatam, aut venenatis halitibus infectam suspicamur, ut hinc pestis, aut ma-
lignioris morbi imminentis criterion habeatur.

Quod ad therapeiam attinet, quando hic morbus levius infligitur, ejus
cura ut plurimum naturæ relinquitur: etenim hæc febris, cum sit tantum syno-
chus simplex, intra paucos dies per diaphoresin judicari solet: quare à sudore
copioso plerumque circa tertium diem, aut quartum calor & sitis, lassitudo
ac dolores gravativi sedantur: deinde tussis diutius protracta postea pau-
latim remittitur, & demum ægri sensim convalescunt. Si quando hic affectus
altiores radices egerit, remediis idoneis & exacta medendi methodo opus
est. Febris ingravescens juxta leges in putrida observandas sanetur; verum-
tamen cum hoc discrimine, ut quoniam transpiratio præpedita, & humoris
serosi in pulmones suffusio præcipuè in culpa sint, ideo diaphoretica, & re-
media dicta thoracica crebrioris sint usus: hæc enim feri è vasis intus exun-
dantiam cohibent, ipsumque aut poros referando foras convehunt, aut à
cruoris sinu præcipitando per ductos urinarios amandant. Itaque medicina
methodus pro hoc morbo in pejus evecto respiciat tum *intemperiem febrilem*,
cujus sanandæ gratia juxta intentiones in febre putrida adhibitas dirigatur:

tum affectionem Rheumaticam, quæ tamen sit indicans secundarium; & remedia non quælibet expectorantia, aut contra tussim usitata, sed ejusmodi tantum admittit, quæ febrem minimè intendunt. Horum formulæ, & medendi occasiones è præceptis pro curatione *febris putridæ*, & *tussis* passim traditis petantur: auxilia, quæ nunc crebra experientia in hoc morbo opem præcipuam contulisse vulgò perhibentur, sunt *diaphoresis*, sive *procuratio sudoris*, & *sanguinis missio*; etenim vasis hoc aut illo modo depletis, tum immodica sanguinis effervescencia, tum feri exuberantia cohibentur.

Febris Epidemica sub initium Autumni, Anno 1658. exorta descriptio habita Idibus Septembris.

Febris vernalis modo descripta vix ultra sesquimenssem duravit, ut planè videretur ea tantum levior sanguinis efflorescentia, qua nimirum in vere turgescens, simulque ob ventilationis defectum spatio coarctatus, instar musti utribus inclusi impetuosius ebullivit, ac dein sponte cessavit. Exinde tamen, prout neque annus, ita nec sanguis noster debitam temperiem recuperabat, adeoque in novam usque febrem fomes alter citò congestus est. Quippe post solstitium æstivum, Borea adhuc flante, tempestas frigida diu persistit, ita ut fruges ac segetes hoc anno vix ad maturitatem perducì posse agricolæ vererentur: posthac autem, paulò ante calendas Sextiles, calor intensissimus per plures dies insequutus est; & jam regnante Sirio aer impensè æstuabat, ut sub dio versari plurimum tæderet. Propter hujusmodi æstus ac frigoris excessus, hujus anni temperatura fuit maximè inæqualis: quapropter sanguinem nostrum modo figi, ac velut congelari; modo præassari nimis, ideoque à crasi naturali in retorridam, aut atrabiliariam perverti necesse fuit; etiam poros cutis à constitutione recta plurimum alterari, ut proinde transpiratio insensilis haud solito more perageretur.

A quo defuit febris superior ferè ad occasum Caniculæ fuit status salubris, & morbi cujusque popularis immunis: deinceps verò pauci primò in villis ac vicis minoribus sparsim ægrotarunt; postea autem circa finem mensis Augusti febris nova derepentè exorta per totas regiones undequaque in vicinia nostra grassari cœpit. Hæc etiam, prout altera, quæ novissimo autumno increbuit, in pagis, & villis rusticanis præcipuè desæviit; interea tamen urbium & oppidorum majorum incolæ rariores decubuerunt. Eodem tempore in aliis regionibus procul hinc dissitis, imò per totam ferè *Angliam*, febris epidemica grassari ferebatur; etiam in aliis quibusdam locis longè crebriora funera, quàm hîc inter nostrates audiebantur. Forsan hujus febris modo regnantis idea, ejusque symptomatum apparatus haud ubique locorum per omnia similis existit, aut iisdem prorsus phænomenis & accidentibus insignitur: quicquid tamen circa naturam ejus, prout in vicinia nostra se habuit, observatione propria, aut ab aliis communicata edidici, succinctò ac breviter subjiciam.

Circa prima hujus morbi initia fuit typus ejus vagus, & valdè incertus; quippe in nonnullis aderat effervescencia continua, in aliis intermittens, & paroxysmis stasis interpolata: quamplurimis verò ægrotantibus velut *symptoma* hoc tempore *pathognomonicum* accidit, in *cerebro & nervoso genere se malè habere*, ut statim à febris hujusce primordiis de capite graviter affecto ferè omnes

quererentur: quippe alios cephalalgia immanis, alios gravitas auditus cum tinnitu aurium infestarunt: plerisque verò aut torpor, & somnolentia gravis, cum affectu vertiginoso, aut vigiliæ pertinaces cum delirio & spirituum animalium distractionibus accidere solebant. Observavi in nonnullis, quod primo, aut secundo ægrotationis die maculæ lætæ & rubicundæ morbillis similes in toto corpore sensim eruperint, quibus brevi postea evanidis, febris statim intensior, & præcipuè affectiones capitis longè graviores evaserunt. Exinde quosdam torpor sensuum, & somnolentia per plures dies inceserunt, ut sine loquela, aut amicorum notitia velut moribundi diu jacuerint. Novos hinc in lethargum, aliosque in apoplexiam conjectos; quosdam in deliria, & phrenesim incidisse. Ex his juniores, & robustæ ætatis homines (non sine diuturno tamen languore, & dubia convalescentia) complures evaserunt: interea senes, aliàs imbecilles, ac invaletudinarii passim interibant. Qui febre velut continua cum istis malignitatis notis decubuerunt, rariùs, & in quibusdam tantum ædibus sporadicè affecti extiterunt. Quæ verò in nostra vicinia ægrotatio communissimè grassata plurimos incesit, atque etiamnum graviter desævit, typum febris intermittens, scilicet aut Tertianæ, aut Quotidianæ imitari videbatur: siquidem in diebus aut singulis, aut (quod sæpius observatur) alternis, ægri paroxysmos habent, qui cum frigore, æstu, ac sudore ordine succedentibus eos diu ac graviter infestant: hujusmodi verò accessiones, necnon totius morbi decursus, pro diversis ægrorum ætate, ac temperamento, cum varia symptomatum & accidentium *συνδρόμῳ* insigniri solent. Hoc tamen plerisque (penè dixerim omnibus) decumbentibus commune est, unà cum hac febre affectibus cephalicis malè plecti.

Cum itaque hoc morbo quispiam afficitur (sive ex causa evidenti, aut contagio, sive absque occasione manifesta ægrotatio excitetur) dolor in capite, & non rarò in lumbis, cum siti, inappetentia, lassitudine spontanea, ac calore, licet minus intenso, ejus adventum produnt. Si in corpore juvenili, sanguinis floridi, & temperamenti calidioris accadat, circa ejus initia paroxysmi frigore, aut rigore carent, æstu tamen diuturno & acri sunt plurimum molesti: ægri vomitu sæpe tentantur, iisque caput plerumque immaniter dolet: sudor difficulter succedit, qui sæpe partialis, ac cito interruptus paroxysmum rarò solvit; quin cum sudore desierunt, denuo incalescunt, ut vix intra horas 18. aut 24. in quibusdam accessio finiatur. Interim à cruore admodum effervescente phantasia perturbatur, ut sæpe delirium, fabulatio absurda, vigiliæ, & summa inquietudo durante paroxysmo concitentur; eodem verò finito, interstitii tempore adhuc sitis molesta, calor lentus, virium languor, & spirituum magna debilitas, cum cephalalgia & affectu vertiginoso plerumque infestant. Rarò inveniuntur, qui prout in tertiana communi, accessionum intervallis se mediocriter habent. Circa morbi principia exacerbationes febriles paulò mitiores existunt, quæ postea qualibet vice sensim ingravescunt, & dein cum frigore, aut rigore incipiunt: cui tamen post æstum diuturnum & valde molestum sudor ægrè in plerisque succedit, ita ut paroxysmus rarò intemperiem debitam finiatur. Intra sex, aut septem periodos ægrotantium vires plurimum atteruntur, ut languidi & imbecilles
facti

facti difficile habeant pensum cum morbo colluctari; quippe nisi ab arte naturæ succurratur, febris usque prævalet, & rarò aut nunquam intra breve tempus aut crisi solvitur, aut sensim remittit: quin affectos diurnâ obsidione in summas angustias adducit, eò usque nimirum persistens, donec sanguis à crebra deflagratione valde effœtus & aquosior factus, sponte in vasis nimium effervesce, aut in corde uberius accendi sit omnino inhabilis; & tunc non rarò ita vapidus, & spirituum inops evadit, ut lampadi vitali prorogandæ insufficiens mortem accersat. Interdum verò cruoris massa ab hoc morbo depravata, & inops facta ignem vitalem semiextinctum (ægrè licet) perennare, ipsumque dein cum spiritu & vigore paulatim, & diutino tempore redintegrare valet: interea tamen post statum hujus morbi, cum sanguis debilior, simulque impurior factus materiam febrilem, seu recrementa adusta motu critico foras expellere nequit, eadem cerebro transfert; ideoque circa febris hujus *ἐμπύρετον* spirituum torpor, & stupiditas, somnolentia, vertigo, aurium tinnitus, tremores, & motus convulsivi cum magna totius facultatis animalis oppressione sæpius inducuntur.

Qui frigidioris temperamenti, aut provectioris ætatis homines hoc morbo corripuntur, licet minùs acutè febricitent, cum majori tamen vitæ periculo decumbere solent: quippe in his præter sanguinis diathesin haud facillè reducibilem, etiam in paroxysmis, quod extraneum & non miscibile congeritur, ægrè subigitur, & difficulter à cruoris massa secernitur: quare & sanguis in crasi sua usque insigniùs depravatur, & in singulis paroxysmis impura mixtione magis inficitur: insuper liquor nervosus à debita temperie valde pervertitur, & recrementis adustis cerebro continuò suffusis pessimè inquinatur. Cum itaque senes, melancholici, aut aliàs invaletudinarii in hanc febrem incidunt, à primo ejus insultu statim torpidi, & plerumque vertiginosi evadunt: in paroxysmis licet calor sit minùs acris & mordax, inquieti tamen, & plurimùm jactabundi degunt: sæpe incongruè, & delirè fabulantur. Post diutinam incalescentiam sudor aut nullus, aut tantùm partialis, & crebro interruptus succedit, quo paroxysmus haud plenè solvitur, quin totis intervallis ægri sitibundi, cum oris siccitate, linguæ scabritie, & amurcæ viscosæ suffusione malè habere perstant. Post aliquot paroxysmos viribus summè dejectis, aut lecto affiguntur penitus, aut parumper interdiu suscitati vix stare, aut è loco in locum, pedetentim licet, incedere valent: interim languore, respiratione difficili, sensuum torpore, & totius nervosi generis imbecillitate magnâ laborant. Urina in plurimis intensè rubicunda est, coloris saturati magis, & consistentiæ crassioris, quàm in tertiana communi: pulsus, dum vires non omninò prostratæ sunt, plerumque robustus est, & æqualis: postea cum ægroti valde oblanguescunt, debilis, inæqualis, ac sæpè intermittens existit; cui etiam tendinum contracturæ, & motus convulsivi in carpis adjuncti, prognostici ut plurimum lethalis occasionem præbent. Qui sensim debilitati versùs mortem declinant, aliquo ante obitum spatio, plerumque sine loquela, aut adstantium agnitione, velut stupidi decumbunt. Rarò accidit in hac febre, ut quispiam moribundus memoriâ & intellectu vegetis res familiæ suæ disponat, aut amicis valedicat. Quos vero è languore summo, & statu ferè deplorato evadere contingit, haud
subitâ

subita & manifesta diacrisi cito emergunt ; verum diu vacillantes, torpidi, ac enerves jacent , ut non nisi post dubium & difficile certamen natura tandem vix ac ne vix quidem morbo potior extiterit , & dein lenta ac diuturna convalescentia vires gradatim recuperet.

Si natura , & formalis ratio febris epidemicæ modo descriptæ inquiratur, dicimus hanc (prout illam prioris anni) esse propriè intermittentem : quæ enim communiter grassatur , hujusmodi typum gerit ; licet continuæ quædam rariores interspersæ sunt, quas etiam mox obiter perstringemus. Hujus seminarium non opus erit ab aëre miasmate quodam infecto derivare , quin potius causam ejus *αεθυραμένην* ab indebita anni constitutione , & exinde sanguinis nostri indispositione acquisita petere. Quippe vere , & autumnio febres intermittentes quotannis increbescunt : quia nimirum sanguis noster æquè ac vegetabilium succus , his temporibus solito vegetius commoveri , ac efflorescere solet. Quare si cruoris massa ob prægressam æstatis aut hyemis tempestatem à debita temperie alteretur, & diathesin aut acrem , aut atrabiliariam , aut alijs generis contraxerit, ejus dyscrasiæ prius inceptæ circa æquinoctia potissimum maturantur ; quando nimirum sanguis uberius fermentescens (si modo à crasi naturali desciscit) non ita facile sanguificat , quin succum alibilem ei confusum in materiam extraneam , & febrilem pervertere aptus fuerit. Cum itaque hic annus à constitutione recta plurimum deflexerit , ut non solum Canicula præcedens, sed bina retrò solstitia , totidemque Æquinoctia omninò intemperata extiterint , nihil mirum est , si febres intermittentes solito crebriores , æquè symptomatis quibusdam inusitatis insignitæ sub Autumno ingravescant. Quod igitur febris Epidemica intermittens hoc tempore defæviat , haud aëris præsentis vitio , sed tempestatis prægressæ anomaliis attribuendum duco : à quibus tamen causis , & occasionum momentis symptomata in hac febre propria quædam , & à communi intermittentium norma distincta oriuntur , inquisitu erit dignum. Dixi superius apparatus , quo hæc febris in mortalium perniciem instruebatur , in *duobus* præcipuè constitisse ; scilicet anni temperies modo impensè frigida, dein succedens calidissima, tum *sanguinis nostri crasin variè perverterat* , tum *poros cutis constitutione indebita affecerat*. Juxta rationes ab utrisque petitas hujus morbi accidentia explicare, ejusque phænomenon causas assignare satagam.

I. Primò observamus quod febris hujus typus fuit varius , nimirum in his cum effervescencia continua , in alijs cum macularum eruptione , in plerisque autem intermittens, & instar tertianæ , ac interdum (licet rariùs) quotidianæ, diebus singulis , aut alternis paroxysmos repetens. Diversitatis hujus causam assignamus , quoniam hoc anno *ιοτερὴν πικυτάριον* fortior & potentior erat, quàm ut solummodò febrem intermittentem in Autumno communiter assuetam produceret : quare in aliquibus praviori forsan corporis habitu præditis febres nonnihil malignas concitavit , & quibus juxta solitum tempestatis morem intermittentes accersivit , eas peculiari symptomatum apparentia notari fecit.

II. A febre hoc tempore Epidemica (sive ea sit continua, sive intermittens) correpti, protinus malas capitis affectiones patiuntur ; scilicet modo cephalalgia immani, modo spirituum animalium aut stupore, aut distractione nimia in-

festari solent. Hujus ratio est, quod succus nervosus æquè ac sanguis, propter anni intemperiem, à crasi debita, scilicet natura dulci, ac spirituosâ, plurimum alteretur, ac modo hebes & ferè vapidus, modo acris nimium & pungitivus evaserit. Præterea item ipsa cruoris massa huic malo valde contribuit; dum enim effervescit, effluvia vaporosa, quæ exterius diffilari oportuit, ob poros constrictos capitis membranâ, ac cerebro suffunduntur: atque propter hujusmodi *πύκνωσιν* ferè omnibus impressam sudor ægrè, & non nisi partialis, & sæpe interruptus in paroxysmis succedit: hinc etiam in morbi statu crisis perfecta, aut spontanea ejus solutio rarè & vix omnino contingit; quin vice hujus, si res naturæ committitur, materies adusta, seu recrementa in cruore congesta capiti transferuntur, ibidemque affectus modo comatosos, modo phreneticos, eosque diuturnos ac contumaces concitant.

III. Quod paroxysmi interdum sine frigore, aut rigore incipiant, cum æstu tamen molesto, & sudore difficili, partiali ac sæpius interrupto diu protelentur; dein quatenus eodem finito ægroti rursus incalescant, ut non nisi longâ halitus sicci evaporatione accessiones finiantur, in causa est nimis acris & biliosa sanguinis diathesis, qua Sale & Sulphure adustis potius quàm seroso latice refertus, quando turgescit, sine prævio nitrosæ materiæ fluore protinus incendium concipit; ideoque ob seri defectum, & poros occlusos, exhalatione ferè tantum sicci, deflagratio ejus longo tempore continuatur, & vix tandem in *ἀνμυρξίαν* desinit. Atque idcirco paroxysmorum interstitia calore, & siti, cephalalgia, vertigine, aliisque affectibus sunt plurimum molesta: quia scilicet materia febrilis in sanguine congesta singulis *paroxysmis* haud tota discutitur, quin pars ejus post accessionem relicta velut extranea, & non miscibilis, effervescitiam ferè continuam inducit.

IV. Observare est, quod hac febre affecti viribus suis, & solita corporis firmitate confestim decidant, ut post unum aut alterum paroxysmum anhelosi, & valde imbecilles vix pedibus stare, aut absque sustentaculo ambulare valeant; cum usitatum sit, febre intermittente communi correptos in accessionum intervallis satis vegetè & alacriter se habere. Discriminis ratio est, quoniam in hac febre cruoris massa tum succi degeneris impura mixtione plus depravatur, tum præcipuè quod eadem à crasi naturali magis pervertitur; & propterea quando extra *paroxysmos* minus ebullit, in cordis tamen sinibus haud ritè, & æquabiliter fermentescit: quare cum à motu citiori, aut corporis agitatione quavis sanguis in cordis sinus impetuosius urgetur, quoniam illic non totus statim accenditur, & foras exsilit, stagnatione sua cordis oppressionem, & spirituum vitalium exsolutiones magnas infert. Propter hujusmodi cruoris dyscrasiam, qua nimirum fermentationi, seu accensione debitæ in corde fit inidoneus, etiam jumenta quædam, ac præsertim equi, tempore verno, aut autumnali fiunt anhelosi, atque ad motum rapidiorem valde inepti.

V. Super hac febre ultimò inquirendum restat, quare in villis, pagis minoribus, ac ruri potissimum increbrescat; quando urbes, ac oppida majora leviori plaga feriantur. Videri autem posset, quod hic affectus ab halitibus paludosis, aliisque noxiis in hoc aut illo aëris tractu uberius congestis exci-

tetur : verum ratio melius constat , asserendo istiusmodi locorum incolas frigori vernali , ac dein caloribus æstivis magis expositos dyscrasiam sanguinis majorem , adeoque in hanc febrem diathesin aptiorem contraxisse. Enimvero rure habitantes vix ædibus egrediuntur , quin solis radiis , aut æris æstuantis fervori exponantur. Insuper agricolæ , & rustici durioribus negotiis assueti (inter quos hæc febris maximè sæviit) à labore & exercitiis immodicis sub dio habitis , simulque victu pravo & aspero utentes , sanguinis diathesin adustam & retorridam , ideoque huic morbo aptiorem , citius acquirunt , quàm cives , & oppidani , qui otio & victu salubri fruētes in contuberniis , aut plateis ædificiorum umbra refrigeratis sæpissimè degunt. Huic assertioni fides astruitur , eo quod non solum febris Epidemica modo desæviens , verum & altera prioris Autumnii propter sanguinis dyscrasiam excitata , inter colonos & ruris incolas potissimum increbuit : quæ autem medio Vere febris popularis exorta est , à transpiratione præpedita præcipuè dependens cives , & oppidanos maximè infestavit : interim rustici exercitio & laboribus *ἡμετέροις* liberiores procurare soliti impunius degebant.

Hujus morbi prognosticon generale tantum ominari videtur , similem ferè plagam huic successuram , ac ob eam quæ febrem prioris Autumnii Epidemicam sequuta est , scilicet (augurio à sanguinis nostri intemperie potius , quàm ab æris labe desumpto) haud pestem , sed febrem quartanam denuò imminentem vereri liceat. Quoad *συνέπειαν* particularem , ut signa quæ mortem , aut salutem promittunt , brevi contraham , ea præcipuè respiciunt vel sanguinis cum Spiritu vitali , vel etiam succi nervosi cum Spiritu animali temperiem , & regimen. Si à pulsu , urinis , actionibus minus læsis , aliorumque symptomatum apparentia planè indicetur , quod sanguis quoad diathesin febrilem , à crasi naturali haud valde pervertitur , quod in *paroxysmis* modicè tantum deflagret , & materiæ febrilis sarcinam in qualibet lucta facile subigat , & consortio suo penitus excutiat ; quod post aliquot accessiones ejusdem sanguinis massa versus temperiem debitam nonnihil restituatur ; quod minus succum alibilem pervertat , & mitiori turgescencia quod extraneum est , & non miscibile excernat : atque interea si liquor alter spirituosus cerebrum ac corpora nervosa ritè inflat , ac irrigat , ut somnus , vigiliæ , sensatio , & motus benè , aut saltem mediocriter peragantur , de ægroto liceat omnia bona sperare. Sin verò ex iisdem indiciorum fontibus constabit , quod sanguis in hac febre crasin à naturali dissitissimam acquisierit , si plurimum succi alibilis pervertat , & dein ab extranea & incongrua ejus mixtura cruoris liquor valde turbatur , & Spiritus in confusionem aguntur : Si in paroxysmis cruor intense nimis , & longo tempore deflagret , nec tamen materiam febrilem ritè subigat , aut totam foras excludat , quin impura ejus miscela adhuc magis (& in qualibet accessione febrili) usque magis inficiatur , simulque spiritibus continuò assumptis pauperior evaserit , vitam ægrotantis periculosa subjectam alex pronuntiare possumus. Super his si liquoris nervosi accedant vitia , ut à debita temperie alteratus , aut hebes nimium , & quasi vapidus cerebrum , & nervosum genus minus actuet , aut supra modum acris eadem in spasmos , & distractiones continuò irritet , ac si præterea effluvia vaporosa à sanguine continuo decidentia , aut recrementa adusta sudore critico secerni solita in caput

caput transferantur, ibidemque affectus lethargicos, aut maniacos inducant, salutis spes admodum in præcipiti versatur, & eventum valde funestum timere licebit.

Circa hujus morbi *therapeiam* intentiones curativæ præcipuè *tres* in considerationem veniunt. Primò sanguinis, & liquoris nervosi ad crases naturales (quantum fieri potest) cita reductio, vel saltem istorum depravationis nimiae præcautio. Secundò, ægrotantium circa paroxysmos recta tractatio, quæ procurare debet: *Primò*, ut minus succi degeneris in paroxysmi materiam congeratur. *Secundò*, ut congesti penus qualibet accessione in totum diffletur, quò in intervallis ægroti melius habeant. *Tertiò*, ut corpore in melius alterato, remediis antifebrifugis paroxysmi inhibeantur. Tertia intentio respicit symptomata præcipuè urgentia, quibus tempestivè occurratur, quò natura minimè impedita quidquid in visceribus, aut vasis contentum intemperatum sit, reducat; extraneum subigat, & excernat; atque cito demum vim vegetam, & vigorem pristinum recuperet.

Primò igitur pro sanguinis & succi nervosi reductione, & emendatione diversimodæ evacuationes circa initia ægrotationis in hoc morbo bono cum fructu adhiberi solent. *Vomitoria* in hoc affectu potius quam in tertiana communi insigniter ex usu esse, è praxi moderna satis constat: quare in corpore robusto, ac in vomitionem proclivi, sub initium secundi aut tertii paroxysmi pharmacum emeticum propinari convenit. Hujus operatio in hac febre magis prodesse videtur, & quatenus è ventriculo sordes, ac vasis choledochis bilem flavam uberius evacuat, & quoniam serosum laticem è nervosi generis emunctoriis circa pancreas, & intestina consitis copiosè exprimit, & proritando emulget. Quare observamus, à vomitorio adhibito circa capitis affectus ægrotantes se melius habere. *Purgatio* (quibus vomitio non convenit) die paroxysmum sequenti velut succedaneum instituitur, etiam emetico licèt præmisso; dein post unam, aut alteram accessionem ritè succedat: verumtamen cum pharmaco tantum miti, & benigno, quod sanguinem minimè perturbet, aut exagitet, peragatur. Nobis solenne est in his febribus medicamine quovis *Aloëtico*, aut *Diagridiato* posthabito, tantum infusionem, aut pulverem ex *Senna*, *Rhabarb.* & *Santal. Citrin.* cum *Tartaro*, ac *Sale Absinthii* exhibere, atque hujusmodi purgationem haud longè nimis à morbi initiis celebrare: aliis verò temporibus crebro enematum usu alvum solutam reddere. *Vena sectionem* in hoc morbo apprimè utilem crebra experientia satis edocuit: cum enim ob poros in omnibus solito constrictiores sanguis à febre effervescentes ventilatione indigeat, sanguinis missio *διαρροῆς* liberioris vicem supplet, præcaveque, ne effluvia cohibita adeo promptè cerebro, & nervoso generi suffundantur. Attamen hoc remedium præcipuè indicatur à sanguine præfervido, & temperamento calidiori; neque indifferenter à senibus, pituitosis, aliisque valdè imbecillis usurpari debet, nisi forsan in exigua quantitate, ut cruoris massa nonnihil eventiletur, & materiæ febrilis in cerebrum metastasis inhiberi possit. Si venam secari convenit, circa febris initia, aut saltem ante quartam, aut quintam accessionem fiat; scilicet priusquam cruor à deflagratione crebra effoetus valde, atque materiæ adustæ confusione impurus nimium reddatur: quippe si cruore insigniter labefactato phlebotomia

celebretur, spiritus vitales, ac ægroti vires inde plus debilitantur, nec tamen de morbi potentia, aut causa ejus quidquam detrahitur. Restat alius evacuationis modus in hac febre celebris, per emplastra nimirum *vesicatoria* variis corporis partibus adhibita, hæc adeò juvamen præstare vulgò observantur, ut inviti, ac tale remedium valde perhorrescentes, aliorum exinde meliùs habentium exemplo ducti illud faciliè admittant. Quo ritu cuticulam à cute segregent, & quasi in vesicam aquæ plenam attollant; an humorem istum aquosum, & limpidum ex arteriis, an ex nervis exprimant, non est hujus loci disquirere: ea tamen in hoc morbo utiliter adhiberi, præter experientiam, ratio hæc nonnihil suadere videtur; quia nimirum hujusmodi serosi laticis larga profusio transpirationis liberioris defectum quadamtenus compensat: insuper hoc remedii genus velut fores, & ostia patefacit, quibus & sanguis, & succus nervosus materiam extraneam ipsis confusam purgamento propiore illicò excernant; quare in peste, & affectibus malignis vesicatoria valde proficua æstimantur. Etiam communi observatione constat, quod in hac, aliisque febribus eadem tempestivè habita graviores capitis affectus præcaveant, atque iisdem priùs inductis opitulari soleant: quare in pituitosis, senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus emplastra epispastica circa primum hujus morbi insulsum præservationis causâ applicari possunt, atque in aliis quibusvis torpore, vertigine, aut cephalalgia immani laborantibus; propter eorundem affectuum curationem utiliter adhiberi solent. In constitutionibus verò impensè calidis, ubi cum seri defectu sanguis aduriturnimum, atque si febricitantes cum æstu intolerabili, vigiliis, aut phrenesi sunt obnoxii, vesicatoria minùs ex usu esse videntur.

Pro sanguinis crasi, necnon viscerum tenore emendandis, temporibus intermediis, quando ab evacuationibus modò citatis parumper vacat, locum habent remedia attemperantia, atque digestiva, quæ nimirum sanguinis liquorem fundunt, ejusque sæculentias segregant, & velut præcipitando versus emunctoria deturbant: propter ejusmodi intentiones propinari solent *Iulepia*, & *decocta refrigerantia*, spiritu *Vitrioli*, *Salis*, *Tamarindis*, *succo Aurantiorum*, aut *Limonum acidulata*, quorum formulæ satis elegantes vulgo prostant. Etiam in hunc finem conducunt *pulveres acetosi*, *salini*, *testacei*, scilicet ex *Tartaro*, *Halimuro*, *salibus herbarum fixis*, è *Cornu cervi usto*, item *chelis*, aut *oculis cancrorum parati*. V. g. R. *Cremoris Tartari drach. 3. Salis absinthii, drach. 1. cum semiss. dosis drachm. sem. in decocto aperiente*, bis in die extra paroxysmum. Vel, R. *Cremoris Tartari drach. 2. pulv. oculorum Cancris drach. 1. nitri purificati drachm. semiss.* Misce, propinetur eodem modo. Vel, R. *Cornu cervi usti drach. 2. spiritus Vitrioli quantum pulvis imbibendo excipiet*, dosis est scrup. unus. Egregii usus est, cum febricitantes lumbricis infestantur. Hujusmodi remedia materiæ febrilis secretionem promovent, necnon sanguinis, & viscerum fermenta ferè deperdita restituunt.

Secunda intentio, scilicet ægrotum circa *paroxysmos* recta tractatio, plura comprehendit. Primò institui debet idonea victus ratio, quò succi degeneris in *paroxysmi* materiam congestio plenior inhibeatur; quare alimentis, solum tenuibus ægri vescantur; carne (aut ipsius jusculo) ovis, potu generoso, & esculentis quibusvis opiparis omninò abstineant; solum decoctis hordeatis,

aut avenaceis , panatellâ , sero lactis , & cervisiâ tenuiori contenti : siquidem uberius alimentum minimè coquitur , aut assimilatur , quin ventriculum aggravat , & cruori confusum ejus liquorem perturbat , & impetuosius effervesce cogit. Ingruente *paroxysmo* , & pro tempore durationis ipsius , nisi pro siti restinguenda , nullum alimentum ore assumatur : pro temperandis verò calore , & siti julepia , & decocta refrigerantia , & imprimis cervisia tenuis , & serum lactis concedi debent. *Secundò* , paulò antequam accessio febrilis expectatur , pharmacum lene exhibeatur , quod *paroxysmum* vel præcavendo arceat , vel diaphoresin facilius procurando faciliat : in hunc usum confert Doctissimi *Riverii* potio febrifuga , ex aqua *Cardui* , cum oleo *Sulphuris* , & Sale *absinibii* : vel , *R. Cremoris Tartari* , *Salio absinibii* , *sem. urtica* , *an. scrup. i.* detur in decocto radicum *Acetosæ*. Cùm febris declinare incœperit , & *paroxysmi* paulò remissiùs habeant , epithemata febrifuga exterius applicata accessiones febriles non rarò inhibent. Interea tamen , quandiu *paroxysmi* repetunt , ægri tractentur adeo , ut qualibet accessione materia febrilis in sanguine congesta penitus diffletur : quare cùm sudor ægrè succedit , Medicamentis temperatis paulò excitetur ; etiam in lecto cum blanda diaphoresi ægri se detineant per plures horas , nec citò nimis excitari permittantur : etenim sæpiùs observavi ægrotantes usque deterius habuisse , quoniam lecti impatientes , priusquam effluvia vaporosa satis exhalarint , vestes induerunt.

Tertiò , quoad symptomata , & accidentia particularia , quibus ægroti in hac febre infestari solent , eorum quamplurimis cum remediis , & curationis methodo hætenus descripta satis prospicitur : contra sitim , ardorem , oris & linguæ scabritiem , vomitus , diarrhœam , syncopen , aut lipothymiaæ metum , præscriptiones in aliis febribus vulgò usitatæ satis commodè hunc transferri possunt : quæ autem peculiarem medendi methodum in hoc morbo exigere videntur , sunt imprimis capitis , & cerebri cum nervoso genere affectiones , quibus ni tempestivè occurratur , exinde in magnum vitæ discrimen ægrotantes citò adducuntur. Circa hujusmodi capitis mala indicationes sunt duplicis generis : si ex torpore , somnolentia , vertigine , aut cephalalgia constet , succum nervosum nimis hebetem , & quasi vapidum existere , ideoque cerebrum & corpora nervosa non vegetè satis actuare , præter remedia superius tradita , & imprimis vesicatoria , in hoc casu optimè conducunt medicamina Sale volatili referta ; quare spiritus Cornu cervi , sanguinis , necnon Sales eorundem , egregii sunt usus : si verò liquor nervosus sit nimium acris , aut effluvia à sanguine æstuante suffusa spiritus animales in distractiones agant , ejusmodi è Sale volatili remedia paulò in minori quantitate cum fructu adhibentur. Insuper crebra sanguinis missio , & medicamina ejus fervorem demulcentia conducunt , uti emulsiones , serum lactis , aqua simplex uberius propinata. Opiata in hac febre cautè admodum usurpentur : nam phrenesis ab iis sedata sæpiùs in lethargum , aut altum stuporem commutatur.



DE URINIS.

Dissertatio Epistolica.

Ad Virum Doctissimum mihi que amicissimum,

D. RADULPHUM BATHURST, Med. Doct. & Coll.
Sacrosanctæ Trinitatis Oxon. Socium.



RNATISSIME DOMINE,

Urinarum inspectio, & ab illis circa praxim largitus directionum investigatio usque à primis Medicinæ initiis inter Antiquos haberi cæperunt: hinc enim pro judiciis circa agrotos ferendis, ac pro eligendis aptissimis medendi temporibus Magnus Hippocrates tum prænotiones, tum præcepta sua potissimum desumpsit; adeo ut celebre istud, & usque hodie ratum veteris Medicinæ statutum, scilicet τὰ πεπονα φαρμάδια, sine matula ritè consultâ observare non licuerit. Hoc etiam communissima rationi consonum videtur, ut si quidem corporis agroti, tanquam vasis occlusi intima perscrutari nequimus, à latice infuso, partesque singulas perlucens, ac à plurimis ramenta quadam delibante iudicium petatur. Neque enim certius aquæ acidulæ dilutescentis minera quàm percolantur, naturam produnt, quàm urina diversimodas corporum nostrorum dyscrasias, atque habitudines testatas faciunt. Quare huius excrementi (licet vilissimi) contemplatio in scientiam accrevit, & Medicorum illustrium, tum veterum, tum recentiorum ingenia exercuit. Super hac re plurimi extant libri magnâ cum diligentia exarati, in quibus variæ urinarum differentia, colorum, consistentiæ diversitates recensentur; contenta ad amussim describuntur, & pro singulis istorum distincta & propria præcepta traduntur: quæ quidem tanta certitudinis à quibusdam aestimantur, ut à lotio inspecto nullius non morbi, aut partis affecta, imò cuiusvis circa agrotum accidentis, significatio petatur. Verùm in hoc vulgus egregie decipitur, & pertinaciter usque decipi vult, cum affectus cuiusque digno-

tionem,

tionem, ejusque prognosin, nonnisi matulâ inspectâ erui posse contendit; & Medicum, nisi à matraccio, tanquam vitro magico, divinare susceperit, nullius pretii aestimat. Quod autem revera attinet ad præcepta & regulas, quibus ἑπονομασθῆαι praxis innititur, extant multa diligenti observatione collecta, & dein bono cum judicio, & ratione stabilita: quatenus tamen urinarum significatio ad casus particulares largè nimis à quibusdam extenditur: intertexuntur plurima incerta, deceptioni obnoxia, & nonnulla planè falsa; ut qui lotio tantū indice de rebus egroti cōfidenter pronunciat, Præstigiatoris potius quàm Medici nomē mereatur.

Hæc autem circa urinas doctrina ita passim erroribus scatet, eo quod observationes, quæ praxin ejus spectant, aut perperam factæ sunt, aut non benè in methodum redactæ. Suspiciari fas est observationes non ritè factas, quoniam à casu forsàn uno, aut altero particulari sæpe regula generalis infertur. Ex. gr. quia nonnulli hydropici urinam tenuem, & aquosam reddunt, ideo statuitur istiusmodi urinas necessariò hydropem denotare, cū & in aliis nonnullis affectibus tales urinae excernantur, & aliquādo in hydrope urina sint crassæ, & rubedine saturatæ. Item quod vulgò receptissimum habetur, scilicet, urinas quibus cremor innatat (velut in aqua cui Tartarus incoquitur) pthisin denotare, plerumque incertum est; quippe signum hoc hypochondriacis magis proprium & familiare est, quàm tabidis: & quamplurimi sine hoc intabescētes moriuntur. Præterea, quod generatim asseritur, scilicet in morbis quibuscumque naturā affectūs ab urinis innotescere, omninò falsum est; quoniam aliquando morbidi urinas sanorum simillimas reddunt, & interdū qui videntur satis integrè valere, propter accidens quoddam (forsan à cibis comestis) urinas habent suspectas & à statu naturali recedentes. Quod attinet ad methodū, sive doctrinam circa urinas à plerisque traditam, videtur ista omnino Empirica, & nequaquam rationalis: etenim nuda recensentur urinarum differentia, prout juxta colorem, consistentiam, & contenta variè distingui solent: dein singulis horum speciebus significationes pathologicae observationibus tantū rarioribus collectæ opponuntur; cū interea nec causa phænomenōn, aut alterationum præternaturalium, in urinis (uti oportuit) assignantur; nec urinarum significatio morborum causis applicatur, sed tantū morbo, aut symptomati, ideoque sæpissimè fallax est, & incerta; quoniam eadem causa morbifica pariter, & ejusdem urinae significatio poterit simul diversos morbos, & symptomata mediātè respicere. Ex. gr. urina tenuis, & aquosa immediātè sæpissimè denotat apepsiam, sive defectū cōctionis in visceribus: verum tamen propter istum cruditatis statum sæpe χλάρωσις in virginibus, quandoque hydrops, aut leucophlegmatia, interdum cephalal-

cephalalgia, & alii complures affectus oriuntur. Quod verò à me exigis pensum (Clarissime Vir) nimirum ut notiones, quas olim inter nos à colloquiis mutuò habitis, velut collatis tesseris, circa urinas concepi, & qualem super hac re studio, & observatione propriâ notitiam assequutus videor, in fasciculum redigere velim, & ἐποικίως methodum planè novam conscribere; fateor opus grandius, quàm cui ritè peragendo nostra sufficiant vires: utcunque animo statui in quantum hoc exequi potis fuero tibi morem gerere. Atque ut supra vulgarem, & planè Empiricum philosophandi modum doctrina, sive methodus circa urinas instituatur, erunt hac duo discursus nostri capita: nempe primò, ut tradatur urina anatome, quibus constat elementis, & partibus; simulque in corpore nostro ejus genesis, quali nimirum coctione, & dein particularum aliarum ab aliis secretionem hujusmodi liquor conficiatur. Secundò, ut ritè explicetur urinarum in matula inspectio, & quæ sint ἐποικίως certitudo, & regula.

C A P U T I.

De Urinae elementis, & præcipuis accidentibus.

CUM urinae liquor, aut recens corpore excretus, aut longâ digestionem putrefactus analysi Spagyricæ exponitur, in has partes, velut principia, resolvi solet: inter destillandum primò ascendit quidquid huic inest *Spiritus* vinosi cum aqua diluti: verùm in exigua admodum quantitate, ut non facile sit ipsum gustu percipere: huic succedit *latex aquosus* in proportionem satis largam, cui *Salis*, ac præcipuè *Sulphuris* particulae quædam laxiores commiscuntur: tertio extillatur aqua valdè penetrativa, quæ vulgò *Spiritus urinae* vocatur; revera tamen *Spiritus* vinosi verè expers maxima ex parte tantùm phlegma est *Salis* insigniter aculeatum; ideoque, prout in destillatione aceti, ultimò ascendit: quatenus verò *Sal urinae volatilis*, iste verò *aceti* tantùm *in fluore est*; ideo liquor extillatus qui hujus particulis imprægnatur, valde *acidus* est: qui alterius *Salinis* imbuitur, plurimùm *acris*, & pungitivus existit. Quod hujusmodi urinae (quemadmodum apud vulgus audit) *Spiritus* acedinem suam *Sali* potissimùm debeat, indicio est, quia subtilissimus licet fuerit, flammam non concipit, verùm admotam extinguit. Post humiditatem penitus exhalatam, in fundo cucurbitæ altera *Salis* portio cum *Terra* remanebit; cui si calor nonnihil intensior adhibetur, *Sal* iste in Alembicum sublimabitur, derelictâ tantùm fæce terrestri. Hujusmodi *urinae* anatome planè ostendit, quod elementa è quibus liquor ejus conflatur, sunt plurimùm *Aqua*, & *Salis*, aliquantulùm *Sulphuris*, & *Terra*, atque *Spiritus* tantillùm.

Salsedo in urinis gustu, & tactu percipitur; sapore proximè ad *Salem nitrosum* accedit: elicitur quidem è *Salinis* esculentorum particulis, quæ coctione in visceribus, & circulatione in vasis ulterius exaltatæ, ut plurimùm in *Salem volatilem* facessunt: hoc est, *Sal*, & *Spiritus* quidam ob diuturnum utriusque

utriusque consortium arctissimo nexu colligantur & ideoque ipsum Salem, alias fixum, in sublime rapi, motuique non inhabilem reddi, ceu pennis alterius, contigit. Pro varia corporis nostri affectione *urina* plus, aut minus in se continent Salis, eumque magis volatilem, aut fixum habent, quæ proinde diversi sunt coloris, & consistentiæ.

Sulphur in *urinis* contineri earum cita putredo, & fœtor satis testantur: oritur è pinguibus, & *Sulphureis* alimentorum particulis inter coquendum minutissime confractis, seroque cum Sale incoctis: hujus, prout etiam Spiritus, minor inest copia, quam aut sanguini & cornibus animalium, aut fuligni: quare in distillatione *urina* ferè nihil oleiforme, aut pingue ascendit. Enimverò dum cruor in vasis circulatur, corpuscula spirituosæ, & *Sulphurea*, quæ ab ipso decedunt, magnâ ex parte foras evaporant: interim recrementa salina, & aquosa lotium precipue constituunt; nihilominus *urina* de *Sulphure* aliquatenus semper participant, ejus verò quantitas, & proportio diversimodè alterantur, juxta varios coctionis, & cruditatis gradus: exinde etiam color, & consistentia in *urinis* plures mutationes suscipiunt.

Spiritus vinosi portionem non nisi exiguam in *urinis* contineri, ejus defectus in liquore primò exstillato, etiam cita lotii putrescentia testantur: aliqualem verò subesse arguit intestinus particularum in *urinis* motus, scilicet tenuis à crasso secessio, & partium aliarum ab aliis spontanea segregatio, ac in hypostasim collectio: insuper particulæ salinæ (in quantum volatiles sunt) spirituosæ maritantur, ideoque sunt motus, & energię promptioris. Pro diversa tamen spirituum in *urinis* copia, & præpollentia varii emergunt hypostaseôn, & subsidentiarum modi; ipsæ etiam *urina* citius, aut tardius putrescunt.

Aquosa urina pars quantitate cæteras longè superat, ipsisque ferè sextuplo major est: destillatione haud ita simplex prolicitur, quin Salis, & *Sulphuris* particulæ quædam (utpote volatiles) unâ ascendunt, atque latici fœtorem ingratum impertiunt: hic originem præbent materia potulenta cum alimentis copiosè ingesta; quæ tamen cujuscunque generis fuerit, priusquam in urinam mutatur, qualitates proprias amittit, & alias acquirit: siquidem è liquore assumpto, præter meram humiditatem nihil ferè sincerum in lotio relinquitur.

Terram, & facem limosam in *urinis* haberi, hujus destillatio, aut evaporatio satis declarat: cum enim cæteræ partes exhalant, Terra, velut Caput mortuum in quantitate mediocri in fundo restabit: quippe in succo nutritio, præter activa *Salis*, *Sulphuris* & *Spiritus* principia solidum aliquid requiritur, unde moles, & magnitudo corpori accrescant: hujus recrementa, scilicet faculentia terrestres, copiosè in sero dissolvuntur, ipsique consistentiam crassiorem, & contenta contribunt: hæc autem pro vario coctionis, & cruditatis statu se variis habent modis.

Hæc sunt principia, quæ *urina* corpus constituunt, etiam in quæ Analyfi chymicâ facilè resolvitur: è diversis harum *ovçvçiaç*, & varia contemperatone oriuntur cæteræ *urina* accidentia, scil. *quantitas*, *color*, *consistentia*, & *contenta*, quæ sunt quoad sensum maximè circa ipsum notabilia, & præcipua *σπουδαία* objecta: cum enim ferè nihil præterea in lotio conspicitur, hæc

prima phaenomena constituunt, in quibus ritè solvendis tota hujus scientiae hypothesis versatur. Quare de his jam proximo loco dicendum erit; & primo de *urina* sanorum, quæ sit ejus *quantitas*, quomodo *colorata*, quâ *consistentiâ*, & quibus contentis prædita; simulque explicandum ex qua elementorum mixtura, qualique in visceribus & vasis coctione singula hæc dependent. Secundo ostendetur quot modis *urina* ægrotantium ab hac sanorum norma, sive regula deflectunt, & pro singulis earum differentiis proprias alterationum causas assignare conabor: atque hæc primum in hoc discursu propositum, scilicet *urinae* anatomiam, absolvent.

C A P U T II.

De quantitate, & colore in urinis sanorum.

URinae *quantitas* in sanis paulò minor esse debet humore, seu substantiâ liquida quotidie ingestâ; etenim potulenta, & humida quotidie assumpta, sunt ipsa materies, è qua *urinae* primitus constant: hæc autem (& fame & siti urgentibus) uberiùs requiruntur; tum ut chymi massam satis diluant, quò ritè in visceribus fermentescat; tum ut pro vehiculo inserviant & chymo, quò massæ sanguineæ convehatur; & sanguini ipsi, ut sine incrassamento in vasis circuletur; atque succo nervoso, quò sensus, & motus organa actuet, & irriget. Quando latex serosus hoc ritu quidquid ferè habuit Spiritus ac Sulphuris, pro nutrimento, calore, ac motu impendit, novo cedit humori nutritio, atque ipse, velut inutilis, ope renum à cruore seclusus amandatur. Liqueor alimentosus, qui in urinam demùm mutabitur, ex sua natura diversimodus existit, scilicet modò aquosus, modò Spiritu, modò Sale, ac Sulphure imprægnatus, ac pro variis hujus, aut illius elementi in eo præpollentis *urinae* nonnihil alterari solent: attamen liquida quæcunque ore assumpta, nec tota, nec illibata corpus nostrum pertranseunt: quin variis in partibus mutationes subeunt, & quantitatis suæ portionem aliqualem amittunt, antequam in lotium faceßant: etenim latex, sive humor in urinam convertendus primò in ventriculum recipitur (nec enim Reusnero assentior, qui eundem magnâ ex parte in pulmones delapsum mictionis à potu citioris causam asserit,) usquedum in ventriculo commoratur, ibi coquitur: etiam Sale, & Sulphure, aut propriis, aut ab alimento solidiori dissolutis imprægnatur: dein plurimùm ejus cum succo alibili cruori confunditur, qui cum diu circulatur, & exinde pro varia sanguinis temperie, ejusque in corde accensione ulteriorem Salis, ac Sulphuris tincturam recipit; hinc aliqualis ipsius portio cum Spiritu animali in cerebrum, & nervosum genus derivatur: indeque postea effœtus ac imbellis factus, denuò in cruoris sinum reducitur. Postquam & sanguini, & succo nervoso impenditur quidquid generosum in sero continetur, etiam *quantitas* non exigua diaphoresi, aliisque emunctoriis absumitur: quod residuum est, dum sanguis renes continuò perluit, aut percolatione, aut vi fermenti cujusdam præcipitatione factâ, ibidem à cruore secernitur, & per ureteres in vesicam, indeque foras eliminatur.

Ex origine, & lustratione serosi laticis modo descriptis planè constat, quod urina in proportionem aliquanto minori (forfan sub tripla) liquidorum assump-
torum quantitati respondere debeat; quod viscerum coctioni inservientium
crasin & robur, necnon ipsius sanguinis, & aliquatenus succi nervosi tempe-
riem, & distributionem planè ostendat; insuper de affectibus ductuum urina-
riorum indicia secum referat. Lotii *quantitas* ab hac norma non raro deflectit,
ut interdum *superabundet*, interdum etiam *deficiat*: utrumque pro brevi tem-
pore, cum diathesi haud multum insalubri consistere potest; sin ejusmodi affe-
ctiones diu perstiterint, statum invaletudinarium arguunt. Super his inter urinæ
in morbo corpore apparatu phænomena dicemus; jam proximè urinæ sanæ
colorem perpendamus.

Urina sanorum quæ post coctionem in toto corpore absolutam redditur, est
citri coloris, instar lixivii mediocriter cocti; qui proculdubio procedit à *Sale*
& *Sulphure* succi nutritii, & sanguinis inter coquendum dissolutis, & sero in-
coctis. Non à *Sale* tantum oritur hic color (prout nonnulli contendunt) quia
liquor *Sale* imprægnatus, nisi ad spissitudinem quandam evaporetur, minimè
flavescit: etiam *Sal Tartari* deliquio solutus adhuc limpidus perstat. Quod ob-
jicitur de lixivio cinerum, dico illic totum *Sulphur* comburendo non absumi,
sed colorem citrinum oriri à particulis quibusdam salinis, aliisque sulphureis
adustis cineri adhærentibus, & dein liquori infusis, aut incoctis. Nec tantum à
Sulphure urina sanorum ejusmodi colorem acquirit, quia *Sulphur* in menstruo
aquofo, nisi adjecto *Sale*, haud dissolvitur, nec ullam sui tincturam deponit.
Quod si *Sal Tartari*, & *Sulphur* commune simul in aqua digerantur; aut si
Antimonium menstruo salino incoquitur, utrique liquores instar urinæ exinde
flavescunt: consimili prorsus modo *Salinæ*, & *Sulphureæ* alimentorum par-
ticulæ digestionem in ventriculo & intestinis, ac circulatione cum sanguine in
arteriis, & venis minutissimè confractæ, seroque incoctæ ei colorem citrinum
impertiunt.

Hujusmodi *Salis*, ac *Sulphuris* dissolutio, cujus gratia urinæ citrinescunt, in
visceribus primo inchoatur, ac postea in *vasis* perficitur. Plurimum dependet à
coctione in ventriculo, & intestinis peracta: hîc enim caloris, & fermento-
rum ope alimenta ingesta maximè subiguntur: soluto mixtionis vinculo parti-
culæ *Salinæ*, & *Sulphureæ* minutissimè confractæ, & comminutæ in cremorem
lacteum facessunt, indeque serum à coctione & distributione istius succi lactes-
centis residuum coloris citrini evadit, non absimili ritu, ac cum *Sal Tartari*, ac
Sulphur commune invicem dissoluta, & acido quovis perfusa colorem lacteum
induunt: dein contentis per subsidentiam separatis, liquor reliquus instar lixi-
vii flavescit; quod si alimenta propter malam ventriculi diathesin in prima
coctione non ritè digerantur, prout in pica, hydrope, aliisque viscerum dyscra-
siis usu venit, etiam urina redditur cruda, limpida, & ferè insipida, instar aquæ
fontanæ. Sin ob fermenta viscerum plus debito exaltata, aut alias depravata,
prout in scorbuto, affectione hypochondriaca, aut intemperie febrili, comesto-
rum particulæ in prima regione nimis dissolvuntur, exinde fiunt urinæ rubi-
cundæ, & crassæ.

Serum modo prædicto in prima coctione lixiviali tinctura imbutum, &
sanguini confusum, quamdiu cum ipso circulatur, adhuc ulterius coquitur,

& colorem magis saturatum acquirit : etenim assatæ, & peradustæ sanguinis particulæ, licet maxima ex parte in vesicam felleam seponantur, tamen aliquatenus seroso latici incoctæ ejus colorem intendunt : hinc coctione finitâ, quæ primò excernitur urina pallidior est ; quæ dein ultimò, magis rubicunda ; quæ post longa jejunia, adhuc magis saturata : ubi sanguis frigidior est, uti in cachecticis, minuitur urinæ color ; ubi cruor febrili calore æstuat & assatur, lotium intensè rubescit.

De urinis sanorum adhuc observatu dignum est, quod quæ post pleniorē potum minguntur, nequaquam tinctæ, verum pallidæ, & aquosæ existunt, de quibus inquirendum erit, quo pacto latex serosus tam citò è ventriculo elaboratur (contra quàm vulgò creditur,) atque ductus omnes chylicos, dein venas, arterias, ipsius cordis sinus, renum, & ureterum anfractus pertransiens intra tam breve spatium è corpore excernatur ; insuper quæ fiat ut urina ita præcipitanter facta, contra ac in aliis plerisque, non modò nullum in transitu mutetur colorem, verum etiam proprium amittat : namque, uti in proverbio est, *cervisia nostra nihil spissius intrat, atque nil clarius exit.*

Circa hæc dicendum videtur, quod præter longum succi nutritii ambitum, quo nimirum post aliqualem in ventriculo moram intestinis illabatur, & exinde per vasa lactea in novos ductus, indeque in venas deducitur (quæ quidem circumvectio haud brevi absolvi poterit) verisimile est quod detur alia propior ejusdem nutritii laticis transitio, qua quidem è vestigio, & sine mora sanguinis massæ, & forsan liquori nervoso convehatur ; atque idcirco post inediam à comestis, præsertim à potulentis ingestis, immediate sequitur citissima virium refectio : quæ tamen ne per Spiritus, & vapores fieri credatur, etiam à tali potu urina statim excernitur, & quidem citius quam chyli massa è ventriculi sinu demitti putatur : quare non improbabile videtur, quod cum liquor alimentosus ventriculo ingeritur, statim tenuior ejus portio, quæ Spiritu, & Aqua imprimis constat, à membranis ejus, utpote spongiosis imbibatur, indeque venarum osculis instillata cum sanguine versus cor refluxo protinus confundatur : etenim in ea opinione (licet non præfracta admodum) semper frui, *Chymum aliquatenus immediate è ventriculo, & intestinis, per ramos venæ portæ in cruoris massam derivari.* Et sicut lactei ductus ipsum longo ambitu circumvehunt, quo in venæ cavæ truncum descendente instillentur, ita ut propiori via, scilicet per hæc vasa, in ejusdem truncum ascendente feratur : quippe sanguis in circulatione pauperior factus, ex utraque parte rediens, priusquam cor ingreditur, novo succo refici debet, quo vegetius in cordis sinu fermentescat ; quatenus autem multò pars maxima cruoris sursum vehatur, certè consonum videtur, ut saltem aliqua succi nutritii portio huic prius deflagrato, ac ferè effæcto in novam à corde accensionem velut pabulum accedat. Quæ hoc suadere videntur argumenta non levis momenti potui hîc plura congerere ; verum ita nimis longè è proposito diverterem : quare quod tam cito à potu aquosum mingimus, modo prædicto aliquatenus fieri existimo ; idcirco qui properè adeo ex alimentis cruoris massæ convehitur liquor, per angustos adeo (ac sunt viscerum membranæ) anfractus pertransiens, velut destillatione prolicitus, materia crassiori rejecta, ferè Aqua tantum & Spiritu constat ; quo nimirum Spiritus vitales reficiat, ac sanguinem diluat : circa quod

quod pensum cum pars spiritiosa absimitur, latex aquosus præ copia sua gravativus & molestus continuò per renes amandatur; & cum à ventriculo, Sale, & Sulphure nondum imbutus advenit, nec diu cum sanguine circulatur, ut tincturam lixiviale inde acquirat, limpidus & tenuis excernitur.

CAPUT III.

De consistentia, & contentis Urinæ sanorum.

H Actenus de *quantitate & colore* & urinarum, quæ à sano corpore decedunt: quod verò ad *contenta* attinet, sciendum est, nihil præter *hypostasim* urinæ sanæ inesse debere; hæc autem quid sit, ac quo pacto subsideat, proximo in loco explicandum restat.

Quamdiu sanguinis massa sero, & humore alibi perfusa in vasis continuò circulatur, ex ea succus quidam nutritius perpetuâ digestionem elaboratur, qui nutrimentum solidis partibus continuò apponendum facessit: hic primò in humorem glutinosum, instar ovi albuminis, postea in tenuia filamenta excoquitur, quæ poris, & spatiosis solidarum partium intertexta, iis novæ usque substantiæ accretionem præbent: dum verò serum sanguini commixtum universas corporis regiones perluit, ultimi hujus alimenti solidis partibus apponendi portionem quandam superfluum in se absorbet, & secum foras abducit, atque hoc est, quod in urinis *hypostasim* constituit, quare quamdiu hæc adest, quatenus coctionem, & nutritionem aliquatenus obiri indicat, pro signo laudabili habetur; ejus absentia, aut cruditatis in cachecticis, aut dyscrasiæ in febribus indicium est. Tenuibus filamentis constans primò dispersa est per totum urinæ corpus, ac deinde in unam nubeculam colligitur hac ratione: filamenta ista sunt longa, & teretia, etiam asperitatibus quibusdam veprium instar prædita, ut hinc inde commota facile se invicem corripiant, & inter sese complicantur; non aliter, ac si matraccio aquæ pleno plurimos injicias pilos, ac dein vas istud diu conquassando circumducas, pili primò sparsim innatantes, brevi post tempore se mutuò comprehendunt, ac in unam fasciolam colliguntur: pari (uti videtur) ratione filamenta quæ *hypostasim* constituunt, colore, & spiritibus urinæ insitis variè hinc inde agitata se invicem implicant, & protrudunt, donec mutuo omnium implexu in unam nubeculam coeunt. Et quoniam filamenta ista sunt compacta, & cæteris urinæ contentis solidiora, pondere suo versùs fundum subsidunt.

Quod hujusmodi filamenta in urinis sanorum *hypostasim* faciunt, verisimile est, eo quod sanguis benè constitutus, & ad nutriendum dispositus, fibrillis seu filamentis albis valdè refertus sit: quod cum vena secta cruor emissus aquâ calidâ excipitur, cuivis conspicuum erit; etenim crassamento rubro à liquore diluto, fila isthæc teretia, & candida aquæ innatant: quare videtur quod istorum tenuia quædam ramenta cum seroso latice abrepta, sint flocci istius in urina subsidentis materia: quare in cachecticis ob cruditatem sanguis valdè aquosus, & nutritioni ineptus fibrillis istis benè elaboratis destituitur.

Etiam in magnis dyscrasiis, quando cruore nimis affato humor nutritius in huiusmodi filamenta non ritè excoquitur, hypostasis in urinis aut omninò deest, aut valde confusa & perturbata existit.

Hypostasis bona & laudabilis dicitur, quæ est coloris albidæ, figuræ rotundæ, & æquabilis, & versus fundum subsidit : ad quæ requiruntur *primò*, ut alimentum illud ultimum ritè elaboretur, quo filamenta evadant alba, teretia, & solida, instar tenuium fibrarum. *Secundò*, ut urina satis polleat spiritibus, qui (ut in musti effervescencia cernitur) partes omnes hinc inde agitant, & compellunt. *Tertiò*, ut liquor non sit nimium crassus, nec ejus pori corpusculis alienis prius occupentur, quo sit motus contentorum impeditus; sed spatium agitandis & circumducendis istiusmodi particulis satis liberum relinquatur.

Si *ὑπόστυς* sit rubrum, indicio est, alimentum istud ultimum nimio calore perassari, & aduri: quare tale sedimentum plerumque fit initio febrium, quamdiu coctio in visceribus, & vasis haud in totum pervertitur; si hypostasis sit abrupta, & inæqualis, signum est nutrimentum solidis partibus destinatum non rectè, & æquabiliter coqui, ejus particulas non esse homogeneas, & ex omni parte congeneres: quare filamenta non unà cohærent, verùm hæc cum illis, & ista cum aliis seorsim implicantur. Hinc quædam densiora versus fundum descendunt, alia autem rariora altius suspenduntur. Quando hypostasis non omninò subsidet, verum tota aut in summa, aut media regione pendet, ideo contingit, vel quoniam ista constat filamentis non perfectè elaboratis, solidis, & compactis, sed rarioribus, & spongiosis; aut quia liquor est crassior, Sale, & Sulphure imprægnatior, ideoque lixivii instar quædam pondera sustentat, quæ alias in imò subsiderent. Interdum hypostasis omnino deest; in sanis post longam inedia, immodicos labores, aut sudorem copiosum, materia aut in nutrimentum penitus absumpta, aut diaphoresi evaporata; in febribus, ob sanguinis crasin valde depravatam; etiam in pica, cachexia, aliisque ejusmodi affectibus, ob summam cruditatem.

De *consistentia* urinæ in sanis haud multa consideratione digna occurrunt. Ejusmodi esse solet, qualis est cervisiæ mediocris longa fermentatione depurata, aut lixivii mediocriter cocti; scilicet aquosus urinæ liquor poris & meatibus suis includere debet quamplurimas Salis, & Sulphuris particulas minutissimè confractas ac dissolutas; ac præterea aliquantum terræ secundum minima divisæ, & per totum lotii corpus dispersæ. Si consistentia sit debito tenuior, qualis in urina limpida & aquosa cernitur, signum est indigestionis, & cruditatis, quod alimenta non planè subigantur, ac coquantur: si urina sit crassior, & debito spissior, indicio est corpus liquoris contenti præternaturalibus saturari. Verùm de his alibi, cum de urinis ægrotantium dicemus.

Hucusque de urina, quatenus in sano corpore coctionis (tum in visceribus, tum vasis ritè peractæ) excrementum, & signum est, cujus *quantitas*, sive moles à materia potulenta determinatur; *color citrinus* à Sale, & Sulphure dissolutis, & sero incoctis; *hypostasis*, seu *contenta* à filamentis in cruore pro nutrimento solidarum partium elaboratis dependent: *consistentia* à Sale, & Sulphure,

phure, unâ cum Terræ particulis serosi laticis poros, & meatus implentibus. Restat proximè ut de urinis ægrotantium agamus: in quibus etiam quantitas, color, contenta, consistentia, & quædam præterea accidentia considerationi sese offerunt.

CAPUT IV.

De quantitate, & colore in urinis Ægrotantium.

IN morboſo corporum apparatu, aut ſtatu invaletudinario ſæpe urinæ *quantitas* proportioni liquidorum aſſumptorum haud exactè quadrat; namque interdum à debita menſura deficit, & aliquando ipſam excedit. Quando lotium potulentis ingeſtis longè minus exiſtit, ratio eſt, quia latex aquoſus aut alibi in corpore ſubiſtit, aut in aliam, quàm per urinam, excretionis viam diverſitur: ſi intus manet, *primò* vel circa viſcera, eorumque cavitates congeritur, & ſic modò in ventriculo plus debito moratur, ejuſque diſtentiones cum ſputatione moleſta inducit; ſæpius verò in cavitate abdominis, ac interdum thoracis, ac capitis deponitur, ibidemque morbos hydropicos inferre ſolet. Vel *ſecundò* ſerum in vaſis reſtagnat, adeoque ſanguinis ac liquoris nervoſi moles adauget, atque motus inſigniter pervertit: unde catarrhi, affectiones Rheumaticæ, & non rarò paralyſes, ac convulſiones excitantur. Aut *tertiò* humor iſte aquoſus in habitu corporis deſigitur, atque ita totius, aut partium quarundam intumeſcentias creat. Aut *quartò* denique in viis urinariis lapide, aut materia craſſa, velut aggere oppoſito, obſtruitur; inque illis partibus dolores, ac ſpaſmos, & in toto corpore ſeri plenitudinem infert. Quando latex ſeroſus aliò impenditur, ut plurimum in ſudores crebros, ac moleſtos, aut in diarrhœam ferè continuam ægri ſunt proclives.

Sunt igitur affectus, quos urinæ paucitas indicare ſolet modò viſcerum quorundam intumeſcentiæ, & in iis aquarum congeſtiones; modò affectus catarrhales, modò nervoſi generis diſpoſitiones malæ; interdum anasarca, & tumores œdematoſi; ac aliquando renum, ac veſicæ diatheſis calculoſa. Quandoque etiam lotii diminutio evacuationis cujuſdam alterius præternaturalis, ſcilicet ſudoris, diarrhœæ, aut alijs immodicæ *inexplicatis* effectus, & ſignum eſt: ſingulas hîc ſeroſi laticis aut in corpore ſubiſtentis, aut aliàs excreti cauſas, ac fiendi modos ad amuſſim deſcribere, eſſet totam ferè pathologiæ materiam huc transferre; complures enim, & diverſimodæ ſunt occaſiones, & circumſtantiæ, propter quas ſerum in hac, aut illa parte congeritur, ac in corpore ſubiſtens lotii quantitatem diminuit; plerumque tamen hujus cauſa principalis, & maximè frequens conſiſtit non tam in hepatis, lienis, aut renum, quàm ipſius ſanguinis vitio; ſcilicet urinæ copioſa ac libera excretio, necnon ipſius in corpore mora, & tantùm minuta redditio præcipuè dependent à cruoris temperie, ejuſque ſive acceſſione, ſive fermentatione in corde: nam ſi cruor principiis activis (ſcilicet Spiritu, Sulphure ac Sale) ritè exaltatis pollens vegetè in vaſis efferveſcat, adeoque ſatis laxatâ liquoris compage à cordis fermento debitè accendatur, ferè totus ſpirituaſcit.

& cum calore & motu rapido singulas partes sine infarctione trajicit, quidquid superfluum & volatile est, foras evaporat: dumque sanguis rarefactus, & cum calore ebulliens renes pertransit, quod serosum est, à renum sive colicantum, sive (quod verisimile est) coagulo facile secernitur, ac à reliqua cruoris massa velut præcipitatur: hoc modo sanguini ferè idem accidit, quod in lacte observamus, scilicet dum incalescit ac effervet, facillimè in partes secedit, ejusque serum à levissimo coagulo infuso separatur: sin eidem frigefacto fermenta fortiora, & valdè acida infundas, præcipitatio vix omnino succedit: itaque si cruor à mala constitutione aut victu pravo frigidus ac aquosior extiterit, ut elementis activis minùs dotatus segniter effervescat, ac minutim in corde accendatur, pigrè admodum, ac difficulter in vasis circuletur, poros & meatus viscerum, aut carnum pertransiens paulatim adhærescit ac sui aliquid ponè relinquit, unde obstructions, & tumores passim gignuntur; cruor etiam hoc modo viscosus, & frigidus, adeoque præcipitationi, vel percolationi inidoneus minùs promptè in renibus exuvias serosas deponit, verùm eas in toto corpore, quoniam ægrè, & non sine humoris cujusdam residentia circuletur, ubivis relinquit. Quare in hoc statu quæ sanguinem valdè exagitant, cujusmodi sunt exercitia, & motus citatior; aut etiam quæ velut coagulo infuso eam fundunt, uti sunt acetosa, & salium præparata, urinam liberius provocant.

Interdum accidit urinas ægrotantium in quantitatè larga, & valdè profusa reddi, ut nycthemeri spatio duplo, aut forsan triplo plus mingant, quàm liquidi ingesserunt: cujus item affectus causæ sunt variæ, & significationes plurimùm diversæ. Si post urinæ suppressionem, aut quantitatè ejus priùs diminutam; si in affectibus hydropicis, rheumatismis, aut nervosi generis passionibus; vel si in febrium crisi bus aut sponte naturæ, aut diureticorum usu lotii profluvium succedat, plerumque morbi, aut dispositionis præternaturalis solutionem, vel saltem declinationem denotant. Sin verò (uti crebrò observavi) in constitutione gracili, & imbecilla (sine præviis modò citatis affectibus) urinæ liquida assumpta longè excedant, indeque totius magna debilitas sequatur, hoc reverà diathesin malam cum tendentia ad atrophiam, aut tabem significat. Novi quasdam teneræ, & rarioris texturæ mulieres, quæ interdum per plures dies malè habentes in copia ingenti (supra duplum liquidi assumpti) aquosum, & tenue, sine contentis, aut hypostasi quotidie mingere solebant; quo tempore de virium languore, respiratione difficili, & impotentia ad motum querebantur; suspicor in hoc casu sanguinem, & succum nervosum à Sale ejecto, & fluorem passo nimis acescere, ideoque ut in mixtione nonnihil resolvantur, & in serositatem nimis fundantur habiles reddi. Etenim observare est, quod liquida quævis, crassiora licet, & mucilaginosa fuerint, si ad acorem servantur, statim aquosiora, & magna ex parte limpida fiunt: etiam urinæ profluvia quandoque à tali sanguinis, & humorum dispositione oriri constat, eo quod lotium ita copiosè excretum sapore acetum refert; atque hujusmodi affectus potissimùm chalybeatis, & minimè adstringentibus, aut incrassantibus curari solent.

Quod verò ad *Colorem* spectat, urina sanorum sit norma, sive regula, ad cujus examen cæteræ omnes ægrotantium revocari debent: cum verò sanorum color

color sit *citrinus*, erit ægrotantium urina vel citrinâ pallidior, & sic vel *aquea*, aut *alba*; vel eâdem saturior, cujus præcipuè species sunt *flammea*, *crocea*, *rubicunda*, *viridis*, & *nigra*. Singulas harum breviter percurram, simulque appendere conabor quibus de causis quælibet alterationes fiant, & quales affectus, seu morborum apparatus indicare soleant.

Urina est aquea, sive limpida, quando ob ventriculi indigestionem Salina, & Sulphureæ esculentorum particulæ non ritè subiguntur, nec minutim confractæ adeo volatilifantur, ut sero dissolutæ ei tincturam impertiant, quam per singulos transitûs sui anfractus secum referre possit: etenim latex in urinam mutandus, quia per ductus valde secretos, & minimè patentes, velut destillatione quadam urgetur, ideo colore, & consistentia, quæ in liquidis assumptis fuerant, omninò spoliatur, nihilque penitus nisi volatile è chymo (cujus vinculum est) imbibit. Quare si ob summam cruditatem Sal, Sulphur, & alia contenta haud primò volatilifantur in visceribus, nec postea dissolvuntur in vasis, ut cum seroso latice unâ iter faciant, ipse demùm ferè omnibus denudatus, velut aqua limpida foras excernitur. Quod principiis activis tales urinæ ferè careant, signum est, quia diutissimè à putrefactione immunes servantur. Hujusmodi urina in puellis *χλωρόσιν* plerumque denotat, in plerisque cachexiam, aut hydropem, in quibusvis *ἀπεψίας* & cruditatis indicium est. Quandoque in nephritide obnoxiiis paroxysmum ingruentem prænunciat, scilicet dum serum à succo lapidescente in renibus coagulatur, ejus dissoluta, & contenta in materiam Tartaream congelantur, superstitè tantùm latice aquoso. Qui tenue, & aquosum aliquamdiu mingunt, qualicunque ægritudini sunt obnoxii, sæpissimè adjuncta habent *respirationem difficilem*, & à motu *crebram*, atque circa regionem ventriculi *distensionem*, & à pastu velut *intumesceniam*. Prioris ratio omninò dependet à defectu *πυκνωσεως* in sanguine: etenim quia liquor ejus particulis activis (Spiritus, Sulphuris, ac Salis) haud ritè exaltatis plenè inquinatur, ideo à fermento cordis non satis accenditur, quo statim totus exsiliat, & velut in flammam prorumpat: quin ægrè fermentescens, & in corde stagnare, aut magna ex parte residere aptus, ipsum valde aggravat: quare si cruor ita dispositus à motu citiori in cordis sinus solito plus urgetur, quia non sponte rarefactus statim totus egreditur, ideo magno pulmonum nixu, & crebriori agitatione opus est, quo foras exantletur. Hujusmodi cruditatem in sanguine urinæ aquosæ propterea significant, quia siquidem à Sale, & Sulphure tincturam ferè nullam receperunt, indicio est eorum particulas in cruoris massa minùs dissolvi, aut volatiles reddi. Quod ad ventriculi inflationem attinet (cujus item urinæ limpida sunt effectus, & signum) dico quod propter debitæ *ζυμώσεως* defectum chylus minimè in cremorem volatilem, verùm (instar panis non fermentati) in massam gravem, & ponderosam facessit; quæ quidem tardè, & non sine residentia viscosi phlegmatis è stomacho eliminatur: hinc ejus reliquiæ plicis & membranis ventriculi impactæ poros, & meatus quosvis obstruunt, ut nihil evaporet, nec quod tenuius, & spirituosum est, per ductus secretos (uti fieri oportuit) protinus sanguini convehatur: hinc flatus copiosè gignantur, qui ventriculum continuò distendunt, ac supra debitam molem inflant. Etiam cum sæculentiæ istæ diu in stomacho relictæ sale fixo abundant, in

materiam modò acidam, modò vitriolicam, aut aliàs naturæ degenerat: unde cardialgia, absurdorum appetitus, sæpe ardor cum siti immani, interdum vomitus atroces, aliæque symptomata valdè infesta oriuntur: quorum nonnulla licèt calorem satis acrem intus latitare arguant, tamen ob coctionis privationem taliter affecti sæpe urinam crudam, & aquosam reddunt. De urina *limpida* ita fusè egimus, quoniam hinc reliquarum, quæ pallidæ & tenues, citra colorem, & consistentiam in sanis subsistunt, rationes peti debent. Etenim à Sale, & Sulphure plus, aut minùs dissolutis, seroque incoctis, urinæ pallidæ, stramineæ, colorumque aliorum infra citrinum phænomena excitantur, ac simili ritu, quo de aquea dictum est, explicari poterunt.

Restat urinæ species quædam altera *citrinâ pallidior*, minimè *tenuis*, verùm *crassa*, & *opaca*, atque *coloris subalbidi*. Communi observatione constat sæpe pueros talem excernere cùm viscera eorum lumbricis scatent; cujus ratio videtur, quia materia ex qua fiunt lumbrici, est viscida quædam pituita, ob chyli indigestionem, & *ανδραλώς* defectum in visceribus congesta, quæ primò nullam urinæ tincturam transmittit, ob materiæ fixitatem: postea eadem materia putrescens exaltatur, & aliquo modo volatilifatur; atque tunc partim calore & spiritu in lumbricos efformatur, ac partim chylo transeunti confusa, ac in vasa delata, cùm sit nutritui inidonea, cum sero à cruore secernitur, & urinæ permista colorem album ipsi conciliat. Quandoque etiam in febribus, præcipuè puerorum, urinæ albicant: cujus ratio est, quia succi nutritii supplementum è chylo cruoris massæ suffusum non ritè assimilatur, sed in humorem excrementitium degenerat: cujus portio sero incocta ei consistentiam crassiorem, & colorem lacteum impertit: secus ac in adultorum febribus, ubi cùm calor sit fortior, ejusmodi succi degeneris adventus colorem rubicundum sero imprimit. Item urinæ albescunt in fluore albo, gonorrhœa, ulceribus renum, vesicæ, & meatus urinarii, ob saniei aut seminis corrupti confusionem: utcunque sit, color urinæ albus ab ejus contentis producitur, quibus demùm subsidentiâ ad fundum depositis, liquor plerumque evadit coloris subflavi & pallidi; non aliter ac in conficiendo lacte sulphuris cernitur, ubi substantia lactea ad fundum subsidente, liquor supernatans citrini coloris existit.

Urinæ quarum color est *citrino intensior*, non tantùm Sali & Sulphuri plus solito dissolutis, verùm aliquatenus *crassioribus* in liquore contentis causas suas debent. Salis atque Sulphuris uberior dissolutio potissimùm in vasis in ipsa cruoris massa peragitur, indeque seroso latici tinctura imprimitur: hoc autem duplici ut plurimum modo fieri contingit; scilicet vel *propter effervescentiam febrilem*, quatenus cruor in vasis ebulliens, & in corde magis accensus in mixtione plurimùm laxatur, adeoque Salis ac Sulphuris particulas velut coctione delibatas sero copiosè affigit: vel *sine febre*, quando ejusmodi Sulphurea ac salina corpuscula, aliis emunctoriis excerni solita cohibentur, ideoque sensim in cruore congesta sero affunduntur. Hujus item duo sunt præcipuè casus, sive modi: aut enim recrementa sanguinis, quæ de Sulphure adusto maximè participant, & per vasa choledocha amandari debuerant, retinentur, adeoque seroso humori suffusa flavedinis tincturam imprimunt; aut etiam effluvia, quæ sunt præsertim nature Salina, & transpiratione insensili evaporari oportuit,

oportuit, cohibentur, ab iisque lotium lixiviali tinctura saturatur. Prioris generis urinæ *ictericis* sunt propriæ; quæ verò hujus, in *scorbuto* familiares existunt: namque in scorbuto salinæ cruoris particulae à volatilisatione desciscunt, & fluorem nascuntur: quare ob fixitatem minus evaporant, ideoque in sanguine plenius congestæ, ipsius crasin magis pervertunt, & humorem serosum false-dine plurimum imprægnant. *Contenta* quæ urinæ colorem intendunt, sunt *duplicis generis*; scilicet vel *recrementa adusta* à deflagratione sanguinis residua; vel *succi nutritii* in materiam extraneam *degeneris particulae*: de quibus infra proprio in loco dicetur. Restat modo ut singulos urinæ citrino intensiores colores speciatim describamus.

I. Primò occurrit urina *flammea*, quæ instar Spiritus nitri cum fulgore rutilat; hæc autem sæpissimè in febre tertiana intermittente reperitur. Oritur hic color à portione flavæ bilis tenuioris, sero dum in motu est, commixtæ; quippe in hac febre adest sanguinis acris & calida intemperies, quæ humores quovis adurit, & torrefacit, ideoque bilem copiosè gignit. Hæc autem, licet maxima ex parte ductibus & vasis bilariis à cruoris massa secernitur; cum tamen in vasis abundat, pars ejus, seu (quod idem est) particulae quædam sanguinis & humorum retorridæ & adustæ, seroso latici incoctæ ei flavedinem saturatam impertiunt. Hæc urina tenuis est & coruscans, eo quod in hoc morbo continua ferè diaphoresis succi nutritii recrementa, & crassiores qualvis feri partes ad circumferentiam corporis protrudat.

II. Urina *Crocea*, quæ & lintea eodem colore inficit, indubitatum est ictericiæ signum: hoc modo tingitur à flava bile, sive à Sale & Sulphure adustis, ac sero ubertim commixtis: etenim bilis flava à jugi calore & motu sanguinis necessariò gignitur; huic autem à cruoris massa secernendæ cystis fellea, ejusque ductus in hepate radicati à natura designantur. Sin verò talis secretio quovis modo impeditur, humor iste in sanguine restagnans, copiosè congestus flavedine sua cutim, cruorem, & imprimis laticem serosum inficit. Differt urina *crocea* à *flammea*, quoniam in hac tantum bilis tenuioris portio quædam, verum in ista crassior, & longè uberior copia lotio suffunditur: porrò in flava bile Sulphur cum Sale adjuncto diu circulatum ab ipso plenè dissolvitur, ut velut pigmentum evadat cuivis subjecto tincturam croceam impertiens, prout cum Sulphur commune ac oleum Tartari simul digeruntur. Quæ autem sine istius bilis restagnatione in urinis rubedo excitatur, eodem modo ac in lixivio cinerum contingit; ubi Sulphuris particulae sine prævia à salinis digestionem, unà cum ipsis in liquore protinus deponuntur.

III. Restat proximè dicendum de urinis *rubicundis*, quæ sunt diversæ habitudinis, neque semper ab iisdem dependent causis, nec planè idem denotant affectionum genus. Præcipuas earum differentias, & proprias significationes breviter percurramus. Primò, urinæ liquor aut ex se rubescit, eodemque modo perstat, nec partium quarumvis subsidentia calor alteratur. Vel Secundò, urinæ rubedo saturata ejus contentis præcipuè debetur, quæ cum ad fundum subsiderunt, liquor flavescit, vel minus intense rubicundus existit. Affectus quos hujusmodi urinæ indicare solent, sunt præcipuè *febres*, *scorbutum*, & *phthisis* confirmata. Singulorum rationes perpendamus.

I. Quando urina quæ mingitur rubicunda, ita perstat. Primò vel est confitentia

stentia mediocris, & pellucidæ; atque tunc colorem suum debet Sali & Sulphuri plus solito adustis, ac proinde sero copiosius incoctis: vel *Secundò* talis urina rubicunda est, simulque turbida & opaca; hæc autem præter Salis & Sulphuris contenta, etiam particulas quasdam terrestres sibi incoctas habet, quæ quidem poris & meatibus serosi laticis impactæ minimè descendunt, quoniam urinae liquor spiritibus idoneis destituitur, qui heterogenea quævis segregent, & ad fundum compellant; veluti in vappa, aut in cervisia propter tonitru acescente usuvenire solet, ubi liquor facie turbida inficitur, & propter defectum spiritus non denuò clarescit: quare hujusmodi urina pessimum in febribus signum est, quippe talem in sanguine materiae adustæ, ac secernendæ confusionem indicat, quali spiritus vitales subigendæ & perdomandæ non sunt pares.

II. *Urina* interdum *rubicunda* mingitur propter ejus *contenta*, quibus ad fundum subsidentibus liquor alterius coloris evadit. Sunt autem ista contenta, uti superius innuitur, duplicia; scilicet modo tenuia, quæ sunt materies, seu recrementa adusta à deflagratione cruoris residua; modò crassiora, nimirum particulae succi nutritii degeneres. Utraque hæc à sanguine effervescente torrefacta, & secreta partim sudore excluduntur, partim seroso latici commista ejus consistentiam incrassant, ac colorem intendunt; scilicet quamdiu hujusmodi contenta poris & meatibus liquoris inclusa sustentantur, color urinae saturatior, & consistentia spissior apparet: his verò ad fundum præcipitatis, & rubedo, & crassities liquoris minuuntur. Hujus ratio inferius assignabitur, ubi de causis colorum, necnon diaphaneitatis & opacitatis urinarum dicemus: nunc inquiramus quæ sit discriminis ratio, quod urinae rubicundæ tum in febribus, tum etiam in *scorbuto*, *phthisi*, ac forsan aliis quibusdam affectibus reddi solent.

I. In febribus urinae liquor rubore saturatur propter *uberiorem Salis & Sulphuris dissolutionem*, eorumque particulas sero copiosius incoctas: dum enim sanguis & humores à causa febrili effervescent, propter calorem plenius accensum Salina & Sulphurea corpuscula adusta & torrefacta plus dissolvuntur, serosoque latici incocta ei tincturam altiore affigunt: quemadmodum si lixivium è cineribus super ignem coquatur, intensius rubescet, quàm si per infusionem tantum procedat. Etiam in febribus *urina contenta ejus colorem sapissime adaugent*; scilicet ob sanguinis intemperiem & deflagrationem, tum succi nutritii particulae degeneres, tum materies altera (velut cineres ab adustione cruoris residui) in calcem rubicundam veluti comburuntur, quæ poris urinae inclusa ejus colorem saturatum reddit, & postea subsidens fit sedimentum instar ochræ rubrum.

II. In *scorbuto* diuturno urinae liquor sæpe ita intensè rubescit, ut non magis in febre ardente: talis si evaporetur, aut destillationi exponatur, Salis copiam ingentem cum facie limosa exhibet; quare saturatam hanc rubedinem à Sale potissimum oriri (prout supra innuimus) hoc experimento constare videtur: quippe in scorbuticis particulae salinae, quæ volatilifari, adeoque constanti diapnoë foras exhalari debuerant, fixiores evadunt, atque ab effluxu cohibitæ uberius in corpore affecto congeruntur. *Sal intus manens cum Sulphure & terra variè coagulatur, ac dein continuè resolvitur; & ab hac diversimoda*

diversimoda *coagulatione* & *resolutione* admiranda hujus morbi symptomata excitantur. Etiam à corpusculis salinis cum fæculentiis Tartareis ubertim resolutis, & sero dilutis urinæ intensa rubedine saturantur, cui sæpissimè accedunt in hoc affectu inveterato hepatis ac vesicæ felleæ vitia: cum enim hæc viscera, aut obstructa, aut aliter depravata, munere suo pro secernendis adustis sanguinis particulis minus defunguntur, eadem in cruore plenius congestæ seroso latice dissolvuntur, ipsumque lixiviali tinctura adhuc magis inficiunt. Et si particulæ adusti Sulphuris cæteris Salis fixi & scorbutici præpollent, simul icterus flavus scorbuto accedit, & urina croceam tincturam linteis affigit. Sin istis minores sunt, & particulæ salinæ præcellunt, producit affectus tantum scorbuticus, in quo urina intensè rubicunda est, nec tamen linteamenta tingit. Rem ita se habere persuasus sum, quia cum plurimum è scorbuto defunctorum cadavera dissecai, quibus urina rubicunda extiterat, observavi hepar, aut cystim felleam in culpa fuisse: in nonnullis fuit hepar prorsus exsangue, & exsiccum instar uberis vaccini; in aliis vesica biliaria erat vacua & inanis; in aliis lapidibus obsita; in aliis amurca minimè amarescente repleta; in omnibus viscera hæc taliter affecta, ut secretio bilis impediretur.

III. Propter hujusmodi Salis resolutionem in *morbis arthriticis* urinæ interdum rubescunt: nam præter insultus podagricos (in quibus tale lotium non rarò excernitur) observavi in quibusdam affectionem dolorificam, & velut febris æmulam, cum urina valde rubicunda excitatam: adsunt dolores vagi, modo in hac, modo in illa parte graviter infesti, ut ægroti vix pedibus stare, aut membra movere possint: vigiliis & crebris sudoribus sunt obnoxii, etiam fiti, & faucium ardore valde molestantur, atque urina intensè rubicunda cum sedimento copioso & rufo existit: interea tamen nec à pulsu, spirituum languore, aut cephalalgia sanguinem supra modum effervescentiam, aut febrem induxisse constat: quare hujusmodi affectum præcipuè à nervoso genere consistere, atque à principii salini potius quam Sulphurei exorbitantiis dependere suspicor.

IV. Etiam in *phthisi* confirmata, præsertim si hectica adjungitur, urina rubicunda existit: cujus ratio est, quod si quando ulcus in pulmonibus excitatur, inde putrida sanies sanguini præterlabenti confusa effervescentiam ei ferè continuam inducit, qua particulæ Sulphureæ & salinæ uberius dissolutæ, seroque incoctæ liquorem ejus rubedine afficiunt: præterea ob sanguinem hoc modo inquinatum succus nutritius ferè totus in putrilaginem degenerat, cujus recrementis urina saturata magis rubescit, & contentis plurimum infercitur. Hujus indicium est, quod tabidi à pastu plerumque æstuant, & calore per totum corpus suffunduntur, sudore nocturno succedente. Insuper *urina* eorum sedimentum crassum & copiosum deponunt; scilicet succus alibilis cruori confusus, cum non assimilatur, effervescentiam in ipso concitat, atque in materiam extraneam degener, partim sudore per poros cutis exhalat, partim ad urinam transmissus ejus colorem & consistentiam valde intendit.

Hactenus de urina rubicunda, cujus singulæ modo prædictæ species plures habent intensiōis & remissionis gradus, prout causæ colorem & consistentiam in eis alterantes sunt aut debiles, aut fortiores.

IV. Quod ad *urinam viridem & nigram* spectat, colores ejusmodi saturatos (quales scilicet porrum, & atramentum exactè referunt) fateor me nunquam in lotio vidisse; quin existimo ex *flava intensiore, viriduscula*; ex eadem cum mixtura opaca & nonnihil atrata, *Nigricantis urina* apparentiam desumi, indeque ab Authoribus lotium viride & nigrum appellari. Quæ autem istis modis *urina* coloratæ habentur, vel ita constanter aliquo tempore perstant, aut sunt icteritiæ, aut etiam cruoris virulentia quadam affecti signa: vel pro data occasione tales *urina* variè immutantur, & modo hujus aut illius, modo statim alterius coloris existunt. Ita novi hypochondriacos tales urinas quibusdam temporibus velut criticè excernere solitos, dein postea sanorum similes reddere. Quoad prius, cum icteritia plurimum ingravescit, ut in cruoris massa *Sulphuris* ac *Salis* portiones adustæ diutius persistant, eadem longa incoctione colorem flavo saturatiorem, scilicet primò viridem, & postea nigrum acquirant, ac eundem sero impertient: etenim si bilis flava cysti fellea exempta, ac cucurbitæ indita leni balnei calori exponatur, eadem brevi viridescet, ac postea instar atramenti nigerrima apparebit: quare in ictero nigro, qui tantum est flavus diuturna mora in deterius evectus, nihil usitatus est quàm *urinas* atratas reddi. Præterea hujusmodi *urina* in febre maligna ac peste interdum apparent; etiam non rarò ab epoto veneno: atque in hoc casu signum lethale plerumque existunt; quippe sanguinem valde corruptum, & profligatis spiritibus, ac soluto mixtionis vinculo, velut *νεκρόσας* affectum arguunt, non secus ac cum pars aliqua in corpore nostro ulcere affecta, postea gangræna aut sphacelo corripitur, illico sanies, quæ prius aquosa, alba, aut flava effluxerat, nigra evadit. Quare in affectibus citatis cum *urina* nigricat, sero & sanguine per totum vitiat, etiam cutis externa tali colore obfuscatur. Quod ad urinas colore viridi, ac præsertim nigro periodicè tinctas attinet (quæ nimirum hypochondriacis frequenter accidunt,) verisimile est, quod tales à fæculentiis atrabiliaris in liene reconditis, & deinde præ congestione nimia aliquoties exundantibus, & sanguini confusis oriantur: etenim talis materia quæ in quibusdam hominibus sæpe in ventriculum suffusa vomitus atratos ciet, etiam in aliis eadem à cruore pertranseunte resorpta latici seroso ejusmodi colorum suffusiones impertire potest.

Hucusque de *coloribus urinarum*, quorum *pallidiores è cruditate nimia, saturati ferè omnes* oriuntur vel à *Sale & Sulphure* uberius dissolutis, & interdum à *recrementis adustis sero* penitus incoctis, vel à *crassioribus urina contentis*, sive ipsa sint *alimenti* inter coquendum *degenerati* velut *calx & pars residua*, sive *corporis tabescentis* aut *partis* cujusdam malè affectæ *deliquamentum*, aut *abscessus*. Quæ dicta sunt melius intelligentur, si explicetur modus quo istiusmodi dissoluta aut contenta possunt *urina* colorem variè immutare.

Colorum diversimodè apparentium, & variè immutatorum, necnon opacitatis, & diaphaneitatis in urinis causæ (veluti in liquoribus aliis quibuscunque) unicè dependent à varia incidentia ac emersione radiorum lucis, prout alibi in tractatu de fermentatione innuitur: nam si liquoris compages sit rara & tenuior, cum poris & meatibus apertis, ut radii lucis faciliè pertranseant, iste fit pellucidus, & instar aquæ fontanæ limpidus: sin vero contentis, seu corpusculis innatantibus laticis pori implentur adeo ut radii luminosi

in transitione sua refringantur, utcumque verò demùm emergant, juxta varios istiusmodi refractionum, & emersionum modos color citrinus, croceus, aut rubicundus in liquore adhuc diaphano apparebunt. Quod si pororum spatiosis adhuc plus occupatis lux minimè pertransit, opacitas inducitur: tunc autem si radii immerfi parum aut minimè reflectuntur, fusci, aut atrii coloris liquor apparebit: sin verò reperiuntur, pro diverso reflexionis modo *φάσις* alba, cineritia, aut alijs generis inducitur. Ex hoc supposito, juxta quod *urinae* liquor modò Sale & Sulphure, aliisque dissolutis ferè privatus lucem facile transmittit, modò ejusmodi contentis aut modicè, aut valde refertus radios incidentes aut in transitu distorquet, aut penitus imbibit, aut denuò reperiunt, facile erit colorum & consistentiæ in iis phænomena quævis explicare.

Non rarò accidit ejusdem *urinae* colorem variè immutari: quæ enim rubicunda mingitur, aëri exposita albi, aut fusci coloris, ac dein aliquo post tempore citrina evadit: cujus ratio, ni fallor, hæc est. Hujusmodi *urina*, dum mingitur, rubicunda est, quia pori liquoris sunt contentis plurimùm occupati; quamdiu tamen calore dilatantur, radios lucis (licet variè distortos) transmittunt, ut denuò emergant. Verùm hæc *urina* non citiùs frigori exponitur, quin poris constrictis situs & positio partium in contentis mutetur, & proinde radiorum lucis pertransitus inhibetur: quare liquor statim opacus evadit, & prout isti radii hoc, aut isto modo reflectuntur, color aut albus, aut fuscus, aut alijs generis inducitur: tandem verò contentis pondere suo ad fundum subsidentibus, pori liberati radios lucis denò transmittunt, ipsosque minùs distorquent: quare color minùs saturatus, sive citrinus evadit.

Ex his quæ circa *urinarum* colores dicta sunt, constare potest quæ sit causa variæ *urinarum consistentiæ*; prout enim *Salis*, & *Sulphuris materia adusta*, *succi nutritii* inter assimilandum depravati particulae plus aut minùs sero incoquantur, etiam *urinae consistentiam tenuiorem*, aut *crassiorem* nanciscuntur. Restat proximè ut de *contentis* in *urinis* præternaturalibus (quorum sæpe monitio facta est) explicatiùs dicamus.

CAPUT V.

De contentis in Urinis agrotantium.

Contenta in *urinis* Agrotantium duplicia agnoscimus, scilicet vel *universalia*, quæ à sanguinis, & liquoris nervosi massa procedunt, & totius corporis habitudinem respiciunt; vel *particularia*, quæ sunt unius visceris, aut partis malè affectæ excrementa, aut deposita, de quibus mox inferiùs dicetur. Quæ prioris generis à toto decedunt, sunt vel *naturalia*, scilicet filamenta hypostasini, prout in sanis, constituentia; vel *præternaturalia*, quæ præcipuè sunt humoris nutritii ab assimilatione degeneris particulae, & sedimenti in *urinis* corpuscula crassiora constituunt; atque his demum (si adest intemperies febrilis) materies à deflagratione sanguinis adusta & seroso latice diluta accedit, & contentorum molem auget.

Hæc autem tum *naturalia*, tum *præternaturalia* urinarum contenta se vario habent modo, prout sanguis plus, aut minus indebitè effervesceat; etiam prout alimenta in visceribus, & vasis variè coquuntur, & chymi inde confecti aut superfluitates, aut corruptelæ cum sero abluuntur: namque si humor alibilis cruori transmissus haud totus pervertitur, sed magna ejus portio in nutrimentum solidis partibus apponendum mutatur, etiam hujus ritè elaborati partes quædam sero commixtæ in urina adhuc aliqua hypostaseos vestigia imprimunt: quodque ex materia degeneri, aut adusta sedimentum præternaturale conflatur, adhuc paucum, & tenue existit, neque hujus naturalis apparentiam omninò delet. Quare in principio, & declinatione febris, quandoque etiam in phthisi, aut cachexia hypostasis, licet non adeò perfecta, cernitur. Quod si major ejusdem chymi portio cum sanguine effervescens ob calorem immodicum in materiam heterogeneam pervertitur, quæ postea ut noxia, & inutilis cum sero amandatur, hypostasis statim obscura & imperfectior evadit; atque præter eam in urinis plurima habentur contenta, quæ earum colorem & consistentiam intendunt. Talis urina quæ simul hypostasim, licet imperfectam, & alia ejusmodi in se dissoluta continet, si in loco calido detineatur, sola hypostasis cernitur; reliqua autem contenta, poris *urinae* à calore dilatatis comprehensa fiunt prorsus inconspicua: postea tamen pororum spatiosis à frigore constrictis præcipitantur eadem contenta, ac proinde situm ac positionem mutantia urinam turbidam, ac opacam reddunt, ac hypostaseos apparentiam delent. Hujusmodi *urinae* in meliori febrium statu, catarrho, tussi, *ἀσθμα*, cacochemia & levioribus plerisque dyscrasiis mingi solent.

Sin ægritudine ulteriùs proectâ omnino vitiatur coctio, & succus nutritius totus in putrilaginem mutatur, hujusmodi contenta etiam absque hypostasi in urina cernuntur, & variè in morbis significant, prout variis præcipitantur & subsidunt modis, sedimentumque diversi generis constituunt: prout nimirum citò, aut tardè, aut non omninò partium separatio succedit, & prout materia subsidens fuerit pauca, aut multa, aut etiam coloris albi, vel fusci. Quæ circa hoc præcipuè notabilia & observatu digna occurrunt, breviter percurram.

I. *Urina* hujusmodi contentis saturata aliquando non præcipitatur omninò (nisi cum longo post tempore liquoris compages putredine resoluta fuerit;) quin turbida & nonnihil opaca diu perstat, corpusculis per totum innatantibus. Hujus ratio est, aut quoniam hæc contenta nimis altè sero incoquantur, ita ut Spiritus insiti purum ab impuro, crassum à tenui nequeant segregare; uti cernitur in conficienda cervisia, cui si brasii farina nimium incoquantur, nunquam postea clarescit liquor: aut etiam urina manet turbida, quia omninò destituitur spiritibus, qui partes liquoris in fermentationis motum compellant; sicuti fieri solet in cervisia ob tonitru aut calorem immodicum acfcente, & fæce turbidâ infecta, quæ vix unquam ritè defæcatur. Hujusmodi urina plerumque in febribus valde periculosis, & quandoque in cachexia conclamata cernitur, atque semper malum portendit.

II. Interdum contingit urinam adeò contentis saturari, ut dum adhuc incalescit, turbari incipiat: sæpiùs observavi hoc modo fieri in febre lenta, cujus

cujus calor fuit mitis , & remissior ; in qua scilicet nutritii crassamenti particulæ depravantur , sed minùs calore subactæ , aut sero incoctæ faciliùs ejus poris excidunt : veluti cùm *Sulphur* commune lixivio incoquitur , si priusquam perfectè dissolvatur , ab igne amoveatur , liquor primò clarus & rubicundus ob citam dissoluti præcipationem statim fit turbidus , & subalbidi coloris.

III. Quod verò sæpissimè usuvenire solet, urinam hujusmodi contentis gravidam , quamdiu incalescit , & aliquo post tempore videri claram , & perspicuam ; cùm verò frigescit , paulatim turbari , & velut coagulo infuso secundum omnes sui partes præcipitari : eandem tamen , si juxta focum , aut in aqua calida aliquantisper detineatur , denuò clarescere : hujus ratio , ubi de causis opacitatis , & diaphaneitatis dictum est , satis superiùs fuit explicata.

IV. Postquam *urina* frigori exposita hoc modo præcipitatur , observandum erit quo pacto ejus contenta ad fundum descendunt ; quandoque enim brevi tempore subsident , & si spatio duarum , aut trium horarum liquor clarescat , signum est *urina* liquorem haud nimis esse crassum , nec *Sale* , & *Sulphure* valdè saturatum : quare in principio , ac declinatione febrium , quando calor est remissus , talis *urina* sæpissimè excernitur : interdum non nisi plurium dierum spatio talis subsidentia succedit : cujus ratio est , quia liquoris consistentia est debito crassior , ideo contenta , aut dissoluta complexu non adeo facilè dimittit , ut pondere suo ad fundum decidant. Hujusmodi *urina* in febrium statu reddi solent , & malam sæpissimè crisin præcedunt.

V. Nec minùs diversi generis sunt quæ ad fundum cadunt sedimenta. Ut præteream hoc in loco saniem , & sanguinem , arenas , sabulum , & similia partium quarundam deposita ; ea quæ sunt totius corporis producta , ut plurimum sunt aut *alba* , aut *fusca* , aut *rubra* instar ochræ : si urinam , cùm diu steterit , per chartam emporeticam trajicias , contenta hæc colligere poteris. Vidi sæpe instar cretæ albicantia ; quandoque instar boli Armeni rubra. Proculdubio est eadem omnium materia , nimirum sanguinis deflagrati , & succi nutritii inter assimilandum depravati recrementa ; quæ prout in corpore nostro à calore exassantur , & diversimodè pervertuntur , etiam in *urina* sub vario colore , & forma apparent ; non secus ac Antimonium nitro commixtum , prout plus aut minùs calcinatur , exhibet calcem modò rubram , modò croceam , modò flavam , modò fuscā : par (uti videtur) ratio est de urinarum sedimentis , quæ sunt veluti calx materiæ *Sulphureæ* & terrestris , in visceribus , & vasis febris incendio deflagratæ.

VI. Præter hujusmodi contenta , quæ in urinis ægrotantium contingunt , non rarò observavi , postquam *urina* aliquandiu steterit , aliquid arenarum instar matulæ lateribus affigi , & quidem sub diversa figura ; modò enim hæc corpuscula sunt arenis similia , cum superficie aspera & inæquali ; modò cum striis instar crystallorum nitri concrescunt : & quidem splendent , & pellucida sunt instar glaciei ; aliquoties in urinis dysenteria affectorum , etiam bis in vigiliis pertinacibus hujusmodi crystallos matraccio affixos vidi. Interdum urinis , cùm aliquandiu steterint , cremor quidam supernatat , veluti cùm Tartarus aquæ incoquitur : hujusmodi crusta albicans in superficie lotii concrescens , vulgò pinguis , & adiposa creditur , ac pro solidarum partium deliquamento habetur.

quare talem urinam excernere soliti, statim tabidi, & quasi deplorati pronunciantur. Veruntamen ista concretio tantum salina est, quæ si igni admoveatur, minimè liquatur, sed in substantiam crustaceam obdurefcit. Quinimò, & hoc, & reliqua urinarum incrustamenta sunt veluti Tartarus coagulatione quadam in iis productus: talis autem concretio omninò dependet à particulis salis fluidi, sive acetosi, cum aliis Salis fixi, aut Alcalisati combinatis: etenim in quovis subjecto, ubi salium utriusque generis commistio, seu sponte naturæ, seu ἐγγχεσθ artificiali procuratur, crystallisationes & coagulationes diversimodæ excitantur: quare lotium ejusmodi, cui cremor iste innatat, aut crystalli in lateribus vasis concrefcunt, indicat sanguinem à natura dulci & balsamica (qualis à Sale volatificato dependet) in acidam & corrosivam, ob principii salini fluorem & fixitatem desciscere. Talis urina si evaporetur, Salis copiam ingentem in fundo vasis relinquet: affectus, in quibus reperiri solet (uti sæpiùs observavi) sunt sputum sanguineum, atrophia, & dispositio hypochondriaca.

In urinis ægrotantium observatu dignum est, utrum matrarium infecerint, necne? Quandoque enim in febribus urina non citiùs vitro imponitur, quin statim ejus latera nebulâ albicante obfuscet, & rursus hoc alio tempore non succedit. Puto vitrum infici, quando urinæ liquor Sulphure dissoluto plus saturatur, quàm ejus pori in se continere possint: quilibet enim liquor Sulphure nimis imprægnatus idem præstat, prout cernitur in lixivio, cui Sulphur commune, aut Antimonium incoquitur: item quælibet urina, si diu in vitro steterit, donec putrescat, ejus latera inficit crustâ, seu nebulâ modò albicante, modò rufa, modò aliùs coloris: nimirum liquoris compage putredine solutâ, Sulphuris particulæ à mixtionis vinculo soluto vitro affiguntur: in urinis verò ægrotantium aliquando hoc statim succedit, quia Sulphur sero copiosius dissolvitur quàm ut poris ejus includi possit.

Quod verò spectat ad *contenta* urinarum *particularia*, ea quidem multiplicia existunt, & à variis locis & partibus provenire possunt: sæpiùs tamen à morbis circa *renes*, *vesicam*, & *ductus urinarios* consitis dependent: interdum accidit propter abscessum in hepate, liene, pulmonibus, aut alio viscere excitatum, vel ob humores præternaturales in illis locis congestos, & plenitudine sua exundantes, materiam extraneam in sanguinis massam, indeque in serosum laticem transmitti: attamen hoc rariùs contingit, quoniam apostema intus disruptum, plerumque in viscerum cavitates saniem profundit, è quibus in ductus urinarios nullus patescit aditus. Insuper cruoris massa impuritatibus scatens, haud statim eas per urinam, at sæpius sudore, sputatione, exanthematum eruptione, tumoribus, aliisve excretionum viis eliminare nititur. Quare observatione communi constat, quod alia urinarum contenta (quàm quæ suprà citavimus) potissimùm à renibus aut eorum appendice dimittuntur, quorum præcipua sunt *arenula*, *calculi*, *sanguis*, *pus*, *caruncula*, *membrana*, *sedimenta farinacea*, quæ plerumque significant aut affectionem *calculosam*, aut *ulcerosam*, aut simul *utramque* ultra vasa emulgentia consistam.

Usitatum est *arenulas* rubicundi coloris à quibusdam in magna quantitate cum lotio excerni: horum nonnulli calculo renum sunt obnoxii, atque
paroxysmis

paroxysmis nephriticis crebro tentari solent : novi tamen alios sine dolore, aut alio graviore symptomate longo tempore arenosum minxisse : urinæ quæcumque, si in vase plumbeo aut terreo vitreato aliquandiu steterint, ejusmodi sabulum rubrum matulæ fundo & lateribus affigunt ; nimirum Sal urinæ volatilis cum Sale fixo metalli coagulatur : sic quando Sal Armoniacus limaturæ chalybis, Sali marino, aut vitriolico commixtus sublimatur, flores elevati insigniter rubescunt : quare videtur quod ejusmodi arenulæ rubræ in renibus gignuntur, eo quod Sal urinæ cum faculentis Tartareis circa anfractus renum depositis coagulatur (indeque materia sabulosa constat, quæ protinus à seroso latice pertransiente abluatur. Itaque arenæ, quæ ita crebro minguntur, non sunt ramenta calculi majoris (uti vulgò creditur ;) verum sanguinis & feri renum anfractus perluentium extemporanea producta.

Quo pacto *calculi* in vesica aut renibus producantur, non est hujus loci plenè disquirere : hoc autem à *coagulatione* potius quam *exsiccatione*, seu excalesfactione fieri extra dubium ponitur. Observavi nonnullos calculo vesicæ laborantes, qui postquam urinam deposuerunt, cum magno conatu & dolore succum crassiorem & viscidum excernere solebant, qui illico in materiam squammosam obdurescebat : hujus odor fuit lixivialis, & consistentia qualis lixivii ad spissitudinem evaporati, cujus scilicet liquor crassior factus & frigori expositus, protinus in duritiem salinam obrigescit. *Calculi minores* meatus urinarios interdum pertransiunt, & foras excernuntur. Satius est grandiores in foveis suis immotos permanere. Loca in quibus usitatè gignuntur, sunt *renum sinus anfractuosi* ; exinde minores in *vesicam* delapsi, si non excernuntur, in lapides ingentes excrescunt. Semel vidi plures calculos majores circa vesicæ latera, inter membranas ejus velut in cysti conclusos : isti proculdubio à renibus adhuc minores dimissi in ureterum ductibus inter vesicæ tunicas perreptantibus manebant, atque illic sensim mole augebantur. Matrona taliter affecta longè ante obitum è meatu urinario rejecit membranam crassam atque latam, materia sabulosa refertam, quæ (uti postea è cadaveris dissectione constabat) fuit pars tunicæ interioris vesicæ, à calculis ibidem inclusis attrita & disrupta.

Nephriticis familiare est *sanguinem* aut *pus* cum lotio crebrò excernere : etenim à calculo majori, & asperitatibus prædito renum caro facile atteritur, & vasorum oscula referantur, quibus sanguis exundans urinam tingit : cumque solutio continui hoc modo in renibus excitatur, sæpius ulcus succedit, quo pus & sanies cum seroso latice perfunduntur, & sedimentum copiosum & foetidum in urina constituunt : dein ab ulcere continuum plus solvitur, & sanguinis profusiones largiores non rarò sequuntur, atque ipsa renum caro attrita, & sensim exesa cum lotio ejicitur. Olim invisi mulierem annosam, quæ per plures menses cum urina purum sanguinem in magna copia quotidie reddebat ; insuper carunculas ingentes, carnum frustra, vasorum exesorum velut tubulos, quoties mingeat, in magna quantitate excernere solebat, ut suspicio esset renem alterum hoc modo totum è corpore abcessisse : postea tamen à decocto vulnerario cum Spiritu Vitrioli acidulato mictio ista cruenta sistebatur ; atque hæc foemina adhuc sana in vivis degit.

Novi matronam alteram, quæ primò sanguinem & materiam potulentam cum membranis à longo tempore meiando ejicere solebat : deinde, mictione cruenta cessante, per plures annos aquosum mingebat, cum sedimento copioso, & albo instar puris, in matulæ fundo subsidente : postea cum sedimentum illud deesse cœperat, intemperies febrilis cum doloribus hinc inde vagis, virium languore, aliisque mali moris symptomatis successit : cumque ægra in magnum vitæ periculum adduceretur, tumor in latere circa renis sinistri situm exortus, & in abscessum maturatus, propter largam puris profusionem ipsam liberavit : tamen ulcus cavum, & sinuosum in isto loco ichorem tenuem exsudans, durante vita manebat : quod aliquoties persanatum denuò statim erupit. Exinde, biennio vix elapso, Illustrissima hæc Domina urinæ suppressionem per dies 14. passa, apoplectica interiit : cadavere aperto, ren sinister omninò defuerat ; ejus loco substantia membranosa lumbis adnata, vasorum & ureteris extremitates complectens accreverat : ureteris vestigia quædam remanserant, verum sine apertura in ductus cavitatem : quinimò ichor, sive serositas quædam arteriæ emulgentis osculis exsudans in ulcus istud sinuosum exterius ferebatur. Ren alter fuit materia sabulosa & calculis minoribus valde oppletus : insuper juxta summitatem ureteris lapis circa pollicis magnitudinem defigebatur, cujus extremitas erat ductui, seu cavitati ureteris adeo adaptata & firmiter impacta, ut velut epistomio aperturam ejus exactè clauderet, & seroso latici transitum omninò inhiheret. *Materia purulenta* non tantum à renibus, verum aliquando è vesica, & meatu urinario ulcere affectis in lotio deponitur ; quandoque etiam è vasis & locis genitalibus *sanies, semen corruptum, fluor albus, aut sanguis menstruus* urinis suffunduntur, & subsidentias præternaturales in iis produciunt.

IV. In urinis ægrotantium sæpenumero conspiciuntur *contenta alba*, & *copiosa*, è corpusculis minutis conflata ; quæ cum subsiderunt, supra medietatem liquoris implent, ipsumque albidum & opacum reddunt, reliquo in superiori matracii regione tenui & claro permanente. Hujusmodi sedimentum farinaceum dicitur, quia scilicet aquam farina imbutam refert : de hoc ambigitur utrum è tota cruoris massa, an tantum è visceribus urinariis conferatur. Observatione constat, in calculo vesicæ ejusmodi lotium constanter reddi, etiam aliquando ob renem lapide grandiori obsitum : absque affectu nephritico talem subsidentiam in urinis nunquam vidi ; quare hoc ferè indubitatum calculi signum semper reputavi : atque videtur, quod à succo, sive humore circa calculi molem congesto omninò dependeat : namque ubi lapis in rene aut vesicâ defigitur, humor nutritius ibidem ab assimilatione pervertitur, & in mucum crassiorem degenerat, qui valdè copiosus coacervari solet, veluti ichor, qui propter globulum in fontanella positum ubertim exsudat. Iste autem mucum cum sero ablutus sedimentum illud album constituit.

CAPUT VI.

De judiciis circa Urinas agrotantium ferendis.

HActenus de urinarum *anatomie*, in qua explicantur earundem *elementa*, & *principia constitutiva* unà cum præcipuis ipsarum *accidentalibus*, scilicet *colore*, *consistentia*, & *contentis*; tum quæ per essentiam iis debent *naturaliter* inesse; tum quæ iis ob corpus malè affectum *præternaturaliter* solent accidere. Facile erit cuiquam hanc hypothesein ad praxin accommodare, & *judicium* de urinis in matula inspectis ferre; etenim ex dictis constat, quarum partium morbi per urinae inspectionem innotescunt, & quid in singulis urina significat. Circa hoc subjectum abundè satis ab Authoribus dictum est; ideo rem breviter tantum perstringam, & sicco (ut aiunt) pede pertransibo.

Licet urinae materia, scilicet serum sanguinis, universam corporis regionem perluat, & cum sanguine per singulas partes circuletur; haud tamen omnium statum & morbos patefacit, sed istarum solummodò, quibus aut naturalem sui perfectionem & genesin debet, aut à quibus alterationem quamvis suscipit: quare viscerum coctioni inservientium actionem & crasin aliquatenus refert; & præterea sanguinis & humorum in vasis temperiem & motum subindicat: verum ut quis dolorem in capite, abscessum in gula, aut quemvis alterius partis affectum, unde nihil sero communicatur, ex matula cognoscere & divinare præferat, ignorantia potius suæ, quàm morbi cuiusvis indicium præbebit.

Urinae ab ægrotis delatae quandoque sunt omninò *sanorum similes*, & tunc nullam de morbo aut parte affecta lucem præferunt: licet verò iis inspectis aliquid negativè pronunciare, scilicet ægrotum esse febris immunem; circa ventriculum & alimenti coctionem non admodum malè se habere: quare ni sit in tabem proclivis, aut abscessu, aut alio morbo solutæ unitatis laboret, affectum, qualiscumque fuerit, non valde videri periculosum, aut curatu difficilem.

Interim tamen nihil temerè edicat velim, nec eousque progrediatur, unde nulla receptui patefcat via: non rarò enim observavi in gravissimis quibusdam affectibus, scilicet in febre maligna, ubi cum viribus dejectis, pulsu debili & inæquali, macularum eruptione, aliisque malè moris symptomatis ægrotantes periculosè admodum decubuerunt, urinas quoad colorem, consistentiam, & hypostasim veluti in sanis laudabiles fuisse, ut reverà tali in casu Medicus è lotio tantum conspecto, circa prognosticon perquam turpiter erraverit: quare urinae singulari testimonio, nisi alia suffragantur indicia, à grè commodetur fides. Quod verò in peste, & febribus malignis mendax sit illa, & meretriciam exerceat, in causa est, quod in istis morbis nonnunquam sine magna effervescentia sanguis sensim, & velut tacitè corrumpitur; adeoque licet coagulatione, aut *νεκρώσει* liquor ejus afficiatur, tamen quia non eodem tempore immaniter deflagrans materiae adustæ velut cinerum congeriem facit, serum à solita crasi, aut tenore parum aut minimè alteratur: præterea

aliquando, cum in tali ægritudine cruor multum effervescit, quicquid excrementitium in massa ejus congeritur, statim cerebro & nervoso generi transferatur: quare latex serosus à contentis præternaturalibus immunis usque solito more se habet; extra hunc casum, quando urinæ coloris saturati, turbidæ, & sine quovis sedimento apparent, non est quare ἰσομαρτία in prognosi faciendâ multum hæsitet.

Quoties urinæ ægrotantium sunt istis sanorum dissimiles, aut ipsis aliquid naturale deest, aut quid præternaturale additur, aut simul utrumque contingit.

I. Deesse poterunt color, consistentia, contenta, & quantitas. Si color sit debito remissior, & liquor pallidus, indicat cruditatem, & ἀνδραπνώσεως defectum; quod nimirum succus nutritius nec in visceribus, nec in vasis ritè coquitur, aut exaltatur, ut particulæ Salinæ, & Sulphuræ simul evectæ, feri distributioni, velut destillationi obsequentes, eidem penitus adhærescant, unde etiam ipsi tincturam impertiant: quare tali urina conspecta de hujusmodi symptomatis non ineptè hariolari poteris. Quod si sit gravitas in ventriculo, inappetentia, & dyspepsia, tensio in hypochondriis, ineptitudo ad motum, somnolentia, respiratio difficilis, & crebra intra exercitandum palpitatio cordis, color pallidus, pedum & abdominis intumescencia; dicas periculum esse ne forsan incidat, aut jam inciderit in cachexiam, aut hydropem; & si virgo sit, quod pica aut malacia afficiatur.

Quod si in febre urinarum color remittatur absque crisi, signum est materiam fermentativam, seu recrementa sanguinis adusta, esse à cruoris sinu secreta, & alicubi defixa: quod plerumque in cerebro contingit, & proinde tales urinæ solent delirium, seu phrenitidem prænunciare; in nephriticis subita alteratio urinæ in pallidam & aquosam, ingruentem nephritidis paroxysmum denotat.

Urina pallida & copiosa sæpe indicat salium resolutionem nimiam, ob quam è toto corpore, ac præcipuè è partibus nervosis serositates velut profluvio quodam amendantur. Talis excretio interdum salutaris est, & velut critica, qua superfluitates tantum eliminari contingit: quandoque symptomatice est, & magnam debilitatem infert, quia scilicet succus nutritius, & humores utiles unâ excernuntur.

Si consistentia sit tenuis, & liquor pallidus, arguit cruditatem & ἀνδραπνώσεως defectum, aut potum nimium, aut affectionem nephriticam: sin color sit flammeus, signum est febris tertianæ intermittens.

Si desint contenta, & palle scat, apepsia significatur, & cachectica corporis diathesis. Sin verò color sit citrinus, & consistentia mediocris absque hypostasi, suspiceris ægrum nimio labore & exercitio uti solitum, aut nocturnis sudoribus crebro affici, aut forsan atrophiam laborare, aut esse in tabem proclivem.

Si urina in minori, quàm par sit, quantitate continuò reddatur, nisi adsit largior diaphoresis, signum est cruorem à seroso latice non satis expurgari: quare necesse est ut aquosior evadat, & tandem cachectica corporis dispositio, aut hydrops inducatur. Sin derepentè supprimitur, & cum dolore & difficultate mingitur, affectionis nephriticæ indicium est.

II. Urinæ aliquid superadditur, nimirum aliquando color intenditur, interim

ut consistentia & contenta se debito modo habeant; atque suspicio erit de diathesi ad febrem, vel de hectica inchoata. Forſan cauſa quædam evidens præceſſit, prout balneum, æſtus, crapula, aut immodica exercitatio, quæ ſanguinem excaleſcerent: aut frigus incautè ſuſceptum fuerit, unde pororum occluſio, & *διαπνῶσις*. Si urina ſit crocea, & lintea flavedine tingat, dicas morbum eſſe icteritium: ſi crocea ſit, aut rubicunda, abſque febre, neque lintea tincturâ inficit, affectionem ſcorbuticam, aut hypochondriacam plerumque indicat.

Ut color & hypotaſis ſe rectè habeant, contenta præternaturalia non rarò urinæ inſunt; idèò cùm frigefcit, turbatur, & ſedimentum deponit, modò *album*, & tum ſuſpicio erit de cruore ſordibus ſcatente, item de ventriculo impuro, materiâ excrementitiâ, aut lumbricis obſeſſo; modò *ruſum*, quod ſæpe contingit ob tranſpirationem impeditam, phthiſin, & quandoque ob erapulam, aut febrem inchoatam.

Urinæ naturaliter ſe habenti contenta præternaturalia craſſiora interdum inſunt, quæ alicujus partis circa vias urinarias affectionem denotant; unde pus, aut ſanguis fluor albus, ſemen corruptum, aut ſimilia urinæ permilcentur: & facile dignoſcas, interrogando quomodo in hoc aut iſto loco æger ſe habeat, quæ pars ſit affecta, ut recolendo qualem morbum ejusmodi urinarum ſedimenta indicent, de natura affectûs certior fias.

Cùm urinæ aliquamdiu ſteterint, eiſque ſedimenta alba, & copioſa ſubnaſcantur, non facile erit primo ſtatim aſpectu dignoſcere undenam ea prove- niant, ſcilicet an à tota cruoris maſſa, an à particulari tantùm viſcere ſeri, aut feminis præparationibus dicato? Etenim ſanguinis, & ſucci nervoſi impurita- tes ſub ſpecie farinacea ad fundum matraccii depoſitæ, ſæpe fluoris albi in fœ- minis, aut gonorrhœæ in viris ſuſpicionem Medico movere aſſolent: etiam in lotio contenta ferè ſimilia cernuntur, quæ à partibus urinariis, ac quæ à ſpermaticis procedunt. Inter has ambiguitates ne *επομάντις* temerariâ confi- dentiâ non ſolùm incerta pro certis, ſed inſuper falſa pro veris referat, ejus- modi urinarum discrimina poterit hoc ritu indagare. Si contenta ſint univer- ſalia, eorumque indicia maſſæ ſanguineæ applicari debeant, ut plurimum à prima miſtione (niſi aliquando fortè in *διεργασίᾳ* critica) iſthæc (utpote in ſub- ſtantia tenuiori) ſunt omninò inconſpicua: dein urinâ à frigore turbatâ tardè ad fundum deſcendunt: & poſtquam ſubſiderunt à calore matraccio adhibito eorum apparentia ruruſus deletur: ſi verò *ὑποσήμελα* iſthæc alba à particulari foco amandantur, urinam recens emiſſam illico turbant, & incrallant, citò præcipitantur, & à calore minimè evaneſcunt: ut verò conſtet cui viſceri par- ticularia ejusmodi contenta adſcribenda fuerint, ex aliis circumſtantiis facili negotio eruendis innotefcat.

III. Urina quandoque à naturali ſtatu proriſus alteratur; color, & contenta quæ ineſſe debuerant, deſiderantur, & aliena ipſi inſunt: tum verò indicatur, intemperiem in toto corpore aſeſſe, & coctionem in viſceribus, & vafiſ depra- vari; tunc dicas ægrum febre laborare, dein interrogando diſcas, & ſtatim pronuncies quod caput doleat, quod ſiti, ardore, anorexia, vigiliis, & aliis ſymptomatis hinc conſequentiâ quadam deducendis afficiatur.

Aliquando accidit urinam à naturali ſtatu deſlectere, tamen affectum, de quo

quo æger conqueritur, minimè referre; & vel ostendit morbi causam, vel partis alterius cum affecta consensum: ut si quis de immani cephalalgia, aut tremore cordis queratur, & urinam exhibeat aqueam, illa non denotat ipsos affectus, sed tantùm cruditatem in ventriculo, necnon lienis, & viscerum circumcirca obstructions, quæ possunt esse istorum affectuum causa. Dico ego quod in hoc casu, urinâ inspectâ, præcipuæ indicationes circa medendi methodum desumuntur, & remediis utimur nec cephalicis, nec cardiacis, sed vel catharticis, quæ vomitum aut purgationem moveant; aut deobstruentibus, & imprimis chalybeatis: interdum verò urina est vitiosa, tamen ab affectu de quo æger queritur, ejus significatio est prorsus aliena; ut si quis comati, aut lethargo obnoxius eam reddat rubicundam, & contentis præternaturalibus saturatam, ejus inspectio optimè coindicaciones suggerit, scilicet ne remediis nimis calidis, sed temperatis insistamus.

Præcipuus *ὑποπίσεως* usus erit in observandis morbi cujusvis statu, & progressu, necnon alterationibus versus salutem, aut mortem. Etenim in affectibus chronicis ex urina quotidie inspecta Medico innotescit quibus gradibus ægritudo in dies accrescat; quo tempore remedia purgantia, aut alterantia erunt magis opportuna; qualia medicamenta sunt maximè proficua. Hinc observare est, an natura morbo prævaleat, necne? Certissimum hinc prognosticum elicitur de spe, aut periculo convalescentiæ, prout nimirum coctionis, aut cruditatis signa in urinis apparent. In morbis acutis hinc status, & *ἄκμῃ* febris optimè prænosceatur; quo tempore crisis, & quo successu speratur; quando evacuationibus, & quando cardiacis tempestivè insistendum est. Non certiori fide, aut majori diligentia pyxidem nauticam intuentur naucleri, quàm pro idoneis medendi temporibus, & modis urinarum phænomena observare debent Medici.

Hæc sunt quæ circa judicia urinarum, non è vanis agyrtarum traditionibus collecta, sed rectæ rationi, & veritati consona in promptu erat dicere. Scio præterea à medicastriis, & mulierculis innumeras ferè *ὑπομαντείας* regulas, & præcepta passim tradi, ut matulâ tantùm inspectâ divinare præseferant, an sit vir, an fœmina qui ægrotat, quamdiu decubuerit, quali morbo labores; utrum affectus in mortem, an salutem desinet; an patiens amoris, aut tristitiæ affectibus sit obnoxius; utrum mulier utero conceperit, necne? & an gravida marem, an fœminam paritura sit; & sexcenta alia, in quibus vel inani conjecturâ utentes, confidentiâ suâ credentium animis imponunt; vel (quod crebrius iis in more est) callidâ versutiâ rem aliter exquirendo indagantes notitiam suam urinæ inspectioni falsò ascribunt.

C A P U T VII.

De Urinarum examine, & variis probationum modis.

Licet apparatus circa examen & inspectionem urinæ vulgo tantum simplex adhibeatur, scilicet lotium vitro immissum medicastri, & agyrtæ plerique intuentur, parum conquassant, indeque statim judicium ferunt; tamen quibus

quibus ægrotantium salus cordi est, res paulò intricatior videtur, & circa *ὑποκρίαν* circumstantiæ quædam observari solent, quibus omissis nihil certum, aut in praxi medica reverà directorium è matraccio ediscitur. Insuper in quibusdam affectibus, præter meram vitri inspectionem habentur alii probationum modi, quibus circa urinas quod in recessu latet, visumque effugit, palam fiat: unde earum *evaporatio*, *destillatio*, *putrefactio*, etiam *precipitatio* non inutiliter à quibusdam *ὑποκρίων* accuratiùs curantibus in usum assumuntur. Quapropter de recto lotium inspiciendi modo, & in casibus nonnullis analysi variè instituenda breviter dicemus.

Cùm urina ægrotantis Medico offertur, si priùs eadem aliquandiu in vitro steterit, atque si liquor sit diaphanus, hypostasis velut in nubeculam collecta, & reliqua contenta ad fundum subsiderint, nihil ultra deest, quin protinus sententia *Συμφοτικῇ* proferatur. Sin lotium matraccio aut recens infunditur, aut priùs conquassando perturbatur, expectes dum partes confusæ denuo segregentur, & debita subsidentiae loca acquirant. Quod si liquor contentis saturatus, poris à frigore constrictis turbidus, & opacus evaserit, vitrum in loco calido detineatur, donec lotium denuo clarescat; & deinceps aliquandiu prope focum collocetur, ut dum contenta præternaturalia, aut tenuiora, poris à calore dilatatis absorbentur, aut crassiora in fundum decidunt, filamenta hypostasim constituentia (si aliqua adfuerint) in media regione, aut paulò inferiùs simul congregentur; ita enim constabit quæ sit natura, & qualis morbi potentia: item in febribus caloris & effervescentiæ gradus, humoris nutritii coctio, aut depravatio, etiam materiæ adustæ in sanguine congestio, ejusque secretio incepta, aut prorsus frustrata, significatione ab urinis desumptâ nonnihil elucescunt; quare hoc etiam modo procedere oportet, si quando urina à longinquo adfertur, cujus nimirum particulæ multâ concussione perturbatæ, nisi in loco tepido aliquandiu detineantur, haud facilè repetunt positionum suarum loca. Sin ægrotum in proprio cubili degentem crebrò invisurus sis, opportunum erit, ut urina recens micta, & matraccio indita circa hypocautum collocetur; quæ dum modicè intepescit, singulæ partes sine quavis perturbatione optimo disponuntur subsidentiae modo.

Postquam urina ita nudè, & quasi omni velo discooperta intuitui offertur, proxima erit cautio ne aliqua ejus phænomena accidentaliter contracta, & non propriè ad ipsam spectantia Medico imponant; quod reverà aliquando accidere solet propter alterationes in illis à cibis assumptis excitatas, quæque imprimis consistunt in *calore*, & *odore* urinarum, præter naturam, & Medici expectationem variè immutatis.

Enimverò error satis vulgaris committi solet, cùm urina à rhabarbaro, croco, semine fantonici, aliisque ore ingestis flavescens, & lintheamenta tingens, indubitatum icteritiæ signum creditur; etiam à crassia lotium nigricans humore atrabiliario imbutum dicitur; quandoque etiam à jure cicerum, aut decocto rubiæ tinctorum, aliisque epotis, urinam rubore saturatam æstimamus (falsò licèt) intemperiem febrilem indicare. Non rarò accidit à potu tenui copioso urinae colorem intensum præter expectationem minui, atque à fortiori potu, atque alimentis calidioribus intendi: cujusmodi mutationum

causæ ni Melico innotescant, de lotio inspecto iudicium non nisi falsum adhiberi poterit. Cum itaque sine causa manifesta color in urinis immutatur, victus ratio inquiratur, ut si forsan ab ingestis alteratio procedat, ne perperam ascribatur morbo. Quæstio hæc oritur, cur si quidem pleraque ore assumpta, priusquam in lotium facessant, colores insitos omnino amittunt; aliqua tamen sunt, quæ comesta sero tincturam imprimunt pertinacem, adeo ut per omnes ductuum anfractus illibata transeant? Cujus rei causa in hoc cardine versatur, quod mixta nonnulla particulas chromatismi constitutivas habent valde subtiles, easque insigniter volatiles: quare hæc in exigua tantum quantitate ingesta totam chyli massam colore suo inficiunt; & deinde succus nutritius sanguini convehendus coloratus ascendit, ejusque vehiculum, scil. latex serosus, usque tinctus amandatur.

Qualis sit odor ab urinis sanorum, unicuique propriam quadamtenus olfacenti obvium est: scil. dum recens mingitur, ob particulas sulphureas, & salinas in liquoris compage constrictas haud valde ingratus est: cum aliquandiu steterit, ut mixtione solutâ sulphur sale aculeatum exhalare inceperit, graviter putescit: præterea autem observare licet, quod aliquando urinæ recens factæ odorem suavem, scil. violaceum, expirant, atque interdum foetorem valde ingratum naribus objiciunt. Prius nec à sano, nec in salubri corporis statu dependet, verum ab assumptis solummodo producit. Terebinthina, nux moschata & alia quædam gummi, & aromata, diversæ licet naturæ, aut operationis, ori ingesta urinæ planè similem odoris suavitatem impertiunt. Hujus ratio videtur esse, quod in hujusmodi mixtis sulphuris purioris (hoc est spiritibus imbuti) particulae complures emineant; quæ cum volatiles fuerint, sero confusæ mixtionis vinculo non continentur: quare lotio excreto statim hæc solitariae, aliisque urinæ foetidis incommittatæ exsiliunt, ideoque odorem satis gratum diffundunt; qui licet à comestis diversimodis concitetur, usque tamen eodem modo violaceus perstat, eo quod in omnibus sulphuræ istæ particulae digestionem ab aliis ejusdem concreti adjunctis liberantur, neque alienis à lotio inficiuntur. Quod verò ad urinam foetentem spectat, ista nonnunquam ab ulcere circa renes, vesicam, aut vias urinarias confito procedit; quandoque etiam à calidiori renum, aut totius corporis intemperie suscitatur: cum enim sulphur saturatè nimis sero incoquitur, ejus particulae cum salinis aculeatæ (utpote minùs arctè conclusæ) protinus evaporant, & olfactus sensorium graviter feriunt: præterea autem aliquando à comestis urinæ foetorem contrahunt. Etenim Balsamus sulphuris, allium, rad. asparagi, pomaceum, vinum Rhenanum, & alia pleraque ore ingesta urinæ graveolentiam accersunt: hujus ratio si inquiratur, dicimus quod talia quæ urinæ foetorem imprimunt, etiam in quantitate uberiori eam provocant; quare videtur quod ejusmodi assumpta sanguinem fundunt, & feri præcipitationem valde accelerant: cumque hoc ritu latex serosus à cruoris massa velut abruptè divellitur, liquoris compages laxa efficitur, neque partes exactè miscentur, nec crasseos æquabili vinculo continentur: quare cum lotium istud corpore excernitur, compage ejus prius solutâ, sulphuris crassioris (hoc est cum Sale combinati) particulae citò expirant, adeoque tetrum odorem diffundant. Etenim urina ab assumptis hoc modo alterata li-

xivio, cui Antimonium aut Sulphur commune incoquitur, atque acidum quodvis postea instillatur, persimilis videtur: quippe in hoc decocto, prout etiam in tali lotio, reſeratâ liquoris compage corpuscula Sulphurea protinus erumpunt, & gravi fœtore sensorium percellunt.

Quod si supra visus, & olfactus examen quispiam curiosus urinarum explorator ulterius indagare velit, in promptu erit diversimodâ *ἐν ἑκαστῇ* eas in partes resolvere, ac velut ad vivum dissecare, indeque directiones Medicas non levis momenti elicere; quippe in morbis quibusdam chronicis, ubi sanguinis dyscrasie exactius perquirendæ sunt, ut in eo Salis, & Sulphuris proportio, & temperatura ritè investigentur, convenit interdum urinas *evaporare*, aut *destillationi exponere*; nam ex iisdem *precipitatis*, aut *putrefactione resolutis* nonnihil ediscitur. Novi fœminam honestam squammosa cutis fœditate graviter afflictam, quæ nimirum quotidie materiæ velut furfuraceæ copiam ingentem scalpendo excutere solebat, cujus urina in scutella evaporata sedimentum crustaceum & salinum, excremento isti cutaneo simillimum, vasis lateribus adhærescens reliquit. Olim viri prænobilis motibus convulsivis, & musculorum tensionibus dolorificis graviter obnoxii urinam evaporavi, cui in fundo quantitas Salis, & materiæ Tartareæ dimidium integri liquoris pondus excedens remansit. Hoc modo facile erit principii Salini in sanguine, & humoribus proportionem invenire; utrum verò Sal iste volatilis, an supra modum fixus evaserit, urinae *destillatio* palam reddet: nam si Spiritus (ita dictus) ex urina copiosus prolicitur, & præterea Sal in Alembicum ascendit, volatificationis signum est: huius verò contrarium Salis fixitatem arguit.

Sicut urinae *evaporatio*, & *destillatio* principii Salini valorem ostendunt, ita *precipitatio*, & *putrefactio* Sulphur, & crassiora urinarum contenta, velut in pondere, & mensura patefaciunt. Quoad prius, licet urina sit liquor salus, & sæpe contentis gravidus, tamen quatenus particulæ ejus salinæ non sunt (veluti in plerisque menstruis assolet) aut prorsus in fixitatis aut fluoris statu, sed maximâ ex parte volatiles; ideo haud facile, neque statim à quovis falso infuso præcitationem subit: Spiritus vitrioli cæterique acetosi nihil efficiunt, Sal Tartari perturbationem exiguam concitat. Aluminis verò solutio, in quantum spatiola valdè constringit, mox totum liquorem maximè perturbat, atque omnia urinarum contenta, velut latebris extrusa, palam oculis conspicienda tradit. Quare hoc ritu sine longa subsidentie mora illicò dignoscas, quantum materiæ sulphureæ, & terrestris, & cruoris massæ pro recrementis in sero deponitur.

Urinarum *putrefactio* singulas cujusque generis particulas adhuc magis distinctas, & velut seorsim dispositas exhibere solet; namque si lotium per plures dies in vitro immotum steterit, *colore*, *odore*, & *consistentiâ* plurimum alteratur: est enim color intensior, odor ingratus, & summè fœtidus, consistentia crassior, non rarò in superficie lanuginem modò albicantem, modò lividam asciscit; etiam in vasis fundo sedimentum crassum & copiosum, & sæpe in lateribus crustam arenaceam, sive Tartarum coloris albi, vel cineritii affigit. Ex hujusmodi phænomenis, & quatenus urinae citius aut tardius putrescunt, indeque plus aut minùs à priori statu alterantur, conjicere licebit,

quanta sit Salis, aut Sulphuris proportio, utrum istorum unum alteri præpolleat; etiam de materiæ terrestris, siue contentorum qualitate, & copia hinc non infidum desumetur iudicium.

Ita demùm habes (Vir amicissime) ἐποκρίσεως doctrinam, siue methodum, qualemqualem tenuitas nostra adornare potuit. Dissertationis hujus & sterilitati, & erroribus non tantùm agnoscas velim, verùm aliàs eadem excusata habeas. Quippe hortatu vestro hæc primùm scripta, atque ex tuo solummodò arbitrio, & jussu etiamnum publici juris fiunt. Quare foetum istum invitâ quasi lucinâ ferè per abortum editum, ceu exposititium, & meritò ἐπὶ οὐκλήρον ad limen tuum dimissum fac cures.






CEREBRI ANATOMIE,

CUI ACCESSIT

Nervorum Descriptio & Usus.



PRÆFATIO.



B effoso erutoque Capite humano aternitatem sibi & Imperio, veluti optimis auspiciis, promiserint olim Romani; neque orbem Capitolio superstrui posse iis persuasum est, nisi defuncti hominis Cranio inadificaretur Capitolium.

Non is sum, qui imperia in artibus medicor, aut de devicto literarum orbe triumphos mihi spondeam: At interim documentis satis illustribus dudum deprehendi, frustra omnino, nisi illis ipsis auspiciis, in Philosophia praesertim Naturali, adlaborari.

Deposcente enim illa quam in hac Academia sustineo Provincia, ut de Sensuum, qua externorum, qua etiam internorum muniis, de Anima facultatibus affectibusque, necnon horum omnium organis & vario apparatu commentarer; & in eam rem rationum syllogas aliquot, & phanomenis non abludentes hypotheses excogitassem, quae (ut fieri in istiusmodi negotiis amat) in systema quoddam artis & doctrina compagem demum accreverant: Tandem verò cum, deflagrante inventionis impetu, singula retractarem, & ad severiores calculos exigere, is mihi videbar esse, qui ceu pictor aliquis, Caput humanum non ad Archetypi alicujus fidem, sed audacis penicilli arbitrium delineaverat, id secutus, non quod verius, sed quod accommodatius, quodque optavit potius referret, quàm quae cognosceret. Hac serio apud me pensitans, tandem velut ex placido evocatus somnio tristis evigilavi; puduit nimirum me hucusque precario fuisse Philosophum, & Poeticam quandam Physicem, novitate imprimis & conjecturis affabrè atque concinnè

sese excipientibus, Auditores meos & meipsum delinivisse, & utrisque nostrum, ceu incantamento & prastigiis, fecisse fucum.

Quamobrem, mora omni seposita, aliam protinus inire viam serio apud me statuo, inque hoc unum incumbo, ut non ex receptis aliorum placitis, non propriae mentis suspicionibus & auguriis, sed in posterum ex Natura & Ἀπορίας fide penderem. Itaque totus deinceps sum in studio Anatomico: cumque in Cerebri ejusque appendicis Nervosi munera ac usus potissimum inquirerem, Caputum imprimis cujusque generis crebra apertioni, & contentorum quàm possim maximè seria ac sedula inspectioni me addico; ut postquam totius, & partium singularum figura, situs, processus, eorumque ad alia corpora respectus & habitudines exactè perpenderentur, circa œconomia animalis exercitium, defectus, & anomalias quiddam veritati subnixum tandem aliquando eliciatur; adeoque basis firma & stabilis jaciatur, cui non modò Physiologia certior, quam in Scholis profiteri teneor, sed & quam diu meditatús fueram, Cerebri & Nervosi generis Pathologia superstruatur.

At verò huic operi accuratius perficiendo, cum mihi nec otii, ac forsàn è proprio Marte non virium satis suppetere, auxiliares aliorum manus accersere non erubesceram. Atque Medici hîc imprimis Doctissimi, & Anatomices summè periti, Domini Richardi Lovver, ope ac socia usus sum opera; cujus sane & cultelli & ingenii aciem mihi in corporum prius abditorum tum fabrica, tum muniis melius indagandis, emolumento fuisse lubens agnosco. Quare hoc comite & coadjutore ascito, nulla fere dies sine administratione quadam Anatomica transibat; ita ut brevi temporis spatio, de Cerebro, ejusque intra Cranium appendice, nihil non planè detectum & nobis intime perspectum videretur. Post hac, cum pensum longe difficilior, & ἀποτομικὴ scilicet aggredieremur, tunc plurimum emicuit Viri hujus solertia plane admiranda, necnon indefatigabilis industria, nulloque obice sistendus labor: Nervi enim cujusque, utut minuti, ac intra alia corpora immersi, ac varie impliciti, divaricationes omnes quaquaversus oberrantes exactissima indagine prosequutus, adeoque ramorum & propaginum cujusque Paris longe lateque diffusorum labyrinthos evolvens, eorundem, uti & multorum sanguiductuum schemata, sive Iconas, cujusmodi in hoc tractatu prostant, Ichnographicas propria manu exaravit; quæ quidem ut sine falsi crimine aut erroris labe fideles prorsus ac emendatissima prodierint, id egit, ut vix ullam Tabula contineat lineolam, aut levissimum ductum, cujus conformatio, & exacta habitudo non plurium animalium, eam ob causam mactatorum, indicibus comprobata fuerit.

Præter

Præter suppetias ab hujus manu in dissecando peritissima allatas, celare non decet, quantas insuper acceperim à viris Clarissimis, Domino Th. Millington, Med. Doctore, nec non à Domino Chr. VVren L. L. Doctore, & Astronomiæ Professore Saviliano: qui utrique dissectionibus nostris crebrò interesse, & circa partium usus rationes conferre solebant. Porro, prior ille Vir Doctissimus, cui privato observationes meas & conjecturas de die in diem proponebam, me animo incertum, & propria sententiâ minus fidentem, suffragiis suis sæpe confirmabat. Caterum alter, Vir Insignissimus Dr. VVren, pro singulari quæ pollet humanitate, plurimas Cerebri & Calvaria figuras, quò exactioris essent opera, eruditissimis suis manibus delineare non fuit gravatus.

Quaquam autem istis praesidiis instructus, & horum Illustrum Virorum velut auxiliaribus copiis stipatus in arenam prodeam; haud tamen me à calumniis tutum esse, imò nec culpæ & justissimæ reprehensionis immunem, fas est ut præsumam: Quippe in Cerebri, ejusque partium & appendicis, tanquam claustris obsignati recessus ac penetralia hîc inquiritur; de quorum certè muniis vix quiquam proferre promptum sit, quin quod, ut Doctiorum judiciis elimari & provehi, ita malevolorum convitiis proscindi & convelli possit. In aliis partibus, ubi sensu arbitrio res omnes sistuntur, non ita facile in errores impingimus. In plerisque siquidem visceribus & vasis τὰ ἐσώρρυα, sive humores contenti, necnon meatus eorû intra ampliores partû continentium cavitates visu discernuntur: In Cerebro autem & Nervis, neque τὰ ἀσώρρυα, scilicet ipsi spiritus animales, nec eorum tractus aut vestigia quovis modo percipi possunt. Quare Cerebri usus explicare velle, æquè difficile pensum videtur ac Animam depingere, de qua vulgo pronunciari solet, quod omnia intelligat præter seipsam: perinde enim indefessus Cerebri labor corporum aliorum adyta perlustrat, propria interim ditionis & familiæ æconomia ignorata prorsus ac occultata.

Quod verò in sequenti Tractatu à nobis fideliter præstitum esse profiteamur, atque aliis emolumento futurum speramus, hoc imprimis est; nempe, quod partes ipsas, quarum Anatomia instituitur, non temerè descripsimus, sed phænomena varia, & observationum syllagas, multiplici dissectione, diligenti cura, & summa fide collegimus. Si quæ ex postulatis & diagrammatis illis, quasi ad matheseos ritum delineatis, exinde colligi deberet Theoria, manca adhuc, necdum omnibus numeris absoluta appareat; non dubito, quin longior dies, & plurium observationum accessio ei formam ac perfectionem ulteriorem conciliet; ut non irritò prorsus omine Antiquitas dixisse videatur.

Ex aperto Cerebro, obstetricantibus etiam Vulcani ferramentis, Minervam enatam fuisse. Nam aut hac via, scilicet per vulnera & mortes, per Anatomiam, & quasi Cesareo partu in lucem prodibit veritas, aut semper latebit.

CAPUT I.

Cerebri dissecandi methodus, sive administratio Anatomica proponitur.

INter varias corporis animati partes quæ disquisitioni Anatomicae subjiciuntur, nulla facilius aut melius cognosci posse præsumitur, quam Cerebrum; interea tamen, ut nulla minus ac imperfectius sciatur. Totum hujus, quod *prima facie*, seu in *fronte* eminet, ac vulgo describitur, post rudem quamlibet sectionem, uno fere aut altero intuitu conspicitur; sin vero quæ in *recessu* latent, requiras, novi subinde sinus, & corporum prius abditorum productiones ubique panduntur: Quinimo ipsius Cerebri partes adeo complicatae & involutæ existunt, earumque ad invicem respectus & habitudines ita extricatu difficilēs sunt, ut perfectam ejus *Anatomiam* instituere, pensi magis ardui videatur, quam *labyrinthi* cujusdam *flexiones* & *maandros* velle in plano delineare: Quippe sicut hujus, ita neque istius fabricæ aut ichnographiam depingere, aut mensuram æstimare possumus, nisi prius diruta subiecti mole, & compage ejus in minutias dirempta. Hinc factum quod veteres Anatomi, in Cerebro dissecando, quid *primum*, quid *secundum*, quidque *deinceps* ordine naturæ collocaretur haud satis attendentes, globum ejus quasi in taleolas resciderint, & phænomena è tali sectione casu emergentia, pro veris Cerebri partibus facile habuerint: cùm interea tamen ab aliis dissectione aliter instituta, partes & processus ejus à prioribus longè diversi appareant. Cujus ratio est, quod Cerebri ejusque appendicis compages intra cranium contenta ita se habeat, uti plura Tubera cum variis caudicibus sive pedunculis simul compacta: quæ omnia licet ab invicem distincta, & figuris diversimode expansis prædita sint: ipsa tamen, quo minori spatio contineantur, in eundem veluti globum compinguntur, adeoque inter se complcantur, ut difficile sit reperire, ubi *Cerebri principium* ac *finis*, necnon ubi partium prope adjacentium limites & dissepimenta consistunt; porro, quo singulæ τὰ ἐγκέφαλα partes ita complicatae situm suum retineant, neque statim ab invicem solutæ resiliant, in debitas plicaturas fibris & membranis à parte in partem protensis connectuntur. Ac proinde quoties Cerebri ita conglobati moles secatur, toties ferè necesse est ut assula abscissa partium diversarum portiones unà cohærentes secum auferat. Quapropter ut vera & genuina Cerebri descriptio exhibeatur, priusquam ejus substantia aut continuïtas dissolvitur, ante omnia, tota ejus moles explicari, & membranarum nexu penitus soluto, singulæ partes in proprias dimensiones evolvi & expandi debent. Quo ritu hæc fiant, & quali methodo Cerebri dissectio, sive *administratio anatomica* optimè peragatur, hic imprimis ostendere oportet; dein
his

his præmissis, Cerebri descriptionem, unâ cum partium ejus singularum usu & actione, explicatius trademus.

Ut perfecta *Cerebri* ejusque partium notitia obtineri queat, non modo capita humana, verum aliorum cujuscunque generis Animalium dissecare ac inspicere oportebit: nam præterquam quod hominum cadavera non ita præsto habentur, ut Cerebrum de die in diem intueri, ejusque fabricam, & partium situs sedulo perpendere, earumque ad invicem respectus, habitudines, & dependentias eruere liceat; insuper etiam ipsius Cerebri humani moles immensa impedimento est, quo minus accuratè intricatissima ejus compages, variique recessus & appendices discerni & investigari possint: quæ quidem omnia, velut in epitomen redacta Zootomia magis commode & plane refert. Quare cum in *cane*, *vitulo*, *ove*, *porco*, & *plerisque aliis quadrupedibus*, Cerebri forma & compositio (magnitudine solum excepta) parum differant ab ejusdem figura & partium diathesi in *homine*, satius duxi *Cerebri Anatomem* quandam è crebra cujuscunque generis animalium dissectione componere. Atque in hoc negotio, si quidem ostendero communitates & differentias quas in variis animalibus inter se & cum homine collatis, subjectæ partes obtineant, certe ex tali *Anatomia comparata*, non modò *cujusque organi facultates & usus*, verum ipsius *animæ sensitivæ vestigia, influentias, & secretos operandi modos* detegere licebit. Circa animalium Capita, in quibus dissecandis nos potissimum exerceri convenit, observare est, inter *hominem & quadrupedes*, item inter *volucres & pisces*, quoad præcipuas τὰ ἑγκεφάλου partes analogiam insignem intercedere: Cum enim mundi recens conditi producerentur primi incolæ, ut *una dies volucres simul & pisces, altera hominem & quadrupedes* pariter exhibuit, ita & utriusque *speciebus Gemellis* cerebri fabrica similis existit; sed inter *istam* prioris, & *hanc* sequentis diei *prolem*, quoad partes istas, magnum discrimen reperitur. In quantum igitur *homines & quadrupedes* Cerebra perfectiora & inter se magis similia obtinent, ab illorum inspectione observationes nostras ordiemur: dein postea ejusdem Cerebri in volucrum & piscium genere anatomias tradituri. Atque hic imprimis circa *hominum & quadrupedum* Capita (prout modo innuimus) ipsius *dissectionis* sive *Anatomicae* administrationis methodum proponemus, simulque partes omnes seriatim & compendioso quasi catalogo recensebimus; deinde Cerebri, ejusque appendicis particulas, brevi in tabella sic adumbratas, mox latius protrahemus, earumque *usus & actiones* pro cujuscunque facultatis exercitio designabimus.

Cum itaque *hominis* vel *canis*, *vituli* aut *ovis* Caput præ manibus habetur, velamente ejus exteriora (de quibus utpote satis notis, parum solliciti sumus) seponantur: tum *crani tegmine* ferra diviso & adempto, ex omni parte ossa ad calvariaë basin forcipibus aut scalpro diffringantur, ita ut contenta, quantum fieri possit, simul intuentibus omnia palam fiant. Igitur quod *primò* in conspectum venit, est *dura meninx* communi integumento cætera quævis includens. Hæc membrana *exterior* & *superne* in quibusdam locis, præcipuè circa suturas, calvariaë connectitur; at vero circa *basin* cum ossibus arctissime cohæret, ita ut facile divelli nequeat: *Interior* (sive in *concava* ejus superficie) satis laxa & soluta est, nisi quod juxta *sinus omnes* per venarum *insertiones*, ac in *calvaria* basi per arterias & *nervos pia matri* alligetur.

Eadem hæc membrana inter cerebri, ac præterea ipsius & cerebelli interstitia sese per unum latus alte insinuans, & ex altero emergens, duplicaturas quasdam relinquit, quibus ejusdem membranæ coalitu superius occlusis, cavitates, quas vulgo *sinus* appellant, efformantur: nimirum ista fere ratione *tres* priores *sinus* constituuntur; *quartus* autem ejusdem membranæ oblongus & teres, simulque cavus processus est, qui per Cerebri interstitia, juxta finem corporis callosi usque ad glandulam pinealem demittitur. Sinuum majorum cavitates pluribus in locis velut cellulis quibusdam interstinguntur: eo, ut videtur, sine, quo sanguis ita per varios anfractus in sinibus istis transiens, à motu rapidiori inhibeatur.

Porro hæc *meninx* ex utroque latere *duas* admittit *arterias*; quarum *una* conjugatio non procul ab arteriis *carotidibus* per foramina ossis *cuneiformis*, *altera* vero ex osse frontis emergit: quæ quidem omnes per superficiem membranæ exterioris diffusæ eam irrigant; terminantur autem *partim* in *Calvaria*, præsertim juxta suturas, quo sanguinem convehunt; & *partim* in *sinibus*, ubi quod superfluum est deponunt. Insuper hæc arteriæ quibusdam in locis supra cerebri verticem (uti *Webferus* observat) duram meningen perforant, ac *pia matri* surculos quosdam impertiunt. Denique, *superficies* exterior hujus meningis tam crebris venarum propaginibus quam arteriis nusquam consita est: verum è *quatuor* ejus *sinibus* (qui sanguinis *receptacula venosa* sunt) per interioris hujus membranæ superficiem venæ plures exeunt, quæ statim *pia matri* insertæ per totum ejus ambitum disseminantur, eademque quaquaversus è sinibus delapsæ arteriis è capitis basi ascendentibus ubivis occurrunt, cumque iis unâ divaricatæ multiplices vasorum plexus constituunt.

Quo hæc melius conspiciantur, postquam arteriæ satis notatæ sunt, *dura meninx* juxta cranii diffracti limbum orbiculatim secetur: dein quicquid illius Cerebro & Cerebello integumento ac interstitio est, elevetur, ut vasorum, scilicet venarum, è sinibus exitus, earumque in *piam matrem* distributiones adverti queant; quibus postea disruptis, membrana cum sinibus penitus avellatur; quod vero hujus membranæ reliquum ossibus ad calvariæ basin cohæret, separetur, adeo ut integra Cerebri ejusque appendicis compages quandatenus elevari, huc illuc deduci, per totum conspici, ac demum calvariâ eximi poterit. Ista autem ut peragantur, ab anteriore parte, qua abscissum est os frontis, incipiendum erit.

Itaque Cerebri *prora* sub hoc osse recondita si parum elevetur, protinus in conspectum venient *processus mammillares*, una cum nervis olfactoriis iisdem appensis; quibus juxta insertionem dissectis, in utroque processu cavitas apparebit. Hæc in vitulis ampla & rotunda est, item aquâ limpida impleta: sed & in utroque nervo olfactorio cavitas manifesta reperitur, utrinque ad ventriculos anteriores Cerebri continuata, cui si immisso siphone insuffletur, statim tota Cerebri moles intumescet.

Post nervos olfactorios, circa *cristam Galli* *duæ* exiles *arteriæ* à Calvaria emergere, ac versus Cerebri interstitium deferri videntur, quæ tamen revera sunt carotidum rami, qui antè delati *cristæ* annectuntur, & exinde reflexi Cerebro anteriori prospiciunt.

Hiscæ vasis ibidem dissectis, nervorum opticorum coalitus & exitus succedunt; quorum trunco abscisso, paulo inferius *infundibulum*, & ex utroque ejus latere, *arteria carotides* ex osse Cuneiformi emergentes apparent; quæ cerebro elevato clarius conspiciuntur. His item discissis, & cerebro ulterius reclinato, *nervi oculorum motorii* continuo se produnt; & sic deinceps *cætera* nervorum *paria* ordine succedunt, ut eorum uno pari abscisso, cerebroque cum appendice magis elevato, proximum usque intuentibus obvium occurrat, donec omnibus nervis intra cranium oriundis, item arteriis tum *carotidibus*, tum *vertebralibus* demum amputatis, tota *ἐγκεφάλου* compages calvaria eximatur.

Verum (ut hæc vasa eodem ordine quo inter disseccandum occurrunt, describantur) post *nervos* oculorum *motorios* duo *exiles* succedunt, quos ob rationem posthac reddendam, *patheticos* appellamus. Hi nervi cæteris superius pone *nates* & *testes* oriundi, & antrosum deflexi, & aliquanto spatio sub dura matre incedentes, dein per idem foramen cum prioribus simul è calvaria egressi, in oculi orbitam propagantur. Hoc par à *Fallopio octavum*, à nobis *quartum* dicitur.

Infrà hos *nervulos* utrinque è lateribus protuberantiæ annularis (quæ à cerebello demissa medullam oblongatam circumdat) duo *nervi* insignis magnitudinis oriuntur, qui postquam per *duram matrem* permeaverint, ramum alterum insignem utrinque recta deorsum extra cranium demittunt, ramo altero longiore tractu prope *Sellam Turcicam* utrinque Calvariam pertranseunte. Hi nervi (uti posthac ostendetur) provinciam amplissimam nacti, *palato*, *oris*, & *faciei* partibus, etiam *naso* & *oculis* ramos elargiuntur; quinimo & *nervo intercostali* radices impertiunt. Hoc par *quintum* appellamus, vulgò *tertium* habetur.

Juxta horum origines, ex ima medullæ oblongatæ basi duo *nervi minores*, trunco singulari præditi oriuntur, qui antè delati, & statim sub dura matre demersi, ex eodem foramine cum *nervis* oculorum *motoriis* egrediuntur, & toti in oculorum orbitas impenduntur. Hoc par à nobis *sextum* statuitur.

Proximum his nervis succedit *par Auditorium*, quod quidem altius è lateribus medullæ oblongatæ, qua parte cerebellum ipsi appenditur, nempe juxta processum annularem minorem exoritur; unde mox duplici processu in foramen ossis petrosi defertur: Ramorum ejus alter durior est, motui potissimum inserviens: alter omnino medullaris & mollior, quasi sensui tantum destinatus.

Paulo inferius oritur *per vagum*; quod vulgò *sextum* dicitur. Hoc multis *nervis* constare videtur, quorum plures una oriuntur; iisque accedit alter trunco majori præditus, qui ab extremitate medullæ oblongatæ, imo ultra hanc, è medulla spinali productus cum prioribus unitur. Adeoque omnes velut *fasciculus nervorum* facti egrediuntur per foramen occipitis, per quod etiam exit ramus major venæ jugularis internæ. Hoc nobis *par octavum* dicatur.

Subtus *par vagum*, ferè è basi medullæ oblongatæ, Par aliud pluribus item fibris constans exoritur, quod recta descendens, & statim sub dura matre

immersum, per peculiare foramen è cranio egreditur; dein uterque nervus in truncum paris vagi inosculatus, statim versus *linguam* reflectitur. In homine protuberantia peculiaris supra medullam oblongatam adnascitur, è qua hujus nervi origo procedit. Hoc *par nonum* appellamus.

Infrà hoc in postremo occipitio, è medullæ oblongatæ jam in spinalem cessuræ lateribus, par aliud fibris etiam multis constans, exoritur: quod versus medullam spinalem tendens, *duram matrem* eodem loco subit, ubi *arteria vertebralis* in cerebrum ascendit; attamen ex ossium sinibus non nisi infra primam vertebra emergit, unde in musculos cervicis defertur; ut dubium sit, utrum hoc *par ultimum Cranii*, an *vertebraliū primum* appellari debeat.

Quando hæ partes, scilicet nervi prædicti, & arteriæ tum *carotides* tum *vertebrales*, cum venis *jugularibus* (quibus *ἐγκέφαλος* calvariæ basi cohæret) abscinduntur, eorum extremitates, quantum fieri potest, productiones factæ, aut in compage exempta maneat, quo nervorum omnium origines plane annotentur; aut eorum trunci juxta radices abscissi, in foraminibus *calvaria* relinquantur, quo illorum exitus & distributiones observari queant. Utriusque exemplaris imagines in Tabula *prima* & *secunda* delineatæ prostant.

Dissectionis opere hucusque producto, quod calvariæ residuum est plura exhibet consideratu digna, de quibus posthac speciatim dicetur. Imprimis vero exemptam *cerebri* compagem una cum *appendice* ejus perlustrare, ejusque phænomena quævis, prout dissectionis ordine succedunt, examinare oportebit.

Moles exempta, quæ *figura* aliquatenus *rotunda* ac velut sphæricæ est, in *parte* ejus *superiori* & *convexa* *Cerebrum* & *cerebellum* oculis exhibet; *basin* autem, seu *partem* ejus *simam*, *medulla oblongata*, cum extimis superiorum corporum limbis ferè totam occupat: Hæc tria juxta posita, eorumque omnium superficies exteriores *meninx* tenuior obducit: nec modo eadem laxè circumvestit, verum in singulas eorum cavitates & recessus sese altius insinuans, eas intime succingit ac obducit: cumque *hac membrana vasorum plexibus* undique intertexta sit, protensione sua eadem cuilibet parti & portioni exporrigit, adeoque sufficienti sanguinis affluxu totum irrigat. Hic considerare subest hujus membranæ *vasa*, ejusque *protensionem*.

Quoad prius, intueri licet totam subjectæ compagis superficiem vasorum plexibus, tanquam rei mirabiliter variegatæ, obductam, ejusque aspectus est veluti sylvæ fruticescentis scenographia; cujusmodi *Ideam* cerebri vasa aptius repræsentant: ipsaque melius & distinctius conspicitur, si prius *arteria carotidi* liquorem atratum injeceris. Vasa meningem tenuem intertextentia, sunt arteriæ & venæ. Arteriæ sunt quatuor, scilicet *duæ carotides*, & *duæ vertebrales*. Ex utroque latere infundibuli *arteriarum carotidum* extremitates abscissæ prostant, quarum trunci sursum ascendentes, statim ex utroque latere in ramum anteriorem & posteriorem diffunduntur. Horum *utrumque par* ad invicem inclinatum mutuo conjungitur, insuper *rami posteriores* ita conjuncti, cum ramis vertebralibus (prius in unum truncum coalescentibus) uniantur: namque arteriæ vertebrales è foramine cranii penultimo emer-

gentes.

gentes, primo *divisa* per latera medullæ oblongatæ incedunt; dein *unitæ* in basi ejus canalem singularem producunt, qui posterioribus carotidum ramis (uti dictum est) occurrens, iisdem conjungitur; & ab isto eorum coalitus loco, *ramus insignis* sub Cerebri limbo utrinque ascendit, qui super crura medullæ oblongatæ delatus, in propagines exiles & velut capillares quamplurimas dirimitur, quarum aliæ ad glandulas pone Cerebellum confitas ascendunt, reliquæ autem *plexus choroeideos partem arteriosam* efficiunt. *Carotidum rami anteriores* priusquam uniuntur, utrinque ramum insignem à se dimittunt, qui sursum repens instar rivuli limitanei, utrumque Cerebri Hemisphærium in binas veluti provincias distinguit; postquam verò rami prædicti uniuntur, denuò mox à se invicem abscedentes, ad Cerebri proram deferuntur, indèque reflexi inter Hemisphæria ejus super *corpus callosum* incedunt. Omnes hæ arteriæ, *ante* & *post* mutuos eorum coalitus, propagines & ramusculos undequaque dimittunt, quæ non modo extimum hujus sphæræ ambitum, verum ejus penetralia & interiores recessus, tanquam vineæ palmites, perreptant ac intimè succingunt. Hujusmodi arteriarum tum *carotidum* tum *vertebraliū* ramificationes ostenduntur in *Tabula prima*, quemadmodum in Homine; ac in *Tabula secunda*, prout in Ove reperiuntur.

Porro *tenuior ista meninx*, totum *ἐγκεφάλου* ejusque partes investiens, prout *arterias* è quadruplici (uti dictum est) fonte ascendentes suscipit, ita *venis* è *quatuor sinibus* dimissis, per totum referta est. Hæc vasa mutuo occurrentia invicem complicantur, & per propagines ab utrisque derivatas, & alterutris obviam factas, varièque inter se contortas, plexus retiformes fere ubi-vis constituunt; quæ quidem non modo exterius in superficie habentur, verum inter disseccandum, *ubicumque partem aliam ab alia, absque unitate soluta, secernere queas, hujusmodi vasorum plexus reperiuntur*. Quippe si hanc compagem Cranio exemptam intuearis, hæc membrana omnium anfractuum & interstitiorum summitates una colligans, & vasorum conjugationibus obducens, totum *ἐγκεφαλος* ambitum, instar pilæ tela acu picta *obvelata*, apparere faciet. Attamen si hanc sphæram projicere, & partes hujus membranæ nexu cohærentes aliàs separare pergas, illico deprehendes, quod hæc meninx Cerebri anfractuum omnium hiatus obducit, utriusque medietatis, sive Hemisphærii interstitia succingit, posticam Cerebri partem, alias solutam & laxius pendentem una contrahit, & limbum ejus quasi fimbria quadam circumdans, medullæ oblongatæ adnectit: Quodque rei summa est, Cerebri universa substantia corticalis (in qua nempe spiritus animales procreantur) hac membrana, vasorum plexibus frequentissimis confita obvelatur; verumtamen interior Cerebri expansi superficies (quæ corpus callosum dicta, omnino medullaris ac albida existit) hac membrana haudquaquam investitur; ast, vice ejus, plures vasorum *plexus*, vulgò *choroeides* vocati, intra complicaturam ejus suspenduntur, & quasi liberè fluitant. Cujus ratio est, quod cum hæc pars, scilicet *corpus Callosum*, spirituum circulationi potius quam *generationi* dicetur, ideo sanguinis uberiores influxum non admittit: nihilominus si quidem calore opus est, quo spiritus ibidem facilius circulentur, sanguis intra vasa illic per inane spatium suspensa commotus, calorem vehit ab igne intra focum accenso suppeditat. Verum intra alios omnes Cerebri

recessus, & præterea intra Cerebelli plicas, sive lamellas, imo utriusque horum & medullæ oblongatæ interstitia, hæc *meninx* se insinuat, ac vasorum distributiones interferit. Enim verò hujus membranæ *protenso* ideo magis admiranda videtur, quod peculiarem suæ originis locum nusquam habens, non tantum communi integumento ἐγκεφάλου succingit, sed insuper omnes ejus partes propriis quoque velamentis investit, earumque summitates & processus invicem adnectit. Quinimo hæc *meninx* origine multiplici ac diversimoda gaudere videtur: nam ubicumque partium aliquarum aut processuum hiatus, vel interstitia eveniunt, hujus membranæ portiones ibidem enatæ singula obducunt, ac unà colligant, iisque vasorum ramificationes exporrigunt. In *Cerebro humidiori* hæc *meninx* facilè separari, ejusque amplæ & latæ portiones digitis avelli possunt; quæ dum abstrahuntur, vasorum insertiones in Cerebri & appendicis ejus substantiam ubique liquido apparent. Denique hac ratione Cerebro ita denudato, membranisque & velamentis exuto, ipsius fabrica & *partium omnium diathesis inspectioni Anatomica* proximè subjiciuntur.

Ut Cerebri ita propriè dicti Anatome ritè celebretur, haud vulgari sectionis modo procedendum esse existimo: Verum ubi *totius ἐγκεφάλου* calvaria exempti compages coram oculis sistitur, imprimis posterior Cerebri limbus, ubi Cerebello ac medullæ oblongatæ connectitur, membranis undique discissis aut avulsis, à cohæsiōne cum partibus subjectis (quantum fieri potest) liberetur; tunc facilè constabit, quod Cerebri substantia corporibus istis haudquam unitur; verum per se, nisi quod membranarum nexu superficie tenus conjungitur, ab iis omnino libera ac independens fuerit: quinetiam hæc Cerebri puppis à vicinis partibus eo ritu divisa, si antè reclinetur, medullæ oblongatæ crura prorsus nuda, ac à Cerebro & cerebello (nisi in quibus locis hæc illi appenduntur) omnino distincta apparebunt. Porro cum Cerebri limbus à cohæsiōne sua solutus elevatur, tres ventriculi, ita vulgò dicti, in *unum inane spatium* (seu vacuitatem meram è *complicatione Cerebri* resultantem) evadent. Insuper observare erit, quomodo *Cerebrum antè tantum medullæ oblongatæ uniatur*; utque *binis in locis crurum* ejus, velut *apicibus*, affigatur, quod *fornix* ita dictus velut *subtensa*, sive *ligamentum fuerit*, quæ antè, ubi Cerebrum appenditur, exorta, ad posteriorem ejus limbum producit, cui duobus veluti brachiis expansis unitur, adeoque totam Cerebri compagem, ne in planum evolvatur, usque in figura sphaerica continet, eamque medullæ oblongatæ cruribus firmiter colligat. *Cerebri humani* à partium aliarum nexu divisi, ac sursum elevati, quo scilicet *vacuitas* à plicatura ejus resultans, & pro ventriculis habitæ, item quo *fornix*, & *crura medullæ oblongatæ* nuda & distincta conspiciantur, Figura in Tabula quarta repræsentatur.

Et vero hæc Cerebri *positio*, sive *aspectus*; nempe cum posterior ejus limbus, à medullæ oblongatæ cohæsiōne per membranas facta liberatus & elevatus antrorsum inclinatur, totam ejus compagem, quicquid nimirum *extra* aut *intus*, sive in *fronte* aut *recessu* habet, item quæ sit illius ad alias partes *habitus* & *respectus*, plane detegit, & ipsis oculis usurpanda exponit. Horum præcipua breviter, ac eodem ordine quo inspectioni occurrunt, subjiciam.

Cerebri figura, præsertim in *homine*, ad globosam, sive sphaericam nonnihil accedit

accedit: superficies exterior, gyris & anfractibus, qui intestinorum convolutionibus similes sunt, undequaque insignitur: singuli anfractus, imo totus ejus ambitus duplicem substantiam continet, scilicet *corticalem*, quæ cineritii coloris & extima est; atque *medullarem*; quæ isti substrata, subalbida apparet. Cerebrum hujusmodi anfractibus quasi *liris* & *fulcis* exaratum, in medio diffinditur, ac veluti in *duo Hemisphæria* dirimitur. Utræque tamen medietates conveniunt, & quasi fundantur in substantia similari albissima, quæ totam Cerebri molem interius obducit, ac quasi concamerat. Hæc durior quàm alia quævis Cerebri portio existit; cumque omnino medullaris fuerit, omnes omnium Anfractuum medullas in se recipit, iisque tanquam bases communis loco est. In utroque cerebri Hemisphærio, circa partes anteriores hoc *corpus callosum*, sive substantia medullaris, supra quàm in alio quovis loco longe crassior & spissior evadit; atque ibidem medullæ oblongatæ apicibus utrobique affigitur: ab istis apicibus, tanquam ortu suo, medullaris hæc substantia cerebrum obducens, & concamerans, versus posteriora expanditur, ac sensim in crassitie minuitur: demum hujus expansi limbus exterior arctius contrahitur, ac inferiùs medullæ oblongatæ caudici (uti modò innuitur) membranarum & vasorum nexu conjungitur. Porro firmioris connexionis gratia, ab anteriore corporis callosi parte, juxta ipsius apices, processus medullaris exoritur, qui Cerebri fissuram subtendens ad limbum ejus pertingit, cui velut brachiis utrinque reflexis unitur: quæ quidem brachia medullæ oblongatæ caudicem amplectuntur, adeoque istum cerebri limbum ei firmiùs annectunt.

Iste medullaris processus, vulgo *fornix* dictus, sub exorru suo *duas* habet *radices*, *albas* & *medullares*, utrasque pariter prodeuntes è corpore calloso, quæ juxta apices, ubi cerebrum appenditur coeuntes, in ipsum *fornicem* veluti processum latum transeunt, qui cerebri cameram tanquam trabes subtendit. Sub duplici hac fornicis radice transversim sternitur ejusdem magnitudinis truncus medullaris, per quem, pontis instar, transitus & communicatio quædam existit inter duos processus lentiformes, corporaque striata in iisdem radiantia. Porro è media hujus *fornicis* superficie *septum tenue* & *pellucidum* erigitur, quod toto fere ductu corporis callosi lacunari affigitur: Atque hac ratione, dum *fornix trilaterus* cameram ex cerebri complicatione ortam subtendit, cavitatem ejus apparentem in *tres veluti partitiones* distinguit, adeoque efficitur ut in ipso tres ventriculi repræsententur.

Interiores cerebri recessus adhuc clarius patebunt, si limbus ejus à medullæ oblongatæ cohæsiōe, quantum fieri potest, ex omni parte separatus & elevatus, ad latera ejusdem medullæ, quibus juxta corpora striata unitur, paulo ulterius per substantiam suam secetur, simulque fornix juxta radices discissus unà cum cerebro reflectatur; tunc enim *Cerebri compages* penitus *elevari*, antrorsum reflecti, ac in planum explicari poterit, ita ut corporis callosi in aream latam expansi interior superficies tota conspici & tractari possit. Ubi, præter medullarem & nitidissimam illius substantiam, observare est *plures lineas albas parallelas*, quæ cerebri dissepimentum rectis angulis secant; quasi essent *tractus* quidam, sive *vestigia*, in quibus spiritus animales ab uno Cerebri Hemisphærio in alterum migrant, resiliuntque.

Ad huncmodum in plerisque quadrupedibus perfectis, *cerebri compages*, veluti *sphæra in planum projecta*, *evolvi*, ejusque interior superficies in latum explicari solet. Hujusmodi item dissectionis methodus in *Cerebro humano* locum habet, ubi prorsus eadem phænomena observationi Anatomicae occurrunt. Præcipua discriminis ratio est, quod in *Homine* cerebri moles, siquidem præmagna, item longè crassior & pluribus anfractibus prædita fuerit, ideo non ita facile uti in *Vitulo* aut *Ove*, penitus inverti, ac in latam aream reduci queat: Eo usque tamen juxta limbum elevari & expandi potest, ut interiores quivis recessus in conspectum veniant. *Cerebri humani reclinati* Imaginem Figura tertia & quarta exhibent: *Cerebri autem Ovini* penitus explicati ac veluti in planum projecti aspectus in Tabula septima ostenditur.

In *quadrupedibus minoribus*, uti *Mure*, *Lepore*, *Cuniculo*, & quibusdam aliis, cerebri superficies omnino plana & æquabilis anfractibus caret; tamen à limbi complicatione & fornicis subensione, cavitas ventriculos repræsentans resultat.

Postquam omnia quæ ad Cerebrum spectant, ordine quo dictum est, perillustravimus, utrumque ejus Hemisphærium corpore calloso intus obductum, quæ appensum est, à medullæ oblongatæ apicibus dividatur & amoveatur; quod quidem exacte fiat, secando prope latera *prominentiarum lentiformium*, quæ in vulgari Capitis dissectione intra ventriculos anteriores reperiuntur: sunt enim istæ *prominentiæ crurum medullæ oblongatæ* summitates, sive *apices*, quibus corpus callosum immediate affigitur. Quando cerebrum eo ritu discinditur, ut prominentiæ, quæ medullæ oblongatæ crurum apices sunt, nudæ relinquantur, istæ per longum in medio secantur (nimirum in parte medullari, ubi corpori calloso conjungebantur) atque interior earum substantia per totum *striata* apparebit; scilicet *striæ medullares* prorsum & retrorsum ascendere & descendere videntur; ne quis dubitet, quin istæ *striæ* velut *ductus* sive *canales* facti à natura fuerint pro *spirituum* è corpore calloso in medullam oblongatam, & è contra, itu redituque. Medullæ oblongatæ crurum à Cerebro divisorum, cum apicibus suis, qui nempe sunt corpora striata, Figura in Tabula octava exprimitur.


Post hæc corpora striata medullæ oblongatæ crura aliquanto spatio divisa pergunt, dein unita in eundem caudicem, binis veluti caulibus conflatum coeunt. Medullæ autem oblongatæ caudex in tractu, scilicet ante, & post crurum ejus coalitionem, plures habet *processus*, *appendices*, *prominentias*; & *vasorum insertiones*, quarum aliquæ ex uno latere, & aliæ ex altero emergunt, ipsumque variis productionibus & protuberantiis inæqualem reddunt; de quibus in sequenti.


Figura Prima.

Cerebri humani Cranio exempti basin, cum vasorum abscissorum radicibus ostendit.

- A. A. A. A. *Cerebri quadripartiti anteriores, posterioresque lobi.*
 B. B. *Cerebellum.*
 C. C. *Medulla oblongata.*

D. D. *Nervi*





de medio S vid pag. 401. 402.

- D. D. Nervi olfactorii, sive Par primum.
 E. E. Nervi optici, sive Par secundum.
 F. F. Nervi oculorum motorii, sive Par tertium.
 G. G. Nervi oculorum pathetici, sive Par quartum.
 H. H. Nervorum Par quintum.
 I. I. Nervorum Par sextum.
 K. K. k. k. Nervi auditorii, & eorum utrinque bini processus, Par septimum.
 L. L. l. l. & c. Par vagum, sive octavum, pluribus fibris constans.
 M. M. Nervus spinalis, ad originem Paris vagi à longinquo accedens.
 N. N. Par nonum, pluribus etiam fibris constans (quæ deorsum tendentes, in eundem truncum coalescunt) qui paulò supra processum occipitis emergit.
 O. O. Par decimum deorsum tendens.
 P. P. Arteria carotidis truncus abscissus, ubi in ramum anteriorem & posteriorem dividitur.
 Q. Q. Ejus ramus inter duos cerebri lobos incedens.
 R. Carotidum rami anteriores uniti abscedunt, in cerebri fissuram pergentes.
 S. Carotidum rami posteriores uniti, & trunco vertebrali occurrentes.
 T. T. T. Arteria vertebrales, & earum tres Rami ascendentes.
 V. Vertebrali ramus in eundem truncum coalescentes.
 V. V. V. Locus designatur, ubi arteria vertebrales & carotides uniuntur, & utrinque ramus ad plexum choroeidem ascendit.
 X. Infundibulum.
 Y. Y. Dua glandula pone infundibulum confita.
 a. a. a. a. Protuberantia annularis, quæ à Cerebello dimissa medulla oblongata caudicem amplectitur.

Figura Secunda.

Cerebri Ovini cranio exempti basin & vasorum abscissorum radices ostendit, ubi arteriæ omnes ab atramento uni carotidum injecto atratae & conspectiores redduntur.

- A. A. Duo cerebri Hemisparia absque lobis, secus ac in homine.
 B. B. Cerebelli portiones laterales.
 C. C. C. Medulla oblongata.
 D. D. Nervi olfactorii juxta processus mammillares abscissi, ut illorum cavitates appareant.
 E. Nervorum optidorum coalitio.
 F. F. Nervi oculorum motorii, sive Par tertium.
 G. G. Nervi pathetici, seu Par quartum.
 H. H. Par quintum, cujus nervi truncus statim in duos ramos dirimitur.
 I. I. Par sextum.
 K. K. k. k. Par septimum, sive nervi auditorii, quorum utrinque duo sunt processus.
 L. L. Par octavum, sive vagum, cuius origo pluribus fibris unà coalescere visis, constat.
 M. M. Nervus è spinali medulla ad Paris vagi exortum accedens.

N. N.

Par nonum diversis etiam fibris distincte oriundis constans, quæ postea in eundem truncum coalescunt.

O. O.

Par decimum deorsum tendens.

P. P.

Arteria carotidis truncus abscissus, ubi in ramum anteriorem & posteriorem dividitur.

Q. Q.

Ramorum anteriorum inosculatio.

R.

Carotidum Rami posteriores uniti, & trunco vertebrali occurrentes.

S. S. S.

Arteria vertebralis triplici ramo ascendens.

T. T.

Vbi carotides vertebrali occurrunt, utrinque arterie plures ad plexum Choroeiden ascendunt.

V.

Ramorum vertebrali in eundem truncum coalitio.

V. V.

Infundibulum.

X.

Glandula alba pone ipsum consita.

CAPUT II.

Medulla oblongata, & ceteræ posteriores τῆς ἑγκεφάλου partes recensentur, earumque dissectio traditur.

Postquam igitur utrasque meninges & vasorum in iisdem ramificationes, necnon cerebri, ita propriè dicti fabricam descripsimus; cum exteriorum ejus limbum circa medullam oblongatam crura in plicas collectum, & utrumque ipsius medullarum corporibus striatis appensum ostendimus; jam reliquas τῆς ἑγκεφάλου partes ordine prosequamur.

Corpora striata seu medullæ oblongatæ apices, sunt duæ prominentiæ lentiformes, quæ intra priores cerebri ventriculos, vulgo dictos, conspiciuntur; harum capita, quæ ampliora & magis obtusa sunt, ad se mutuò inclinantur, & ferè contigua sunt: ex hujus inclinationis angulo fornix geminâ radice oritur, quibus subjicitur, & striata hæc corpora simul connectere videtur transversarius quidam processus medullaris, prout videre est in Tabula septima G. G. at eorundem corporum extremitates, acutiores factæ extrorsum reflectuntur, & trianguli acuti bina quasi latera efficiunt; quorum superficiei anteriori, corporis callosi medullæ longo tractu cohærent, ubi si hæc corpora per medium & in longum sectentur, striæ medullares (prout suprâ dictum erat) illico apparebunt. Horum figura & situs, item striæ medullares in Tabula octava apte repræsentantur.

Ubi corpora striata desinunt, proximam medullæ oblongatæ partem occupant nervorum opticorum Thalami appellati; nempe hic loci crura ejus in protuberantias inæquales assurgunt, è quorum jugis nervi optici oriuntur, & hinc antrosum ambitu quodam deflexi, circa basin ejusdem medullæ coeunt ac uniri videntur; mox iterum sejuncti, & versus oculi orbitam pergentes, calvaria egrediuntur. Medulla oblongata crura hic loci in homine ut plurimum sunt prorsus distincta, & ab invicem dehiscencia, aperturam declivem, quæ ad infundibulum transitus est, relinquunt: verum in quadrupedibus plerisque, ejusdem

eiusdem caudicis medullaris crura illic tantum inferius sunt distincta, & rimam pro infundibulo incisam habent; ast illorum juga, in quibus nervi optici origines latent, aliquatenus junguntur, & per unciae semissis spatium coalescunt: quare in *brutis* foramen unum ante hunc coalitum, & aliud pone eundem consistit, quæ ambo versus infundibulum ducunt. Hujus discriminis ratio est, quod in homine, siquidem ipsius cerebri compages perampula, ejusque medullæ ab invicem remota existunt; crura ejus, quo melius iisdem medullæ oblongatæ apices adaptentur, sejungi & à mutuo contactu in majorem aperturam deflecti oportuit. Hinc observare est, quod in *homine* crura medullæ oblongatæ, à cerebri appensione, majori inclinationis angulo ac ambitu quodam deflexa prodeunt; verum in *brutis* eadem fere parallela jacent. Quo ritu hæ partes in *cerebro humano* conformantur, *Figura tertia* item & *quarta* exhibet; quo ritu in *quadrupedibus* habent, in *figura septima* ostenditur.

Ab iisdem crurum medullarium jugis, unde Nervi optici origines desumunt, processus quidam medullares exorti, & utrinque supra foraminis secundi marginem delati, juxta radicem *glandula pinealis* una coeunt. *Hi processus* (uti videtur) sunt partes istæ, quas Insignissimus *Cartesius* supposuit esse *nervos* ad *glandulam pinealem* pertinentes: quin potius suspicor has tantum productiones esse, quibuscum nervi optici, etiam juxta origines suas, communicant. Harum figura in *Tabula septima* satis apte describitur.

Post *Thalamos nervorum opticorum*, adhuc aliæ protuberantiæ insignes, vulgo *Nates* & *testes* dictæ, superiori *caudicis medullaris* parti accrescunt, & superficiem ejus, circiter unciae spatium, obtegunt; cui tamen cum in medio non sint contiguæ, iis toto ipsarum tractu cavitas quædam subjicitur. *Hæ protuberantiæ* sunt minores in *homine*, item in *cane* & *fele*; denique, si recte observavimus, in cæteris animalibus, quæ recens edita, ad victum quærendum impotentia & minime instructa sunt: In *vitulo*, *ove*, *porco*, & similibus, longe majores apparent; in *piscibus* & *volucris* omnino desunt.

Numero sunt *quatuor*; scilicet utrique medullæ oblongatæ lateri *bina* adnascuntur: *priores*, *Nates* dictæ, sunt majores, & principales videntur; quibus *aliæ* posteriores, *Testes* dictæ, illarum velut *epiphyses* appenduntur. Quoad *Figuram*, *orbiculares* sunt, & vulgo habentur pro cerebri & cerebelli, juxta confitorum, binis utrinque cruribus, quæ scilicet incurvata & versus se invicem reflexa, una coalescere, adeoque medullam oblongatam constituere dicuntur. Verum hæc opinio, uti postea fusius ostendetur, dissectione ad nostram methodum instituta, plane concidit: Nam liquido constabit, cerebrum longe ante hæc corpora medullæ oblongatæ affigi; neque inter hæc & istud commercia quævis, nisi valde remota intercedere.

At vero si partium harum situs, earumque ad corpora vicina respectus & habitudines probè adnotentur, plane liquebit, ipsas velut regionem quandam peculiarem constituere, à *cerebro* & *cerebello*, etiam ab ipsa *medulla oblongata* prorsus distinctam. Earum situs ab anterioribus satis remotus est; satisque à medullari caudice per cavitatem seu ventriculum subjectum seponuntur: quinimo *via propria*, sive processus *unus* è medulla oblongata in has prominentias ducere, atque *alius* ab iisdem abducere, & illinc in cerebellum deferri

videtur. Hinc suspicari licet quod prominentiæ istæ (præsertim Natiformes, quæ principales sunt) *diverticula* quædam fuerint, in quæ spiritus animales à *medulla oblongata* in *cerebellum*, & vice versa, ab hoc in *illam* derivandi secedant, ibidemque propter usus quosdam animales (de quibus postea dicemus) commorentur. Quoad *viam*, qua ex *medulla oblongata* in has prominentias ducitur, manifestum est quod infra nervorum optidorum origines, utrinque processus medullaris cum villis sibi propriis descendit, qui in prominentias prædictas terminatur : Dein si ex his *exitum* quæras, æquè clarum est, è prominentiis posterioribus, qui testes dicuntur, utrinque *processum medullarem* oblique ascendere, qui in *cerebellum* delatus, per totam ejus compagem divaricatur. Quod vero prominentiæ Natiformes sint principales, & testes illarum epiphyses, sive processuum medullarium, qui exinde in *cerebellum* feruntur, capita, quibus istis diverticulis primariis adjunguntur, manifesto apparet in *Ove*, *Vitulo*, *Equo*, & quibusdam aliis, ubi cum *Nates* sint magnitudinis insignis, iis *Testes* perexiguæ molis adnascuntur, atque his planè intermediis, *processus medullares* prominentiarum priorum appendices existunt. Prominentiæ prædictæ, una ac processus medullares, qui versus ipsas ducunt abducuntque, apte repræsentantur in *Tabula quarta*, adhuc clarius in *Tabula octava*, t. t. P. P.

Porro quoniam spiritus animales in utroque promptuario & appendice resides, priusquam *cerebello* inferantur, invicem confundi & commisceri debent, idcirco *pares* utriusque lateris *prominentiæ*, velut aliis ad invicem exporrectis, mutuo coalescunt; quatenus vero coalitus istos à *medulla oblongata* distinguere oportuit, ideo cavitas intercedit, quæ à quibusdam *ventriculus quartus*, ab aliis *transitus ad illum* habetur. Hæ prominentiæ in *Homine*, *Cane*, & *Fele*, & quibusdam aliis animalibus (uti suprà innuitur) perexiguæ sunt, & ferè æquales; item, uti reliqua portio *medullæ oblongatæ*, albidi coloris apparent. In *Vitulo*, *Ove*, *Equo*, & plerisque aliis quadrupedibus, protuberantiæ priores, vulgò *Nates* dictæ, insigniter magnæ sunt, item exterius carnei coloris esse apparent, quia tenui meninge, quæ plures venas & arterias in se continet, investiuntur; quæ si separetur, interior illarum partium substantia subbluei coloris existit, qualis præterea non est in tota *medulla oblongata*. Attamen plane constat, quod sicuti in brutis, ita in homine *prominentia posteriores* priorum epiphyses sunt, quodque ab his *epiphysibus* *processus medullares* in *cerebellum* oblique ascendunt; juxta quos alii *processus* istos intersecantes, *recta à cerebello descendunt*, qui *Caudici medullari* haud inferi videntur, ast eum circumambientes, *protuberantiam annularem* constituunt. Hæc annularis protuberantia major est in homine, quàm in alio quovis animali. Porro observare est, quod ubicumque *prominentia superior Natiformis* amplior existit, hæc *inferior annularis* perexigua est; & è contra. Porro, isti *processus medullares* versus *cerebellum* ascendentes, per *processum* alterum *medullarem transversum* inter se mutuo communicant; & è processu hoc transverso duo exiles nervuli oriuntur, *quartum Par* eorum quos supra recensuimus, quippe à nobis *pathetici* appellantur. Singula horum figuris idoneis delineata *Tabula septima* satis clare exhibet.

Non procul à prominentiis prædictis, nempe inter has & rimam quæ *Anus* vocatur,

vocatur, *Glandula pinealis* collocatur. Hæc in convalli posita est, quæ protuberantias Natiformes, atque illas quæ nervorum opticom Thalami sunt interjacet; ubi loci glandula ista, modo per plures fibras exiles, ac interdum per duas radices medullares insignes, parti subjectæ affigitur; atque insuper membrana, quæ piæ matris portio est, velut in capsula includitur; cunque hæc membrana pluribus arteriis & venis refertur, etiam Vasa quædam exilia hanc glandulam subeunt.

Subter prominentias modò descriptas (prout supra innuimus) *cavitas angusta*, seu *ventriculus* longo ductu protenditur, qui licet usus quosdam egregios obtineat, tamen ipse secundariò & velut casu tantum existere videtur; in quantum scilicet utriusque prominentiæ processus inter se *conjugi*, & à substrato medullari Caudice *distingui* oportuit. In Ventriculum hunc duo patent foramina, quorum *unum* in *principio*, & *aliud* in *sine* ejus consistit: perque medium ejus ductum, *apertura declivis* versus infundibulum tendit; ita ut humor serosus alterutrum foramen subiens, protinus ad infundibulum dilabatur. Porro, in eandem infundibuli aperturam *transitus alius*, nempe per foramen primum, quod prope fornicis radices consitum est, patescit; itaut ab omni *inæquali* plaga serositates in cloacam istam ferantur; nempe per foramen primum è *Cerebri plicatura*, seu ventriculis anterioribus; per *secundum foramen*, humores qui circa *prominentias orbiculares* aggregantur, decidunt; atque per *tertium foramen*, qui juxta *Cerebelli confinia* deponuntur, exitum inveniunt. Singula hæc foramina cum distinctis ad infundibulum viis, in *Tabula septima* plane adumbrantur. H. M. T.

Supra glandulam pinealem, velut supra fibulam, *plexus choroeides* suspendi videtur: iste autem *plexus* ad hunc modum constituitur: ex utroque medullæ oblongatæ latere, quæ Cerebri limbus ei connectitur, *dua arteria* è posterioribus carotidum ramis, ubi vertebralibus uniuntur oriundæ, recta ascendunt; quæ statim divisæ, velut plures rivuli juxta confiti, versus glandulam pinealem evehuntur, ibidemque mutuo occurso terminari videntur; atque illic loci, è sinu quarto super glandulam pinealem dimisso *surculi venosi* utrinque prodeunt; qui pariter in filamenta divisi, *arteriis capillaribus* obviam fiunt, inque illas pluribus in locis *inoscuntur*, & varie *complicantur*, adeoque hæc vasa inter se plurimum irretita, & glandulis inserta, plexus admirandos constituunt: cujusmodi vasorum plexus, duabus veluti aliis expansis, utrinque super crura medullæ oblongatæ usque ad corpora striata protenduntur; attamen iis fere tantum superficie tenus incumbunt, neque ullis vasorum insertionibus, aut medullæ oblongatæ, aut corpori calloso firmitus affiguntur; adeo ut sanguis in hæc loca nullo affluxu ejus in partes subjectas facto, solummodo adduci abducique videatur; propter quos usus infra dicetur. *Plexus choroeides cum glandula pineali*, in *Tabula septima* delineantur, G. F. E.

Atque hæcenus de phænomenis supra medullam oblongatam, inter corpora striata & Cerebellum repertis; quæ quidem, cum in *homine*, tum in *quadrupedibus*, nisi quod in magnitudine solum differant, fere simili modo constanter habent. Intra hoc spatium, in basin ejusdem medullæ, plura notatu digna occurrunt: nam præter vasorum, quæ supra recensuimus, abscissorum fines, *infundibuli situs & structura* considerationem merentur: Nam pone utriusque

nervi optici coalitionem, inter crura medullæ oblongatæ ibi dehiscencia, receptaculum velut tubulatum, membrana tenui, à pia matre orta, extus obductum, atque intus medullari substantia munitum dimittitur: hujus orificium superius inter crura medullæ oblongatæ confitum est, eorumque aperturam declivem excipit; exinde tubus brevis dimissus *glandula pituitaria* inseritur. Vidimus hunc tubum in Cerebro equino penna anserina majorem, item pellucidum & aqua limpida repletum; ut nemini dubitandum fuerit, quin serosi humores hac via, de Cerebro in *glandulam pituitariam* dilabantur: quò tamen humores isti illinc ablegantur, postea inquiretur; quippe quod vulgò creditur, in palatum minimè feruntur.

Juxta inferiorem infundibuli oram, in homine due *glandulae* candicantes subsistunt, licet in brutis tantum *unica*, quæ tamen major est, reperiatur. Quis proprius sit partis illius usus, posthac dicetur: interim, sive gemina, sive unica tantum amplior fuerit, videtur quasi *aggeris* loco esse, & tenuem infundibuli membranam, ne disrumpatur, aut loco suo extrudatur, suffulcire: ex altero latere nervorum optidorum coalitus ejusmodi suffulcimenti vicem præstat.

Quod præterea in hoc spatio continetur, fere tantum sunt ipsius *medulla oblongata crura*, quæ à Thalamis nervorum optidorum versus occipitium ductu recto procedunt; cumque infra infundibulum ambo coalescant, postea toto illorum tractu, linea per medium ducta, distinguuntur. *Hæc crura homini* longe ampliora sunt quam brutis animalibus: nimirum in isto pluribus velut chordis medullaribus unâ conjunctis constare videntur; quasi in communi hoc spirituum animalium ductu, & *via regia*, totidem essent *distinctæ orbitæ*, quas spiritus, juxta varios *sensus & motus localis* impulsus, respectivè subeunt. Porro, hoc spatium medullæ oblongatæ ideo brevius & curtius in homine apparet, quia multum ejus à *protuberantia annulari*, quæ à Cerebello dimittitur, & præmagna existit, occultatur. Hujus Caudicis medullaris latera *pia mater* undequaque obducens confertissimis vasorum plexibus investit; quibus nempe calor & succus nervosus, spiritibus longe iter instituentibus, velut continuum vectigal advehuntur. Hæc de *priori medulla oblongata sectione*, sive portione ejus anteriori. Jam proximè inspectionis ordo nos ducit ad *posticam* ejus *regionem*, cui nempe *Cerebellum* adnascitur: & *processus* ab hoc dimissi aut Caudicem ejus *circumdant*, aut eidem *inferuntur*; item è qua *ceteri nervi* intra Cranium producti origines desumunt; super his deinceps ordine dicemus.

C A P U T III.

Cerebelli & processuum ejus, necnon postica medulla oblongata regionis descriptio.

INfra prominentias orbiculares *Cerebellum* inspiciendum succedit. Hujus *Figura*, instar Cerebri, nonnihil *globosa*, etiam *gyris & anfractibus* quibusdam *insignita*, inæqualis apparet; quorum anfractuum & *liras & sulcos* *pia mater* obtendit,

obtendit, eorum summitates colligat, & hiatus profundos obducit, iisque omnibus vasorum plexus exporrigit, eosque altius inserit. Attamen Cerebellum *gyris & convolutionibus* suis, haud uti cerebrum, incerto modo variegatur; verum *plica* ejus serie quadam ordinata disponuntur: namque exterior compages, *lamellis*, sive *circellis* invicem contiguas & complicatis, necnon situ parallelo per totum ambitum circumeuntibus constare videtur.

Utraque Cerebelli regio, nimirum *anterior & postica*, in *processum vermiformem* terminatur: juxta hos terminos, velut in *gemino polo*, *circelli* isti sunt *brevisissimi*; exinde versus summitatem, velut *Aequatorem*, ascendendo, isti velut *paralleli sphaera*, sensim ampliantur. Hi *Circelli* extus *corticales*, & intus *medullares* existunt, atque omnes omnium *medulla* in bina ampla *medulla* transeunt; quæ quidem in Cerebello eadem esse videntur ac *corpus callosum* in cerebro.

Cerebellum in quibusdam animalibus *unica* compage constat, ejusque omnes circelli eodem situ parallelo consiti, eandem inter se proportionem servant; in aliis vero Cerebello velut *sphaera primaria*, & circulis majoribus præditæ, corpora quædam alia, quasi *tubera* seu *episphaeria* circellis minoribus insignita adnascuntur: hæc ipsi cerebello *eccentrica*, sæpe *plicas* sive *lamellas*, serie diversa ab eo ordinatas habent.

Cerebellum autem (seu ipsi accreverint tubercula prædicta, seu defuerint) ipsum in quibusvis fere animalibus ejusdem figuræ & proportionis, necnon ex ejusmodi lamellis conflatum reperitur. Quæ Cerebrum diversimode ab homine configuratum habent, uti *volucres & pisces*, item inter quadrupedes *cuniculi & mures*, quorum cerebra *gyris* seu *convolutionibus* carent, his cerebelli species eadem, similis *plicarum dispositio*, & partium cæterarum composituræ existunt. Hujusmodi *discriminis* in Cerebro, & *conformitatis* in Cerebello, ratio inferius reddetur, cum de usu partium differemus.

Prout cerebrum intra cavitatem suam *plexum choroeiden*, ex arteriis & venis varie complicatis & glandulis densissime interfertis conflatum habet; ita & cerebellum similes vasorum plexus, eosque glandulis plurimis, & majoribus quam sunt in plexu choroeideo, insignes obtinet. Hi *plexus & glandularum acervus*, separata *pia matre*, quæ posteriorem cerebelli partem investit, facile in conspectum venient; nam illic loci, utrinque juxta *processum vermiformem*, duobus velut ramis hi sursum repunt; *arteriam* utrobique ab *arteria vertebrali medullæ oblongatæ basi substrata*, atque *ductus venosos* ab utroque *sinu laterali* emissos accipiunt. In hujusce *plexus & glandularum* ejus usum posthac inquiremus.

Interim ut *cerebelli sinum & appensionem* describamus, idem *medullæ oblongatæ* insistentis, lateribus ejus, per *duos* veluti *pedunculos*, affigi videtur; inter quos ex utroque latere consitos, atque *cerebellum supra*, & *medulla oblongata caudicem infra*, collocatum (quoniam hæc omnia ab invicem distincta esse debent) *cavitas* intercedit, quæ *ventriculus quartus* vulgo appellatur.

In utroque *pedunculo* cerebrum sustentante, *tres* distincti *processus medullares* reperiuntur. Horum *primus* à protuberantiis orbicularibus emissus obliquè ascendit; *secundus* recta à cerebello descendens, & per priorem decussatim transiens, *medullam oblongatam circumdat*; *tertius* processus è postica cerebelli


belli regione descendens, medullæ oblongatæ inferitur, ejusque Truncum, velut chorda adscititia exauget. Singuli hi processus in *Tabula septima*, Q.P.R. aptè repræsentantur.

Quod vero spectat ad *protuberantiam annularem*, qua Truncus medullaris, tum in homine, tum in quadrupedibus quibuscumque cingitur, ista ad hunc modum efformatur. *Secundus*, sive *medius cerebelli processus*, recta ad medullam oblongatam descendens, quamprimum hujus latera attingit, non statim iisdem implantari videtur, verum in molem ampliore succrescens, diversis, nempe circularibus fibris ejusdem medullæ superficiem ambit: Cumque adeo in utroque latere istiusmodi ambo cerebelli processus, à summitate Caudicis medullaris versus basin ejus delati mutuo occurrunt, *circularem istam protuberantiam* efficiunt. Hujus compages longè amplior est in homine quam in alio quovis animali; in *lepore*, *cuniculo*, *mure*, & similibus perexigua est; in *volucris* aut omnino deest, aut præ tenuitate ejus vix oculis conspicuus est. Circa hujus molem hæc constans observatio est: Quibus *prominentia orbiculares* ante cerebellum sunt *minima*, hæc *annularis protuberantia maxima existit*; & è contra, quibus *prominentia ista majores*, aut maximæ *existunt*, his *annulus perexiguus est*; porro, in quibus *protuberantia natiformes omnino desunt*, uti in *volucris*, etiam hæc *annularis* desiderari videtur.

In plerisque brutis animalibus, non item in homine, juxta hanc *protuberantiam majorem*, paulo inferius, *alia minor* pariter circularis, ac medullæ oblongatæ superficiem circumambiens consistit; cujus radix est *linea alba* & medullaris, sub cerebello supra fundum quarti ventriculi protensa. E lateribus hujus *minoris protuberantia*, *nervi auditorii* exoriuntur: in homine, nervi auditorii è margine extrema protuberantiæ majoris oriri visi, pariter pro radice sua *lineam albam medullarem* ventriculo quarto obductam habent.

Ut hæc *linea* & *tres distincti processus medullares*, qui utrumque cerebelli pedunculum constituunt, conspectui planius exhibeantur; item quo intima cerebelli compages perlustrari queat, totum ejus globum per utrumque polum, scilicet per processus vermiformes in medio secare oportet; tunc planè constabit quod in *utroque hemisphærio meditullium amplum consistit*, in quo rami medullares, velut arboris cujusdam quaquaversus expansi, corticalem cerebelli substantiam ubivis diffusam oblinunt; quodque *utrique meditullio tres distincti processus*, qui utrumque cerebelli Caudicem, seu pedunculum efficiunt, inferuntur. Singula horum in *Tabula septima* aptè repræsentantur.

Hæc de cerebello, & qua ratione medullæ oblongatæ appenditur. Porro super his observare est, quod circa imam medullæ oblongatæ basin, ex annulo majore *duæ* velut *chordæ medullares* prodeunt, quæ à reliquo medullari Trunco distinctæ, versus medullam spinalem recta pergunt, ac in processu suo sensim angustiores factæ, *pyramidum* instar, post uncia circiter spatium, in cuspides acutas desinunt. Harum extremitates, è regione, quæ origines *vagi* nervorum *Paris* habentur, consistunt, & in medulla oblongata intumescuntiam quandam faciunt. Hinc verisimile est, quod hæ chordæ, spirituum animalium ductus, sive canales fuerint, in quibus isti ab annulo majore, seu, quod idem est, à cerebello, in *Par vagum*, aliorumque nervorum origines juxta consitas perducuntur; in quem finem inferius dicetur. Hæc cor-
pora



pura pyramidalia, quamdiu eadem pia mater investit, & vasorum plexibus obducit, non ita manifesto apparent: verum membrana isthac avulsa, adeo conspicua sunt, præsertim in *homine & cane*, ut velut *nervi majores* videantur. In quibus animalibus protuberantia annularis paulo major est, hi processus ab eadem ad rectos angulos producti ampliores conspectioresque existunt; & è contra in volucris plane desunt.

Circa hanc posticam τὴ ἐγκεφάλῳ regionem, haud multa præterea, exceptis vasorum productionibus, notatu digna occurrunt. Sunt autem vasa quæ præcipuè ad has partes spectant, *posteriora sex nervorum Paria*, intra cranium oriunda, & *arteria vertebrales*. Priorum origines aliquatenus supra descripsimus; quæ ad pleniores eorum Theorias spectant, proprio loco tractanda reservamus. Quoad *arterias vertebrales*, istæ circa extremum medullæ oblongatæ, jam in spinalem cessuræ finem, ad latera ejus pertingunt. Hæc vasa, uti paulò exiliora, ita cum minori apparatu quàm *Carotides*, Cranium ingrediuntur: nec enim prius in *plexus retiformes* divaricantur, nec per ambages longo itinere feruntur; quin utraque arteria, os cuneiforme directè pertransiens, Caudicem medullarem utrinque amplexatur. Hæ, licet aliquanto spatio divisæ pergunt, tamen postea uniuntur, & cum ductu seu canali singula, posterioribus carotidibus mutuo ad se inclinatis occurrunt; adeoque omnes rami velut in *trivio* conveniunt, ac in se invicem inosculantur. *Arteria vertebrales* primo intra cranium emergentes, secus in brutis animalibus ac in homine disponuntur; in hoc per latera medullæ oblongatæ aliquo spatio parallelæ incedunt, dein ambitu quodam velut semicirculari ad sese mutuo inclinantur, & statim occurrunt. Rami, qui primò divisim pergunt, modo sunt *duo* tantum, nempe unus in alterutro latere, modo *tres*; & tum præter duos priores, alter in medio producitur. In brutis verò uterque truncus arteriæ vertebralis à primo ad medullam appulsu, statim ad alterius occursum cum angulo acuto inclinatur, & brevi ambo conveniunt. *Vertebrales*, non secus ac *Carotides*, in progressu ramos multiplices cum innumera propaginum serie dimittunt, quæ medullam oblongatam, cerebellum, eorumque recessus & cavitates omnes obducunt, ac omnia copioso sanguinis affluxu irrigant.

Hæc sunt *Phænomena*, quæ tota cerebri, ejusque appendicis compages, quoad fabricam, partesque & processus omnes, qui tum intus, tum extra reperiuntur, inspectioni Anatomicæ exhibere solet. De singulorum actionibus & usu disquirere, ut opus arduum & plenum alea, ita res est tanta cum utilitate & voluptate conjuncta, ut ausum mihi aliisque operæ etiam maximæ pretium polliceri. Prius tamen quam hæc aggredior, nonnulla in quibusdam Cranii ossibus recondita, uti inprimis sunt *glandula pituitaria*, *rete mirabile* & quædam alia, explicanda restant; item cerebri in volucris & piscibus, saltem brevis *hypotyposis* præmitti debet.

Figura Tertia.

Cerebri humani cranio exempti superficiem extimam sive superiorem exhibet; ubi cerebri Limbus à nexu cum aliis partibus per membranas factus, solutus elevatur & antè flectitur, ut

Crura medullæ oblongatæ, Fornix, Nates & Testes cum glandula pineali, aliique processus clare & distincte conspiciantur.


- A. A. Cerebri Limbus, qui in situ naturali, cerebello continguus erat.
 B. Corporis callosi, utrumque cerebri hemispharium oblinentis Ora, sive margo, quæ in situ naturali glandula pineali incumbibat.
 C. Fornix.
 D. D. Ejus Brachia medulla oblongata Crura amplexantia.
 E. E. Medulla oblongata Crura, è quibus nervi optici procedunt, & quorum apices (ulterius extra conspectum siti) sunt corpora striata.
 F. Glandula pinealis, inter quam & Fornicis radicem, Rima ad infundibulum ducens consistit.
 G. G. Protuberantiæ orbiculares quæ Nates dicuntur.
 H. H. Protuberantiæ minores, Testes dictæ quæ sunt priorum Epiphyses.
 I. I. Processus medullares, qui à testibus obliquè in cerebellum ascendunt, ejusque medullæ utriusque partem constituunt.
 K. Processuum istorum per alium processum transversum Commissura.
 L. Nervorum patheticorum è Commissura processuum prædictorum Exortus.
 M. M. Medulla oblongata portio processibus & protuberantiis prædictis substrata.
 N. Foramen ventriculi, seu cavitatis, quæ protuberantiis orbicularibus subjicitur.
 O. O. Protuberantiæ annularis à cerebello dimissa, & medullam oblongatam amplexantis portio.
 P. P. Cerebelli superficies extima, & superior.


Figura Quarta.

Effigies cerebri humani, quod cujusdam Adolescentis ab ipsa natiuitate Fatui, & ex eorum numero qui vulgo Lemurum subditi perhibentur, fuerat; Cujus cerebri moles, cum tenuior ac solito minor fuit, limbus ejus ulterius elevari & reflecti potuit, ut interiora quævis penitus conspicerentur.

- A. A. Cerebri Limbus elevatus, & plurimum reclinatus, qui in naturali situ medulla oblongata prope cerebellum innixus, Nates & Testes abscondebat.
 B. Corporis callosi ora, sive margo inferior.
 C. C. Fornix cum duobus brachiis ejus, crura medullæ oblongatæ amplectens.
 D. D. Interna cerebri cavitatis, à limbi ejus complicatura circa medullam oblongatam resultans.
 E. E. Crurum medullæ oblongatæ Apices, seu corpora striata.
 F. F. Thalami nervorum Opticorum.
 G. Glandula pinealis, inter quam & fornicis radicem foramen, cujus ductus tum ad Infundibulum, tum ad ventriculum protuberantiis orbicularibus subjectum tendit.
 H. H. Protuberantiæ Nates dictæ.
 I. I. Protuberantiæ Testes dictæ.
 K. K. Processus medullares à Testibus ad cerebelli medullæ protensi.

Fig. III.





- L. L. *Cerebelli per medium dissecti hemisphæria seposita; ut medulla oblongata Caudex melius conspici possit: ubi substantia ejus medullaris ramificatur ad formam arboris.*
- M. *Scrobs infra Caudicem medullarem, quæ cerebello obteeta ventriculū quantum ad formam pennæ scriptoriæ constituit.*
- N. N. *Processus medullares, qui transitus è medulla oblongata in protuberantias orbiculares esse videntur.*
- O. *Medulla oblongata in spinalem cessura extremas.*

CAPUT IV.

Calvaria sepositæ partes, & contenta quadam explicantur.

Non est nostri instituti, sed neque opus erit, singulorum *Cranii ossium figuræ & situs* delineare, aut varia illorum *foramina* (quæ vasorum truncos, veluti machinæ horologicæ pensilia, transmittunt) describere. Hæc omnia vulgò satis innotescunt; ut hujusmodi *Osteologiam* instituere, esset jam satis superque actum agere. Porro item quo ritu *nervi* intra Cranium oriundi, cum ramificationibus suis ossium claustra & cavernas subeunt, inferius speciatim tradetur. Quare in præsentiarum hoc nobis solum negotii incumbit, ut quædam circa *vasa sanguifera Os cuneiforme pertranscuntia*, præcipuè observatu digna, nec ab aliis satis animadversa annotemus.

Inter varios usus & officiorum munera, quæ *Os cuneiforme* cerebro ac appendici ejus præstat, haud minimæ notæ aut momenti est, quod *arterias carotides*, non sine apparatu quodam mechanico transmittat; quodque in media, qua illis transeundum est, via *glandulam pituitariam*, ac interdum *rete mirabile* contineat. Horum singula considerationem merentur; eo magis, quoniam in diversis animalibus sese diversimode habent, & de illorum fabrica atque usu inter Medicos valde controversatur. Imprimis autem de *Glandula pituitaria* dicemus; quoniam hæc pars superius collocata inspectioni Anatomicæ ante alias obversatur.



Glandula pituitaria intra sellam propriam, in medio ossis cuneiformis excavatam reconditur, in arca modo strictius, modo laxius inclusa: Nam in *cane, fele*, & quibusdam aliis animalibus, infundibulo cohærens, cum eo amoto una divellitur; & tunc moles ejus glandulis duabus inter se distinctis, & facile ab invicem separabilibus constat. Verum in *vitulo, ove, porco*, & multis aliis, ex omni parte, nisi quæ infundibulum admittit, *dura meninge* investitur, ejusque obductione intra ossis cavitatem arcte concluditur. Insuper in his compages ejus unica, & individua videtur, licet revera è substantia, quæ duplicis generis est, conflatur.

Hæc *Glandula* in cunctis animalibus perfectis reperitur; ea namque *homo, quadrupedes omnes, imo volucres & pisces* instruuntur: unde ipsam necessarios quosdam usus in cerebro habere concludimus. Attamen quoad *quantitatem* ejus,

in diversis animalibus, ad Capitis aut Corporis, cui inest, magnitudinem, varia est proportio; quippe in *agno* major est quam in *homine* aut *cane*; item moles ejus in *equo* minor est quam in *bove*. Verum hujusce discriminis ratio in eo potissimum consistere videtur, quod *glandula pituitaria* in aliquibus solummodo superimpositam *cerebri* molem, atque in aliis, & *cerebrum*, & *arterias carotides* juxta illa ascendentes respiciat; adeoque prout simul utrique horum, aut tantum alteri respectum debet, ejus moles aut major, aut minor existit. Enimvero in quibusdam animalibus *arteria carotides* intra cranium delatae, statim in *plexus retiformes* divaricantur, & à plexibus istis plures utrobique vasorum propagines hanc glandulam subeunt, ejusque substantiam intertexunt. Porro quoniam iste vasorum plexus, *Rete mirabile* dictus, in aliquibus valde amplus, & in aliis perexiguus reperitur; idcirco hæc Glandula, siquidem ab his pauciores ramos, & ab istis longè plures, atque in aliis quibusdam animalibus, ab arteriis, vix ullas propagines admittit, diversæ huic vasorum distributioni, molis suæ variata proportionem, respondet. Quippe observare est, quibusdam animalibus, uti imprimis *Homini* & *Equo*, *Rete mirabile* omnino deesse; cumque in talibus utraque arteria longa ambage intra hujusce ossis recessus circumducitur, à trunco ejus in *homine* modo furculus unus, aut alter, modo nullus in glandulam pituitariam infertur; etiam in *Equo* pauciores ramuli eam subeunt; ideoque moles ejus in his diminutior evadit.

Verum in aliis plerisque animalibus (præsertim quibus *rete mirabile* adest) multa vasa sanguifera hanc Glandulam subire, præter *αυτοψία*, etiam hoc experimento probari potest: Si enim liquor atratus *carotidi* per syringam injiciatur, Glandulæ pars exterior & vasis sanguineis intertexta, colore nigro plurimum inficietur. Quapropter hanc Glandulam humores in se recipere, nempe in omni animalium genere ab *infundibulo*, & in nonnullis à *carotidum ramis* influentes, extra dubium haberi debet. Quo tamen isti humores denuo ablegentur, non ita planè constat; ipsos enim per ossis subjecti foramina in palatum desidere omnino falsum esse, cum Doctissimo *Schenidero* asserimus. Interea tamen, foramina isthæc, haud tantum propter levitatem ossi conciliandam fabricata esse censemus; quippe in iis animalibus, quæ majorem habent glandulam pituitariam, plura etiam & majora ei subsunt foramina; porro intra foramina ista, vasa, sive canales contineri sæpius deprehendi: cumque in *vitulo*, intra ossis ejusdem majus foramen atramentum injicerem, liquor atratus illico *venas minores* ossi subjectas, ac denuo *venam jugularem* subibat. Atque ex hoc potissimum experimento de Glandulæ hujus officio & munere conjecturam facimus; de quo posthac explicatius dicemus, cum in hujus ac *infundibuli* usum inquiremus.

Juxta utrumque *glandula pituitaria* latus, si *dura meninx* aperiatur, *Arteria Carotis*, ad uncia circiter longitudinem super os cuneiforme exporrecta jacet: cum enim hæc *arteria* infra *sellam Turcicam*, modo propius, modo posterius, intra cranium emergit, eadem mox à primo ascensu intorta, sub *dura matre* incedit, donec ad anteriorem ejusdem *selle* oram pervenitur; ubi denuo intorta, ac cum ambitu quodam sursum emissa, *duram meningem* perforat, & recta versus *Cerebrum* evehitur. Adeo hoc vas duplici suo ascensu, & *curvatura*, (nempe supra *cranii basin*, & dein supra *duram meningem*, unà cum

situ subter eandem, in longum porrecto) literam  inversam in plerisque refert. Verum in *homine* (uti posthac fufius ostendetur) *situs* ejus, ob *longiorem* vasis *protractum* & magis *sinuosam curvaturam*, eadem Litera ad hunc modum duplicata  repræsentatur.

Arteria Carotis in cunctis animalibus obliquè intra cranium ascendit; verum quoad situm, sive protensionem ejus juxta glandulam pituitariam, non eodem modo se habet in omnibus: nam in *Homine* canalem osseum, propter ipsam peculiariter exsculptum, trunco singulari pertransiens, utrobique per longum exporrecta jacet; atque ex hoc trunco interdum furculos quosdam ad glandulam pituitariam, licet haud semper, emittit. Item in *Equo* truncus ejus singularis est; verum ubi primum intra cranium emergit, per *ramum transversum* ab uno latere in alterum emissum *utraq; Carotides*, priusquam *duram matrem* perforant, inter se communicant. Cumque in cæteris plerisque animalibus arteria, utut prius ramificata, tamen singularis & truncus facta, Cerebrum conscendit; in *Equo* utraq; *Carotis* bipartita, duos ramos è *dura matre* in duobus distinctis locis emergentes, sursum emittit.


In *Cane*, *Vulpe*, *Ove*, *Vitulo*, *Cervo*, & plerisque aliis quadrupedibus, *utraq; Carotis*, dum intra cranium sub *dura matre* reconditur, in *propagines exiles* divisa, cumque aliis vasis, scilicet tum *venis*, tum *fibris nervosis* complicata, *Plexus retiformes* constituit; qui plexus utrinque ad latera *sella Turcica* protensi, cavitationem inibi existentem implent; dein post multiplices vasorum omnium divaricationes, propagines quædam arteriosæ ab aliis extricatae, ac denuo unitæ, in eundem truncum coalescunt, qui *duram matrem* perforans recta Cerebrum conscendit.

Prædictus plexus, *Rete mirabile* (idque jure merito, quia nihil in tota corporis animalis fabrica magis admiratione dignum occurrit) vulgò appellatur; in quo præter *ramusculos arteriosos*, qui ab utraq; *Carotide* ascendente procedunt, *furculi venosi*, pauciores licet, à ramis jugularibus internis descendentibus occurrunt; atque utriusque generis vasa in propagines exiles divisa, instar fasciæ è filo holoserico intortæ variè complicantur: quæ tamen vasorum complicationes *fibris nervosis*, à majore *quinti* nervorum *Paris* trunco suppeditatis sustententur. Prædicti vasorum plexus, sive *Rete mirabile*, in quibusdam animalibus longè majus est, ac multo plures vasorum divaricationes continet, quam illud ipsum in aliis; nam in *vitulo*, *ove*, *capra*, & cæteris quæ herbaceis vescuntur, ejus compages amplior est, quam in *cane*, *fele*, aliisque brutis carnivoris, & calidioribus. Porro observare est, ubi *Rete mirabile* majus existit, unius lateris plexus in plexus oppositi lateris inosculari, ac ab utrisque longè plures vasorum furculos glandulam pituitariam subire; ita quidem ut, si infra cranium arteriæ trunco atramentum injicias, utriusque lateris vasa, sive plexus eadem tinctura inficientur, & liquor atratus ex arteriæ oppositæ trunco abscisso effluet.

Profecto hujusmodi experimentum sæpius repetitum vidimus. *Arteria Carotides* in utroque cervicis latere denudentur, adeo ut eorum tubuli sesquiunciam circiter longi, una conspectui exhibeantur, dein unius lateris trunci, liquor tinctus, & embolo majore contentus, sursum injiciatur: post unam aut alteram injectionem, videbis tincturam à latere altero, per arteriæ

oppositæ truncum descendere : imo si eadem copiosius versus caput injiciatur, illinc per arteriam lateris oppositi redux, infra præcordia, usque ad imam corporis regionem pervadet ; cum interea parum aut nihil ejusdem tincturæ per venas jugulares externas & majores referatur : dein capite aperto, arteriæ omnes ante capitis ingressum, & venæ iisdem succenturiatæ, liquoris injecti colore imbuuntur. Porro in vasis quæ *Rete mirabile* constituunt, & quæ Cerebri basin obducunt, ejusdem tincturæ vestigia quædam apparebunt. Veruntamen quod liquor iste ubertim adeo per *oppositam arteriam*, ac minimè per *venam jugularem*, aut sociam, aut oppositam descenderat, ratio est, quoniam venas istas subire nequivit, nisi prius totius cerebri regione trajecta, *sinus* intraverat : at vero liquor affatim injectus minutula vasa cerebrum obducentia tam cito trajicere non potuit : quare potius quam à violento ejusdem liquoris impulsu vis cerebro inferatur, iste ab injectione redundans, ac alias cerebro diluvium minaturus, recessus viam inveniet, etiam per *arterias oppositas*, eum nempe in finem & priusquam ingrediuntur cerebrum, & postquam ingressæ sunt, inter se communicantes. Atque hic nunquam satis admirari possumus adeo providam, & nulla mechanica arte æquandam, *sanguinis intra cerebri confinia dispensationem*. Quandoquidem enim *arteriæ carotides* inter se variis in locis communicant, ac mutuo inosculantur ; *duplex* inde commodum, effectum licet contrario, resulat : quippe hac una eademque ratione cavetur, tum ne cerebrum debita sanguinis irrigatione defraudetur ; tum etiam, ne tumentis alvei impetuoso nimis affluxu obruatur. Quoad primum, ne accidat, una fortè *Carotidum* obstructa, altera utriusque penum suppeditat ; deinde ne cruor nimis pleno torrente irruens, cerebri alveos & canales inundaret, opposito quasi emissario fluvius castigatur, & per easdem fluxus sui vias *retro properare* jubetur, *versisque recurrere lymphis*.

Istiusmodi apparatu *arteriæ* cerebrum consensuræ instruuntur : Quinimo & *ductus venosi* sanguini illinc reducendo destinati, mirabili quoque artificio disponi videntur. Cum enim *sinus anteriores* sarcinam suam in *duos laterales*, qui posteriores sunt, transferant, ipsique in *venas jugulares* desinant ; observare est, quod isti posteriores sinus sulcos, sive cavitates quibus insideant, occipiti insculptos habent : cumque per foramen proprium uterque sinus in venam jugularem cessurus Cranio elabatur ; juxta foramen illud, in exteriori calvariae parte, *specus amplus*, rotundus, ejusdem utrinque sinus extremitate in majorem capacitatem ampliata, obductus excavatur ; eo quidem fine, ut sanguis, ne dum pleno torrente extra caput proripitur, rapido nimis & vorticoso influxu in venas irruat, adeoque ipsi cordi impetum faciat, illic diverticulum satis amplum habeat, in quo æstuans, donec suo decursui spatium laxius & patentius conceditur, sine molestia commoretur. Certè opportuna hac Sanguinis in cerebro, & extra ipsum *διαδοχή*, ejusque in diversis animalibus, pro cujusque necessitate, accommodata reciprocationis via, nihil artificiosius, quodque magis summi Conditoris providentiam arguit, excogitari potest. Denique in *Zootomia* alia id genus miracula occurrunt, quibus digitum numinis & divinum opificem spirantibus, Atheïsmo, utut pervicaci, potentissimus Elenchus opponatur.






Figura Quinta.

Exhibet Cranii humani basin internam; ubi ostenditur, quo ritu vasa cujusque generis, cerebro abscissa, & Cranio egressura, sub *Dura matre* reconduntur.

- A. Cavitas Ossis frontis.
- B. Ossis Cribriformis septum.
- C. C. Processus Mammillares, qui multo tenuiores, & minus aperta cavitate præditi sunt, quàm in quadrupedibus odoratu præstantiori dotatis.
- D. D. Nervi optici longe sejuncti Calvaria egrediuntur, secus ac in brutis plerisque.
- E. Glandula pituitaria cum infundibuli apice inserto.
- F. F. Arteriae Carotides juxta latera ejus emergentes.
- G. G. Nervi oculorum motorii Cranio egrediuntur.
- H. H. Nervi Pathetici sub *Dura matre* reconditi, eodem foramine cum prioribus Cranio exeunt.
- I. I. Nervi Paris quinti sub *Dura matre* demersi.
- K. K. Par sextum sub *Dura matre* protensum, etiam eodem foramine cum Pari tertio & quarto exit.
- L. L. Par septimum cum duplici processu Os petrosum subiens.
- M. M. Par octavum sive vagum, cum multis fibris & nervo accessorio N. N. coalescere visis, Cranio egreditur.
- N. N. Nervus ad Par vagum accessorius.
- O. O. Par nonum.
- P. P. Par decimum deorsum tendens sub *Dura matre* reconditur; ubi arteria vertebralis ascendit.
- Q. Q. Sinus lateralis.

Figura Sexta.

Exhibet Calvariae Vitulinae basin; ubi ostenditur, quo ritu vasa cerebro abscissa & cranio egressura sub *Dura matre* demergunt.

- A. A. Cavitates ossis Spongiosi.
- B. B. Processus Mammillares, qui nervis olfactoriis abscissis, cavi apparent.
- C. Nervi Optici uniti, mox iterum sejuncti Cranio egrediuntur.
- D. Glandula pituitaria.
- E. E. Arteriae Carotides juxta latera ejus emergentes.
- F. F. Nervi Oculorum motorii Cranio egrediuntur.
- G. G. Nervi Oculorum Pathetici sub *Dura matre* reconditi, eodem foramine cum prioribus Cranio exeunt.
- H. H. Nervorum Par quintum sub *Dura matre* demersum.
- I. I. Par sextum sub *Dura matre* demersum, eodem foramine cum Pari tertio & quarto egreditur.
- K. K. Par septimum cum duplici processu Os petrosum subiens.

L. L. Par

- L. L. Par Octavum seu vagum, cum multis fibris & Nervo accessorio coalescere visis, Cranio egreditur.
 M. M. Par nonum.
 N. N. Par decimum deorsum tendens sub Dura matre reconditur.

CAPUT V.

Volucrum & Piscium cerebra describuntur.

QUÆ hætenus de Cerebri, ejusque appendicis descriptione protulimus, Observationibus ex dissectione capitum *Hominis* & *Quadrupedum* factis potissimum debemus. Mox tandem procedere oportet ad commentarios super observationibus istis subnectendos; nimirum ut ex partium cerebri ita descriptarum fabrica rite pensitata, earum *munera* & *usus* eruere, adeoque functionis animalis œconomiam designare satagamus: At verò quoniam *Anatomia comparata*, Physiologiam de usu partium plenior & magis exactam supplet; ideo priusquam hoc pensum aggredior, in Capita quorundam aliorum animalium, nempe *volucrum* & *piscium*, inquirere, operæ pretium videtur.

Supra innuimus, Cerebra hominum & quadrupedum in plerisque similia existere; tum etiam Capitibus volucrum & piscium contenta, ab utrisque prioribus longe diversa, tamen inter se, quoad præcipuas *εγκεφαλικὰς* partes, symbola reperiri. Utræque animalium species, à mundo condito coætaneæ & velut gemellæ, in nihilo magis quam in cerebri fabrica affinitatem suam testantur. In homine & quadrupedibus rem ita habere, in superioribus plane constitit: Jam videamus si quæ notatu digna *volucrum* & *piscium* Anatomia exhibeat.

Ut à *volucris* ordiamur, cranii tegmine sublato, *dura meninx* molem contentam arcte complectitur: in medio illius, ubi Cerebrum in duo hemisphæria dividitur, *sinus* in *longum* protensus habetur, qui tamen nulla falce interstitia dimissa, cerebro minus profunde inseritur: dein ubi hæc membrana cerebrum & cerebellum interstinguit, *duo sinus laterales* efformantur: Insuper volucris *sinus quartus* adest, verum qui aliquanto posterius, quàm in homine aut quadrupedibus situm habet; nam paulo infra glandulam pinealem, *dura meningis* processus cavus & teres super medullæ oblongatæ crura dimittitur; ubi statim dividitur in duos ramos, quorum utrinque unum sursum emittit, in cavitatem inter membranam striatam & cerebri hemisphærium, in posteriore cerebri parte confitam.

Superiore hac membrana, sive *dura meninge* circumquaque discissa & seposita, *Pia mater* valde tenuis apparet, quæ non, uti in homine, aliisque perfectis animalibus, tam crebris vasorum plexibus insignitur; verum hæc meninx subtilissima fibrarum textura constans, cerebri intus contenti superficiem planam & æquabilem, gyrisque & anfractibus prorsus destitutam solummodo investit undique, ac intime succingit.

Cerebri fabrica in volucris aliter habet ac in homine aut quadrupedibus

dibus: nam præterquam quod in ambitu ejus anfractus & inæqualitates omnino defunt; etiam interius *corpus callosum*, & *fornix*, etiam *corpora striata*, qualia supra descripsimus, prorsus desiderantur: atque insuper ipsa cerebri compages alio modo configuratur. Quo hæc melius perspiciantur, cerebri *anseris*, aut *galli Indici* dissectionem instituas; atque membranis discissis, cerebri fissuram, & medietatem ejus unam ab altera, leviter comprimendo, diducas, & separare pergas, donec ventum erit ad ipsum fundum, in quo duo corpora medullosa existunt; quæ nervorum instar, transversim protensa, hemisphæria invicem connectunt. Utrumque interstitii latus membrana subalbida investit, quæ quidem striis velut radiis, à toto ambitu versus angulum inferiorem productis insignitur; striæque istæ circa corporum medullarium insertiones concentrantur. Dein si membrana hæc secetur, in utroque cerebri hemisphærio cavitas subjecta apparebit; quæ totum ab interstitii latere spatium, ac insuper posticam cerebri regionem magna ex parte subducit, eaque membrana striata concameratur. Utraque cavitas circa fundum, in ductum intermedium & communem, qui ad infundibulum patescit, aperitur; & ex utroque ductus istius latere medullæ oblongatæ crura exporriguntur, quibus utrinque cerebri hemisphærium per duo medullaria corpora appenditur; nimirum è cerebri mole ventriculo substrata, meditullium unum, & è membrana striata ventriculum obtegente meditullium alterum prodit. E binis hisce in utroque latere positis, Corpora medullaria, nervorum instar, transversim protensa, duo cerebri hemisphæria invicem conjungunt: Insuper bina hæc utrinque coalescentia utrumque cerebri hemisphærium medullæ oblongatæ cruribus affigunt.

Adeo cerebri figura in volucribus, si hominum & quadrupedum perfectiorum cerebro comparaveris, velut *inversa* esse videtur: Nam sicuti in his pars *corticalis* exterior est, eique *medullaris* substernitur; ita in volucribus inferior cerebri compages, quæ mole crassa & spissiori constat, *corticis* loco est; membrana autem extima & superior ventriculum concamerans, supra quamvis aliam partem *medullaris* apparet. Porro *ventriculi* in hominis & quadrupedum cerebris, *infra* & prope fundum, in volucribus *superius* & juxta oram anteriorem collocantur. Hujus discriminis ratio esse videtur, quod in cerebro perfectiore, quale homini & quadrupedibus contingit, spiritus animales tum ortum suum, tum exercitium habent; scilicet in parte ejus *corticali* procreantur, atque in *medullari*, quæ satis ampla huic substernitur, pro facultatum actibus iidem circulantur, varieque expanduntur: At verò in volucrium cerebro, spatium quidem satis amplum subest pro spirituum *generatione*; sed pro *circulatione* eorum, ibidem locus vix ullus conceditur: Nempe avium cerebra, muneribus phantasiæ aut memoriæ non multum occupari videntur: Quinimo putandum est, spiritus in cerebro genitos, in medulla oblongata, pro tuenda functione animali potissimum exerceri; namque illic, uti mox ostendemus, substantia medullaris, quæ corporis callosi loco est, consistit, & instar corporum striatorum in *aliis*, in *his* sunt membranæ striatæ; per quas scilicet spiritus in cerebro procreati sine quavis ibidem diatari protinus in medullam oblongatam feruntur: Cæterum, quia spiritus in cerebro geniti excrementa serosa deponere debent; ideo à complicatura

membranæ striatæ; super cerebri puppim, ipsiusque medullæ oblongatæ crura, ventriculi ad hanc rem satis idonei resultant. Attamen volucrum cerebris, quia fornix omnino deest, *bini* tantum *ventriculi* anteriores adfunt; intra quos plexus choroeides expanditur, cujus portio venosa à sinu quarto, uti modo dictum erat, paulo inferius oritur; arteriæ autem ex utroque latere medullæ oblongatæ ascendentes accedunt.

Nec magis in ipso volucrum cerebro, quam in medulla oblongata heterogeneitas, sive conformatio ab eadem in hominibus & quadrupedibus longe dispar apparet: nam in prima illius Sectione, unde nervi optici oriuntur, *duæ insignes protuberantia* lateri utrique accrescunt: Hæ multo majoris sunt proportionis, quam in perfectioribus prominentiæ orbiculares; adeo ut *cerebrum alterum*, & *succenturiatum* videantur: utraque albidi coloris & pure medullaris, interius excavata est; ita ut in hujusce generis animalibus *bini* ventriculi in cerebro, totidemque in medulla oblongata reperiantur: Cumque in his, sicuti in cæteris quibuscumque animalibus, etiam cavitas cerebello subjiciatur, ventriculi in toto *ἐνκεφάλῳ* existentes *numero* pariter ac *figura* & *positione* differunt.

In medio caudicis medullaris, ubi scilicet istæ prominentiæ lateribus ejus adnascuntur, Rima ad infundibulum ducens inducitur, in istam autem utriusque ventriculi apertura dehiscit, ut minime dubium fuerit, quin serositates ibidem congestæ ista via amendantur. Porro verisimile est, has prominentias excavatas, & medullares in volucris corporis callosi vicem supplere, in quibus nempe spiritus animales, propter facultatum suarum exercitia, circulentur: Quippe in cerebro spatium angustum est, ut spiritus intra illius confinia produci, ac una circulari nequeant. Porro cum in volucris spirituum animalium usus ad facultatis sensitivæ, ac locomotivæ actus, plus quam ad phantasiam aut memoriam requiratur; certe præcipuus locus, ubi & convenient & exerceantur, in medulla oblongata potius, quam in cerebro collocari debuit.

Arteria carotides quæ ad avium majorum cerebra sanguinem adducunt, tam exiles sunt, ut ad easdem in homine & quadrupedibus harum nulla sit proportio. Trunci ipsarum intra calvariam delati, sine quavis divaricatione in plexus reriformes, eodem quo in aliis animalibus ritu, juxta glandulam pituitariam ascendunt, & recta cerebrum petunt, vasorumque exiles quasdam propagines, tum ad exteriorem ejus ambitum, tum per interiores recessus distribuunt. Enimverò perexigua sanguinis portione, respectu aliorum animalium, avium cerebra irrigantur; quia nempe ad spirituum animalium refectionem ubi phantasia aut imaginatio minus exercetur, haud multum sanguinis requiritur.

Volucres (secus ac nonnulli asserunt) & *Processus mammillares*, & *Oscrobrosus* habent; nam anteriores cerebri productiones, summe extenuatæ & dura *meninge* involutæ, fere ad mediam rostri partem protensæ, ossi triangulari (cui finis duplex, tenui septo interstinctus, adest) inferuntur: Isti autem processus intra prædicti ossis finis delati desinunt in vesicas aqua limpida plenas, quæ plane referunt processus mammillares in vitulo aqua limpida tumidos. Porro, cum è quinto nervorum *Pari* ramus insignis in utroque latere, oculi orbitam

orbitam pertransiens, naris cavernam ingreditur, è trunco ejus furculus emissus ipsi naris orificio impenditur; interim ambo majores trunci, ossi cribroso circumdato, mutuo conveniunt, & mox ab invicem abscedentes, & ad rostri finem perducti, in palatum distribuuntur. Ad hunc modum *volucres*, pariter ac *homo & quadrupedes*, peculiari *olfactus organo*, gemino scilicet *processu mammillari* instruuntur; ac insuper intra nares, è *quinto Pari* nervos *ascititios* habent, quorum actione, & ramorum in alias partes communicatione etiam in ipsis stricta adeo inter olfactum & gustum affinitas contrahitur. Cætera nervorum *Paria* fere ad eundem modum habent, ac in homine & quadrupedibus. Pariter item observamus, quantum ad cerebellum, & reliquam medullæ oblongatæ portionem, inter aves & alia quæ supra consideravimus animalia, haud magnum discrimen intercedere; nisi quod prominentiæ orbiculares ante cerebellum, aliæque annulares sub ipso in illis occurrente, utraq; in volucris desiderantur; nempe hæ posteriores non videntur omnino requiri: priorum autem vices à prominentiis medullaribus excavatis, quales volucris subesse ostendimus, facile supplentur.

Atque hæc præcipuè notatu digna in *avium* cerebris reperiuntur. Inter hos & *Pisces*, quoad plurimas τὴν ἐγκεφάλου partes, similitudinem quandam intercedere supra innuimus: Quare ex re fore videtur, ut hic, coronidis loco, de *piscium* cerebro nonnulla proferamus. Primo observamus, quod cum *piscium capita*, respectu totius corporis, sint *majora* quam cujusquam alterius animalis, *cerebrum* tamen præ cæteris *minimum* in se continent: Nam duæ molculæ antè posita, totum cerebri ita propriè dicti locum sustinent; ex his duo nervi olfactorii insignes procedunt, qui longo & recto itinere ad foramina ex utroque oris latere excavata, quæque instar narium sunt, feruntur: atque hoc piscibus singulare est. Porro de nervis opticis advertimus, quod isti, uti in cæteris animalibus, ad se mutuo inclinati, haud tamen uniuntur, nisi forsan superficie tenus; verum intercussantur, nervusque è dextro medullæ oblongatæ latere oriundus, in sinistrum oculum defertur, & è contra: ita quidem ut radii visorii non tantum in oculo, verum intra ipsa nervorum corpora, refractionem subeant. Medulla oblongata in piscibus simili omnino ritu, ac in avibus, *duas insignes protuberantias* intus *excavatas* habet; & revera quoad motus locales, spiritus in utrisque simili modo exerceri videntur: nam uti *pisces natant in æquore*, ita *avium volatus* videtur quoddam *nationis genus esse in aëre*. Porro in his observare est glandulam pituitariam, infundibulum, & arterias *carotides*, uti in cæteris animalibus; item pleraque nervorum *Paria* easdem origines & distributiones habent: excepto tamen quod nervi auditorii hic desiderantur; licet *Casseri* *Placentinus* hoc munus nervis olfactoriis attribuat. Cerebelli figura eadem est quæ in perfectioribus animalibus. Porro quod de nervorum *Pari vago* in homine & quadrupedibus advertimus; nempe quod pluribus ejus fibris una oriundis, ad eos nervi truncos à spinali medulla accedit; omnino pariter habet in *Piscibus*. Verum singula ulterius describere non opus est: nam cætera, cum ea quæ *Ipsis* tantum & *Avibus* propria sunt, tum etiam quæ cum volucrum & perfectiorum quoque animalium genere communiora obtinent, partim ex peculiari cum *Avibus* similitudine, partim ex universali omnium analogia faciliè innotescunt.

Itaque jam quod superest de cerebri ejusque partium, & appendicis *usu & actione*, unà cum *functionis animalis œconomia* integra, philosophari aggredimur, ubi imprimis in cerebri perfectioris, quale Hominis & quadrupedum est, munera inquiremus; simulque secundariò & collateraliter cerebri minus perfecti, quale Volucrum & Piscium est, ejusque partium officia & actiones explicabimus.

CAPUT VI.

De cerebri ejusque partium Muniis. Vbi imprimis de Cranii & Dura Meningis Usibus differitur.

INtra Jovis cerebrum Pallada formatam, & ex illo editam fuisse, Poëtæ fingunt. Revera intra cerebri uterum, Animæ tum *rationalis*, tum *sensitiva conceptus* omnes, *Idea, impetus*, & *potentia* qualescumque formantur, ac ibidem *speciem & formam* adepti, in *actus* prodeunt. Quapropter erit operæ pretium in hæc nobiliorum genesēn loca, earumque exordia & primæva rudimenta inquirere; tum etiam diversas cerebri partes, seu organa generationi famulantia curiosius expendere: adeoque huic parti operis mei eo scilicet lubentius accingor, nempe ut dissectionis nostræ filum retractando, phænomena quævis *inspectioni* ac *sensui* prius objecta, nunc iterum rationis oculo & severiori discursus examini pensanda subjiciam, saltem ea quæ insignioris momenti, & summe notata digna esse videbuntur. Neque enim in animo habemus singula aliorum manibus trita, & vulgari observationi prostantia, hic in volumen ingens congerere.

Itaque cerebri Anatomiam recolenti, primo considerata sunt ejus integumenta, cranium nempe, & duæ *Meninges*. De illo observare est, perfectis quibusvis animalibus *Cranium durum* ac *osseum* obtigisse. Cujus ratio duplex assignari potest: 1. quod *ἡμέτερον* nobilissimo usui destinatus, tecto firmiore, nec facile penetrabili, contra ictuum externorum injurias, seu *galea naturali*, protegi debuit; insuper 2. hæc armatura, uti *muniminis*, ita *claustrum* loco est; quippe eadem *dura meninge* intus obducta, spirituum animalium effluvia, ne congerie nimis densa evaporent, coercet ac intra cerebrum cohibet. Porro, ut cranium propter hos fines osseum evadat, causa efficiens sunt particulae salinae in sanguine cerebrum irrigante, quæ interiori spirituum animalium operi inutiles, adeoque extra amandatae, in periphæria ita concreverunt, ac in duritiem saxeam congelantur: Enimverò sanguis versus caput delatus, uti spiritus, ita sale plurimum abundat; hujus particulae summe *volatiles*, spiritibus conjugatae, cerebro impenduntur; interim corpuscula salina, quæ *fixioris* naturæ sunt, à spiritu insito de cerebro in circumferentiam protrusa, *Cranium lapideum*, velut bullam flatui incluso superinductam constituunt.

Intra concavam cranii superficiem plures *sulci & inequalitates* à vasorum protuberantiis exarati apparent; nec raro utramque ejus laminam à vasis per-

transcun-

transeuntibus in quibusdam locis perforatam videmus : hujusmodi autem fossulas per Calvariae concavum ducunt arteriae in *dura meningis* superficie exteriori eminentes : Cum enim tota cranii substantia primo sit mollis, & cerae instar facile cedens ; arteriae subtus continuo pulsantes, prout sensim indurescit illa, tractuum suorum vestigia facile imprimunt.

Cranii figura in *quadrupedibus* depressa atque angusta, in *homine*, cui cerebri moles immensa est, capacior ac fere sphaerica requiritur : Cumque huic Deus *os sublime dederit, caelumque tueri*, ac insuper cerebro ejus *animam immortalem*, & coelestium speculationi habilem indidit ; ideo sicut *facies erecta* est, ita cerebrum ipsum loco eminentiore, nempe supra cerebellum & quavis sensoria collocatur. In *brutis* vero, quorum & facies in terram prona est, & cerebrum speculationi inidoneum existit, cerebellum, utpote insigniori praecordiorum actioni & muneri inserviens, in *suprema sede* ponitur, cui cerebri moles subjicitur : Insuper aliqua sensuum organa, *aves* nempe & *oculi*, cerebro si non superiora, saltem aequalia statuuntur. In *Capite humano cerebri & cerebelli* juxta positi, imo totius cranii basis Horizonti parallela constituitur ; quo fit ut minus sit periculi, ne qua *ἐγκεφάλου* portio huc illuc nutare, aut propria sede dimoveri possit : in *quadrupedibus* autem, qui pendulo capite incedunt, *Cranii basis rectum angulum cum Horizonte facit* ; quare cerebro subiecto cerebellum in summo collocatur ; ita quidem ut hoc minus stabile, vacillare & de sede sua concuti posse videatur. Cui tamen incommodo, ne crebra cerebelli concussio spirituum deliquia, aut anomalias circa praecordia inducat, in quibusdam miro naturae artificio cavetur ; quippe cum in omnibus cerebelli compages dura meninge arctissime constringitur, insuper in quibusdam sepiamento osseo stabilitur ; in aliis vero, uti *lepore, cuniculo*, aliisque brutis minoribus, cerebelli portio quaedam ex utroque latere *osse petroso* includitur ; adeoque hoc *duplici retinaculo* tota ejus moles cranio firmiter alligatur. De praecipuis cranii ossibus, scilicet de *Osse cuneiformi, cribroso, & organo auditorio*, erunt propria dicendi loca, cum de *cerebri ventriculis*, ac de *sensibus*, quibus isthaec ossa inserviunt, particulariter agemus. Proximè ad *duram Meningem* transeamus.

Dura Meninx duplici vasorum & processuum genere instructa, *duplicem* quoque *aspectum* gerit, & muneris sui partem Cranio ambientis, partemque *ἐντὸς αὐτῆς* intus contento debet. Hujus membranæ *processus exteriores*, intra omnes Cranii sinus, & cavitates insinuantur ; quorum aliquibus *oblinimento & munimento* sunt, aliis autem *vim sensilem* impertiunt ; id quod manifestè satis apparet in *osse cribiformi*, per cujus foramina meningis hujus laciniae trajectae, olfactus sensui aliquatenus conducunt. Item hujus productiones *ossis cuneiformis* recessibus & cavernis instratae, pro *vasorum & exitu & ingressu* vias muniunt. *Dura meningis processus interiores*, qui *ἐγκεφάλου* spectant, cerebri ac cerebelli partes dividunt ac interstinguunt ; iisque in locis dura mater crassissima existit, ne scilicet in magna capitis concussione duo isthaec invicem allidantur, ac se mutuo comprimant. Quare in *canibus* (prout modo innuimus) qui prono capite ad citatiorem cursum urgeri solent, *Dissipimentum osseum* inter haec corpora dimittitur : Pariter in *felle, equo, canipe*, & plerisque aliis animalibus, à quibus vivendi ratio & usus postulat ut citatiore cursu moveantur, *Sepimentum*

illud osseum, vulgò *Os triangulare* dictum, profunde dimittitur inter cerebrum & cerebellum; quin sinus omnes per os istud, foraminibus in id affabre excavatis, transeunt.

Vasa ad Duram Meningem spectantia, aut *arteria* sunt & sanguinem adducunt; aut *ductus venosi*, qui sanguinem illinc, ac à toto præterea Capite interiore superfluum excipientes, versus Cor reducant. Quoad *vasa prioris generis*, utrinque *duæ arteria* à Carotide ejusdem lateris, antequam ad cerebri basin pertingit, oriundæ, in crassam meningem feruntur: quæ tamen superficiem ejus exteriorem, sive convexam ferè tantum occupantes, huic membranæ, etiam aliquatenus Cranio, ejusque integumentis succum & sanguinem afferunt. Quoad *vasa sanguinem reducentia*, hæc meninx *quatuor amplissima* continet, in quæ velut *magna maria*, arteriarum toti *ἐγκέφαλον* inservientium rivuli omnes sese exonerant, nempe in hac membrana *quatuor* insignes cavitates, vulgò dictæ *sinus*, observantur; quæ eo ritu disponuntur, ut velut promptuaria in diversis locis constituta, sanguinem è qualibet cerebri regione & angulo reducendum excipiant: nam *sinus tertius*, sive *longitudinalis* anteriori cerebro prospicit, *quartus* meditullio ejus, *primus* autem & *secundus* sanguinem à cerebello & postica cerebri parte regurgitantem admittunt. Porro ex his *tertius* & *quartus* in *primum* & *secundum* sese exonerant; atque *hi* demum in *venas jugulares* sarcinam suam transferunt. Undequaque ab his *sinibus*, vasa minora, scilicet *canales venosi* dimittuntur, qui juxta interiorem, sive concavam duræ matris superficiem exeuntes, statim *piæ matri* inseruntur, ejusque protensionem sequentes, per totum cerebri, ejusque intra Cranium appendicis ambitum, ac interiores quosvis recessus distributi, cumque arteriis complicati, sanguinem superfluum excipiunt, ac in majores istas cavitates important. Rem ita habere planè constat, quoniam si liquorem atramento tinctum arteriæ tubulo injicias, iste propagines *arteriosas*, ac demum *venosas* trajiciens, ultimo in *sinus* pervadit.

Dum *sanguis* à toto interiore capite redux intra hos sinus pleno velut alveo colligitur, etiam alio respectu usum valde insignem præstare videtur; nempe calorem *spirituum animalium exstillationi*, velut *operi* cuidam *chymico* requisitum suppeditando. Quandoquidem enim sanguis destillandus, in vasis *piæ matrem* intertextentibus continetur, superiores rivi per *duram matrem* undique diffusi, calore suo instar *balnei marie* adhibito, sanguinem suppositum circumfluunt, & ex illo liquorem subtilem in cerebri substantiam urgent; seu potius sanguis intra sinus calorem exsuscitans, velut *ignis suppressionis* habeatur, qui in distillatione per descensum, circumcirca vas materiam stillatitiam continens accensus fuerit. Enimvero cerebri substantia interior, utpote *sale copioso* & *sulphure perexiguo* prædita, *temperatura frigidioris* existit: quapropter ut è sanguine superficiem ejus irrigante pars spiritiosa exstilletur, inque meditullium ejus urgeatur, caloris ambientis gradus intensior adhiberi debet, qualem revera sanguis in amplissimis sinuum æstuariis collectus facile præbeat. Porro ut sinus isti sanguine calorifico distenti, *balneum* quoddam *destillatorium* æmulantur: ita reliqua *duræ matris* membrana, circa totum *ἐγκέφαλον* protensa, instar *alembici impervii* se habet, qui scilicet obductione sua halitus spirituosos, ne immoderatus evaporentur, intus cohibet.

Circa hanc membranam considerandum adhuc restat, quo *motu* aut *sensu* prædita sit. Ac de *sensu* minime ambigitur, quin satis exquisito polleat: Cum enim membranæ omnes sentiunt, & facultatem istam spirituum animalium affluxui à cerebro debent; certe *hæc meninx*, siquidem cerebro ac appendici ejus propior & valde affinis fuerit, adeo ut plerisque nervis Cranio egres-
suris tunicam accommodet, valde accuratam sentiendi virtutem obtinebit: id quod etiam ab effectu arguere licebit: quoniam Capitis dolores non raro à solutione continui in hac membrana excitata, procedunt. *Motum* vero quod attinet, huic *dura meninx* vix satis apta comparatur, quoniam plurimis in locis cranio firmiter alligatur; & tamen probabile est, eandem in partibus quibusdam aliquando saltem contrahi & corrugari: Certe in sternutatione contrahi ipsam & remitti extra dubium est. Pariter cum ab hujus læsione vomitus aut motus convulsivi in visceribus aut membris succedunt, in causa est hæc membrana, quæ alicubi contracta, aut diducta, eodem spasmo molem intus contentam secum implicat.

De *motu* hujus membranæ cogitanti animo subest texturam ejus, præsertim quomodo intra *sinuum cavitates*, ac *cerebri & cerebelli interstitium* habet, adhuc amplius considerare: Etenim in *his locis* plures fibræ, seu velut *chordæ majores & nervosæ*, cujusmodi scilicet observamus in Cordis ventriculis, varie protensæ reperiuntur. Intra *sinus* à variis membranæ processibus *cavitas anfractuosa*, & pluribus quasi cellulis multifariam divisa constituitur. Hoc in eum finem ita fieri videtur, nimirum ut sanguis è diversis rivulis in *sinuum cavitates* redux, variis obicibus, & quali valvulis retardaretur; ne forte impetuose nimis & confertim irruens, motu vorticoso & inordinato intra hunc pelagum flueret. Attamen præter hæc meningis istius intricaciones & cellulas, observare est in quadrupedum capitibus quod insuper in *tota sinuum cavitate* plures chordæ, seu velut ligamenta, ubique ab uno latere in aliud producantur. Horum munus ex parte sit, ut cavitatis latera intra debitos aperturæ & dilatationis fines contineant, ne scilicet à sanguine vehementer irruente supra modum distendantur, adeoque cerebri molem comprimant. Quinimo fibrarum istarum albicantium, quæ tum intra *sinuum cavitates*, tum in hac *meninge* cerebellum ambiente, ac istum & cerebrum interstinguente occurrunt, contextura innuere videtur, ipsas etiam motui cuidam inservire. Enimvero suspicari licet, quod *fibræ istæ robustæ*, ac velut *ligamentosæ*, membranam cui intertexuntur, modo *contrahant*, modo *dilatent*, ac varie *diducant*. Ab hujusmodi *Duræ meningis* motibus sanguis intra sinus confluens varie exagitari, & pro data occasione in circuitu suo quandoque accelerari, ac interdum retardari aut inhiberi potest; nam in plerisque animæ sensitivæ affectibus sanguis, æquabili circulatione perturbata, modo ad Cor confestim ac impetuose præcipitatur, modo à foco ejus, juxta cerebri confinia diutius detinetur. Cæterum quod varii passionum turbines tantas in motu sanguinis anomalias concitent, aliquatenus in causa sunt partes nervosæ circa præcordia consitæ, quæ eadem contrahendo aut dilatando sanguinis cursum varie moderantur; ita tamen, ut interea hujusce muneris pars quædam ipsi cerebro, aut saltem appendici ejus debeatur. Cerebrum ipsum quidem motu caret; at sanguis illius compagem permeans, si quidem huic meningi totus infunditur, ejusque

ejusque receptacula pertransit, ad motum nutumque hujus membranæ, modo à cerebro abigitur, & Cordi succurrere jubetur, prout in timore & ingenti tristitia; modo versus cerebrum accitus, à refluxu aliquandiu prohibetur, uti in pudore, indignatione, & quibusdam aliis affectibus.

Profecto hujusmodi interiores sinuum processus, ac velut chordas transversas, commodiori sanguinis reductioni conducere, etiam exinde colligimus quod in jumentis, quorum cerebro (quia pendulo ac prono Capite vescuntur, & incedunt) majus ab inundatione sanguinis periculum impendit, processus isti maxime insignes habentur, utpote qui successive contracti sanguinem, ob Capitis inclinationem alioqui stagnare aptum, sensim protrudunt. Neque ab hoc loco alienum est observare, eadem hæc animalia semper reti mirabili eoque majore instructa esse: quo quidem providetur, ne sanguis confertim nimis cerebrum invadat; sicuti artificio modo descripto cautum est, ne idem nimis diu in cerebro commoratus, debiliorem illius compagem opprimeret.

Itaque postremo, ut quæ super *Dura meninge* dicta sunt, recolligam, ejusque usus præcipuos recenscam, 1. Cranium intus obducit, eique aliquatenus per vasa nutrimentum exporrigit. 2. Toti ἐγκεφάλῳ integumento est, ejusque partium præcipuarum interstinctioni inservit. 3. Vasa sanguini à toto capite interiore reducendo designata continet; quæ interim præ sanguinis in ipsis contenti copia & situs opportunitate, calorem spirituum exstillationi requisitum ministrant. 4. Vasorum omnium intra Cranium admissioni & egressui vias instruit, munitque; quibus addi potest, quod eorum nonnullis tunicas elargitur, prout inferius patebit. 5. Denique hæc *Meninx* à spiritibus animalibus, juxta animæ passiones aut naturæ necessitates varie commotis, huc illuc contracta aut diducta, sanguinem modo juxta cerebri confinia diutius sistit, modo illum exinde versus præcordia propellit.

C A P U T VII.

De Meninge tenuiore, sive pia Matre. De protensione ejus, necnon de Vasorum Plexibus eidem ubique intertextis.

M*Eninx interior, sive Pia mater*, exterior longe tenuior est, ac fibrarum textura subtilissima constat. Hæc non modo τῇ ἐγκεφάλῳ superficiem laxè circumambit, prout *dura mater*; sed arcte admodum ita amplectitur, ut difficillime separetur; insuper in omnes anfractus & sulcos ejus se insinuat, eorumque intima investit: Porro hæc *meninx* licet tenuis fuerit, tamen *arteriarum & venarum plexibus* per totum obducta, & aliquatenus intertexta est, adeoque rivulis innumeris Cerebri & Cerebelli spatia omnia irrigat. Cum enim utriusque horum, ac imprimis cerebri regio valde anfractuosa fuerit, hæc membrana *anfractuum & gyrorum* ejus *sulcis profundis*, pariter ac *liris summis* adnascitur; quinimo

quinimo præcipuæ vasorum complicationes usque in convallibus disponuntur, quasi ibidem tutelæ gratia recondentur. Nec tantum *anfractuum hiatus* hæc meninx obducit; ast etiam *interstitiorum omnium summitates colligat*, ac invicem connectit, adeoque integram τ ἐγκεφάλου superficiem planam reddit, globosam, & quasi mundi æmulam.

Quo mirabilis huius membrana in omnes cerebri anfractus diffusio, adeoque vasorum per intimos quosque recessus distributio melius conspiciantur; hominis aut etiam bruti animalis hydrope defuncti caput aperiatur: quibus enim cerebrum multa humiditate scatet, retinacula, quibus hæc meninx cerebri substantiæ affigitur, laxantur, adeo ut membrana cum vasorum plexibus facile abstrahi, ac fere integra avelli poterit: qua quidem avulsa, cerebri plicæ nudæ apparebunt; etiam vasorum ubique in penitiorem cerebri substantiam insertiones percipientur. Cerebro autem sano & sicco Pia mater ita arctè cohæret, ut vix in ulla parte distrahi aut cultello separari queat.

Jam pridem ostendimus, quo ritu arteria & vena (quæ velut hedera serpentes, Pia matri innituntur, eamque varie intertexunt) universum cerebri & cerebelli ambitum, eorumque interstitia, anfractuum hiatus, sinus, & cavitates surculis densissimis obvelant, & ubique in medullarem substantiam propagines exiles demittunt; ita ut minime dubitandum fuerit, quin spiritus animales, immediate è sanguine velut exstillati, ubivis in toto ἐγκεφάλῳ in poros & meatus cerebri & cerebelli excipiantur. Hinc facile erit Pia matris usum sive officium assignare: Scil. imprimis hæc membrana universas totius ἐγκεφάλου partes investit, easque omnes ab invicem interstinguit. Enimvero hæc anfractuum hiatus & interstitia quævis obducens, sepimenti loco est, quo spiritus animales intra proprias ubique cellulas & expansionum orbitas coercerantur, nec in fines alienos transcurrere, adeoque facultatum plurium actus confundere permittantur. Dein 2. hæc meninx vasa omnia sanguifera, sc. tum arterias, tum venas, una cum diversimodis illarum productionibus sustentat, adeoque sanguini versus cerebrum adducendo abducendoque com meatum præbet.

Circa hæc vasa quæ huic meningi innituntur, ejusque in partes omnes pro- tensionem sequuntur, plurima admiranda & summe notatu digna occurrunt, quorum rationes & usus investigare nostri instituti est.

Super his primo observamus, quod hæc arteria & vena, secus quàm in ulla præterea corporis parte, haud juxta oriundæ, usque sociæ pergunt; verum à sinibus oppositis prodeuntes, ubivis sibi mutuo occurrant; sc. arteria è Calvariæ basi ascendunt, & totum perreptando, surculos & propagines sursum emittunt; quibus ductus venenosi è sinibus exorti, & deorsum lati obviam fiunt. Hac ratione sanguinis rivi ubique in cerebro adæquari videntur, dum sc. majores arteriarum ramos exiles venarum propagines, & è contra venarum truncos, arteriarum ramusculi assequuntur.

Secundo, superius ostendimus hæc vasa plurimum & varie inter se inosculari, sc. non modo arterias cum venis, verum, quod rarius & fere singulare est, arterias cum arteriis, nempe arteriæ carotides unius lateris pluribus in locis uniuntur cum carotidibus alterius; insuper vertebrales utriusque lateris inter sese; & in posteriores carotidum ramos prius unitos inosculantur, Carotidum anastomoses in pleris-

que animalibus circa Calvariæ basin, sub *dura meninge* peraguntur, idque diverso ritu; in quibusdam per vasa retis mirabilis, à latere alterutro ad alterum communicata; in aliis (uti cum admiratione quadam observavimus in *Equo*) inter Carotidum truncos *canalis arteriosus* *producitur*, quo sanguis à latere uno in aliud, & vice versa, traduci queat. Insuper vero *intra duram matrem*, circa *ἑγκεφάλου* basin, ejusmodi arteriarum *inosculationes* in homine & quadrupedibus quibusvis perfectioribus continuo habentur.

Horum ratio esse videtur, *partim* ut sanguis è corde in diversas cerebri plagas deducendus, prius quam ad loca designata perveniat, quoad partes & particulas exacte misceatur. Nam sanguinis torrens, quoniam in minutiores rivulos divisus, tam longo circuitu incedit, langueret, ejusque spiritus depauperari possent; denique ipse nimium defervesceret, nisi varii *laticis* ejus ab utroque latere & aliunde *concursum*, hanc flammam vitalem, brevi in spiritus æthereos cessuram, de novo accenderent.

Veruntamen subest *alia*, eaque longe potior, multiplicis horum vasorum inosculationis ratio; nimirum ut *sanguini* in diversas cerebri regiones ituro, in singulas *multiplex*, eaque *certior via* pateat; adeo ut uno forte aut altero præcluso aditu, alius tamen succedaneus facile reperiatur: ex. gratia, si *Carotides* *unius* lateris obstruerentur, tum lateris *alterius* vasa provinciae *utrique* prospiciant. Etiam quoad arterias *vertebrales* eodem ritu providetur. Porro si *carotides* utraque infarciuntur, per *vertebrales* singularum munera supplentur, & vice versa, *vertebraliū* occlusarum defectus *Carotides* resarciunt.

Ad hunc modum, ne sanguinis uspiam in quavis cerebri aut appendicis ejus intra cranium parte affluxus deficiat, singulari artificio cautum est: Cum enim laticis hujus *quatuor* sint *distincti*, & ab invicem remoti *aditus*, si forsan *tres* eorum occludi contigerit, per unicum tantum sanguis advectus reliquorum omnium canales & ductus illico supplebit. Id quod experimento à me, non sine admiratione, summa & voluptate sæpius facto, comprobatur. Nempe liquorem atramento tinctum, quoties in carotidem alterutram injeci, statim rami utriusque lateris, imo & arteriarum vertebraliū præcipuæ propagines eadem tinctura inficiebantur: quinimo si *talis injectio per unicum aditum aliquoties iteretur*, *vasa quemlibet cerebri & cerebelli angulum & recessum perrepantia eodem colore imbuuntur*: Etiam quibus rete mirabile adest, tinctura injecta ex *uno* latere, vasorum plexus retiformes in *utroque* pervadet. Hinc plane constat, quod inter vasa totum *ἑγκεφάλου* irrigantia, communicatio habetur; & licet quælibet arteria ad unicam regionem, seu peculiarem sibi provinciam feratur, eique seorsim prospiciat; tamen ne pars ulla sanguinis influentiæ privetur, ad quamlibet plures viæ per istorum vasorum inosculationes patefcunt, ita ut si vasa appropriata muneri suo fortè defuerint, defectus iste statim ab aliis vicinis compensetur.

Non ita pridem cujusdam defuncti cadaver diffecimus, quem *scirrhus* intra mesenterium ingens, ac demum ulcerosus extinxerat: in eo, dum cranium aperto, quæ ad *ἑγκεφάλου* pertinebant lustravimus, *carotidem dextram* intra cranium emergentem, plane *osseam*, seu potius *lapideam* (cavitate ejus fere in totum occlusa) invenimus; adeo ut sanguinis influxu hac via denegato, mirum videatur quare æger non prius interiisset Apoplecticus: quod equidem

dem in tantum abfuit, ut mentis suæ & functionis animalis libero exercitio usque ad extremum vitæ momentum potiretur. Enimvero contra illud Apoplexiæ periculum natura remedium satis idoneum substituerat; nimirum ex eodem latere quo *carotis defecerat*, *Arteria vertebralis*, Tubuli mole aucta, *pars sua* alterius lateris *tripulo major evaserat*: Quippe sanguis *Carotide* exclusus, vertebralis solito vectigali sese insuper addens, & duplicato fluvio in eundem alveum confluens, arteriæ istius canalem ita supra modum dilataverat. Vir Egregius circa initium ægritudinis suæ atroci capitis dolore juxta latus sinistrum torquebatur; cujus causa nescio an probabilior assignari possit, quam quod sanguis carotide dextra exclusus, cum primo in sinistram impetuosius irrueret, membranam distenderat; ideoque idem affectus postea sponte evanuit, nimirum sanguine superfluo per arteriam vertebralem derivato.

3. Circa hæc vasa sanguifera, *piam matrem* obducentia, observamus, *arterias & venas*, dum à finibus oppositis prodeuntes invicem occurrunt, non modò per singulares propagines mutuo inosculatas sarcinam suam immediate transferre, uti in aliis corporis partibus fieri solet: sed varie complicata & intertexta, ubique *plexus admirandos* constituere, quibus ut plurimum glandulæ perexiguæ valde numerosæ interferuntur. Id quod videre est, non tantum in *plexibus* qui *Chorooides* appellantur, (quo nomine, præter illos qui intra cerebri plicaturam reperiuntur, etiam alios pone cerebellum confitos dignamur,) verum ejusmodi vasorum plexus, cum glandulis interfertis, per totum cerebri ac cerebelli ambitum, & interiores recessus, ac præcipuè inter anfractuum & interstitiorum hiatus, ubique sparsi conspiciuntur. Hoc liquido patet in cerebro humidiori, aut hydropico, ubi glandulæ alias perexiguæ, ut fere visum fugiant, à madore intumefactæ, facile percipiuntur: porro à plexibus prædictis circumquaque confitis vasa exilia ubique dimissa, cerebri ejusque appendicis substantiam corticalem, & medullarem quoque aliquatenus subeunt; nam si liquorem attratum *Carotidi* injicias, præter vasorum propagines, quas eodem colore ubivis intingit, etiam puncta nigricantia sparsim in cerebri substantia apparebunt: porro si vivi animalis cerebrum disseccetur, sanguis tum è cortice, tum è medullari ejus parte vividus scaturiet. Quorum omnium ratio & finis si inquirantur, videtur quod isti vasorum plexus, repetitis ambagibus varie complicati, veluti *canaliculi serpentinii alembico appensi fuerint*, quorum per angustias sanguis longo circuitu transiens, subtilior usque & elaboratior evadit; nimirum crassiore sui parte inter transeundum sensim deposita, aut per ramulos venosos amandata; adeoque demum sanguis tantum purissimus, & valde spirituosus, atque ipse in spiritus animales jamjam evasurus, intra cerebri poros & meatus admittatur. Cæterum uti *cruor*, sive pars sanguinolenta à *venis* absorbetur, ita verisimile est, *serum* sive partem aquosam à *glandulis* intertextis excipi: Etenim haud constat ob quem alium finem hæ arteriæ totidem glandulis ubique stipentur, nisi ut serositates superfluas in easdem deponant. Inter plexus istos haud constat nervos reperi, qui succum aliquem aut humorem serosum iis glandulis demandent; & nondum comperi, utrum lymphæductus hæc vasa comitentur: Quare opinari fas sit, dum purior & spirituosa sanguinis portio, à

reliqua ejus massa secreta in cerebrum exstillatur, humiditates serofas à glandulis, quæ numerosæ adsunt, excipi, & ab iisdem aliquamdiu retineri, donec in venas iterum inanefcentes remandari poterint.

Haftenus vasorum sanguiferorum, quæ *pia matri* quaquaversus intertexta sunt, ramificationes tantum superiores lustravimus; eorumque plexus, qui velut sylvæ coma, aut hederæ serpentes, totius *ἐγκεφάλου* exteriorem abitum obvelant. Quo autem ritu, & artificio quasi chymico, vasa hæc spiritus animales cerebro ac cerebello instillant, ac invicem præterea usui inserviunt, infra dicetur, postquam densissimi hujus nemoris aspectum inferiorem, ac humo proximum, scilicet *arteriarum* omnium quæ cerebro destinantur *truncos majores*, ubi Cranium pertranseunt, & superius emergunt, consideraverimus.

C A P U T VIII.

Ostenditur quo discrimine Arteria in variis animalibus cranium pertranseunt: Item quæ sit cujusque ratio, & in quem usum Rete mirabile constituitur.

Arteria cerebro destinatae numero sunt quatuor, sc. *duæ carotides*, & *totidem vertebrales*. Circa priores supra observavimus, earum truncos apparatu quodam veluti mechanico os cuneiforme pertransire; nimirum utraque arteria sub ipso ascensu incurvatur ita, ac intorquitur, ut antequam cerebrum attingat, repetito littorum objectu, seu obice quodam impeditus, eo tardius & minus rapide influat. Hoc autem in cunctis animalibus haud uno eodemque ritu efficitur: licet enim *arteria ascensus in omnibus sit obliquus & intortus*, ipsa tamen in quibusdam, sc. *homine & equo*, *majori ambitu circumflexa*, & *trunco etiam singulari ac indiviso* ad cerebrum usque progreditur: Cum in plerisque aliis quadrupedibus eadem *minori circuitu* cranium superet, & mox sub *dura matre* delitescens, in *plexus retiformes*, *rete mirabile* vulgo dictos, ibidem divaricetur: Itaque è re fore videtur ut in varias hujusce discriminis rationes inquiramus.

Primò igitur advertimus in *homine*, quod *arteria carotis* aliquando *posterius* quàm in alio quovis animali calvariam ingreditur, sc. juxta illud foramen, per quod *sinus lateralis* in *venam jugularem* desiturus cranio elabitur; nam in *cæteris* hæc arteria sub extremitate, seu processu acuto ossis petrosi intra cranium emergit: verum in *capite humano*, eadem ambage longiori circumducta, (ut sanguinis torrens, priusquam ad cerebri oram appellit, fracto impetu lenius & placidius fluat) prope specum ab ingressu sinus lateralis factam calvariæ basin attingit; ubi statim intorta, canalem proprium ossi cuneiformi insculptum subit, & in majorem cautelam *tunica insuper ascititia* crassiore investitur. *Duplex* hoc munimen adhiberi videtur, ne sanguis, dum nimis ebulliens, versus caput impetuosius rapiatur, & circa cranii ingressum (ubi

(ubi scil. à directo ascensu detorqueri incipit) gurgitem fecerit , alveique ripas , ni firmiores essent , eluvione sua diruperit : *Arteria* canali osseo elapsa , tunicam quoque ascititiam deponit ; cumque jam facta tecta intra cranium evaserit , tunica solum propria investita , longo tractatu juxta latus sellæ Turcicæ , sub *dura matre* prorepat , & medio transitu velut in convallem depressa , mox iterum evecta pergit , donec ad caput *sellæ Turcicæ* perveniatur ; ubi rursus ambitu quodam incurvata ac intorta , recta ascendit , & *duram matrem* perforans , versus cerebrum effertur. Carotidis hujus truncus , Mæandri instar , situ admodum flexuoso calvariam pertransiens , *Figura prima Tabulæ* sequentis apte repræsentatur.





Si hujusmodi *confirmationis ratio* inquiritur , facile occurrit , in capite humano , ubi generosi affectus , & magni animorum impetus ac ardores excitantur , sanguinis in cerebri oras appulsum debere esse liberum & expeditum ; ejusque fluvium decurrere oportuit , non rivulis angustis & multifariam divisis , qui vix molendinum agant , sed lato semper & aperto alveo , qualis navem velis expansis ferat. Atque hoc quidem respectu differt homo à plebisque brutis , quibus *arteria* in mille furculos divisa , ne sanguinem pleniore alveo , aut citatiore , quam par est , cursu , ad cerebrum evehat , *plexus retiformes* constituit , quibus nempe efficitur , ut sanguis tarde admodum , lenique & æquabili ferè stillicidio in cerebrum illibatur. Quod si verum est , uti nonnulli affirmant , *rete mirabile* etiam in cerebro humano interdum reperiri , credo equidem hoc in ejusmodi solum hominibus locum habere , qui exporrecta indole , omnique animi impetu & ardore destituti , jumentis hebetioribus fortitudine & sapientia parum præstant.


Secundò , ad *carotidis* in homine structuram proxime accedit Conformatio ejus in equo ; namque huic etiam *posterius & majori ambage* quam in aliis quadrupedibus , *arteria* cranium ingreditur : quo superato , truncus ejus , ambitu quodam intortus , ac dein aliquantulum depressus , ad Sellæ Turcicæ latus integer , usque amplo ac aperto alveo procedit : Quod equidem ita fieri oportuit , quoniam huic animali , quasi ad bellum & pericula quævis aggredienda nato , magnanimi & feroces impetus conveniebant ; adeoque opus erat , ut sanguis libero ac uberiori decursu , & (si quando occasio requirit) pleno torrente , cerebrum ascenderet : at vero sanguis licet eodem indiviso canale cranii equini basin pertranscat , non uno tamen singulari aditu pervenire debuit ad ipsum cerebrum ; quippe cujus campages in equo longe imbecillior ac frigidior quam in homine existens , à sanguine *αἷμας* irruente inundari ac obrui posset : quapropter *magnus arteriæ fluvius* per duo velut emissaria sese exonerat , totidemque distinctis cerebri locis laticem suum affundit. Porro quasi hac ratione contra cerebri diluvium haud satis cautum esset , inter utriusque arteriæ alveos , *canalis transversus* , quasi diverticulum , efformatur ; per quod sanguis spatio angustatus , potius quam cerebrum opprimat , aut inundet , secedere , & ripa alterutra in alteram fluere possit & refruere. Insuper item , ab arteriæ utriusque trunco furculi quidam emissi , glandulæ pituitariæ inferuntur , quorum usus proculdubio est , sanguinis nimis aquosi serositates quasdam secernere , inque glandulam istam deponere ; quo reliquus latex sanguineus cerebro inferendus , magis purus

& defæcatus evadat. Quo ritu arteriæ carotides in capite equino cranii basin pertranseunt, in Tabulæ sequentis *Figura secunda* repræsentatur. Nondum *simia*, *cercopithecus*, aut etiam *leonis* cerebra inspiciendi opportunitatem nactus sum; verum est cur suspicer etiam in his *carotides trunco singulari* cranium trajicere: in *ove*, *vitulo*, *porco*, imo in *cane*, *vulpe*, *fele*, & cæteris quadrupedibus quos hæcenus disseccare contigit, hæc arteria in *plexus retiformes* divaricatur, quæ vasa quas ob causas, & in quos *usus* ita conformantur, jam proxime inquiramus.

Tertio igitur, *plerique alia quadrupedes*, secus ac *homo & equus*, *Rete mirabile* arteriæ carotidi adjunctum habent: Revera hoc in tam multis occurrit, ut vulgaris Anatomia cunctis animalibus & ipsi etiam homini adesse pronuntiaverit. In quibus reperitur, observamus, quod arteria cranium subitura non ita longa ambage circumducitur, quin juxta posteriorem *sella Turcica* partem emergens, statim in propagines exiles dividitur; ita tamen ut *canaliculus unus* recta protendatur, quem sanguis placide decurrens sine remora pertransit, è vestigio in cerebrum evehctus: verum è latere istius *plures rivuli* quaquaversus derivantur, in quos sanguis impetuosius ascendens facile divertat: *rivuli* isti *partim* in *ductus venosos ejusdem*, & *vasa alterius lateris* inosculantur, & *partim* in *glandulam pituitariam* feruntur, *partimque*, ambage facta, in *priorem arteria alveum* revertuntur. Rem ita habere, præter nudam inspectionem, hoc experimento plane constat: Si infra cranium liquor atratus carotidis trunco blande ac sensum injicitur, iste ductum rectum pertransiens statim in cerebrum feretur, neque later alia plexus vasa tinctura sua inficiet; sin liquor iste affatim & cum inpetu immittitur, illico in plexum currens, ejusdem & oppositi lateris vasa, necnon citeriorem glandulæ partem, & compagem ejus interiorem subiens denigrabit. Si hujusmodi vasorum plexus, sive retis mirabilis usus inquiratur; dico ipsum præcipue in hos fines constitui, sc. 1. ut sanguinis torrente in rivulos exiles diviso, rapidior ejus decursus in tantum hebetetur ac refringatur, ut cerebro nisi paulatim instillari nequeat. Secus enim in jumentis quæ pendulo incedunt capite, ac cerebrum imbecillius habent, liberior sanguinis influxus cerebri molem facile obruat, ac spiritus animales pessundet. 2. *Carotidum* in plexus retiformes divaricatio quandam alium haud minoris momenti usum præstat, nempe ut sanguis aquosior existens (prout ejus temperamentum est in plerisque brutis, ac præsertim iis, quæ herbaceis vescuntur) priusquam in cerebrum affunditur, feri superflui partem aliquam glandulæ pituitariæ demandet, partemque aliam in furculos venosos, versus cor reducendam instillet. 3. Denique, in quantum vasa utriusque lateris mutuo inosculantur, hac ratione cautum est, *tum* ut sanguis antequam cerebrum conscendat, exacte misceatur, *tum* ut viæ pro com meatu ejus certiores fiant: quippe si forsan obstructio circa *rete mirabile* in uno latere contingat, sanguis ab isto plexu mox in alterum traductus aditum inveniat: hanc ob causam, nempe ut sanguini citra impedimenta quævis trajiciendo melius caveatur, non modo sub *dura matre*, circa *rete mirabile* vasa inosculantur, verum utriusque lateris arteriæ rursus idem faciunt, quamprimum *pia matri* innixæ, cerebri superficiem attingunt, prout superius ostendit sum erat. Hujusmodi vasorum in *rete mirabili* inosculationibus efficitur,

ut





ut liquor atratus uni *carotidi* injectus, ac sursum emissus, per truncum arteriæ in opposito latere descendat, prout alibi observavimus: *Retis mirabilis adumbratio quædam rudis in Tabula sequentis Figura tertia exprimitur.*

Sicut autem *Carotides* (de quarum munere & ascensu hætenus dictum) sanguinis tributa *cerebro* destinata important; ita *vertebrales Cerebello, & postica medulla oblongata parti* irrigandis potissimum inserviunt: hinc quia *Cerebelli conformatio* in cunctis animalibus similis existit, idcirco etiam *arteria vertebrales*, secus ac *carotides*, sine magno discrimine in quibusvis similes reperiuntur: Neque enim pro arteriarum vertebralium intra Cranium admissione, sive introitu, magno apparatu opus esse videtur; quippe cum illæ minorem sanguinis portionem importent, cumque sanguis iste cerebello impendendus, nullis ibidem passionum aut conceptuum perturbationibus agitari soleat; eapropter haud necesse est, ut torrenti ejus, aut *remora*, aut *incitamentum* quodvis apponi debeat.

Arteria vertebralis à ramo subclavio exorta, toto per cervicem ascensu, foramina vertebrarum extuberantiis incisa pertransit, donec prope occipitii basin pervenitur, ubi eadem utrinque deflexa, perque foramen ultimum, excepto quâ spinalis medulla egreditur, intra cranium admissa, per medullæ oblongatæ latus defertur; quamprimum autem è regione cerebelli adducitur, ramos utrinque emittit, qui *superficiem* ejus obducunt, ac insuper à *tergo* ejus plexus haud minus insignes, quam sunt Choroeides vulgo dicti, cum glandulis amplioribus densissime intertextis, constituunt. Sicut *istæ propagines succum* pro spirituum animalium exstillatione requisitum, ita hæc sanguinem caloricum, simulque à colluvie serosa depurandum convehunt. Porro infra cerebellum utrique rami vertebrales ad se mutuo inclinati uniuntur eum, uti videtur, in finem, ut si ex alterutra parte sanguinis affluxus præcluderetur, ex altera in totum cerebelli ejusque vicinæ ambitum suppeditari possit. Hæc vasa sanguifera cerebellum, non secus ac alia cerebrum obducentia, plexus insignes tum in extrema ejus ac medullæ oblongatæ superficie, tum intra ipsius plicas & lamellas constituunt; è quibus ubique in subjectam ejus compagem propagines exiles dimittuntur, adeo ut ex his liquor subtilis velut exstillatus, ac à cerebelli substantia corticali imbibitus, in *spiritus animales* facessere videatur. Quo ritu, & in quibus τὰ ἐγκεφάλου partibus spirituum animalium productio perficiatur, jam proxime inquirendum restat.

Figura Prima.

Exhibet Arteriæ carotidis ascensum, & situm intra cranium Humanum, priusquam versus cerebrum efferatur.

- A. *Arteria truncus versus cranium ascendens.*
- B. *Idem dum canali osseo includitur, tunica adscititia investitus.*
- B. C. *Arteria intra Cranii sinus porrecta incurvatura, duplex S, inclinatum referens.*
- D. *Ejusdem truncus versus cerebrum elatus.*

Figura Secunda.

Arteriarum Carotidum ascensum, & sicum intra cranium Equinum exhibet.

- A. A. *Utraque carotis versus cranium ascendens.*
 B. B. *Utriusque truncus, cranio superato, quasi in convallem depressus.*
 C. C. *Utriusque communicationes per ramos transversos.*
 D. D. *Ramus ab utroque trunco in duram meningem destinatus.*
 d.d.d.d.d. *Sirculi utrinque in glandulam pituitariam dimissi.*
 E. E. F. F. *Utraque carotis antequam cerebrum petat divisa, & cum duplici trunco ascendens.*

Figura Tertia.

Exhibet Rete mirabile cum glandula pituitaria in cranio vitulino.

- A. a. *Arteria Canalis directus.*
 B. *Vasorum plexus retiformis à canali isto versus glandulam pituitariam protensus.*
 C. *Glandula Pituitaria.*

Figura Quarta.

Ostendit quo ritu sinus lateralis in venam jugularem cum diverticulo appenso cedit.

- A. *Sinus lateralis descendens.*
 B. *Sinus iste cranio elapsus, in cavitatem amplam & rotundam dilatatus, cui excipiendo peculiaris specus in externa cranii parte efformatur.*
 C. *Prædicta cavitas sive diverticulum, in quod sanguis descensurus divertere possit, ne forte in venam jugularem nimis confertim irruat; quo item cavetur ne sanguis è vena jugulari in sinum regurgitet.*
 D. *Vene jugularis principium.*

CAPUT IX.

Ostenditur quo apparatu, & in quibus τ Ἐγκεφάλῳ locis, spiritus Animales progignuntur: Item Piæ matris *Vsus* alii, & accidentia subduntur.

EX sanguiductuum, qui Piam matrem quaquaversus obducunt ac intertexunt, descriptione hætenus præmissa, orationis filo quodam ducimur ad considerandum quali apparatu, & in quibus cerebri & appendicis ejus locis, spirituum animalium productio peragatur.

I. Quoad prius, è supradictis constat, quod *sanguis* sit ipsa *materies*, è qua spiritus animales proliciuntur; quodque *vasa eum continentia*, & per totum ἐγκεφάλου ambitum ubivis perducentia, sint velut *organa destillatoria*, quæ sanguinem exactius *circulando*, ac velut *sublimando*, puriores ejus magisque activas particulas à reliquis secernunt, ac subtiliant, easque demum spiritualizatas cerebro & appendici ejus insinuant. Circa hanc *materiam destillandam*, optima quidem ratione cautum est, ut penus ejus usque in idonea *qualitate*, ac debita *quantitate* suppeditetur.

Respectu *Qualitatis*, è tota massa sanguinea, portio maxime *volatilis, spirituosus*, & *elementis activis* prædita, versus ἐγκέφαλον constanter assurgere debet; id quod *partim sponte* succedit, *partimque* ut commodius fiat, *artificio* quodam providetur; nempe *arteriæ vertebrales* in cunctis animalibus recta fere & perpendiculariter ascendentes, quodammodo efficiunt, ut sanguis tantum levior & magis subtilis sursum efferatur, reliquo crassiore in viliora artuum ac viscerum quorundam munia velut subsidente. Quinimo etiam *Carotides* in homine caput erectum, ac cæteris partibus eminentius gerente, & in equo vultus suos aliquatenus attollente, idem privilegium nactæ sunt, nempe ut accliviore earum ascensu, sanguis tantum purior & volatilior cerebri regionem conscendat; in quadrupedibus autem aliis, qui prono Capite incedunt, & quibus sanguis frigidior & aquosior existens, in cerebrum facile illabi, idemque nimis diluere possit, huic malo aliquatenus succurritur, *rete mirabili* & *glandula pituitaria* carotidibus appensis; quæ quidem superfluas sanguinis humiditates excipiunt, ipsumque adeo ante cerebri appulsum magis purum & defæcatum reddunt.

Ut verò sanguis usque debita *quantitate*, nempe velut *pondere* & *mensura* vasis destillatorii circa ἐγκεφάλου ambitum protensis suppeditetur, *Carotidum* in omnibus circa cranii basin *apparatus* egregiè præstat: quippe sinuosa earum *incurvatura*, aut in *plexus divaricatio*, sanguinis aut *nimum*, aut *rapidorem appulsum* inhibet: deinde *ne illius aditus* uspiam *præcludatur*, vasorum omnium utriusque lateris mutuæ *inosculationes* efficiunt. Ad hunc modum, circa spirituum animalium, non secus ac Elixiris Chymici extractionem proceditur; nimirum in ipso operationis vestibulo egregiè cavetur, tum ut *materia delectus* habeatur, tum ut *debita* solum illius *proportio* ad destillandum exponatur.

Sanguis hoc ritu velut in opus Chymicum præparatus, *arteriarum quadriga* ad quatuor distinctas τ ἐγκεφάλου plagas evehitur: cumque vasa sanguifera ramificationibus partitis per totum cerebri ejusque appendicis ambitum distributa, gyrorum summitates, necnon anfractus omnes, eorumque hiatus & recessus obducunt; ista materiam in ἐγκέφαλον extillandam, ubique per totam cerebri & cerebelli peripheriam, juxta corticalem utriusque substantiam, præ foribus sistunt; è qua ut spiritus extillati in utriusque compagem subjectam insinuentur, hoc modo efficitur: *Sanguis* per angustiores vasorum plexus & divaricationes, veluti per *serpentinus* (uti dictum est) *Alembici canales*, diductus, in liquore suo quantum fieri potest subtiliatur; interea quod cruentum est, à venarum furculis ubique sociis, aut obviam factis, & quod serosum est, à glandulis ubique dispersis excipitur; attamen illius

pars defæcator & spirituosior ulterius provecta, per propagines exiles ubique dimissas, ipsis cerebri ac cerebelli poris ac meatibus profundius instillatur, ubi quamprimum spirituosæ istæ particulæ à partis subjectæ fermento inspirantur, illico in spiritus animales puros putosque facessunt; qui mox à substantia corticali in medullarem scaturientes, ibidem functionis animalis munera exequuntur. Quid ipsius *cerebri ac cerebelli corpus* peculiare, & *particulæ constitutivæ*, spirituum animalium intra utriusque substantiam generationi perfectionique conducunt, posthac, cum de partium istarum usu agemus, ostenditur: modo, quod superius innuimus, annotetur; nempe quod liquoris spirituosus è sanguine circa *piam matrem* fluxilis *exstillatio* insigni modo promoveatur, tum à *calore ambiente*, qui à sanguine intra sinus contento, tanquam à *balneomariæ* excitatur, & novo jugiter affluente ditatur; tum à *meningum* velut *Alembici obductione*, qua scilicet particulæ spirituosæ ad avolandum aptæ cohibentur, inque partes subjectas urgentur.

At vero licet spiritus animales omnino è sanguine procreantur; haud tamen sanguis cerebrum ejusque appendicem irrigans, solummodo huic operi impenditur: Nam quoad vasa sanguifera, quæ ex arteriarum tum *Carotidum*, tum *Vertebralium* truncis oriunda, totum *ἐνέπαιον* ejusque partes & processus omnes obducunt; licet pleraque illorum, haud tamen omnia, spirituum animalium canaliculi destillatorii existunt. Nam spiritus animales non producantur in omnibus locis, ad quos hæc vasa pertingunt; statuimus enim, *hos spiritus solummodo in cerebro & cerebello procreari* (quod equidem facile erit probare per symptomata quæ in *Apoplexia* & *Paralyti* contingunt, & postea clare ostendetur;) atque à gemina hac spirituum animalium scaturigine isti in cæteras quascunque partes emanant, & totum nervosum genus constanti affluxu irradiant. Interim *Medulla oblongata*, ejusque *varii processus & protuberant. a spirituum animalium in cerebro & cerebello procreatorum*, & exinde emanantium, aut *condi*, aut *commeatus via* sunt; in quantum vero arteriæ & venæ etiam has partes densa propaginum serie investiant, quodque intra cerebri plicaturam, *plexus dicti choroeides* solute & laxè suspenduntur, propter alias rationes hæc ita institui videntur; scilicet tum ut *partes istæ calore*, velut à perenni foco suppeditato *actuantur*; tum ut *spiritibus* qui illic scaturiunt *succus nuncius* impendatur.

Quoad prius, ut spiritus animales jamjam perfecti libere expandantur, & systema nervosum irradiant, requiri videtur, ut calor ambiens à sanguine illic confluente excitatus, spatiola quævis pro transitu illorum aperiat, & commeatus vias insigniter dilatet: quare supra innuimus, quoniam vasorum propagines corpori calloso altius inferi minime debuerant (quippe ne sanguine perpetim influente, spirituum in hoc emporio diversantium commercia perturbentur) ideo *plexus choroeides* sub *camera ejus* suspenditur, ut saltem vicino hoc, quasi *Hypocausto*, calor illic conservetur. Insuper hujus *plexus* alium usum innuimus; nempe ut sanguis per angustos vasorum mæandros & convolutiones pertransiens, recrementa sua serosa in glandulas aut ductus venosos deponeret.

2. Attamen 2. quod plures eorundem vasorum quæ *cerebrum & cerebellum* irrigant, rami, minoresque propagines, etiam *medullam oblongatam* obducunt, ejusque

ejusque poros & penitiorem substantiam aliquatenus subintrant, (intra quam spiritus animales minimè progigni, sed tantum exerceri, & expandi asserimus) dico ob hunc alium respectum illud ita fieri; nimirum ut medullæ oblongatæ compages constantem *nutritionis* penum, cujus opus habet, sanguine affuso imbibat. Quippe dum spiritus animales è cerebro & cerebello in nervosum genus influentes, hujus ductum quasi viam regiam pertranseunt; iis tanquam iter confecturis, à sanguine irriguo hic pabulum aliquod subministrari oportet: Enimverò supponimus (quod item postea liquido patebit) *medullam oblongatam una cum partibus nervosis duplici humore perfundi*; scilicet *uno spirituoso & summe activo*, qui omnino à cerebro aut cerebello profluit, & exinde in totum nervosum genus derivatus, *facultates sensitivam & locomotivam* iis elargitur; atque *altero humore molliori, magisque oleoso & sulphureo*, qui à sanguine suppeditatus, & cuilibet parti immediatè affusus, iis *caloris & vegetationis* author existit. Ambo hi succi inter se conveniunt, ac ubivis conjuncti, & simul maritati, habent se uti *semen masculinum & foemininum* invicem commista; adeoque quibusvis partibus, una *sensus & motus*, necnon *vita & vegetationis* *divinæ* impertiunt. Quare observare est, universas totius corporis partes, à quibus motus ac sensus perficiuntur, non tantum spiritu animali turgescere, cujus influxu si quidem privantur, illico resolutionem patiuntur; verum & vasa quoque sanguifera admittere, quorum tributo si defraudentur, statim emarcescunt, aut sphacelo afficiuntur. Quapropter ut carnes, membranæ, & ossa quævis sanguine irrigantur, ita *ope microscopii* detegere licebit, minuta quorundam nervorum corpora, una cum propriis illorum fibrillis, arteriarum & venarum capillamentis stipari; ut minimè dubitemus asserere, *vasa cerebri & cerebelli* superficiem penetrantia, iis materiam subtilem pro *spirituum animalium generatione* instillare; ast eorundem vasorum propagines quasdam alias *medullam oblongatam* obducentes, ei solummodo *calorem & succum nutritivum* impertire: denique plexus choroeides præcipuè caloris dispensandi, atque aliquatenus serosi laticis separandi gratia, sub camera medullæ oblongatæ reconditos fuisse. Verum super his erit postea fusius differendi locus, cum de *succo nutritio ac nervoso* agemus, cumque celebrem istam controversiam, scilicet an *nutritio fiat per sanguinem aut per nervos*, expendemus: porro alibi plenius dicemus de *spirituum animalium natura*, *stypostasi* ac *indole* diversimoda; item quid *cerebri substantia*, & *partium conformatio*, eorum productioni contribuat.

Haftenus de *Pia matre & vasis sanguiferis*, quæ huic innitentia, ejusque protensionem secuta, totum *κεφαλον* irrigant, fusè disseruimus: priusquam vero hujus *membranæ* considerationem planè dimittimus, inquirendum erit, quali *motu ac sensu* eadem polleat. Certè non immerito est, quod acutiori hujus *sensu* immanes *cephalalgias* ascribimus; (in quibus tamen quoritu hæc meninx afficitur, non ita facile constat.) Vulgaris opinio est, quod acres & tetri *vapores*, à visceribus imi ventris, ac imprimis à ventriculo, hypochondriis, aut utero elevati, hanc membranam feriunt, adeoque eam dolore percellunt. Nos autem, licet hoc impossibile esse dicamus, ut vapores tot viscerum ac ossium interstitia, ac obices, sine molestia quavis penetrantes, unquam ad caput perveniant, eique noxam inferant: verumtamen

haud inficias imus, quin à sanguine intra cerebri confinia æstuante, interdum effluvia vaporosa procedant, quæ sub *pia matre* conclusa, ac veluti in nubem aggesta, eam valde inflant ac distendunt, adeoque dolore afficiunt. Sæpius vidi in capite recens post mortem aperto, *piam matrem* vesicæ instar distentam, ac pelluentem, ut aqua plurima subtus inclusa, eadem intumescere videretur; quod tamen omnino fieri compertum est à flatu membranarum distendente: ipsa enim dissecta, sine lymphæ effusione tumor illico subsidebat.

At vero *Cephalalgias* quæ propter hujus membranæ labem eveniunt, alia quadam ratione potissimum excitari censemus; nempe in quantum hæc *meninx* à sanguine supra modum ebulliente, ejusque poros irruente, *continui solutionem* patitur, adeoque in spasmos leviores contrahitur. Defunctorum capita, qui dum in vivis agerent, cephalalgia miserrimæ erant obnoxii, aliquoties aperui; in quibus juxta *sinum longitudinalem*, ubi dolorum sedes erat, pia ac interior meninx duræ ac exteriori per aliquod spatium, sæpe duos digitos latum, accrescebat, & coalitione sua tumorem asperum & inæqualem excitaverat, in quo vasorum oscula ita penitus obserabantur, ut sanguini, licet plurimum ebullienti, in sinum propinquum nullus aditus relinqueretur.

Quoad membranæ hujus *motum perennem*, ei *systolen* & *diastolen* per se competere, prorsus negamus; utcumque in quibusdam arteriæ pulsantes talem eatenus simulent, ut vulgari huic opinioni ansam fortè aliquam præbuerint. Interea tamen existimare fas sit, hanc *meningem*, eo quod sit valde sensibilis, *spasms* & *motibus convulsivis* obnoxiam reddi: quodque à majore ejus *contractione paroxysmi epileptici*, à *corrugatione* autem ejus *minori* & *partiali*, immanes, uti dictum est, *cephalgia*, ac insuper interdum *scotomia*, *vertigines*, & sæpe nervorum origine in consensum tracta, membri aut visceris alicujus procul diffiti spasmi oriuntur.

C A P U T X.

Cerebri ita propriè dicti Descriptio, ejusque partium Explicatio, & Usus.

H Actenus *integumenta cerebri*, tum *ossea*, tum *membranosa*, necnon arterias & venas tanquam hederas accrescentes, iisdemque innixas, & per universum *ἡ κεφαλή* ambitum distributas lustravimus. Jam proximè restat ut velamentis istis amotis, ipsius *cerebri* & appendicis ejus fabricam, & veram hypotyposin, una cum partium omnium *actione* & *usu* consideremus. Hic autem primo intuitu hæc tria occurrunt, nempe *Cerebrum*, *Medulla oblongata*, & *cerebellum*: E quibus videtur quod *medulla oblongata* sit *Caudex communis*, cui *cerebrum* & *cerebellum* velut *Tubera* adnascuntur. Quare nonnulli contendunt *funem medullarem* esse partem principem, *cerebrum* autem & *cerebellum*

cerebellum appendices ejus : Attamen rem secus habere, hinc constat, quoniam hæc corpora, in spirituum animalium tum *generatione*, tum *dispensatione*, prioris & nobilioris sunt usus quàm medulla oblongata; ita nimirum, ut in spirituum effluxus è cerebro aut cerebello præcludatur, systema nervosum illico eclipsin patiatur; interim si hoc primariò laboret; cerebrum aut cerebellum haud necessario ejus noxam luunt.

Ut à *cerebro* ordiamur, hoc *duplici* respectu considerari potest; nempe & quoad superficiem ejus *convexam*, seu *exteriolem*, prout in proprio situ & positione conspicitur; & quoad *cavitatem internam*, prout nempe cerebrum apertum, superficie ejus *concava*, expansa, & *inversa* apparet. In superioribus ipsum utroque modo, quo ritu scilicet tum *extra*, tum *intus* habet, *ὡς ἐν τύπῳ* delineandum curavimus: Modo restat è fabrica & conformatione ejus ritè pensitati, ipsius & singularum ejus partium *usus* cernere, ac *officia* designare, de quibus in genere explicari debet, 1. quid *totius cerebri officium* fuerit; dein 2. cum ad particularia descendimus, sub considerationem veniunt 1. *cerebri divisio*, scilicet *duplex ejus hemisphærium*, necnon *binæ utriusque lobi*, seu partitiones; 2. *Cerebri anfractus*, sive *gyri & convolutiones*; 3. *illorum duplex substantia*, scilicet *corticalis & medullaris*; 4. *communis omnium basis*, scilicet *corpus callosum*; 5. *ejus subtensa*, sive *Fornix*; 6. *Cerebri supra medullam oblongatam appensio*, & *ambitus*, 7. *quodque exinde resultat, inane spatium, seu ventriculi à complicatura ejus facti*: Super his, quæ præcipuè notatu digna occurrunt, advertemus; de *nervis olfactoriis*, eorumque *processibus* posthac inquiremus, cum de nervis particulatim dicemus.

1. *Cerebrum* Animæ rationalis in homine, & sensitivæ in brutis animalibus, sedes primaria habetur, & revera tanquam esset præcipuus elater in machina animali, *motuum & conceptuum omnium origo & fons* est: attamen hujus compagi *quædam functiones* præcipuè ac *immediatius* debentur; atque aliæ *tantum mediatè* & minus necessario ab ea dependent. Inter istas quæ prioris generis sunt, *imaginatio*, *memoria*, & *appetitus* potissimum habentur: Videtur enim quod *imaginatio* sit spirituum animalium undulatio quædam, interius in cerebri meditullio incepta, & exinde versus ambitum ejus undequaque expansa: è contra *memoria ætus* consistit in spirituum ab exteriori cerebri ambitu versus meditullium ejus regurgitatione; *Appetitus* demum cietur, in quantum spiritus animales quovis modo circa cerebri meditullium conciti, illinc exterius versus systema nervosum tendunt. Cæteræ hujus Animæ facultates, uti *sensus & motus*, item *passiones*, & *instinctus* merè naturales, licet à cerebro quadamtenus dependent, tamen propriè in *medulla oblongata & cerebello* aut perficiuntur, aut ab iis procedunt.

2. In quibusvis animalibus *cerebri compages* in *duas partes*, velut hemisphæria ab invicem distincta, per totam ferè crassitiem, scilicet usque ad corpus callosum, quod fundi loco est, dividitur; pariterque ac in sensoriis omnibus, & plerisque aliis functionum necessariorum organis, *cerebrum* quasi *duplex* habetur, ut contra unius lateris defectum, alterius supplemento provideatur. Porro in homine, cui *cerebrum* præ cæteris animalibus capax & amplum est, *utrumque hemisphærium* rursus in *duos lobos*, nempe *anteriorum & posteriorem*, subdividitur; inter quos arteriæ carotidis ramus, utrinque instar rivi limitanei productus, eos veluti in binas provincias distinguit. Certè hæc cerebri humani secundaria partitio etiam in majorem ejus tutelam designari videtur;

ut si forsan labes quæpiam alterum, aut utrosque priores lobos occuparit, tamen posteriores, siquidem discontinui sunt, noxæ vicinæ ac latius grassantis contagium evadant: ita cerebrum, velut Castellum, in plures arces, seu propugnacula divisum, eo munitius & expugnatum difficilius existit.

3. Quinetiam universa *cerebri compages*, intra singulas prædictas ejus partitiones, adhuc *magis divisa & variegata apparet*; nam tota ejus exterior superficies *gyris & convolutionibus*, quales ferè sunt intestinorum, inæqualis undique & anfractuosa redditur: Gyri isti ab anteriore cerebri parte, versus posteriorem sinuoso ambitu, & circuitu quasi spirali incedentes, utrumque ejus hemisphærium circundant, ut ductu continuato convolutiones omnes se mutuo excipiant: in cerebro humidiores aut diutius reservato, meninx tenuior singula investiens, ac una colligans, facili negotio avellitur; & tunc gyris, sive plicis apertis, & ab invicem diductis, cerebri substantia quasi in sulcos exarari videtur; è quibus anfractuum juga, sive liræ, haud serie directæ, sed decussatim oriuntur; ita nimirum, ut in fundo cujusque sulci, convolutio è dextra parte oriunda in lævam feratur, dein alia proximè succedens, à latere sinistro emissæ in dextrum erigitur, atque ita vicissim hoc ordine totius cerebri inæqualitates variegantur.

Si inquiritur quid cerebro *gyri & convolutiones* præstant, sive quem ob finem tota ejus compages anfractuosa existit; dicimus cerebrum ita fabricari, *tum* propter *uberiorem alimenti spirituosæ receptionem*, *tum* ob *commodiorem spirituum animalium in quosdam usus dispensationem*. Quoad *alimentum* cerebro impendendum, quoniam illud subtile & maximè elaboratum requiritur; ideo non aditu patentiore, sed poris & meatibus tantum exiguis admitti debuit. Quapropter ut liquoris spirituosæ sufficiens copia suppeditaretur, non tantum ubique in plana cerebri superficie è corticali ejus substantia imbibitur; verum ista cerebri superficies, seu corticalis substantia, plicis ac gyris aspera & inæqualis constituitur, ut succo excipiendo spatia quam fieri potest latissimè ampliarentur: Quippe cerebrum anfractuosum, uti fundus verrucis & formicariis usquequaque confusus, extensionem longè ampliorem obtinet, quam si superficie plana & æquabili instrueretur. Insuper isti *Cerebri anfractus vasa sanguifera*, utpote valde exilia & teretia, variosque in plexus invicem irretita aptius recondunt, ac tuto conservant, quæ si exterius in propatulo distribuerentur, injuriis & noxæ frequenti nimis patefcerent.

Attamen haud minoris momenti ratio & necessitas anfractuum in Cerebro, à *spirituum animalium dispensatione* petitur: Cum enim spiritus animales, propter varios *imaginationis & memoriæ* actus, intra certos & distinctos cancellos commoveri, motusque istos per eosdem tractus, sive orbitas sæpè iterare debent: idcirco propter hæc diversimodas spirituum animalium diataxes, multiplices cerebri plicæ ac convolutiones requiruntur, nempe ut in istis, tanquam in diversis cellulis & apothecis, sensibilibus species reservari, atque illinc pro data occasione evocari queant. Hinc plicæ, seu convolutiones istæ, longè plures ac majores in homine sunt quam in quovis alio animali, nempe propter varios & multiplices facultatum superiorum actus; incerta autem & quasi fortuita serie variegantur, ut functionis animalis exercitia sint libera, & mutabilia, nec ad unum determinata. Gyri isti in quadrupedibus pauciores sunt,

sunt, ac in quibusdam, uti *Fele*, sub certa figura & diatayi reperiuntur: quare hæc bruta vix alia quàm quæ naturæ instinctus & exigentiæ suggerunt, meditantur aut reminiscuntur. In quadrupedibus minoribus, item in volucribus & piscibus, cerebri superficies plana & æqualis, gyris & anfractibus omnino caret: quare hujusmodi animalia res pauciores, easque unius fere tantum generis comprehendunt, aut imitatione addiscunt; utpote quibus cellulae distinctæ & ab invicem partitæ desunt, in quibus diversæ rerum species ac Ideæ seorsim asservantur.

4. Quod vero in perfectioribus animalibus singuli anfractus è *substantia duplici*, scilicet *Corticali & Medullari* constant, ratio esse videtur, ut pars una spirituum animalium *productioni*, & altera illorum *dispensationi & exercitio* inserviat. Etenim existimare fas est, *spiritus animales* omnino, aut maxima ex parte, in *corticali Cerebri substantia procreari*; hæc enim immediatius liquorem subtilem à sanguine secernit, & excipit; insuper eum sale volatili imbuens, in spiritus puros putosque exaltat. Cuivis obvium est, quod arteriæ crebriore propaginum insertione cerebri Corticem subeunt, eique laticem spirituosum instillant; cujus quod superfluum est, ductus venosi pariter subintrantes resorbent ac amandant: interim portio subtilior, hic rude donata, in spiritus facessit. Revera sanguis in quantitate perexigua medullarem cerebri substantiam irrigat; quod equidem caloris excitandi gratia potius fieri videtur, quàm quod spiritus animales istius sanguinis influxu ibidem generentur: Enimvero *sal volatilis*, qui instar fermenti liquorem subtilem è sanguine exstillatum spiritualizat, in *Cerebri cortice*, potius quàm in medutillio ejus, copiosus habetur; quippe pars ista, cineritio colore prædita, *νέριον ἀρρηκτικόν*, & humorem in iis contentum, in quibus *spiritus & sal volatilis* plurimum abundant, aspectu suo refert; imo & *odore armoniaco* (qualem utraque pariter exspirant) plane imitatur. Interim medullaris cerebri substantia, *medulla oblongata & spinali* perquam similis videtur: At vero satis notum est, quod hæ partes medullares spirituum animalium *exercitio & dispensationi*, ac minime illorum *generationi* inserviunt: cujus indicium est, quod sicubi obstructio in illis contingat, quicquid inferius est, spirituum influxu destitutum eclipsin patitur; unde sequitur, quod spiritus Animales Funem medullarem irradiantes, in eo minime producuntur, verum aliunde influunt; & quidni pariter de cerebri medutillio existimemus? Profecto hanc partem spirituum *emporium*, potius quàm *officinam* esse, hinc constat, quoniam animalia quæ *memoria, imaginatione, & appetitu* excellunt, cerebri medulla ampliori instruantur, prout observare est in homine, & quadrupedibus perfectioribus: at quæ facultatibus istis parum opus habere videntur, uti quadrupedes minores, item volucres, & pisces, iis cerebri Cortex uberior, sed pars medullaris minima existit. Experimentum inter pueros familiare est gallinæ caput acu transfigere, interim ut illa, cujus Cerebri moles transadigitur, aliquamdiu vivat valeatque: Cujus ratio est, quod ejusmodi animalibus fere tota cerebri compages sit mere corticalis; quare à tali noxa illata (quandiu medulla immunis perstat) spiritus in minori copia generantur, at eorum commercia ad vitam necessaria haud propterea statim interrumpuntur. Profecto *Avium* cerebra, è corticali & cineritia parte fere omnino constant; pars autem

autem medullaris perexigua est, & solummodo nervum minorem utrinque è cerebri ipsius compage descendentem refert.

Postquam spiritus animales, constanti sanguinis affluxu, intra corticalem cerebri substantiam progignuntur, isti ibidem geniti, atque vehiculo aquoso potiti, statim interius scaturiunt, & brevi *medullas* anfractuum omnium & *sulcos & liras oblinentes* subeunt; unde mox ulterius provecti, per singulos cujusque medullæ particulares tractus in substantiam medullarem, quæ anfractibus omnibus communis, iisque tanquam basis substernitur, nempe in *corpus callosum* velut in campum amplissimum feruntur; ubi, tanquam in cœlo libero & aperto, spiritus isti recens producti exspatiantur.

5. Enimvero medullaris ista substantia, *corpus callosum* dicta, quæ interioriorem cerebri superficiem concamerans, anfractuum omnium medullas in se excipit, propter hunc finem condita, ac ibidem disposita esse videtur; nempe ut in ea spiritus undequaque confluentes, velut in propria sua sphaera expandantur, & facultatum animalium actus exercere incipiant. Hic loci, qui à singulis anfractibus prodeunt, una conveniunt, & quasi in *publico emporio* commorantur; è quo in cujusque facultatis usus, pro data occasione, suscitantur eliciunturque: atqui dum hic otiosi aut minus occupati diversantur, *circulatione* continua magis ac magis depurati evadunt: Quippe spiritus isti recens nati, undequaque ab extima hujus corporis ora (ubi nimirum hæc communis medulla posteriores cerebri productiones, sive utriusque illius hemisphaerii limbum oblinet) versus anteriorem istius corporis callosi partem, ubi crassissimum existit, perpetim blande scatent; ibidemque, si opus fuerit, aut imaginationis actui impenduntur, aut medullæ oblongatæ crura subeuntes, appendicem nervosam actuant & inspirant: Qui vero spiritus illic ab his muniis residui feriantur, illico in *fornicem* incurruntur, ejusque ductum transeuntes, denuo ad posteriorem cerebri regionem circulatione quadam remandantur; denique ad hunc modum per angustiores fornicis meatus penetrantes, spiritus illi magis subtiliantur, simulque, uti verisimile videtur, circulari hoc motu subtiliores quosdam phantasie actus peragunt.

6. Profecto, ut de *Fornice* hic nonnihil dicamus, videtur quod *duplici usui* hæc pars inserviat: scilicet *primo*, ne cerebri latera interiora, laxè & solute pendencia in se concidant, aut extra justæ protensionis limites dimoveantur; ista enim, non solum *pia matris* interventu, & retinaculis ab eo depromptis, medullæ oblongatæ & cerebello cohærent; verum insuper Fornix, ligamenti instar, ab una extremitate cerebri ad alteram producta, totam ejus compagem in debitam figuram situmque coercet & continet: Hæc enim pars pure medullaris, & ejusdem substantiæ cum corpore calloso, hujus tantum processus quidam esse videtur, qui scilicet antè inter corpora striata oriundus, & super bina medullæ oblongatæ crura incedens, eadem primo distinguit; postea ab iis sejunctus, per mediam cavitatem defertur, & circa posticam cerebri partem in duo velut brachia dirimitur, quæ utrinque deflecta, & corporis callosi limbo iterum cohærentia, medullam oblongatam arctè complectuntur, ac Caudici ejus posteriorem cerebri molem, ne diffluat aut dilabatur, connectunt ac firmè colligant. Verum *alter*, atque iste insignior

insignior fornicis usus esse videtur, quem modo innuimus; nempe ut spiritus animales per ejus ductum, ab altera cerebri extremitate ad alteram immediate transeant, atque ita quasi per *pelicani rostrum* in sui ipsius ventrem intortum, *circulentur*.

Quo melius quæ circa cerebri penetralia & interiores recessus modo dicta sunt, intelligantur; libet hic sphaeræ ejus evolutæ, ac veluti in planum projectæ, *Schema* subjungere, ita ut *corporis callosi*, una cum *fornice*, *concava ac intima superficies* satis conspici poterit.

Figura Septima

Exhibet cerebrum Ovinum reclinatum, & in cohæsionum locis juxta corpora striata aliquatenus discissum, ut interior ejus compages evolvi, ac in planum explicari queat.

- A. A. *Substantia cerebri abscissa, quæ in naturali situ complicata, cohærebat cum reliqua illius substantia a.a. super corpora striata relicta.*
- B. *Fornicis truncus ascissus, qui in situ naturali cohærebat cum eiusdem Fornicis basi E.*
- C. C. *Fornicis brachia, quæ Caudicem medullarem è regione glandula pinealis amplexabantur.*
- D. D. *Corporis callosi, margo, qui caudicem medullarem prope cerebellum amplexabatur.*
- E. *Fornicis Basis.*
- F. F. *Fornicis due radices rectæ, inter corpora striata iacentes.*
- G. G. *Processus medullaris transversus, duo corpora striata invicem connectens.*
- H. *Rima iuxta Fornicis radices ad infundibulum ducens.*
- I. I. *Corpora striata, quorum superficies arteriæ ac venæ exiles obducunt.*
- K. K. *Corporis callosi superficies interior, striis medullaribus transversis, sive ab uno cerebri hemisphærio in alterum protensis insignita.*
- L. L. *Thalami nervorum opticorum.*
- M. *Foramen anterius in ventriculum protuberantiis orbicularibus subiectum ducens, quod etiam ad infundibulum per aperturam declivem tendit.*
- N. *Glandula pinealis, quæ separatis & amotis Pia matre ac plexu Choroide, conspectior apparet.*
- O. O. *Protuberantiæ natiformes, quæ hic longe maiores sunt quam in Homine aut Cane.*
- P. P. *Protuberantiæ minores, Testes dictæ, quæ priorum sunt epiphyses.*
- Q. Q. *Processus medullares, è Testibus in cerebelli medulla protensi.*
- R. *Processuum istorum commissura.*
- S. S. *Nervi oculorum pathetici, è processuum istorum commissura oriundi.*
- T. *Foramen posterius, in ventriculum protuberantiis orbicularibus subiectum, atque in ipsam infundibuli aperturam ducens.*
- V. *Scrobs in medullari Caudice, quæ cerebello obiecta, quartum ventriculum efficit.*
- VV. *Cerebelli substantiæ medullaris ramificationes, quæ instar arboris apparent.*
- X. *Medulla oblongata, in spinalem cessura, extremitas.*

CAPUT XI.

Ostenditur quali spirituum animalium motu ac tendentia, facultatum animalium exercitia intra Cerebri confinia peragantur: Item quis sit ventriculorum ejus usus.

H Actenus Cerebri ita propriè dicti, ejusque partium *usus & munera* designantes ostendimus quo ritu spiritus animales in hac principali eorundem officina è sanguine procreantur; ac in quæ diversoria recens producti sponte secedunt, ibique veluti claustris distinctis asservantur, in multiplicia functionis animalis exercitia promendi. Verum quia isti spiritus ita perfectionem adepti, ac operi suo accincti, intra easdem Cerebri partes aliûs modi motus & diversas emanationum vias ineunt; idcirco priusquam ulterius ad illorum tractus intra *medullam oblongatam & Cerebellum* investigandos procedimus, declarare oportet circa hos spiritus intra ipsius Cerebri confinia dispositos, quali instruantur acie, qua forma sese explicent, quibusque viis diffundant se, ac progrediantur, quoties debito ordine conscripti *imaginationis, memoria, appetitus*, aliarumque superiorum animæ *facultatum* actus producant. Quandoquidem autem inferius, post absolutam τὴ ἐγκέφαλος ac *appendicis nervosi* explanationem, demum Coronidis loco de *anima Brutorum*, ejusque potentiis agere statuimus, ideo impræsentiarum hoc penso supersedere possim; nisi quod interim ex re foret, hæc pauca tantum in genere prælibare: scilicet cum *anima inferioris*, sive *brutorum*, *dua* sint partes, nempe *vitalis*, sive *flammea* in sanguine accensa, & *sensitiva*, sive *lucida*, per totum ἐγκέφαλος ejusque *appendicem nervosum* diffusa; partis hujus *lucida* geminam velut *radicem* seu fontem, spiritus animales in Cerebro ac in Cerebello jugiter producti constituunt: quinimo spiritus utriusque *profapia*, quatenus *tum* intra fontes istos, *tum* exinde per systematis nervosi compagem, sub eadem *systasi & contextura* velut *radiosa* continuantur, *anima sensitiva* integram *hypostasim*, sive *subsistentiam*, efficiunt.

Huic verò animæ, quoniam vario impulsu *commoveri*, ideoque speciem suam in *toto* aut *parte* *contrahere* aut *dilatare* apta sit, ideo diversimodæ tum *actiones*, tum *passiones* contingunt, nimirum *Sensus*, quos illius *Passiones*; & *motus*, quos ejusdem *Actiones* appellamus. Priorum, vid. *sensuum*, ratio formalis consistit in spirituum *retractione*, seu versus fontes suos *refluxu*. Ubicumque enim objecti sensibilis impressio *radiosa* huic *contextura* infertur, statim aut *tota compages*, aut illius *portio* quædam, quo speciem admittat, *nutare*, ac retroacta veluti *resilire* in se & *recedere* cogitur: è contra, hujus animæ *actiones* sive *motus* fiunt, in quantum *umbratilis* hæc *larva* in *toto* aut *parte* quadam incitata, sese *latius explicat*, ac spiritum *emanatione*, & veluti quadam *vibratione*, virtutem suam ac vim agendi exserit.

Hujus animæ *sensitiva* tum *Sensus*, tum *Motus*, aut *transcentes* fiunt, quando
spiritus

Spiritus seu particulæ ejus constitutivæ alicubi in *systemate nervorum commoti*, una partes continentes trahunt, & pari secum gestu defleunt, prout observare est circa *sensus* quinque *exteriores*, & membrorum *motus locales*: vel utraque tum *actiones*, tum *passiones* sunt *immanentes*, cum nimirum & *motus* & *sensus* sine magna corporis aut partium ejus agitatione, intra *primos animæ fontes*, scilicet ipsum *ἐγκέφαλον*, tacite peraguntur. Ejusmodi quidem *passiones*, intra Cerebri compagem habitæ, sunt *sensus communis* & *imaginatio*; *actiones* vero sunt *memoria*, *phantasia*, *appetitus*: utraque harum, quoad ortus & instinctus suos plerumque à sensibus externis dependent.

Circa priores advertimus, quod quoties animæ parte exteriori perculsa, *sensibilis impressio*, velut *species optica*, aut tanquam *aquarum modulatio*, interius vergens ad *corpora striata* deferitur, *sensationis* exterius habitæ perceptio, sive *sensus internus* oritur: quod si isthæc *impressio* ulterius provecta *corpus callosum* trajiciat, *sensus imaginatio* succedit: dein si eadem *spirituum fluctuatio* Cerebri cortici, quasi ripis extimis allidatur, objecti sensibilis *iconem* sive *characterem* isti imprimit, qui cum exinde postea reflectitur, ejusdem rei *memoriam* resuscitat.

Animæ istius *potentiæ activæ*, scil. *locomotivæ*, *memoria*, *phantasia*, & *appetitus*, modo *passionibus* è vestigio succedunt, modo *seorsim* ab illis, propter alias occasiones, inducuntur. Enim vero *sensibilis impressio corpora striata* feriens non raro, Cerebro nullatenus affecto, cum reciproca spirituum animalium tendentia *motus locales* retorqueri facit; ita in somno (appetitu haud conscio) ubi dolor urget, illico manu admota locum fricamus: sæpius vero postquam *species sensibilis*, à *communi sensorio* ad *corpus callosum* trajecta *imaginationem* excitavit, spiritus abinde reflexi, & versus appendicem nervosum reflui, *appetitus*, *motusque locales* ejusdem executores cient: atque interdum *impressio* quædam *sensibilis*, ultra *corpus callosum* provecta, ipsiusque Cerebri cortici allisa species inibi latentes exsuscitat, adeoque *memoriam* cum *phantasia*, sæpe etiam *appetitus* & *motu locali* ascitis, inducit. Insuper hæ *potentiæ activæ* quandoque propter alias occasiones seorsim à *passione* irritari & exerceri solent. In homine, *anima rationalis sensitivam* variè exagitat, ejusque potentitas modo has, modo illas, pro libitu suo elicit, ac in actum deducit: Porro sanguis supra modum ebulliens, proindeque Cerebri oram impetuosius feriens, rerum species in ea delitescens excitat, easque versus Cerebri medullia propellens, *memoria* ac varios *phantasiæ* actus repræsentari facit.

Circa prædictas *facultates interiores*, sive *immanentes*, in præsentī insuper advertere libet, quod earum *exercitia* præstantiora, præcipue & fere tantum, per *spiritus* jamjam perfectos & summe elaboratos peraguntur, qui enim recens facti, aut in fieri sunt, si quidem copiosi fuerint, functionis animalis actus valde obstruunt ac impediunt: nempe cum à vasis Cerebri corticem undequaque irrigantibus, liquor subtilis pro materia spirituum animalium ubertim instillatur, hic introrsum scatens cerebri poros & meatus omnes infercit, adeoque spiritus à solitis expansionum tractibus ac orbitis pro isto tempore excludit. Quapropter dum potissima Cerebri & spirituum *refectio* celebratur, somnus, sive *spirituum animalium eclipsis* intercedit; dein *vigilia* redit, cum liquore instillato pars subtilior in spiritus puros putosque exaltatur, atque demum aquosior, partim in vapores resoluta exhalarit, partimque à ductibus ve-

noſis cerebri ſubſtantiam ſubeuntibus reſorbeatur, aut etiam in vacuitatem corpori calloſo ſubjectam exſudarit. Super his poſthac explicatiſſe, ſpero, diſſeremus. Interim ut pergamus ad reliqua circa *cerebri* ita propriè dicti compagem propoſita, reſtat adhuc ut de *ventriculis* ejus agamus; quorum tamen de officio, (ſiquidem ipſi ſint tantum *vacuitas*, à *limbi exterioris complicatura reſultans*) non videtur opus eſſe cur fuſius diſſeramus, quàm Aſtronomi ſolent de ſpatio inani intra ſphæræ cavitatem contento.

Verum enimverò cum nihil non alicui deſtinatum uſui in naturalibus occurrat, certe ipſum hoc *vacuum* intra cerebri globum haud fruſtra conditum eſſe ſuſpicamur. *Antiqui* hanc *cavernam* adeo magnificerunt, ut illic ſtatuerint ſpirituum animalium officinam, ubi & procreentur ipſi, & præcipua functionis animalis opera moliantur. E contra autem *Recentiores* hæc loca ita vilipenderunt, ut eadem materiæ excrementitiæ, ac foras amandandæ meras cloacas eſſe aſſeruerint. Profecto iſta veterum opinio facile concidit, eo quod ſpiritus animales, utpote valde ſubtiles & avolare apti, non tam ſpatia ampla & aperta, quam meatus & porulos anguſtiores, quales in cerebri ſubſtantia exarantur, requirunt: nam hi ſpiritus (ſiquidem pro variis animæ facultatibus in varias ſeries & diverſos ordines componi, & *εγτατοεας* oportuit,) idcirco intra peculiareſ velut tractus & orbitas commoveri debent. Porro ſi quis cerebri fabricam exacte conſiderat, & ſerio perpendit, quod hi ventriculi non ex primaria naturæ intentione efformentur, at ſecundariò tantum & accidentaliter de cerebri complicatione reſultent, longe aberit, ut ſuprema animæ ſedes illic figatur, ubi nobiliſſimo *ſpirituum ſatellitio* ſtipata, functiones ſuas exequi aut obire poſſit. Neque enim omnino conſtat, ex quali materia, & quo artificio ſpiritus ibidem progignantur, nec quibus exinde emanationum viis in reliquas cerebri aut ſyſtematis nervoſi partes deriventur. Quapropter anatomici fere omnes, qui citerioris ſæculi fuerunt, illud vilius cloacæ officium interiori huic cerebri cameræ delegarunt. Cui opinioni fides nonnihil aſtruitur ex eo, quod hi ventriculi in deſunctis ſæpe aqua repleti conſpiciuntur; etiam ab illis, tum verſus infundibulum, tum in eos *cribræ forme* excretionum viæ pateſcere videantur. Obſervare eſt quod ubicumque *ſanguis* in partem aliquam copioſius influat, eamque irriget, illic è ſero ſuperfluo, ac inter circulandum derelicto, *vapores* aut *humores* aquoſi progignuntur; qui utplurimum, aut per *effluvia vaporoſa* foras exhalant, aut per *venas*, aut per *vaſa lymphatica* in ſanguinem reducuntur. Cum verò ſanguis uberi ſatis influxu, cerebri non modo corticem, at etiam interiorem medullam irrigat, reſtat ut *latex ſeroſus* (ſi quando magis in ſanguine abundat, quam ut ſuperfluitates ejus immediate per venas, vel per lymphæductus, ſi qui adfuerint, reduci, aut à glandulis ſecerni queant) in ſpecum hanc intra plicaturam cerebri excavatam dilabatur. Revera plures ſunt iſtantiæ, quæ plane evincunt humores ſeroſos in cerebri ventriculos paſſim deponi. *Obſervationes anatomicæ* hominum pleriſque morbis cephalicis, ac imprimis affectibus ſoporosis deſunctorum hoc ratum faciunt. Quinimo opinari faſcit *ſomnum naturalem* ſuccedere, in quantum cerebri pori & meatus à latice aquoſo, qui ſpiritibus pro vehiculo eſt, occupantur, inferciunturque. Dein quoties à crapula aut vini potu quenquam *ſopor profundus* invadit, cauſam

sam esse, quod spatiosa in medullari cerebri substantia, spirituum motibus destinata, humore *narcotico*, aut *aquoso* nimis obstruuntur: cujus reliquæ quædam in vapores resolutæ, & à spirituum consortio detrusæ, sæpe in vacuum, sive inane hoc spatium transfudent.

Ad hunc modum de *cerebri ventriculis*, sive *inani spatio* intra plicaturam ejus relicto, opinari subest. At vero, quoniam hæc res inter Medicos cujusque ævi valde controversa est, ejusque recta decisio pro explicandis aliarum ^{ἡ ἐγκεφάλου} partium muniis, insignis momenti esse videatur: libet hic rationes pro & contra hanc opinionem allatas conferre, ut ei demum sententiæ, quæ aut vera, aut verisimilior fuerit, calculum nostrum apponamus.

CAPUT XII.

Inquiritur utrum humores serosi, intra cerebri vacuitatem congesti, per glandulam Pituitariam ac os Cribiforme foras amendantur, necne?

QUandoquidem experientia testatur serum, & humores excrementitios, jure dicam morbificos, & non raro lethales, sæpenumero intra hos cerebri ventriculos reperiri, circa illorum *aditum exitumque* diligentius inquiramus oportebit: eo magis, quia de specuum harum usu à nonnullis valde ambigitur, nec defunt in nupero hoc seculo, qui opinionem antiquam de spiritibus hic loci genitis, exercitisque, licet dudum explosam, redintegrare fatagunt. Spiritus hic minime progigni, nedum exerceri propter rationes supra allatas, extra dubium censeo: nec minus certum fecit experientia, *serosam colluviem* hic sæpius colligi. Itaque hoc tantum restat, ut videamus, *unde illa, ac quomodo huc confluat*, & deinceps *quibus excretionum viis eadem foras amandetur*.

Quoad prius summè probabile est, laticem serosum, qui spirituum recens productorum vehiculum est, ac unà cum illis in cerebri poros introducit, postea exsolutum, ac in vaporem attenuatum, in hanc cavernam exsudare, ibidemque denuo in humorem aqueum concreescere: secus enim quid sit de humore isto, aut in quod aliud receptaculum derivari poterit? Præter hanc ordinariam, & puto assiduam colluviei serosæ intra cerebri ventriculos congestionem, pro certo haberi debet, quod à glandulis plexui chorocidi insertis, nimium repletis, ejusmodi *serosus humor* in ventriculos ita dictos *exstilletur*. Sæpius vidi in *Hydrope cerebri glandulas* istas intumuisse, & veluti hordei grana à nimio madore crepantia, flaccidas evasisse, adeo ut serositates allatas minime retinuerint, verum eas in cavitatem subjectam continuo deposuerint. Profecto in *Hydrope Cerebri* hæc cavitates seu ventriculi semper aqua repleti conspiciuntur; cujusmodi affectus causa est sanguis aquosior factus, qui majorem feri colluviem inter circulandum deponit, quàm *vena* statim reducere, aut *glandula* satis excipere & retinere valent. Enimverò quo serum usquequaque è vasis redundans in cerebri ventriculos melius dilabatur, ita comparatum est,

ut *maiores vasorum plexus* cum *glandulis intersertis*, prope singulos π ἐν κερῶν ventriculos dispositi fuerint : quippe non modo plexus Choroeides juxta trium ventriculorum in Cerebro concursus, at plexus alter, & non minus insignis (quem supra descripsimus) cum glandulis majoribus, pone Cerebellum, juxta quartum ventriculum collocatur. In omnibus eo ut videtur sine ita cautum est, ut è sanguine qui aut cerebro, aut cerebello destinatur, pars acquosior, siquidem spiritibus procreandis minus idonea fuerit, hos vasorum plexus incurrat ; attamen si major feri copia illic deponitur, quam in iisdem contineri, aut extra amandari queat, quicquid ejus superfluum est, in cavitatem subjectam dilabitur.

Hinc constat, unde & quo ritu serosa colluvies intra cerebri ventriculos congeritur : certe huic exitum denegare, nihil aliud est quam cujusque cerebrum vipera gravidum asserere, cui quidem partus, nisi per exesa parentis viscera minime concedatur. Qui partes juxta ventriculos existentes, earumque fabricas primo tantum intuitu leviter considerat, cum antiquis facile jurarit, quod cerebri excrementa, tum *inferius* per *infundibulum* in *palatum*, tum *anterius* per *processus mamillares* in *nares*, deponuntur : attamen si in partium harum structuram paulo accuratius inquiratur, statim è contra nemo est, qui non facile putaverit, neutra harum via conjusvis humoris excretionem fieri : neque enim à *glandula pituitaria* per *os cuneiforme*, nec à *processibus mamillaribus* per *foramina ossis cribriformis* apertura quævis manifesta percipitur. Verum enim vero ut per bina hæc emunctoria cerebrum aliquatenus purgari existimemus, objectioni isti referre licebit, quod in viventibus humorum translationes, per loca quæ videntur impervia, facile perficiuntur ; dum enim pori & meatus in quibusvis corporis animalis partibus existentes, à spiritu & calore dilatantur, isti velut per raram panni lanei texturam feri depluvium transmittunt : hoc plane constat ex *affectibus arthriticis*, in quibus latex serosus corpora nervosa sensim perreptat, & spatiolia perquam minima trajiciens, in partes modo has, & deinde alias, humorum decubitus facit ; adeoque obvium est quod membranæ & processus nervosi instar spongiæ humores serosos imbibunt, & dein à levi compressione eos confertim reddunt, uti liquet in odontalgia, quoties stylo cavo denti immisso, aqua lymphida copiose excernitur. Revera in corpore animali vivente, *humorum transitus* non modo per *ductus & canales apertos* fiunt ; verum latex aquosus & tenuior, *solida & teretia nervorum corpora*, necnon fibras & membranas, tanquam filtri lacinias *perreptat*, adeoque per angustias imperceptibiles de loco in locum transfertur. Aliquoties novi in *Vomica pulmonis*, per membranas pleuræ adnatas, humorem à cysti in fontanellam lateri inustam dirivatum fuisse, adeoque spuito cessante, morbum alias incurabilem visum, tali epicraseos via sanatum fuisse. Quidni pariter humores serosos, è *ventriculis Cerebri* in *glandulam pituitariam* ac *mamillares processus* decumbentes, per *membranas* aut *nervos*, hic aut illic pertranseunt, amandari supponamus ?

Circa *Infundibulum* res satis probabilis existit ; quippe hujus positio & structura indicare videntur, quod humor aliquis è cerebri ventriculis versus glandulam pituitariam deferatur : Etenim hæc pars ita constituitur, ut in aperturam ejus, è quovis cerebri interioris, ejusque appendicis angulo & recessu

recessu, humorum decubitus fiat : cumque in variis animalibus ventriculorum figura & situs plurimum variant (prout supra ostendimus) tamen in quibusvis illorum, omnes τὸ ἐγκεφάλαιον ventriculi, qualescunque fuerint, aperturas versus infundibulum dehiscentes habent. Cæterum, quod hæc *glandula*, cui infundibuli ductus inseritur, humores serosos suscipiat & foras amandet, etiam hinc constare videtur quoniam illos non tantum à cerebro delapsos, ast etiam à sanguine in cerebrum ascensuro secretos, intra poros suos admittit : Quippe in quadrupedibus plerisque vasa quædam ab utraque *arteria carotide* huic glandulæ inferuntur, quæ substantiam ejus intime subeunt : cujus indicium est, quod atramentum alterutri arteriæ trunco injectum, *rete mirabile*, si modo adfuerit, & sæpius interiorē hujus *glandula* compagem atro colore inficiet : unde licebit arguere, quod hujus *glandula* munus sit, *serositates superfluas excipere* ; quas non tantum à cerebro dimissas postliminio accipit, ast interdum eas præoccupat, & à sanguine, priusquam Cerebro inferatur, derivare solet : Ideoque hæc *glandula*, si seri superfluitates ei tantum à cerebro deriventur *perexigua* ; sin autem insuper à sanguine accedant, *grandior* existit, prout nempe uno aut duplici officio defungitur, uti supra late ostendimus.

Quod vero ad trajectionis viam spectat, qua nempe humores in hac glandula depositi, foras amandentur ; vulgaris opinio est, eosdem per foramina ossis subjecti in palatum decidere : quare in ejusmodi animalibus quibus *rete mirabile* adest, ejusque multæ propagines hanc glandulam subeunt, plura foramina in osse subjecto excavantur : porro si ossis cuneiformis scrobem, sive glandulæ istius sellam, cranio abscissam eximas, ejusque foraminibus membrana denudatis aquam desuper affundas, illa totius ossis compagem cito pertransiens, per alia foramina in lateribus ossis patentia subito exstillabit. Attamen experimentum hoc pro sententia proposita minime concludit : quippe *foramina* ista in quibusdam animalibus, ac ut plurimum in *cranio humano*, omnino desunt ; quibus vero adsunt, uti vitulo, imprimis observare est, quod eadem à vasis quibusdam cavis implentur ; quibus si liquor atratus per syringam injiciatur, iste ossis compagem trajiciens plurima alia vasa ossi subjecta, ac demum *vena jugularis* truncum pervadet ; quod certo indicio est, humores exinde in palatum minime deferri : quoad vasa autem quæ ossis foramina obducunt, quæque numerosius eidem subjiciuntur, aut *vena*, aut *lymphaductus* esse videntur.

Atque ex his præcipuum excretionis modum, quo humores serosi in glandula pituitaria depositi foras ablegantur, conjicere licebit : nempe quod isti ab ea, sicut ab aliis plerisque glandulis, in *Sanguinis massam* remanentur. In vitulo res αὐτοψία patet, nec dubium est de cæteris animalibus, quibuscunque *rete mirabile* adest : quippe sicut *rami arteriosi*, ita etiam *venosi* ad hanc glandulam pertingunt ; qui humores non tantum ab arteriis depositos, ast insuper à cerebri ventriculis delapsos absorbeant. Quinimo item *Homini*, *equo*, aliisque animalibus, quibus *rete mirabile* deest, opinari licet, aut *lymphaductus*, aut *ejusmodi vasa* quædam, qualia in capite vitulino prostant, & ab hac glandula humores certissime exportant, subesse. Illorum vestigia non ita facile detegere licet, quia priusquam hæc claustra perrumpantur, *lymphaductum*, si
qui

qui adfuerint , tractus evanescerent : nec enim vasa isthæc in omnibus, sicut in vitulo , per injectionem deprehendere possumus ; quoniam ossis foramina , quibus , tanquam fili ductu , injectio ad vasa , alias delitescencia pertingit , in plerisque desiderantur. Haud dubito quin longior dies *humorum & glandula pituitaria reductiones* in cunctis animalibus satis manifestas reddet : interim ex eo , quod in aliquibus serositates illius in massam sanguineam remandentur , suspicari licet , quod eodem aut simili ritu etiam in quibusvis fiat , licet comineatus viæ nondum satis pateant.

Quoad alterum cerebri emunctorium , quo nempe humores serosi è cerebri ventriculis in *processus mamillares* deponi, indeque per *foramina ossis cribriformis* amandari putantur : profecto circa hanc excretionis viam multo magis ambigitur , quoniam in defunctis *foramina isthæc*, duræ meningis insertionibus & fibris nervosis , utrinque à processu mamillari dimissis , obducta & plene infarcta , necquicquam humoris , utut limpidissimi , transmittunt : poro nihil certius est , quam quod humores serosi è glandulis & vasorum extremitatibus intra nares desinentium , in ipsorum cavernas exprimuntur ; itaut præterquam quod vix possibile sit humores illuc à cerebro descendere , non opus omnino videtur ejusmodi excretionis viam supponere. Veruntamen super his ut paulo altius ratiocinemur ; si à *partium apparatu* & ab *effectis* arguere liceat, non est , quin probabile existimem , humiditates quasdam etiam à cerebro in narium cavitates depluere : supposito enim , quod humor serosus non modo apertos canales , sed strictiores etiam nervorum poros & meatus trajiciat, atque fibras & membranas , tanquam filtri lacinias perreptans , de loco in locum transferatur (quod equidem facile erit demonstrare ;) quid obstat, quo minus ejusmodi latex per fibras ossis colatorii foraminibus impactas descendat ? Nam licet in defunctis istæ partes imperviæ esse videntur , tamen durante animalis vita , corporum nervosorum meatus ac cæci ductus à spiritu & calore dilatati , humorem copiosum , quo irrigantur , facillime transmittunt.

Os cribriforme , in diversis animalibus, pro multiplici odoratus exigentia & discrimine, varie perforatur : per singula ejus foramina processus à dura matre, & fibræ nervosæ multiplices transeunt, & interiora narium oblinunt : sicuti autem per corporum horum ductus ab organo versus sensorium protensos, sensibilibus impressiones , sive species sensibiles, continuata spirituum animalium velut undulatione ascendunt, ita per easdem vias, humiditates eorundem corporum irriguæ, siquidem aliquando solito magis superfluæ sint, in nares destillare possunt : enimvero tales humores , uti à cerebro perpetim amandari, ita quidem olfactus organa copiose perfundere debent , uti posthac plane ostendemus , cum de nervis olfactoriis speciatim dicemus ; interea *talem excretionis* viam in *nares dehiscentem* extare , *observationes* quædam circa ægrotantes à morbis cephalicis habitæ , ulterius suadent. Novi aliquos *Scotomæ & affectibus vertiginosis* valde obnoxios , quibus sub finem paroxysmi aquæ lymphidæ ingens copia exstillarit ; cujusmodi evacuatione, velut critica , paroxysmus terminari solebat. Non ita pridem Virgo , in hac urbe degens , cephalæa immani diu affligebatur , atque inter medios cruciatus multum feri flavi & tenuis quotidie naribus effluebat : novissima hyeme hæc excretio aliquan

aliquandiu subsistit, & tum demum ægrotans, capite deterius habente, in convulsiones atroces cum stupore incidebat; atque intra triduum apoplectica interibat. Capite aperto, latex ejusmodi flavus Cerebri anfractus profundiores, ejusque cavitationem interiore seu ventriculos inundabat. Novi Fœminam illustrem, *cephalea immani*, necnon *vertigine & crebris* spirituum animalium *deliquis* infestari solitam, quæ cum à gravi proxysmo melius habere cœpisset, primo in Cerebri fastigio motum formicantem, velut aquæ irrepentis, sentiebat: dein motu isto paulatim antè & deorsum progrediente, demum aquæ limpida plures guttæ è naribus exstillabant: hoc symptoma illi passim obtingere solebat, ut minime dubitaret ægrotans, quin lymphæ ista ab ipso Cerebro exstillaverit. Possem hic plures alias rationes proferre, quæ suadere videntur Cerebri ventriculos, sive cavitationem à limbi ejus complicatura factam, esse meram humoris excrementitii cloacam, quodque humores illic congesti, per *nares & palatum* expurgentur: sed tempus est ut ad alia festinemus, atque à Cerebro ita proprie dicto, ad appendices ejus, scilicet Medullam oblongatam & Cerebellum transeamus.

CAPUT XIII.

*Medulla oblongata, ejusque partium quarundam
Actiones & Usus explicantur.*

A Cerebro ad *Caudicem ejus*, cui nempe ipsum & Cerebellum velut tubera adnascuntur, explicandum devenimus. Hæc pars *Medulla oblongata* vulgo appellatur; sub quo nomine comprehendimus totam illam substantiam, quæ à corporis callosi intima cavitate & conjunctura in capitis basi, ad occipitii foramen exporrigitur; ubi eadem adhuc compage ulterius continuata, in *medullam spinalem* desinit.

Medulla oblongata superficies, licet protuberantiis quibusdam & processibus inæqualis reddatur, gyris tamen & involutionibus, uti fit in Cerebro & Cerebello nullis variegatur; neque substantia ejus exterior & corticalis, cineritii coloris, atque interior, medullaris & albida existit; sed *tota ejus compages* quodammodo *medullosa* est; nec tamen pura & nitida apparet, sed *fibris & villis* varie protensis, & diversimode euntibus, multum obfuscat. Nempe *fibræ* ejus in variis locis diverso ritu configuratæ, in his *striatæ* ac velut *radiose*, in illis *directæ* sive in *longum productæ*, inque aliis *circulares* reperiuntur.

Hujus *figura bifurcata* est, & quasi Poëtarum Parnassi æmula, literam Y exhibet: nam *crura* ejus, ab utroque cerebri hemisphærio antè oriunda, ac ad se mutuo inclinata, juxta cranii centrum in eundem truncum coalescunt; qui tamen linea per medium ducta, è binis velut caulibus conflare, in illosque toto ejus processu distingui posse videtur.

Medulla oblongata via lata, & quasi *regia*, esse videtur, in quam *spiritus animales*, à gemino ipsorum fonte, nempe Cerebro & Cerebello perpetim scaturiunt, inde in *partes omnes totius corporis nervosæ derivandi*: qui spiritus dum in

communi hoc ductu διατάσσεται, seu quasi per series & ordines disponuntur, duplicem aspectum gerunt: nempe vel extrorsum versus nervos diriguntur, quando facultatem locomotivam exerunt, vel introrsum versus scaturigines suas spectant, cum sensationum actus, seu potius sensibilibus apprehensiones peraguntur.

Intra patentem hanc viam, callis amplior & maxime apertus recta in Medullam spinalem ducit; per quem spiritus ad Nervos, motus spontanei in plerisque membris executores, emanant. Interim ex eodem medullæ oblongatæ tractu minores semitæ, per nervos particulares, ab eadem intra cranium oriundos, huc illuc exterius feruntur. Præterea item, huic caudici medullari plura diverticula, scilicet varii processus & protuberantia accrescunt, in quas spiritus peculiaribus quibusdam muniis destinati secedant: ne si spiritus omnes ultro citroque in eodem tramite vagentur, sibi mutuo occurrerent, & alterutrorum officia perturbarent.

Dum hoc ritu spiritus animales, propter motuum & sensationum actus obeundos, intra medullam oblongatam exspatiari supponimus, eos ibidem minime progigni, at tantum exerceri statuimus. Enimvero in cerebro tantum ac cerebello procreati, prout ab hoc aut illo procedunt, functionis aut mere involuntaria, aut etiam spontanea munera perficiunt, uti inferius late ostendetur.

Cæterum, quo hic omnia quæ ad Medullam oblongatam spectant explicemus, libet ipsam à carceribus ad calces emetiri, atque singula ejus stadia, diverticula, ac compita pertractare. Ubi corpus callosum desinere putatur, Medulla oblongata incipit; cum nimirum cerebri substantia Medullaris juxta utriusque hemisphærii umbones crassissima existit, utrobique meditullio isti corpus subalbidi coloris, ac nonnihil obfuscum, ac instar eboris striatum cohæret. Bina hæc corpora sunt crurum Medulla oblongatæ extremitates, sive apices, inter quos & cerebrum, proxima & maxime immediata commercia habentur. Utrumque horum videtur quasi Cylindrus in Orbem convolutus, qui tamen utriusque Cruris summitatem haud sphericam, sed ovalem, & ad posteriora nonnihil deflexam constituit. Superficie illius portio amplior Cerebri substantiæ medullari conjungitur: pars tamen aliquota, à Cerebri cohæsiōe libera, seorsum eminet & protuberantiam istam in utroque laterali ventriculo emicantem facit. Hæc corpora si per longum in medio dissecantur, striis medullaribus & velut radios insignita apparent: cujusmodi striæ duplicem aspectum sive tendentiam habent, nempe alia à corporis hujus summitate descendunt, quasi tractus sint à Cerebro in Medullam oblongatam; atque alia à parte inferiori ascendunt, & prædictis obviam fiunt, quasi spirituum orbita sint, à Medulla oblongata in cerebrum: Et observatu dignum est, quod in toto γκαράλῳ nulla præterea pars simili ritu striata reperiatur.

Horum usus si inquiratur, hic statim occurrit, quod hæc corpora inter cerebrum & appendicem ejus collocata, utriusque magna & communia diversoria existunt: quæ nempe spirituum animalium impulsus ac impetus quoscunque ab alterutro emissos suscipiant, ac statim alteri communicent: sive, ut planius dicam, hæc pars commune sensorium est, nempe Aristotelis verbis τὸ αἰσθητήριον, quod sensibilibus omnium ictus à nervis cujusque organi delatos accipit, adeoque omnis sensationis perceptionem efficit; cujusmodi sensibilibus ictus, cum hinc ulterius in cerebrum trajiciuntur, sensationi statim imaginatio

natio succedit : atque insuper hæc corpora , uti *sensuum omnium impetus*, ita *motuum localium spontaneorum primos instinctus* suscipiunt. Quoties nimirum appetitus aliquid agendum decernit , statim reciproca spirituum animalium tendentia , hoc est à *cerebro in has partes motuum* à quavis parte aut membro ineundorum conceptus, hic loci in actus disponuntur : Hic enim, velut in foro celeberrimo, spiritus animales rei volitæ executionem molientes, in nervos appropriatos diriguntur. Rem ita habere constat , quoniam in cerebro in nervosum genus , & è contra , ex hoc in illud , omnes influentiæ , & mutua spirituum animalium commercia hæc corpora pertransire necesse habent. Quapropter *omnes nervi* , etiam qui ad sensuum Organa interiora spectant , *pone hæc corpora striata oriuntur*. Quippe *nervi optici & olfactorii* longo ductu & ambagibus cerebri superficiem perreptant , ut infra hanc partem *Medulla oblongata* inferantur.

Enimverò sensibilibus species per istos nervos susceptæ, immediatius cerebri Meditullio inferri poterant , nisi quod prius huic sensorio sisti debuerint. Porro *has partes* prædicto officio fungi, conjicere licebit ex *striata & quasi radiosa* illarum *contextura* : cum enim istæ striæ , quibus hæc corpora insigniuntur, (uti modo innuimus) duplicis sint generis, nempe *aliæ descendentes*, quæ à cerebro versus Medullam oblongatam spectant , *aliæque ascendentes*, quæ ab hoc versus illud distinctè feruntur, concludere licebit , quod *in his sursum latis sensibilibus impressiones* percipiuntur , atque *in illis deorsum tendentibus motuum instinctus* peraguntur.

Porro hæc corpora, uti dictum est, τὸ πρῶτον αἰσθητικῆς munera exequi, præter istam partium fabricam & usus analogiam exinde colligendam, ex observationibus quibusdam circa hæc corpora *striata*, quo ritu in *Morbis paralyticis* afficiuntur , adhuc certius constare videtur. Cum enim aliquoties cadavera quorundam, à longa *paralyti* & *gravissima nervorum resolutione* defunctorum aperuerim, deprehendi semper hæc corpora præ aliis in cerebro minus firma, instar amurcæ discolorata, & striis multum oblitteratis. Porro in catulis recens natis, qui visu carent , aliasque motus aut sensus facultates ægrè perficiunt , hæc striæ vix integre formatæ, tantummodo rudes apparent.

Corpora striata juxta obtusos & majores eorum angulos ad se mutuo inclinata , ferè contigua sunt ; nisi quod *Fornicis* truncus cum duplici sua radice interveniat : Attamen illic loci , ubi *duæ Fornicis radices* recta demissæ corpori *calloso* inferuntur, *processus Medullaris transversus*, majoris Nervi instar, à corpore uno striato in alterum protensus, eadem quasi conjungit, ac invicem communicare facit. Certè hæc *corporum striatorum commissura* efficit, ut *eorum actiones passionisque non sint duplicata* : verum licet objecti *sensibilis species*, aut *motus ineundi conceptus* à cerebro aut Sensorio *geminatis* profecta τῶ ἀπὸ τῶ αἰσθητικῆς etiam *gemina* inferantur : tamen quatenus hujus alterutra compages cum altera communicat , *impressio* quævis ultro citrove adveniens usque eadem ac unica evadit. Nimirum observare licet in toto κεφάλῳ quod cum fere omnia sint gemina, tamen singula , istorum aut *contiguitate* , aut per *processus emissarios* inter se communicant ; adeoque uti ipsius *duplicatione* , contra absolutam actus *privatorem*, sive *defectum* providetur, ita *ejusdem duplicati commissura* adversus *inane aut confusam* ejusdem speciei *multiplicationem* præcavetur.

Ad hunc modum, *Corpora striata* in homine, & quadrupedibus cujuscumque speciei aut formæ, constanter reperiuntur, ac in quibuscumque istorum simili ritu configurantur; suntque velut *internodia*, quibus *cerebrum Medulla oblongata* *cruribus coheret*. Attamen suprâ ostendimus, quod in *volucris*, & *piscibus*, quorum *cerebra* inter se conformia ab istis *hominis* & *quadrupedum* differunt, res paulo aliter habet: nam in *volucris* *corpus callosum* in *Cerebro* deest; quod vero illius succedaneum est, in *Medulla oblongata* reperitur, scilicet juxta *Thalamos nervorum Opticorum* duo ventriculi prostant, qui substantia albida & medullari (qualis *corpus callosum* in homine & quadrupedibus est) concamerantur. Dein econtra *corpora striata*, sive partes quæ illorum vices præstant, in *volucris* haud solito more *medulla oblongata* portio sunt, sed ipsum *Cerebrum* ingrediuntur: Nam juxta *Cerebri fissuram* duæ membranæ *striis Medullaribus* insignitæ utrumque *Cerebri* hemisphærium distinguunt ejusque ventriculos obducunt: Utriusque Membranæ *stria* velut *radii* descendunt, & circa basin *Cerebri* concentratæ, in processum medullarem coeunt, qui utrinque medullæ oblongatæ inseritur. Adeo hæ partes, scilicet *corpus callosum*, in quo spiritus animales expanduntur, & *corpora striata*, in quibus illorum commensus instituitur, in *volucrum capite transponi videntur*: Cujus ratio (prout alibi innuitur) ni fallor, hæc est: quod ista animalia *imaginatione* & *memoria* minus pollent quam quadrupedes; quin etiam *sensus* & *motus* eorum ferè principes facultates sunt, ideoque propter horum exercitia, insigniori spirituum expansione peragenda, *corpus callosum* in *medullam oblongatam* transfertur, atque loco ejus *corpora striata* in *cerebrum* promoventur.

Circa *corporis* utriusque *striati* extremitatem inferiorem *nervi olfactorii* inferuntur. Etenim advertere est, paulo obscurius in homine, at longe conspectius in *brutis animalibus*, quæ odoratu insigniori prædita sunt, quod *processus mammillares* in firma & planè albida *nervorum corpora* transeunt, quæ juxta laterales *cerebri* anfractus delata, utrobique circa angulum utriusque ventriculi anteriorem, pone *corpora striata*, *medulla oblongata* implantantur; ita tamen, ut utriusque *Nervi* tubulus in ventriculi cavitatem dehiscat, uti suprâ ostendimus. Ad hunc modum *hi Nervi* ab antica *cerebri* parte longo itinere feruntur, ut speciem sensibilem *corpori striato*, veluti *communi censorio*, prius ac potius quam *Cerebro* inferant. Sed de *Nervis olfactoriis* posthac speciatim dicemus.

Ubi hæc *corpora striata* desinunt, ex utroque latere *substantia medullaris* succedit, quæ coloris nonnihil obfusci, aliquo tractu pergens, acclivitate peculiariter à partibus aliis contiguis distinguitur. Hanc *Galenus* (forasan haud improprie) *nervorum opticorum Thalamos* appellavit; namque hic loci, à summa utriusque lateris regione *nervi optici* emergentes, deorsum cum ambitu quodam delati, circa *infundibulum* uniuntur. Dein iterum divisi, & paulo ulterius provecti, calvaria egrediuntur, ad utrumque sensorium rectè pergentes. *Nervorum* istorum *coalitus*, iterumque *sejunctio*, eo fine institui videtur, ut *species visibilis ab utroque oculo suscepta* prorsus eadem, & non gemina appareat; nam ista duplicis organi conjunctio imaginem duplicatam in unam constituit; quæ semel unita, cum postea ad utrumque communis sensorii latus deferatur, in quantum utrobique similis est, prorsus eadem apparet. Si quando ab ebrietate, aut oculorum distortionem, *objectum duplicatum*, & geminis affurgit mensa.

mensa lucernis, ideo est quia *eiusdem rei simulachrum diverso ritu ab uno quam ab altero oculo excipitur*, ideoque velut *bina distincta objecta* repræsentantur: Nam in quantum hic oculus uno modo, ac iste alio distorquetur, eadem species diverso incidentiæ angulo ad utramque pupillam adveniens, diversa, sive gemina apparet. Subest alia nervorum opticorum coalitionis ratio, nempe ut oculo uno læso, spiritus animales visivi omnes alteri impendantur: Insuper, cum *hi Nervi* longo ductu ferantur, *eorum unitio ad munus robur & fulcimen* spectat.

Cum *nervi optici* hic loci à *Medulla oblongata* oriuntur, haud intima aut tota hujus substantia illis impenditur; verum *hi nervi caudici Medullari*, velut rami arboris trunco inseruntur, ita ut *spirituum influxum* exinde suscipiant, & *visibilia species* hac via transmittant. Interim ista *Medulla oblongata* interior compages, *communis ductus* est tum ad oculos, tum ad reliquum systema nervosum posterius ortum, per quem scilicet *spirituum animalium ita redituque*, *sensibilium impulsus & motuum instinctus*, inter Cerebrum & cæteras partes nervosas, quæ ab illo dependent, peraguntur. Quandoquidem *Nervi olfactorii & optici* ita prope *corpora striata* oriuntur, hinc ratio patet, cur *odores*, sive olfactus objecta ipsum adeo *Cerebrum* feriunt, & immediate afficiunt; item cur inter *visionem & imaginationem* communicatio citissima habetur.

Circa *Nervos Opticos* in Homine (quod item aliquatenus in cæteris animalibus eodem ritu habet) advertimus, quod cum illi post unionem, sive commissuram, mox iterum sejuncti cranio egrediuntur, *vasa sanguifera* una è calvaria exeuntia, utrumque Nervum usque ad oculi basin assequuta, utriusque trunco innituntur. *Arteria* huic muneri destinata furculus insignis est, à *carotidum ramis anterioribus* profectus. Hinc, ut opinor, ratio assignari potest, quare cum à potu aut uberiori comestui *somnolentia* inducitur, statim circa oculos *insignis gravedo*, ac velut *oppressio* sentitur. Cum enim sanguis valde turgescens *vasa Cerebrum* irrigantia supra modum impleat, eaque distendendo *cerebri poros* obstruat, etiam à sanguine intra *vasa optica* pariter turgescente *nervi isti* in toto illorum ductu *comprimuntur*.

In *volucris & piscibus*, hic *nervorum opticorum Thalamus* ingenti mole protuberans, *cerebro ipso* haud multo minor est; nam, uti modo innuimus, quod *corporis callosi* vicem præstat, hic loci subest; ac ibidem spiritus animales in camera medullari amplissima præcipuum *Emporium*, sive *Expansionis suæ spheram* obtinere videntur. Cumque adeo hinc spiritus animales, ex uberi & tam pleno promptuario in *nervos opticos* deriventur, propterea quidem est, quod *volucres oculo elegantissimo, & visu summe perspicaci & acuto* instruuntur. Idemque forsan tenet de *piscibus*, modo consideremus, quod his visio in medio crassiori ac sæpe duplici peragatur.

In quibusvis animalibus, in medio horum utriusque *nervi optici Thalamorum*, crura *Medulla oblongata* paulatim dehiscunt, rimam, sive aperturam relinquunt, quæ serositates ab unaquaque Cerebri ejusque Appendicis regione adventantes suscipiens, eas per *infundibulum* in *glandulam pituitariam* dimittit.

Non opus est, ut de *infundibuli ac glandulæ pituitariæ* usibus hic multum differamus, quia superius de *Cerebri ventriculis*, sive inani spatio intra plicaturam ejus relicto agentes, in utriusque horum considerationem opportunè inci-

dimus : ubi ostendimus *serosos humores*, qui intra plures *Cerebri* ejusque *Appendicis* locos coacervari solent, *omnes undequaque*, à quolibet ejus angulo aut recessu, in *declivem infundibuli aperturam* dilabi; adeoque necesse habere, ut per ipsum in *glandulam pituitariam* effundantur. Porro manifestum est, quod hæc *glandula* in quibusdam animalibus *duplici officio* defungatur; nempe cum *serositates* à *Cerebro desuper* immixtas excipit, tum etiam *humores à sanguine*, eidem à *reti mirabili* per *arterias adducto* secermit, eosque præoccupans ante *cerebri ingressum* imbibit. Quare hæc pars *duplicis generis substantia* instruitur: scilicet *una rubicunda* rariore, & *vasis sanguiferis intertexta*, quæ utrumque *latus* ejus constituit; atque *altera albidior*, in medio posita, cui *Infundibulum* inseritur.


Cæterum ostenso, quod hæc *glandula* humores ita *duplici vestigali* allatos suscipiat, circa *vias & modos* quibus isti illinc denuo ablegentur, sedulo inquisivimus: cumque experimento constet, quod à *glandula* ista in *vasa ossi subjecta*, & exinde in *venas jugulares* transitus pateat, verisimillimum esse statuimus, quod ab hæc *glandula* (aliorum more) *humores eliminandi* denuo in *Massam sanguineam* reducantur. Super his ne plura adjiciam, hic gradum promovere, & ad alias *Medulla Oblongata* partes devenire oportet. Interim ut quæ circa *Medullæ Oblongatæ* crura eorumque apices, scil. *corpora striata*, dicta sunt, melius intelligantur, ex re visum est, horum omnium *Iconas sequenti figura* repræsentari.


Figura Octava

Medullam oblongatam Capite Ovino exemptam, cum Cerebro abscisso, & amoto, cumque cerebello, & corpore uno striato, per medium dissectis, aliaque præcipuè ad Caudicem medullarem pertinentia repræsentat.

- A. A. Corpus striatum in medio discissum, ut illius striae medullares appareant.
- B. Corpus alterum striatum, integrum, plexu Choroeideo obtectum, cum corporis Callosi portione extrema, C. C. eidem coherente.
- C. C. Corporis Callosi ora, sive extremitas, corpori striato coherens.
- D. Fornicis basis.
- E. Plexus choreideos ala dextra.
- F. Ductus venosus à sinu quarto protensus, qui mox bifidus, utriusque plexus choreideos ala portionem venosam constituit; subter hujus ductus principium fibræ, & vasis sanguiferis valde stipatum, Glandula pinealis delitescit.
- G. Foramen, sive rima ad infundibulum ducens.
- H. H. Thalami nervorum optidorum.
- I. I. Processus medullares, sive transitus via, quæ à caudice medullari in protuberantias orbiculares ducunt.
- K. K. Protuberantia orbiculares Natiformes.
- L. L. Protuberantia minores, Testes dictæ.
- M. Commissura processuum à Testibus in Cerebellum obliquè ascendentium.
- N. Foramen inferius ventriculi, protuberantiis orbicularibus subjecti.
- O. Nervi oculorum Pathetici.

Fig. VIII





- P. P. *Processus medullares è Testibus in Cerebellum protensi.*
 Q. Q. *Processus alii medullares, qui à Cerebello versus medullam oblongatam dimissi, ejus Caudicem circumdant, & protuberantiam annularem constituent.*
 R. R. *Cerebelli processus medullares infimi, sive tertii, qui medullari Caudici inserti, ejus Chorda additionales evadunt.*
 S. *Cerebelli ramificationes medullares.*
 T. T. *Viriusque Cerebelli medutullia, in quibus tres ejus processus medullares, utrumque ejus pedunculum constituentes coalescunt.*
 V. *Scorbs in medullari Caudice quartum ventriculum constituens.*
 X. *Medulla oblongata in spinalem cessura extremitas.*
-

CAPUT XIV.

De Glandulæ Pinealis & Plexus Choroeidei usibus; item de prominentiis orbicularibus, quæ vulgo Nates & Testes appellantur, aliisque partibus, quæ illarum appendices esse videntur.

INfra *Thalamos nervorum opticorum*, in communi convalle, quæ horum juga & prominentias Natiformes interjacet, *Glandula pinealis* collocatur; hæc non solum in *homine* & *quadrupedibus* reperiuntur, quin etiam *volucres* & *pisces* eadem præditi sunt: Quare licet hinc concludi poterit, ipsam necessarij cujusdam usus esse; tamen hanc *Animæ sedem* esse, aut principes facultates ab eadem oriri vix credimus, quoniam animalia quæ imaginatione, memoria, aliisque superioribus *Animæ potentiis* fere in totum destitui videntur, hanc *glandulam* satis amplam atque angustam habent.

Observare est in omnibus cujuscunque speciei aut formæ animalibus, quod huic *glandulæ*, juxta foramina, aut ductus ad infundibulum patentes semper positæ, *plexus Choroeides* continuo adjungitur; quinimo hic *plexus*, de *glandula pineali* processum ejus medium sustentante, tanquam de fibula aut clavo, suspendi visus, exinde in binas alas, huc, illuc, super *medullæ oblongatæ* crura exporrectas dividitur. Quare *plexus hujus gratia glandulam istam præcipuè conditam esse*, jure suspicamur; ejusque munus non aliud omnino esse quàm aliarum glandularum quæ juxta vasorum sanguiferorum concursus disponuntur; nempe ut *humores serosos*, à *sanguine arterioso depositos* excipiat, & in se retineat, donec aut *venæ* depletiores factæ eosdem resorbeant, aut *lymphæductus* (siqui adfuerint,) eos extra convehant. Etenim observare est, quod *plexus choroeides* glandulis quamplurimis minoribus stipatur, & ubivis intertextitur, quæ serum à sanguine in vasis minutioribus secretum imbibant; idcirco propter idem hoc officium, ubi vasa omnia concurrunt, hæc *glandula* majori mole prædita collocatur, ut serositates illic uberius depositas excipere & continere valeat. Porro non

levis

levis momenti res est, quod hæc *glandula plexum choroeidem*, alioqui laxè pendentem, atque in se concidere, aut saltem extra proprium situm dilabi aptum sustentet, & in debita expansione contineat. Quare sæpius adverti, in *hydrope Cerebri*, quod hæc *glandula*, radicibus à nimio madore laxatis, & non rarò abruptis, loco suo dimota, *plexum choroeideum* ab expansione propria collabi, ac inferius subsidere, necnon vasa ejus inordinatè complicari sinat.

Ex his circa *glandulam pinealem* ita præmissis, non difficile erit etiam *plexus Choroeidei* usum assignare: De quo parum opus erit istam vulgi opinionem refellere, qua asseritur, spiritus animales toti cerebro impendendos in hoc plexu progigni: Quippe hujus vasa, cerebri aut appendicis ejus substantiæ nihil instillant, utpote cui nullibi inferuntur; cerebri autem ventriculos, sive cavitatem in qua eadem vasa suspenduntur, haud quaquam spiritus continere, supra ostensum erat; quod insuper planius constat, quoniam in morbis cephalicis ventriculi isti aquâ replentur, & plexus continuus à nimio madore dissolvitur, cum interea tamen ægroti facultatum animalium exercitio mediocriter polleant.

At vero *plexum* hunc *dup'ici officio* inservire supponimus: scilicet *primò*, quod sanguinis cerebro destinati pars aquosior in hujus vasa delegetur, eo quidem fine, ut reliqua laticis cruenti portio in spiritus exstillanda magis sincera & defæcator evadat; non secus ac in *destillatione Chymica* fieri assolet, nempe cum *plegmata* seorsim excipiendo peculiare receptaculum adaptatur, spiritus magis sinceri ac subtiles recipienti alteri insigniori instillantur. Sanguis aquosior hujus plexus vasa arteriosa subiens, ex iis in venas traductus, versus Cor reman-datur: interim ne serum in vasis istis nimis redundans ac ebulliens, circulationem impediat, superfluitates ejus in aliquod tempus à *glandulis* tum *minoribus* densissime interfertis, tum à *pineali* excipiuntur.

Alter, nec minus egregius, hujusce *plexus usus* sit, calorem à sanguine intra vasorum complicationes æstuante, ac velut in gyrum acto, tanquam à foco excitatum, intra cerebri plicaturam conservare: Quandoquidem enim *corpori calloso*, ac intimis cerebri medullis, utpote spirituum animalium *exercitio* potius quam *generationi* dicatis, *pia mater* densas vasorum propagines haud inferere debuit; tamen ut *calor pro spirituum circulatione requisitus*, ibidem constans serve-tur, hic *plexus* in tota vicinia suspenditur. Ut enim sanguis intra sinuum cavitates aggestus, *Balnei calidioris* vicem præstat, quo spiritus animales in extima & corticali cerebri parte uberius destillantur: Ita sanguis intra plexus hujus vasa exilia contentus, quo iidem spiritus in penitiori ac medullari substantia idoneè circulentur, *Balnei minoris* & magis temperati loco esse videtur.

Postremo reddi potest & altera ratio, quare *plexus choroeides* semper intra cerebri ventriculos, seu cavitatem à plicatura ejus factam, ut diversimode configuratam reperitur: nimirum exinde quoddam aliis generis commodum resultat; ut si quando plexus istius vasa, sanguinem nimis aquosum conductentia, plus seri deponant, quàm quod glandulæ excipere & continere valeant; quod superfluum est, opportune in cavitatem subjectam, velut in cloacam dilabatur. Quapropter etiam *glandula pinealis*, in loco eminentiore licet collocetur, semper tamen juxta foramen, sive ductum qui versus *infundibulum* patefcit, in Cerebro qualicunque ponitur.

Post *glandulam pinealem*, in superiore medullæ oblongatæ superficie *prominentia* quædam insignes reperiuntur, quæ vulgo *Nates* & *Testes* appellantur. Hæ juxta positæ, quatuor velut moleculas constituunt, quæ tamen processibus quibusdam sibi invicem adjunguntur. Infra has moleculas, seu potius inter illarum conjuncturas & medullæ oblongatæ Caudicem suppositum *Cavitas* sive, *specus angusta* & longa relinquitur, quæ à quibusdam Anatomicis *ventriculus quartus* appellatur; attamen secundum alios recentiores, qui ventriculum quartum sub cerebello collocant, hæc Cavitas transitus ad illum perhibetur.

Hujus *specus* extremitas *posterior* juxta ventriculi quarti initium terminatur; extremitas ejus *anterior* ante moleculas priores, *Nates* dictas, aperitur. A media hac cavitate, seu specu angusto, ductus ad *infundibilum* recta pergit. De partium harum situ, earumque ad invicem & ab aliis dependentia, & usu, apud Anatomicos valde controvertitur. De quibus hoc imprimis annotetur, prout supra innuimus, quod hæ *quatuor protuberantia* in quibusdam brutis animalibus, uti in *ove*, *vitulo*, *capra*, & similibus, longe *maiores* sunt quàm in *homine*; etiam in Capite sano, sicco, & vetusto conspectiores sunt, eorumque processus, commissuræ, & habitudines facilius adverti queunt, quàm cerebro adolescentiore, humido, aut aliàs invaletudinario. Profecto horum usus (nisi me fallit conjectura) longe nobilior videtur, quam ut viliora ista *Natum* & *Testium* nomina mereantur.

Cui tamen muneri hæ partes designantur, neque veteres Anatomici traderunt, nec facile erit rationis ope pro certo augurari. Prædictas vero prominentias pro *Cerebri & Cerebelli Cruribus*, utriusque *binis*, ad invicem reflexis, adeoque in *medullam oblongatam* coalescentibus haud sumi debere, prius ostendimus: nam licet ex supposito, pro functionis animalis œconomia *hypothesis* valde concinna fingi poterit, nempe statuendo, quod hujusmodi bina hinc inde crura, totidem essent distinctæ commeatus viæ, per quas spiritus animales, propter *motus obeundos*, è *Cerebro* & *Cerebello* in *medullam oblongatam* influunt; & exinde retro ab hac in ista, pro *sensionum actibus edendis* resiliunt: Attamen ex nostra dissecandi methodo plane constat, quod cerebrum minime juxta hunc locum, at longe superius, medullæ oblongatæ affigitur; ita quidem, ut *prominentia anteriores* non nisi mediate tantum, sc. per *corpora striata*, aliamque Caudicis medullaris portionem, influentiam ullam à cerebro suscipiant, aut dependentiam ab illo habeant. Ad hæc, si protuberantiæ, *Nates* dictæ, essent *Cerebri Crura*, cur eadem in homine cerebrum maximum nato, minima, aut saltem minora quam in plerisque aliis animalibus existerent? Deinde, inter prominentias *Testes* dictas, & *Cerebellum*, licet communicatio quædam intercedat; videtur tamen, quod à *moleculis* istis in *Cerebellum*, ac minime ab *hoc* per *istas* in *medullam oblongatam* commeatus patefuit: Namque ex prominentiis prædictis *processus medullaris* utrinque in *Cerebellum* oblique ascendit, cujus ductu spiritus animales à meta alterutra in alteram tendentes, mutua inter partes & cerebellum commercia efficiunt: At vero *processus* qui à *Cerebello* in *medullam oblongatam* ducunt, ejusque influentias huic inferunt, à prioribus distincti, aliquanto posterius consistunt, prout infra, cum de cerebello dicemus, clariùs ostenditur.

Interim vero, circa munera ac usus quibus *protuberantia* prædictæ inferviunt, hujusmodi conjecturam facimus. *Spiritus animales* è cerebro in *medullam oblongatam* scaturigine perpetua effluunt, resiliuntque; ita ut inter cerebrum & pleraque sensus & motus spontanei organa, commercium constans habeatur: (è quo tamen excipiuntur istæ partes, quæ non *appetitus nutu*, sed aut *natura instinctu*, aut cæco *passionum impulsu*, actiones suas perficiunt, tales enim omnino à *cerebello* influentias suas suscipiunt, uti postea plenius ostendetur.) Dum itaque spiritus è cerebro emanantes intra *medullam oblongatam* scaturiunt, opportunum est ut aliqui illorum exinde in *cerebellum* ferantur: (ob quos usus hoc fieri debet, mox dicetur.) Quapropter ex utroque medullæ oblongatæ latere *protuberantia* enascitur, in quam spiritus quidam *cerebello* designati, è communi *medulla oblongata* ductu secedant; atque *prominentia* istæ priores sunt, quæ vulgo *Nates* appellantur, ac uti diximus, in plerisque brutis animalibus longe majores sunt quam in homine: (cujus ratio infra declarabitur.) *Protuberantia* aliæ *posteriores*, vulgo *Testes* dictæ, hisce prioribus adnascuntur, & sunt eorum solummodo *ἐπιφύσεις* quædam, ac velut *capita processuum medullarium*, qui exinde obliquo ascensu in *cerebellum* feruntur; cum enim spiritus animales à *prominentiis* prioribus in *cerebellum* ascendunt, *posteriores* has velut initia com meatus sui ampliora primo subeunt, unde processuum medullarium ductu in *cerebellum* progrediuntur.

Præterea advertere licebit, quod cum spiritus animales è *medulla oblongata* in *prominentias* majores Natiformes, versus *cerebellum* derivandi feruntur, isti juxta ritum suum (quoties à duplici cujusque facultatis organo versus commune sensorium tendunt) invicem commisceri & confundi debent, priusquam *cerebello* inferuntur: Quare *prominentiæ* tum primæ, tum secundæ his adnatæ, processibus quibusdam, velut aliis ad invicem exporrectis unâ conjunguntur: quæ quidem illorum connexio, quoniam substrato medullari Caudice prorsus distingui debuit, hinc à separatione, sive inani spatio, quod *medullam oblongatam* & *prominentiarum* coalitiones intercedit, *cavitas* ista, quæ *ventriculus quartus* à nonnullis, & *transitus ad ipsum* ab aliis appellatur, emergit.

Quod si adhuc amplius inquiritur, in quem finem spiritus animales, devio hoc transitu, è communi medullæ oblongatæ ductu in *cerebellum* ferantur & exinde resiliant; dico, hoc fieri propter *duplicem respectum*; scil. tum ut *passiones* sive affectus animæ sensitivæ, à cerebro *inceptæ præcordiis* & *visceribus* transmittantur; tum *secundò*, ut *instinctus naturales*, in *præcordiis* & *visceribus* excitati, cerebro communicentur. Reciproca hæc commercia, quæ scilicet inter cerebrum & functionum involuntariarum organa habentur, privata isthac com meatus via institui debent, ne secus *facultatum harum involuntariarum exercitia*, *sensuum exteriorum actus*, aut *motuum spontaneorum intentiones* valde perturbent.

Quoad prius, observare est, quod à quavis Animæ sensitivæ *passione*, uti ab *ira*, *tristitia*, *voluptate*, aliisque affectibus, nobis utplurimum vel invitis, *præcordia* afficiuntur; quæ se varie dilatant aut constringunt, adeoque in sanguine fluctuationes diversimodas concitant: Insuper ab ejusmodi passionum impetu, vultus sive faciei aspectus variis modis alterari & distorqueri

queri solent. Horum omnium ratio esse videtur, quod cum spiritus animales intra cerebrum existentes, juxta passionis conceptæ Ideam commoventur, etiam spiritus alii intra hæc diverticula scatentes, pariter commoti, cerebellum, eoque mediante, nervorum præcordiis, visceribus, & musculis faciei inservientium origines afficiunt, proindeque partes quibus nervi isti distribuuntur, etiam in motus ejusdem passionis æmulos stimulantur.

Attamen *prædictæ prominentiæ*, earumque appendices, etiam haud minus inserviunt *instinctuum naturalium inpressionibus ad cerebrum convehendis*, ut exinde statim *appetitus & motus locales* retorqueantur; quibus exigentiæ quævis à præcordiis aut visceribus perceptæ, suppleri poterint. Cum in foetu recens edito stomachus præ fame latrat, hujus *instinctus*, nervorum ductu, ad *Cerebellum*, & exinde *medullares processus* ad *has protuberantias* deferuntur; at spiritus ibi degentes inpressionis Ideam formant, illamque ad cerebrum transferunt; in quo statim, sine prævia quavis notitia aut experientia, ejusmodi animæ conceptus excitantur ut animalcula quæ s statim ubera materna exquirant exsugantque.

Verum objicitur, haud necesse videri ut supponamus hujusmodi *passionum ac instinctuum actus* in devio hoc secessu fieri; nam quidni à cerebro in *nervos* ad præcordia tendentes influxu, & vice versa, per communem *medullæ oblongatæ* ductum, spirituum animalium commercia instituantur? Sed ad ista in promptu est referre, quod reciprocus ille spirituum motus à meta alterutra in alteram, propter istarum facultatum exercitia, per mediam *cerebelli* regionem fieri debeat: Ideoque (siquidem *per has prominentias* omnimoda inter *cerebrum & cerebellum communicatio* peragitur,) etiam eadem prorsus via, inter hoc & functionum mere naturalium organa comineatus habetur. Præterea si *passionum & instinctuum* *omnes* eodem tramite quo *sensibilium impetus* deferrentur, eorum actus mutuo spirituum animalium occursum, aut aggregationem, valde confunderentur. Hujusmodi autem hypothesis circa *passionum & naturalium instinctuum* actus & progressus posthac magis perspicua reddetur, cum cerebelli, & aliarum partium, quæ pariter cum his protuberantiis ad eadem munia destinari videntur, actiones & usus designaverimus.

Interea, quod statuimus, *prominentias posteriores* tantum esse *priorum Epiphyses*, cuiusvis intuenti liquido constabit. Hoc autem, prout supra innuimus, extra dubium videtur in *vituli, ovis*, & quorundam aliorum *quadrupedum cerebris*; ubi cum *Nates* insigniter magnæ sunt, *Testes* per exigua mole præditi iisdem accrescunt. Porro quod ab *his* in *cerebellum processus medullares* ducunt, & devio hoc tramite spiritus animales convehunt, ita manifestum est, ut nemo qui has partes sedulo inspexerit, ultrà hæsitare aut ambigere queat: Enimverò *villi ac fibræ* quibus hi *processus* in *cerebellum* ascendentes insigniuntur, aliter configuratæ & dispositæ sunt, quam quæ in *processu vicino à cerebello* versus *medullam oblongatam* descendente conspiciuntur.

Porro utræque *prominentiæ* pares, non solum alis mutuo exporrectis inter se communicant, verum etiam prædictos *processus* exinde in *cerebellum* protensos, alter *medullaris processus transversus* invicem connectit; & ab ista illo-

rum commissura *duo nervi exiles* producuntur, qui utrinque deflexi & antrosum delati, *duram matrem* subeunt, adeoque per ipsam recta incedunt, donec nervos oculorum motorios assecuti, eodem cum illis foramine calvariam egrediuntur, recta ad *oculi muscolum Trochlearem* pergentes. Circa hos nervulos observare est, quod cum plerique alii à *medulla oblongata lateribus* aut *basi* procedunt, isti è *prædictis prominentiis*, in summitate ejus extumentibus oriuntur. Cujus ratio, ni fallor, hæc est: *Prominentias* istas, *instinctus naturales* à Corde & visceribus cerebello traditos suscipere, & cerebro communicare, atque vice versa, *passionum* sive *affectuum impetus* à cerebro acceptos, mediante cerebello, versus præcordia transferre statuimus; in utraque vero actione oculorum motus manifesta quadam sympathia afficitur: Nam si dolor, inedia, aliave insignis molestia viscera aut præcordia affligat, dejectus demissusque oculorum aspectus istius molestiæ sensum declarabit; cum è contra in lætitia, & demulcente quavis præcordiorum aut viscerum affectione oculi vigorantur ac cum nitore saliunt. Pariter quosvis *animi affectus*, uti *tristitiam*, *iram*, *odium*, *amorem*, aliasque perturbationes oculi tam clare loquuntur, ut affecti, licet hypocritas agant, animi sensus & intimos conceptus celare nequeant. Procul dubio hæc ita contingunt, quatenus spiritus animales in devio hoc inter cerebrum & Præcordia secessu ultro citroque tendentes, una hos *nervos* uti *plectri fides* pulsant. Quare ex conjectura hujusmodi, quam de usu istorum nervorum facimus, *Patheticos*, eos appellamus; tamen si quidam alii nervi etiam hoc nomen merentur.

Quod superest, circa prædictas prominentias advertimus, quod tum *utraque* harum *partes*, tum *processus* iisdem appensi, à supposito *medulla oblongata* Caudice per interjectam *Cavitatem* distinguuntur, adeo ut cavitas seu *ventriculus* iste secundario tantum existere videatur; quia scil. inter prædicta corpora subter & supra collocata, inane spatium, eadem ab invicem separans, intercedere debuit. At vero hæc cavitas, ita per accidens resultare visa, satis insignem usum obtinet; nam in medio ejus ductu apertura declivis versus *infundibilum* tendit, per quam humores in utrumque ejus foramen, anterius & posterius perforatum, delapsi foras amendantur. *Foramen anterius* inter Thalamos nervorum opticorum paulo ante Glandulam pinealem inciditur, in quod serosa colluvies, juxta *medulla oblongata* confinia deposita, sensim prolabitur: *alterum* autem *foramen* posterius in *ventriculum quartum*, qui subter cerebellum consitus est, aperitur; quod foramen membrana tenui obtegatur, quæ ipsius ac cerebelli oram succingens, præcavet, ne humores è *ventriculo quarto* aut *cerebelli* confiniis derivati, aliò quam in istud foramen decidant; si quando autem à feri inundantia pellicula illa disrumpitur, latex aquosus in *medulla oblongata* basin decumbens, nervorum origines obruit, adeoque *affectus convulsivos*, & *spirituum vitalium deliquia* non raro lethalia inducit; prout in plurimum à morbis Cephalicis defunctorum cadaveribus observavi.

CAPUT XV.

De Cerebelli, ejusque partium & processuum quorundam usibus.

E Menso haftenus *medulla oblongata* tractu, qui tanquam *via regia*, recessibus quibusdam ac compitis devia, à *cerebro*, velut *Metropoli*, in plerasque *nervosi generis* Provincias ducit, modo *cerebellum*, quasi altera primaria regiminis Animalis urbs, perlustranda succedit. Hujus *Situs* à prioris satis remotus, etiam *structura* genus ab eo nonnihil diversum existit: Quinimo videtur quod huic, tanquam civitati liberæ & municipali, privilegia quædam ac peculiaris *jurisdictio* concedantur.

Cerebellum paulo infra *prominentias orbiculares* in ipso occipitio collocatur; ubi *medullæ oblongatæ* Caudici gemino pedunculo accrescens, figuræ ferè sphæricæ apparet: superior ejus gibbositas, *pia matris* interventu, ipsius cerebri limbo superficie tenus cohæret; ipsi vero haudquaquam intime unitur, neque inter hoc & illud, eorumve partes commercium aliquod immediatum intercedit. De *cerebelli figura & situ*, ejusque *variis processibus*, & quomodo *medullæ oblongatæ* appenditur, in superioribus satis dictum est; nunc restat ut pergamus ipsius, & singularum ejus partium munera ac usus designare: ubi *primo* in genere disquirendum, cujusmodi officio in *œconomia animali cerebellum fungitur*, dein postea, ubi ad particularia descendimus, plura sunt quæ notatu digna se considerationi nostræ offerunt: scil. *primo*, *vasorum plexus* totum cerebelli ambitum, ac præcipuè posticam ejus partem, cum glandularum acervo obducentes: *secundo*, *Plica & Lamella* ejus, certa & determinata serie, inque omnibus ferè perfimili ritu ordinatæ: *tertio*, *Plicarum duplex substantia*, scil. *Corticalis*, & *Medullaris*. Tractuumque omnium medullarium in *duobus amplis Meditullis* concentratio: *quarto*, *uterque cerebelli pedunculus*, è binis istis *meditullis* conflatus, ac in utroque pedunculo *tres distincti processus medullares* reperti: *quinto*, *Protuberantia annularis*, è medio cerebelli processu in *Caudicem medullarem* descendente constituta: *sexto*, *Nervi* quidam immediatè à protuberantia isthac, alii que in vicinia oriundi, qui *functioni voluntaria* designati, à *cerebello* spirituum animalium influentias suscipiunt: *Ultimo* demum, *Ventriculus*, sive *cavitas cerebello subjecta*, expendi debet.

1. Quoad *cerebelli* munus, sive usum in genere; nihil hujus aut fabrica dignum, aut structuræ consentaneum, à veteribus dictum occurrit. Nonnulli hoc *alium cerebrum* esse, & easdem cum illo actiones perficere statuunt: At si quis fatuo ac molli cerebro præditus fuerit, multum dubito an is sapiens evasurus sit, eo quod durius forte & solidius *cerebellum* obtinuerit. Alii in hac parte *Memoriam* collocant, supponentes *cerebellum* velut arcam sive Apothecam esse, in qua rerum prius cognitarum *Ideæ*, seu *Typi*, seorsim à specierum recentium incurfu asservantur: verum longe probabilius est, hanc facultatem potius in cerebri spiris corticalibus residere (prout alibi

ostendimus :) Nam quoties objecti dudum præteriti reminisci conamur, tempora & sinciput fricamus, cerebrum erigimus, & spiritus ibidem loci degentes exsuscitamus, quasi aliquod inibi latitans eruere satagentes; interim in occipitio nihil conaminis aut nixus motivi sentitur. Præterea, ostendimus *phantasiam & imaginationem* peragi in *Cerebro*; *Memoria* autem ab *imaginatione* ita dependet, ut hujus tantum *actio reflexa* sive inversa esse videatur. Quare ut cum ipsa in eodem claustrum, nempe in cerebro, collocetur, necesse est; nam plane constat, quod cerebrum inter & cerebellum, nulla immediata commercia intercedant.

Cum olim de cerebelli munere sedulo ac serius meditarer, superque hac re varia animo obvolverem, tandem ex analogia & crebra ratiocinatione, inventus hic (ut opinor) verus & genuinus ejus usus occurrebat, quod nempe *Cerebellum* sit *spirituum animalium in quadam opera designatorum peculiaris scaturigo, & penus ab ipso Cerebro distincta*. Intus in *Cerebro*, *Imaginatio*, *Memoria*, *Discursus*, alique superiores functionis actus peraguntur; præterea item ab ipso spiritus animales in nervosum genus influunt, quo *motus* quicunque *spontanei*, quorum nempe conscii & arbitri sumus, obeuntur. *Cerebelli* autem *officium esse videtur, spiritus animales nervis quibusdam suppeditare, quibus actiones involuntariae* (cujusmodi sunt *Cordis pulsatio, respiratio, αἵματος, alimenti concoctio, chyli protractio, & multæ aliæ*) *quæ nobis insciis aut invitis constanti ritu fiunt peraguntur*. Quoties motui voluntario accingimur, spiritus intra sinciput resides, in actionem sive influxum suscitari, intra nos quasi persentire videmur. At spiritus, cerebelli incolæ, ista naturæ opera absque notitia aut cura nostra tacite, ac impercepti exequuntur. Quapropter cum cerebrum anfractibus & mæandris quasi incertis variegatur, hujus ambitus plicis & lamellis serie ordinata dispositis instruitur; in quarum spatiis, tanquam in orbitis & tractibus designatis, spiritus animales, juxta regulam, sive morem iis naturaliter impressum, expanduntur. Enimvero isti cerebello, velut in Automato quodam artificiali, intra certos loculos & cancellos, eo ritu *σχετῶσται* videntur, ut sine auriga, qui motus ipsorum regat ac moderetur, ipsi seriatim ac justo solitoque ordine sponte sua effluant. Quapropter, siquidem nervi quidam inconsulto, intra cerebri forum, voluntatis aut appetitus imperio, nonnulla motuum genera juxta naturæ instinctus & exigentias perficiant, quis non jure opinetur, spirituum influxus pro hisce obeundis omnino à cerebello derivari? Quippe incommodum videtur, ut in hæc munia, quæ sine tumultu quovis aut perturbatione fieri oportet, spiritus è cerebro, qui passionum & cogitationum quasi ventis continuo in fluctus cientur, advocari debeant.

Ut juxta hunc modum de cerebelli usu opinarer, ratiocinationis filo quodam jamdudum adducebar; cui postea *ἀντοψία* Anatomica accessit, meque in hac sententia plane confirmavit: Namque in crebra Capiti variis generis animalium dissectione, observationes quædam occurrebant, quæ hanc rem extra dubium ponere videntur. Scil. *imprimis* advertit, *nervorum paria* quæ functionibus, *naturæ instinctu*, aut *passionum impetu*, potius quam *arbitrii nutu*, obiri solitis inserviunt, ita immediate è cerebello dependere, ut solummodo hinc in illorum origines spirituum animalium influxus derivari posse videatur.

Quo ritu nervi à cerebello oriundi, aut ab eo spiritus animales penum suscipientes, actiones tantum involuntarias exequentur, inferius declarabitur; interim pro sententiæ hujus confirmatione rationem aliam non minoris momenti in promptu habemus.

Itaque *secundo* advertimus, quod non modo *Cerebelli confirmatio* certo quodam, & peculiari modo ordinata existat, hoc est, quod moles ejus è plicis, sive circellis, serie quadam distincta & apta methodo dispositis, ac inter se proportionatis (uti dictum est) coagmentetur; unde licet arguere spiritus hinc oriundos, & extra affluentes, in opera quædam certa ac ad unum determinata impendi: Verum insuper observare est, quod in *quibusvis animalibus*, quantumvis specie & forma differant, tamen *Cerebelli figura semper valde similis, aut prorsus eadem existit. Cerebrum & Medulla Oblongata* in plurimis diverso ritu configurantur; nam supra ostendimus, harum partium aliquod discrimen in *homine & quadrupedibus* reperiri: Verum inter *hos utrosque ac volucres & pisces*, quoad istas partes, differentia notabilis occurrit. Interea tamen in illis omnibus cerebellum prorsus iisdem lamellis, sive circellis ad invicem pariter complicatis instructum, eademque forma & proportionem insignitum habetur; quod certè indicium est in hac officina spiritus animales certo velut dimenso progigni & dispensari, propter necessaria quædam officia quæ in omnibus eodem ritu peraguntur; quæquæ alia esse non possunt, quàm viscerum ac præcordiorum motus & actiones. Quoad alias facultates, cujusmodi sunt *imaginatio, memoria, appetitus*, imo *motus locales ac sensus*, uno modo in his, & alio atque alio in illis animalibus exercentur; quapropter cerebra diversis modis conformantur. Attamen *Cordis motus & respiratio* in quibusvis sanguine calido prædictis, simili ritu, hoc est, perpetua *systoles & diastoles* vicissitudine perficiuntur. Præterea cerebello munus aliud, & diversum, quàm quod cerebro convenit, assignari oportet; quoniam ubi *plica & anfractus Cerebro desunt*, in *Cerebello constanter reperiuntur*. Præter has rationes ab Anatomia depromptas, etiam corporis humani *pathologia* plures alias suggerit, quæ prædictum cerebelli munus ratum faciunt. Enimvero sæpenumero contingit ut terra & horrenda symptomata, præcordia, ac medii aut infimi ventris regionem infestent; dum interea, causa morbifica in cerebello, aut juxta ejus confinia subsistat. Novi aliquoties homines apparenti solum *occipitis dyscrasia* laborantes, qui de *crebra lipothymia*, & repetitis *spirituum deliquis*, quasi jamjam moribundi essent, quererentur: in quibus tamen de causa morbifica, ejusque sede nihil amplius detegere licebat, nisi quod affecti gravedinem insignem & dolorem in postica Capitis parte sentirent, atque ad subitum Capitis motum aut reclinationem subinde animo fere liquerentur. Profecto *symptomata* quæ in affectu *Incubo* dicto excitari solent, scilicet *æquis & gravamen ingens*, sive *onus* quod pectori videtur incumbere, omnino à materia morbifica in cerebelli confiniis defixa, & spirituum præcordiis destinatorum vias obstruente, procedunt. At vero hæc de cerebelli munere *hypotesis* magis illustrabitur & rata fiet à singularum ejus partium usibus rite designatis.

Quoad *Cerebelli partes & accidentia*; 1. advertimus, vasorum plexus cerebellum, non minus quam cerebrum, undique investire, necnon plicarum ejus æque sulcos ac liras intime obducere; quod certe indicio est, *Spiritus ani-*
males

malis in hac altera eorundem officina à sanguine irriguo progigni, & compagi ejus instillari : quod item luculentius patet, quoniam arteriæ & venæ non tantum in cerebelli superficie varie complicantur, verum utraq; pariter ac in cerebro, in penitiorum ejus substantiam propagines crebras dimittunt ; quare dum sanguinis pars maxime subtilis & spirituosus per longas ambages & vasorum canaliculos, velut serpentinis, traducta, adeoque in spiritus sublimata, intus suscipitur, pars cruenta per furculos venosos, etiam profunde dimissos, ablegatur. Porro, quemadmodum sanguinis cerebro destinati portio aquosior *plexum choroeidem* (quo illic in glandulas inutile suum phlegma deponat) incurrit ; ita phlegmatis separandi gratia, *glandularum acervus* cum *vasorum plexibus*, velut receptaculum huic rei adaptatum, in postica cerebelli regione disponitur.

2. E sanguine hoc ritu dephlegmato, & circulatione diuturna subtiliato, liquor valde purus & spirituosus cerebelli *substantia corticali* instillatur, qui statim à fermento illic consito in *spiritus animales* evehitur. Enimvero *spiritus in corticali cerebelli*, pariter ac *cerebri parte solummodo procreari* statuimus : Quare cum ejusmodi *Cortex medullæ oblongatæ & spinali* postea defuerit, partes hasce spirituum animalium *exercitio* tantum, ac minime illorum *productioni*, inservire putamus.

3. *Spiritus* intra *Cerebelli corticem*, sive exteriorem ambitum, ubivis producti, quo statim functionis animalis operibus accingantur, è *plicis* omnibus in *tractus medullares*, atque illinc in *duo ampla meditullia* derivantur, ubi plenum velut fontem sive scaturiginem efficiunt, ibidemque salientium instar aquarum, tum perpetuo vortice intus circulantur, tum exinde in systematis nervosi partes sibi appropriatas jugiter emanant.

4. Quoad *emanationum vias* observare licet, quod *duo Cerebri meditullia* in *linos* quasi *pedunculos* transeunt, quibus nempe illud medullæ oblongatæ Caudici affigitur : cumque in *utroque ejus pedunculo distincti processus* medullares reperiantur, hi omnes, aut saltem bini illorum, totidem quasi tractus sive orbitæ existunt, quibus spiritus animales è scaturigine sua foras emanant, indeque resiliunt.

5. *Primus* istorum *processuum*, è *prominentiis orbicularibus* in cerebellum ascendit : illius usum supra assignavimus ; quod nempe inter prominentias istas & cerebellum, quædam commeatus via sit, in qua dum spiritus animales, quasi in devio tramite, ultro citroque tendunt, tum *passionum impetus* à cerebro, mediante cerebello, versus præcordia transmittunt, tum *instinctus naturales* à præcordiis & visceribus cerebello traditos, versus cerebrum convehunt. *Secundus* autem *processus* à cerebello recta descendens, caudicem medullarem amplectitur, ipsumque adeo circumambiens, *protuberantiam annularem* constituit, è qua *nervorum paria, quintum, sextum, & septimum* origines suas desumunt ; ita quidem ut *protuberantia isthac*, spirituum à Cerebello emanantium *condus*, sive *promptuarium esse videatur*, è quo in oppositos nervorum ductus isti influere ac derivari poterint. *Tertius* demum utriusque *pedunculi processus*, à cerebello in medullam oblongatam descendens, è regione, qua octavi nervorum Paris origo consistit, Caudici ejus inseritur ; ut verisimile fuerit, spirituum penum huic nervo destinatarum hac via etiam à cerebello derivari ; dein, qui spi-
ritus

spiritus ab hujus nervi exigentia residui superabundant, isti in communem *medulla oblongata & spinalis* alveum prolapsi, partium istarum copias exaugeant. Propter hujusmodi finem *corpora teretia pyramidalia ex protuberantia annulari*, supra medullam oblongatam, versus spinam exporriguntur, nempe ut processuum istorum ductu spiritus in penu illa superabundantes, partim in octavi paris originem, partimque in communem medullaris caudicis tractum effluere possint.

Hæc de Cerebelli, ejusque partium & processuum usibus, breviter ac summarie dicta sunt: quæ tamen ut melius intelligantur, item quo nova hæc *Theoria*, circa *regiminis animalis functionem involuntariam* recens excogitata clarius illustretur, libet hic *spirituum in cerebello productorum diataxim* magis particularem proferre, eorumque velut *armilustrium* instituere. Porro ex re fore videtur, ut *nervorum* ab hoc fonte spirituum copias accipientium *munera*, circa *functionis tantum involuntaria actus habita* apertius designemus.

CAPUT XVI.

De Spirituum in cerebello productorum, propter functionis involuntaria actus, varia diataxi, & Exercitio diversimodo.

Postquam ostendimus quod *cerebelli munus sit, spiritus animales* seorsim à spiritibus in cerebro genitis procreare, eosque in *nervos actionum passionumque involuntariarum* executores dispensare, adhuc explicandum restat, quali *œconomia* ritu spiritus cerebelli indigenæ, ac municipes facti, tum *circulatione intestina* intra proprios lares occupantur, tum *irradiatione exteriori*, propter aliarum partium necessitates & indigentiam, foras expandi & emanare solent: dein, his præmissis, *nervorum*, & quorundam aliorum *processuum* huic regimini ministeria debentium, *usus & officia* particularius designabimus.

Quoad prius, cum *cerebellum* sit altera *primaria anima sensitiva radix*, sive *fons* unde spiritus Animales per totam ipsius ac appendicis ejus *Compagem* diffusi, usque sub eadem *systasi & contextura radiosa* continuantur, notandum est, Spirituum hanc radiationem à *Cerebello* alio ritu, ac alteram à *Cerebro* dimanare: quippe hæc sibi met relicta, constanti effluxu, in functionis tum vitalis, tum mere naturalis organa impenditur, ejusque impendia æque jugi spirituum proventu, à massa sanguinea perpetim instillata, resarciuntur. Contra autem, spiritus è cerebro, nec perenni hujusmodi cursu continenter & paulatim effluunt, nec vectigali perpetuo & sensim illabente sustentantur; sed eorum tum *jactura*, tum *refectio* incerta, inæqualis, & varie interrupta est: neque enim ipsi functionis spontaneæ actus, quibus inserviunt, constanti aliquo & semper eodem ritu peraguntur; sed juxta accidentia & occasiones exteriores, modo confertim & cum impetu quodam eos exerimus, modo prorsus intermitti ac feriari patimur. Ac proinde spiritus dimenso quoque

pariter incerto suppeditantur; nempe in somno ubertim & copiosius, in vigilia autem & difficili labore parce, aut vix omnino instillantur. Quinetiam ipsa *anima sensitiva portio involuntaria* (quæ nempe à cerebello profluit) quatenus cum altera in cerebro radicata commercium & affinitatem (uti supra dictum est) propinquam habet, eatenus in munere suo æquabiliter & tranquille peragendo multum perturbari solet, atque impulsibus hinc inde immixtis varie affecta & agitata, *Systasin* suam in *toto*, aut *parte*, modo contrahere, modo *extendere* cogitur, adeoque *passionibus* quibusdam obnoxia redditur, atque ad *actiones anormales* & inordinatas edendas passim instigatur.

Enimverò *spirituum contextura*, sive *Anima pars* cerebellum ejusque appendicem irradians, & *sensu quodam* afficitur, & in *motus* sibi met appropriatos, diversimodos tamen, urgetur. *Sensio*, sive *sympathia* ad hanc pertinens, si intra cerebelli confinia terminetur, nec undulatione fortiore ulterius ad cerebrum pergit, *semper privata* est, & quia animali haud conscio peragitur, non nisi ab effectu, quatenus nempe *motum peculiarem excitat*, dignosci potest. Talis autem *cerebelli affectio* in eo consistit, quod à qualibet nova præcordiorum ac viscerum diathesi, huic ab infra communicata, item à quavis violenta passione intra cerebri forum excitata, adeoque desuper commissa, impressio quædam cerebelli incolis infertur: qua quidem illi in varias diataxeis, pro motibus his aut illis respective obeundis disponuntur.

Exempli gratia, quamdiu cerebelli regio tranquilla, tanquam sudo ac cælo sereniore, omni perturbatione vacat, spiritus ejus incolæ sensu placido, seu velut complacentia quadam perfusi, tum *blanda circulatione* intra proprios lares scaturiunt, tum *effluxu æquabili*, Nervorum functionibus vitali ac naturali inservientium, origines subeunt: quo quidem *respiratio à bīas* & *pulsus*, *chylificatio*, aliaque ejus census munia tranquille perficiuntur. Sin vero molestia aut perturbatio quæpiam alicubi exterius contingat, unde illius impressio cerebello communicetur, statim *sensio molesta* ibidem concitata spiritus animales in ipso fonte perturbat, proindeque in functionis involuntariæ Organis motus irregulares excire solet: hinc enim *cerebra pulsus* & *respirationis alteratio*, item *viscerum spasmi*, & *motus convulsivi*, nobis insciis, aut etiam invitis oriuntur. *Impressio* autem aliunde cerebello immissa, ac ejusmodi sensum molestum inducens, aut *nervorum ductu* à præcordiis & visceribus ascendit, aut *superne à cerebro*, prominentiarum orbicularium commeatu advehitur, prout mox fusius patebit.

Interim, ex his de *cerebelli potentiâ passivâ*, sive *sensu* præmissis, facile erit colligere, quali ratione, quo ordine ac serie, spiritus animales ab eodem oriundi moveantur. Cæterum inter *duplicem* ipsorum *motum* est imprimis distinguendum: Nam *unus consuetus* est ordinarius, in *spirituum effluxu perenni* & *æquabili* consistens; quo quidem illi in nervorum juxta orientium, ac præsertim *paris vagi* & *intercostalis* origines influentes, *pulsus*, *respirationis*, *chylificationis*, aliosque functionis involuntariæ actus solennes, uti dictum est, exequuntur. Dein 2. *motus alius extraordinarius* & *occasionalis* occurrit, quem iidem *spiritus*, turbatis quasi ordinibus, confuse peragunt: uti cum *pulsus debito celerior* aut *tardior*, *respiratio inæqualis* aut *interrupta* evadit; cumque aliæ facultates, quæ ad hanc classem pertinent, è regulari & constanti suo ritu pervertuntur.

Atque

Atque hujusmodi *motus Extraordinarius* iterum *duplex* existit, quatenus nimirum instigatio ejus à *duplici termino* procedit; nam *impulsus* quo spiritus cerebelli hospites in actionem quamque anormalam coguntur (prout modo innuimus) aut *ab infra*, scilicet à *præcordiis* & visceribus effertur; aut *desuper*, nempe à *cerebro*, transmitti solet.

Quoad *prins*, si quando *præcordia* nimis æstuant, & calore febrili torreantur, illico nervorum *paris vagi* & *intercostalis* ductu, spiritus in cerebello residues istius noxæ admoniti, & *pulsus*, & *respirationis* actus crebriores fortioresque instituunt: pariter si fortè humores, & succi acres, ventriculi aut intestinorum tunicas irritent & valde laceffant, propter illius affectus sensum *cerebello* communicatum, motus obeundi instinctus reciprocatur, quo fibræ partium contractæ & corrugatæ rei noxiæ exclusionem moliuntur. Plures instantiæ circa alios quoscumque functionis vitalis, aut mere naturalis actus, huc adduci possint: de quibus insuper observare est, quod cum molestiæ sensus à *præcordiis* aut visceribus ad cerebellum immediatè convehitur, *affectio* isthæc, velut aquarum undulatio, aut *ibidem sistitur ac terminatur*, unde pro re nata motus, cerebro inconsulto, statim retorquetur, velut cum à febrili intemperie absque notitia nostra *præcordiorum* actiones alterantur; vel *secundo* iste molestiæ sensus ad cerebellum transmissus, si quidem vehementior fuerit, sese latius explicat, & tanquam fortior aquarum undulatio, *cerebellum trajiciens*, ulterius usque *ad cerebrum pergit*, ejusque hospites noxæ monet; quo quidem illi ad hostem oppugnandum incitati, alius generis motus instituunt: ita (prout dictum est) cum *præcordia* immaniter æstuant, *cerebellum hæc sentiens pulsam & respirationem* intendit: Insuper autem *cerebrum*, ejusdem molestiæ admonitum, *potum frigidum*, aliaque remedia calorem attemperantia exigit ac sedulo requirit. Porro, ad hunc ritum proceditur etiam in aliis quibusdam actionibus; quæ cum regulares fuerint, tamen sine prævia notitia in cerebro habita, per *instinctus* mere *naturales* fieri dicuntur, utpote cum bruta animalia recens in lucem edita, statim ubera materna exquirunt, avidèque sugunt; aut aves sine duce quovis, aut exemplo, miro artificio nidificant, ova pariunt, ac humorem inibi contentum incubatu, in pullum vivificant. In ejusmodi operibus, *cerebellum*, à nullo prius edoctum, *media idonea ad fines à natura institutos dirigit*: quod quidem hac ratione fieri videtur. *Necessitatis* cujusque *sensus cerebello* illatus, spiritus ejus incolas ad succurrendum incitat: cui cum pares non fuerint, *impressio* illinc ulterius pergens, ad *prominentias orbiculares* defertur: qua statim spiritus inibi degentes perculsi, *appetitum*, sive agendi intentionem formant, qui exinde demum *cerebro* communicatus, promptè efficit, ut motus locales, operis requisiti executores, retorqueantur. Super hisce paulo fusius differendi locus inferius occurret, cum de respectu, qui inter *prominentias orbiculares* & *annularem protuberantiam* intercedit, dicemus.

Interim *secundò* advertimus, quod spirituum cerebelli Incolarum *motus anormali*, etiam propter *affectuum impetus* illinc à cerebro transmissos excitari solent: nam quoties *passio violenta*, utpote *gaudii*, *tristitia*, *ira*, *metus*, aut alius generis, in cerebro concipitur, illico ejusdem *Impressio* per *devias prominentiarum tramites* in *cerebellum* perducta, spiritus functioni vitali aut mere naturali

destinatos in ipso illorum fonte perturbat, & propterea statim functionum istarum organis insignes mutationes inducit.

Quæ hæcenus de *cerebello*, circa *functionis* tantum *involuntaria* munera occupato, item quæ circa spirituum incolatum ejus *sensus motusque*, tum *solennes*, tum *anomalos*, dicta sunt, melius elucescent, si denique *nervorum*, aliorumque *processuum à cerebello* immediate pendentium, officia non alia esse ostenderimus, quam ut *actus* solum *involuntarios* excquantur: id quod breviter quidem, ac quantum ad hanc rem pertinet, succincte fiet; nam plenior eorundem consideratio alterius loci est.

CAPUT XVII.

De Nervis, qui spirituum copias à cerebello accipientes, easdem functionis involuntaria actibus impendunt.

SUprà ostendimus, quod ex *annulari protuberantia* (quæ cerebelli quidam processus est) tria *Nervorum paria*, scilicet *quintum*, *sextum*, & *septimum*, immediate oriuntur. *Protuberantiam* istam velut *condum* esse diximus, à quo spiritus è cerebello profluentes, inque Nervos appensos pro data occasione derivandi, asservantur; ac interea dum illic commorantur, ipsi qui ab utroque cerebelli *Meditullio* *divisim* emanaverant, in hoc *circo* mutuo occurrentes, simul *uniuntur*. Sicuti autem tria prædicta *Nervorum paria*, mediante isthac *protuberantia*, spirituum copias à cerebello accipiunt; ita etiam *par octavum*, juxta alterius (scilicet *infimi*) *processus medullaris* à cerebro dimissi *insertionem*, originem suam habens, istius *commeatu* spirituum *influxum* non minus à cerebello derivare videtur. Quare cum hæc *quatuor Nervorum conjugationes* spirituum suorum tributa omnino cerebello debeant, si ostendero, singulos hosce Nervos & *sensuum* & *motuum actibus involuntariis* potissimum, ac ferè tantum *inservire*; certè hoc insigni argumento erit, quod juxta *hypothesin nostram cerebelli munus* sit, *spiritus animales pro functionibus involuntariis requisitos* *pro-gignere & dispensare*.

Itaque primo de *quinta & sexta nervorum conjugatione* observamus, quod cum hæc ex *annuli majoris basi*, atque isthac à *lateribus* ejus, tum in *homine*, tum in *quadrupedibus* oriuntur; *par quintum* antè delatum, ramos in *oculorum glandulas*, in *nares*, in *palatum*, *dentes*, imò & *plerasque faciei ac oris partes* distribuat; *Par autem sextum* quibusdam *oculi musculis* totum impenditur. Porro, è *quinti paris trunco surculi bini*, & alter è *nervo sexti paris* posterius reflexi una coeunt; quodque mirum est, atque ab *Anatomicis* haud prius animadvertum, *nervi intercostalis* præcordiis & visceribus destinati truncum constituunt; adeo ut *nervi paris quinti & sexti ramificationem geminam*, nempe *superiorem unam*, circa *oris & faciei partes*, & *inferiorem alteram*, per viscera *medii ac imi ventris* proten-

protendant. Attamen cuivis rem paulo attentius consideranti liquido patebit, præcipuos utriusque partitionis ramos, circa *motus* ac *sensus* munia *involuntaria*, cuiusmodi imprimis aut *passiones* effectrices sunt, aut *Instinctus naturales* exigant, occupari.

1. De *nervo intercostali*, qui in nervis quinti & sexti paris (uti dictum est) radicatus, quoad originem suam omnino à cerebello dependet, hic minimè ambigitur, quin iste præcordiis & visceribus in homine, atque his tantum in quadrupedibus plerisque prospiciens, functionibus tantum vitali ac mere naturali impendatur, adeoque actibus spontaneis parum aut nihil conferat. Porro, in quantum *hic nervus* in præcordia ac viscera totius abdominis exporrectus, per ramificationem superiorem etiam in oculos, necnon oris & faciei partes continuatur; certè hinc vera & genuina ratio assignari potest, quare in *omni passione oculi, facies, & ora, præcordiorum affectionibus*, nobis sæpe insciis aut invitis ita *correspondeant*, ut sæpe intima cordis sensa vultu & aspectu prodere cogamur. Quinimo hinc ratio petitur, cur in *sternutatione, oscitatione, risu, & ploratu, musculi faciei* cum *præcordiis* ita in *motum conspirent*. Porro, cum in homine, secus ac quibusvis præterea animalibus, uti posthac ostendemus, à *nervo intercostali* plures surculi ad *diaphragmatis nervum* mittuntur; hæc certè causa est, *cur risibilitas sit propria affectio Hominis*.

Cæterum, *paris quinti* truncus antèrius delatus, & ramificationibus suis per totius faciei partes distributus, easdem haud tantum patheticè moveri, & juxta præcordiorum affectus configurari facit; ast insuper quosdam alius generis & *motus & sensationis* actus producit, qui ut plurimum *involuntarii* sunt, adeoque immediatè à cerebello pendere videntur: Ex. gr. hic nervus utrique mandibulæ propagines pro manducationis opere requisitas impertit: Verum satis notum est, quod *alimenti in os ingestio* sit *primum & antiquissimum cuiusque animalis negotium*, quod equidem ab instinctu naturali, ante omnem cerebri notitiam, ediscitur. Quoad *sensus* autem, hujus paris rami aliquatenus *olfactui*, ut plurimum verò *saporibus excipiendis & dignoscendis* conducunt: Hinc adeo fit, quod *odores* uti per *nervos olfactorios* cerebrum reficiunt, ita per hujus paris rami cerebellum afficiunt, eoque mediante viscera & præcordia recreare solent. Attamen *sapores* (siquidem hujus ferè peculiaris sint provinciæ) quicquid jucunditatis aut molestiæ habent, potissimum spiritibus cerebelli incolis, ac dein illorum consensu præcordiis & visceribus inferunt. Hinc est quod *Ōwenzis* non tantum famem sedet, sed languidos etiam & animi deliquium passos, vel prima vini libamina resuscitent. Porro, in quantum ab *hoc nervo* rami quidam *gustui*, aliique *olfactui* inserviunt, inter utraque isthæc sensoria adeo stricta affinitas contrahitur, ut *nihil gustui arrideat, nisi quod ab olfactu comprobatur*: atque unius horum sensus abolitio sæpe alterius privationem aut diminutionem infert.

2. De *Nervo sexta conjugationis* observamus, quod cum surculum pro radice *nervi intercostalis* reflexerit, reliquus ejus truncus antèrius versus oculi orbitam delatus, *binis* ejus *musculis*, scilicet *septimo brutis proprio, adducenti, abducenti*que distribuitur. Hinc inferre licebit, quod hic nervus, præter influentiam ejus functioni vitali ac naturali erogatam, etiam oculi motibus quibusdam patheticis, quales nimirum præcordiorum ac viscerum affectibus obsequi

solent, producendis inserviat; adeo ut totam spiritus animalis penum, quam à cerebello accipit, actibus tantum involuntariis impendat.

3. *Par septimum*, sive *nervi auditorii*, etiam à cerebello pendere videntur, in quantum origines suas ex *protuberantia annulari* desumunt: attamen illorum usus paulo aliter in *homine* ac in *quadrupedibus* habet. Quippe in illo *protuberantia annularis* unica est, eaque insigniter magna, è cuius margine inferiori *nervi auditorii* procedunt: In *brutis* vero *protuberantia* binæ prostant; scilicet *una major* à cerebello dimissa, in qua nervorum quinti & sexti origines consistunt; dein juxta hanc *altera minor*, & velut *secundaria* habetur, è qua *nervi auditorii* proficiscuntur. Hic *minor* ac inferior *annulus*, non ita manifesto, uti prior, à cerebello dependet; quin ab utraque summitate ejus *linea alba medullaris*, in *quarti ventriculi* fundo, supra *Medullam oblongatam* protenditur: ita ut hæc à *medulla oblongata* aut *spiritus suscipere*, aut saltem *species sensibiles* eidem inferre videatur: quem ob usum ita constituitur, posthac inquiremus: nam circa hos *septimi paris nervos*, quatenus eorum munia quædam cerebelli œconomiam plurimum illustrent, libet hic paulo fusiùs differere.

Itaque in *Homine* protuberantiam annularem maximam & indivisam nacti, *nervi auditorii*, è margine ejus profecti, prosapiam suam cerebello acceptam ostentant: videamus quo ritu nervorum istorum pensa cum assignato hujus regimine quadrent. *Septimi Paris* utrinque *binos esse processus* (qui aliquatenus distincti nervi dicantur) supra ostendimus: Horum *unus mollior sensui* tantum inservit, atque *alter durior motus* quosdam exequi videtur. Hic posterior *Nervus* extra cranium delatus, in *tres ramos* dividitur, qui omnes motibus patheticis, aut saltem quales cerebro inconsulto peraguntur, inserviunt.

1. *Primus* illorum prope meatum auditorium reflexus, musculis auris impenditur. Proculdubio hujus actione efficitur, ut animalia quævis à subito soni impulsu aures, quasi sonum nimis cito transeuntem capturas erigunt. 2. *eiusdem nervi ramus alter* maxillæ musculos superscandens, versus utrumque oculi angulum furculos emittit, qui musculis palpebrarum attollentibus inferuntur; quorum certè munus est, ad subitum soni appulsum oculos confestim aperire, eosque velut ad Excubias vocare, ut ab aëris verbere auri illato, statim oculus circumspiciat, quid rei sit, & num aliquid periculi subsit, necne: quod etiam animalia quævis improviso agunt. 3. *Tertius* ejusdem nervi auditorii ramus, versus linguæ radicem descendens, musculis ejus ac *ossis Hyocideos* distribuitur, adeoque organa quædam vocis edendæ actuat: propterea autem aliquatenus evenit, quod animalia, à sono inassueto aut horrendo attonita, statim, voce incerta edita, clament ac ejulent. Attamen hujusmodi nervorum conformatio in *Homine* usum alium insigniorem præstat, nempe ut *vix auditui apte respondeat, sitque ista prolata soni per hunc admissi* velut *Echo*: ita quidem, cum ejusdem paris utriusque bini sint Nervi, per *unum sonus auditu excipitur*, qui denuo per *alterum voce redditur*. *Echo communis* & *Extrinseca* in eo consistit, quod aëris concussi & commoti undulatio quædam excitata, & prorsum tendens, sicubi propter obicem quendam ulterius recta deferri nequeat, statim reperiussa, sive ad certos angulos reflexa, metam priorem adversus terminatur. Pariter in *auditu soni impressio*, sive *species*, per ejusdem aut affinis nervi processuum *ansæ* auribus admissa, ac versus

Cerebellum & commune Sensorium intus delata, exinde rursus in *processum vocalem* reflexa ore profertur. Verum inter hæc discrimen aliquod occurrit, quatenus nimirum *Echo exterior sonum immediate reddit*; at *Sonus auditus* haud necessario statim ore profertur, quin hic Ideam in capite relinquit, juxta quam postea pro data occasione vox efformatur, quæ illius, utut pridem admissi, typum & imaginem gerit.

Hic vero (ut parum digredi liceat) inquirendum restat, in qua parte *ἰδυεαῖα* sonorum *Idea* relinquuntur: utrum in *Cerebro tantum*, quod est arca *Memoriæ* acquisitæ, & velut artificialis: vel annon etiam in *Cerebello*, quod naturalis *memoriæ* locus est? Revera sonos ad utraque horum, veluti ad distinctas apothecas, pertingere existimamus. Quilibet audibilis impulsus auri inflictus, statim processus auditorii ductu *protuberantia annulari* infertur; illinc verò, sicut aliæ species sensibiles, ad *corpora striata*, sive *sensorium commune* deferitur; (qua via huc transeat postea ostendetur:) exinde isthæc impressio ulterius tendens, ac cerebro item tradita, *imaginationem* ciet, adeoque in *Cortice* ejus sui imaginem velut tesseram pro *memoria* relinquit. Insuper etiam, sicuti processus auditorius à *cerebello* dependet, & ab eo *Spirituum animalium* penum accipit: ita verisimile est, quod eorundem *Spirituum* recessu sonorum admissorum *Idea* etiam *Cerebello* convehuntur; quæ quidem illic vestigia sive tractus efformantes, sui memoriam imprimunt: unde cum postea species illic reconditæ depromuntur, processus vocalis ope voces sonorum prius admissorum æmulæ, & serie quadam ordinata erumpentes, edifi-
faciunt.

Hinc usu venit, ut *melodia* à quibusdam hominibus facillimè addiscantur, & postea sine meditatione quavis, aut ullo cerebri labore, cum exacta symphonia proferantur; nempe à distinctis harmoniæ auditæ accentibus, spiritus intra *cerebellum* agentes in peculiare schematismos disponuntur, juxta quos, cum in *Nervi auditorii* processum utrobique vocalem effluunt, velut sponte quadam, & quasi specierum successione automa, *plectri modulos*, quos *auribus hauserunt*, voce edunt. Proculdubio hinc ratio peti debet, cur *homines nonnulli musicam nullo negotio addiscunt*, atque *alii difficillime*, aut *vix omnino*. Namque observare est, quod pueri quidam, antequam loqui distincte possint, *melodias* quasdam memoriter celerrime capiunt, concinuntque; interim alii, viri licet summe ingeniosi, quique memoria egregia pollent, ad *musicam aequè inepti* ac indociles fiunt ac *Asinus ad Lyræ*. Quare vulgo dicitur, quosdam *aures musicas* habere, atque alios tali facultate prorsus destitui. Interim in confesso habetur, etiam in his vocis organa minime deficere; attamen omnis culpa, perperam licet, in *Auditum* rejicitur.

Verum enimvero hujus defectus causa genuina in hoc consistere videtur, quod cum in omnibus species audibiles *cerebellum* æque ac immediatius quam *Cerebrum* petunt; tamen in nonnullis ob *Cerebellum durius*, ac impressionibus non facile cedens nactis, istæ species, quoniam nihil sui inter transeundum *cerebello* imprimere poterant, versus *commune sensorium* delatæ, *Typos* sive *Ideas* suas potissimum ac fere tantum in cerebro relinquunt: quæ pars notionibus usque perturbatis occupata, harmoniæ composituris distincte asservandis minus apta existit. Interim vero in aliis *audibilium species*, præterquam quod

Sensorio communi ac *Cerebro* inferuntur, etiam istæ, præsertim si harmonice configurantur, *Cerebellum* (utpote in illis *mollius* ac *impressionum facile capax* existens) peculiari spirituum animalium diatæxi & schematismo afficiunt: ubi, cum *melodia* species in oculis & cellulis idoneis depositæ asservantur, illinc postea absque reminiscentiæ nixu quovis, aut labore, fere incogitanter, serie tamen distincta, atque modis ac figuris velut compositis, effluunt, adeoque *processus vocales* inflando, dulces concentuum modos & *vocalem Musicam* constituunt.

Quod si diversæ *Commeatus* viæ inquirantur, quibus nempe *species audibiles* in *protuberantiam annularem* dilatæ, tum *cerebrum*, tum *cerebellum* petunt; dico, non improbabile esse, quin ex *protuberantia ista* tum aditus in subjectum *Medulla oblongata* tractum, & quasi viam pateat; tum etiam per medullares ejusdem annuli processus, *ductus alius* in *cerebellum* aperiatur. Verum, ne forte *spirituum animalium* & *spirituum sensibilibus* confusio pariatur, (quod sane evitari vix possit) si via eorum translationi constituta in varios aditus & multiplices aperturas dehisceret: idcirco super hoc potius opinari libet, *sonorum ideas*, cum ad commune sensorium ferantur, *cerebellum pertransire*, cujus regione primò trajecta, exinde per tramitem devium, scilicet per *orbiculares prominentias*, ad *corpora striata* tandem deduci: quæ forsitan ex parte ratio est, quod in auditu, sensationis perceptio ita sera succedat, atque objecti impulsus, respectu visionis, tam tarde sequatur.

Dum itaque *species audibilis* *cerebellum* trajicit, quibusdam hominibus in hac regione (liquidem ea temperie molli ac impressionibus suscipiendis apta constat) sui tractus & vestigia relinquit, proindeque isti *aures musicas* sortiuntur. In aliis vero, quibus *cerebelli compages durior* existit, ejusmodi sonorum tractus minime producuntur, ac idcirco tales *facultate Musica* prorsus destituntur.

Cum itaque ad hunc modum *species audibiles cerebellum* trajicere supponimus, hinc ratio potest reddi, quare *Musica* non modo phantasiam delectatione quadam afficit, verum insuper *cordis mœrori* & *tristitia succurrit*; imo passiones quasvis turbulentas, ex sanguinis æstu & fluctuatione immodica in pectore excitatas sedat: Quandoquidem enim spiritus animales præcordiorum motui inservientes à cerebello derivantur, sicuti perturbationes in cerebro conceptæ, influenza huc transmissa, spiritus hosce in ipso fonte commovendo, eorundem affectuum impetus pectori transferunt; ita *melodia auribus introducta*, & per hanc provinciam diffusa, quasi benigno afflatu spiritus hujus incolæ incantant, eosque à furore avocatos, velut ad tripudii numeros & modos componit, adeoque tumultus quosvis & inordinationes inibi excitatas compescit.

Ex his discriminis ratio, qua quidem *nervi auditorii* diverso ritu in *homine* ac *quadrupedibus* habent, aliquatenus innotescat: nam quia hic parum opus est, ut species audibilis, aut propter soni auditi per vocem recipitationes, aut propter harmoniæ modulos illic imprimendos, *cerebellum* trajiciat, (neque enim, quicquid Poëtæ fingant, pro domandis affectibus, qui ferarum pectora exagitant, musica requiritur) idcirco istis (quadrupedibus inquam) *protuberantia annularis*, nervis auditoriis spiritus animales dispensans, ab iisque

hisque species sensibiles excipiens, non ita strictam cum Cerebello affinitatem exigit: quinimo cum sufficiat, ut nervi isti à Medulla oblongata oriantur, tamen protuberantia annularis quasi commune vestibulum iis præfigi debuit; in quo scilicet & spiritus ab utroque latere prodeuntes, & species sensibiles in utrumque referendæ, prius invicem misceri ac *uniri* poterint, ne secus quilibet *sonus geminatus* evadat.

Inter Nervos qui ad Cerebellum pertinere, ejusque munia exequi videntur; ultimo succedit *Par vagum*, sive *octavum*, quod quidem è communi Medullæ oblongatæ caudice, juxta locum ubi ultimus Cerebelli processus terminatur, ac è regione qua corpora pyramidalia è protuberantia annulari producta desinunt, ortum suum habet: ita ut hos item nervos, utrinque mediante isto processu, forsan item aliquatenus per corporum pyramidalium ductus, omnimodum spiritus animalis influxum à Cerebello derivare putemus.

Horum *Origofibris & filamentis* quamplurimis, mox ab invicem distinctis constat; quibus sub ipso Exortu nervi cujusdam insignis truncus, à *spinali Medulla* oriundus accedit. Nervorum *paris vagi* descriptio, ac in præcordia ac viscera quædam protensio, inferius subduntur. Impræsentiarum annotare sufficiat, quod siquidem hic Nervus præcordiis potissimum impenditur, quorum actus involuntarii sunt, ac sine cura aut notitia nostra in somno æque ac in vigilia peraguntur; cumque idem Nervus spirituum copias è propinquiori Cerebelli fonte omnino suscipere videatur; hinc certe aliquatenus concludere liceat, *Cerebelli æconomiam functioni tantum involuntaria* prospicere.

Hæc de Nervis qui Cerebelli imperio ac legibus *mancipati*, sub ipso mereri & ministerium præstare videntur: quibus tamen insuper accenseri debet *Par quartum*, sive *Nervuli oculorum pathetici*, è processibus Cerebelli primis, qui nempe ipsum & prominentias orbiculares intercedunt, oriundi; de quorum usu superius dictum est. Porro hic annotare subest, quod Nervi quidam alii, inferius describendi, in quantum cum prædictis Nervis prope origines eorum communicant, etiam actus quosdam involuntarios edi faciunt; cujusmodi imprimis sunt *Par nonum*, *Nervus spinalis ad Par vagum accessorius*, etiam *Nervus diaphragmatis*, & quidam alii, prout in particulari Nervorum historia fuse ostendemus.

Quinetiam observare est de Nervis modo descriptis, qui profapiam suam Cerebello debentes, functionis involuntariæ muniis designari videntur, quod interdum aliqui istorum, alienæ ditionis licet, Cerebri imperio ac nutui obsequi coguntur: namque faciei partes pathetice & incogitanter moveri solitas, etiam pro libitu nostro in has aut illas configurationes ducere solemus; etiam præcordiorum & viscerum motus & actiones pro appetitus jussu quadantenus alterare possumus. Horum ratio ex parte est, quia *Nervi utriusque regiminis, surculis ad invicem emissis, varie inter se communicant*, ut sæpius alterutrius officia in alterius partes trahantur. Præterea autem supra innuimus, quod *sensibilis impressio* functionis involuntariæ partibus inflicta, siquidem ea vehemens fuerit, tanquam fortior aquarum undulatio, Cerebellum trajiciens, ipsum Cerebrum afficit. Pariter opinari licet de *motu*, qui ad easdem partes spectat; videlicet iste ordinario ritu habens, Cerebello auspice peragitur. Attamen Cerebri edicta quædam severiora devio prominentiarum comiteatu etiam ad cerebellum pertingunt; ejusque Incolarum officia juxta appetitus

nutum obeunda determinant. Nulli non visum est, quod *violenta passiones* (voluntate conscia, pariter & inscia) hoc facile præstant; quidni igitur ipsa etiam voluntas, si quidem occasio requirat, ejusmodi dominium exerceat? Neque interea tamen hoc quicquam derogat à cerebelli privilegiis, quominus illud Civitas libera & Municipalis, adeoque functionis involuntariæ domina appelletur, eo quod in paucis quibusdam cerebro morem gerit: Quippe *cerebrum* ipsum in multis *cerebello* ac regimini ejus inservire cogitur, prout supra ostendimus, atque ad illud necessariò obligatur: nam *cerebrum* ipsi *cerebello* plurimum debet, in quantum scilicet à *functione vitali* (quæ hujus provincia est) sanguinis penum, & per consequens spirituum ab eo productorum tributa accipit: ita quidem *hæ partes* utraque, licet principes, *mutua officia* præstant ac velut *in circulo ministeria* ab invicem requirunt persolvuntque.

C A P U T XVIII.

De utriusque cerebelli Appendicis, nempe Anterioris, quæ prominentiæ orbiculares sunt; & Posterioris, scilicet protuberantiæ Annularis, relatione, sive mutuo respectu: Item de Medulla oblongata portione residua, in medullam spinalem continuata.

PRæter nervos prædictos, nempe *quarti, quinti, sexti, septimi, & octavi Paris*, qui tacitis cerebelli edictis pro *functione quaque involuntaria* tuenda obsequuntur, & reliquis cerebro subjectis numero pares efficiuntur, ut divisum cum ipso imperium cerebellum habeat; etiam in ejusdem muneris ac ministerii partes, *processus* quidam & *protuberantiæ*, quæ ante & post *cerebellum* collocatæ, ejus *appendices* sunt, asciscuntur: Horum descriptio & usus superius particulatim traduntur. Quandoquidem verò (uti pridem innuimus) inter *prominentias orbiculares*, quæ cerebelli *appendix* anterior, & protuberantiæ annularem, quæ alter ejusdem posterior appendix est, habitudo sive respectus quidam intercedit, & pars una ad alterius magnitudinem proportionatur; ita quidem, ut cum *prominentiæ natiformes* sint majores aut maximæ, *Protuberantiæ annularis* semper exigua aut minima existat; & è contra, quibus *hæc* mole prægrandi, *istæ* minori constant; adeoque cum utraque pars, spirituum qui ad cerebelli œconomiam pertinent, peculiaris condus esse videatur, quo major eorum penus in uno promptuario reponitur, eo minor resideat in altero: Cum, inquam, ejusmodi constans *relatio* inter partes istas reperiatur, in quem finem hæc ita constituitur, adhuc eruendum restat.

Super his cogitanti, cum *spiritus animales* intra singulas *τὴν ἐννεακῶν* partes, *distinctis radiorum schematismis* disponantur, per quos, tanquam per vitra dioptrica, & sensibilibus impressiones, & motuum obeundorum instinctus varie transmittuntur; facile occurrit quod in *prominentiis natiformibus* commercia

inter *Cerebrum* & *Cerebellum* ultro citroque habita celebrentur; quodque spiritus, *protuberantia annularis* incolæ, internuncii sunt, qui *cerebelli*, *præcordiorum* ac *viscerum*, necnon *partium patheticè moveri solitarum*, mutuos respectus transferunt. Verum si inquiratur, cuiusmodi sunt ista commercia & respectus, quæ *cerebrum* ad *cerebellum*, ac utraque ad functionis vitalis ac mere naturalis organa, & vice versa, gerunt? In re tam difficili ac valde intricata sententiam hic nostram, hærente licet & dubitante animo, proponemus.

Supra innuimus, *Prominentias orbiculares passionum impetus* à cerebro præcordiis inferendos cerebello tradere, atque naturalium instinctuum necessitates à præcordiis & visceribus cerebello traditas ab illo accipere, & cerebro communicare: his insuper addimus, quod *protuberantia annularis* iisdem prorsus muniis, licet alio modo, famuletur; nempe hæc passionum impetus, velut secundario è vicaria cerebelli manu accipit, ac dein immediatè præcordiis transfert; atque hoc potissimum hujus partis munus esse videtur. Porro, idem *annulus* naturales instinctus à visceribus medii ac ini ventris immediatè accipit, eosque cerebello, ulterius ad cerebrum convehendos imprimit; cuiusmodi usum secundario, & solum commeatus viam præbendo, exhibet: tales enimverò instinctus, cerebello trajecto, intra prominentias orbiculares formari ac perfici censemus, unde in cerebrum transmissi, actiones requisitas, sine prævia illius notitia aut agendi intentione eliciunt.

Hinc opinari subest, quod *Protuberantia annularis* spiritus animales, qui intestinas affectuum commotiones exequentur, præcipuè contineat. In violenta quavis animæ passione, statim præcordia valde perturbantur, eadem nempe varie constricta aut dilatata, sanguinem in fluctuationes diversimodas cogunt; at vero istas præcordiorum *ἀταξίας* & motus anomalos, spirituum magnæ copię alicubi conscriptæ, & composita acie in excursus promptæ, perficere debent; quo quidem ritu in nulla alia parte quàm hic, ante nervorum in hæc munia constitutorum principia, spiritus disponi queunt; quapropter hæc *protuberantia* in homine, ob passionum *ὀρμῆς* impetu quodam ac incitatione peragendas, longe major est quàm in alio quovis animali: Cum enim iste subito ac vehementer perturbari soleat, ideo promptuarium amplius, in quo uberior spirituum copia in tales affectuum inordinationes impendenda asserveatur, requiri videtur. Post hominem, hæc pars in cane, fele, & vulpe, prægrandis existit; in vitulo, ove, capra, lepore, aliisque mitioribus animalibus perexigua est.

Quemadmodum autem *Protuberantia annularis* præcipuum organum, sive spirituum arca videtur, unde *passionum venti præcordiis excitandis* destinati in pectus convehuntur; ita *Prominentias orbiculares* commeatus viam, ipsaque instrumenta esse censemus, quibus *præcordiorum & viscerum instinctus ac necessitates* à cerebello cerebro communicantur. Quinimo spiritus animales, in devio hoc secessu scatentes, ejusmodi instinctuum Ideas sive rationes formales non modo transmittunt, verum aliquatenus formant ac cerebro præparant: cum enim bruta quædam animalia, quibus cerebrum prævia scientia aut habitibus practicis minimè imbuitur, actiones quasdam spontaneas, velut cum iudicio & deliberatione eliciunt, eduntque; certè ejusmodi actuum intentiones

cerebro aliunde, nimirum à prædictis Prominentiis, suggeri putamus. Quapropter observare est, quod in brutis quibusdam cerebro indocili præditis, *Prominentia natiformes maxima* existunt, prout cernere est in vitulo, ove, porco, & multis aliis; quæ animalia, quamprimum in lucem edita sunt, illico victum suum quærunt, quodque ipsis congruum est probe dignoscunt. At vero in homine, cane, vulpe, & similibus, qui ad discendum & habitus acquirendos magis idonei existunt, *prominentia istæ perexigua* sunt; atque animalia isthæc recens nata sensu tantum rudi ac imperfecta instruuntur, insuper ad victum suum quærendum inepta prorsus reperiuntur. Super hac observatione (quæ quidem in plurimis quæ hætenus disseccare contigit animalibus tenet) tanquam *basi*, hujusmodi abstrusam circa *instinctus naturales & præcordiorum affectus* hypothesin fundare ausus sum. Cum enim animalia quæ plus instinctu pollent, uti oves, porci, boves, capræ, aliaque pigra & mitiora jumenta, passionibus sunt minus obnoxia, sunt etiam minus docilia; & è contra, in quibus affectus prædominari solent, quæque ingenio quodam instruuntur, (uti præter homines sunt canes, vulpes, & quædam alia calidiora animalia) minus instinctu pollent: cumque in crebra capitum cujusque generis dissectione observaverim, quod in ejusmodi animalibus quæ ingenio potius quàm instinctu vivunt, *protuberantia annularis* infra cerebellum collocata insigniter magna, & *prominentia orbiculares* tantum *perexigua* fuerint; in aliis vero animalibus, ubi *instinctus ingenio* præpollet, quæque in affectus intensos sunt minus prona, *prominentia orbiculares maxima* essent, & è contra *protuberantia annularis* valde parva: Certè hinc existimare cogebar, quod *prominentia orbiculares*, sive *natiformes*, ubi majores adsunt, quasi cerebri alterius, sive succenturiati vicem præstent, præcipua *instinctuum naturalium organa* existant; ita tamen ut simul hæ partes passionibus à cerebro versus cerebellum & præcordia transferendis, commeatus viam præbeant; quodque (uti supra innuimus) *protuberantia annularis* grandior existens, *spirituum copias* pro *passionum ventis* *requisitas* contineat; interea tamen ut spirituum hujus Incolarum *foras* citra tendente, naturalium instinctuum species à præcordiis & visceribus emissæ pertranseant. Verum utcumque res habeat, quoniam nihil certo aut *certè* affirmari possit, conjecturæ huic nostræ, si minus aliis arrideat, saltem venia concedatur.

De cerebelli ejusque *Appendicis usibus*, & officiis haud multa præterea dicenda restant. Circa compagem ejus quiddam amplius annotatu dignum occurrit, quod nempe à cerebri structura etiam hoc respectu plurimum differat, in quantum scilicet Corticales ejus circelli haud in Medulla expansa, prout cerebri convolutiones, fundantur; verum profunde incisi, toto ipsorum tractu discontinui fiunt: adeo ut integrum cerebelli systema sit tanquam uvarum simul arcte compactarum racemus; in quo baccae licet contiguæ, tamen ab invicem distinctæ maneant, atque fissuras per totam Massæ crassitiem producant. Quinimo, Extrema cerebelli superficies plurimis velut *tuberculis* constat, quæ *caulibus* exiguis accrescunt; atque *caules* isti in *ramos majores* transeunt, illique demum *bipartiti*, juxta cerebelli fundum in duo *Medullia* ampliora, in quorum utroque sunt *tres distincti processus medullares*, facessunt, de quibus utrinque *ter geminis processibus*, eorumque officiis, superius dictum est.

Ex his verò de cerebelli usu in genere adhuc amplius advertimus, quod cum plurima ejus substantia sit corticalis, spiritus animales in magna copia progignit, quibus intra circulandis, non uti in cerebro spatium æquè magnum conceditur; nec enim in œconomia animali multum opus esse videtur: nam spiritus in cerebello ubertim producti emanatione perenni, propter functionis vitalis & naturalis munia, extra effluere debent: interius vero, propter impulsus iisdem variè immixtos, undulationes quasdam admittunt, quibus functionis involuntariæ actus quidam occasionales, prout suprà ostensum est, eduntur.

Quandoquidem vero satis manifestum est, spiritus animales intra corticales cerebelli circellos generari, non opus esse videtur, ut eorum officium in ventriculo compagi ejus subjecto statuamus. Enimverò *cavitas* ista (prout suprà ostendimus) tantum *inane spatium* est, quod *geminum ejus pedunculum & medullarem caudicem substratam, ipsumque cerebelli Tuber superimambens* interjacet. Huic tamen *usus* quidam postliminio accidit, nempe ut in cisternam hanc serosa colluvies è *glandulis & vasorum plexibus* deposita, necnon à *cerebelli substantia*, siquidem uctiori facta, distillans dilabatur. Unde eadem, ne in nervorum origines defluat, membrana coercita, in foramen specus angusti prominentiis orbicularibus subjecti cogitur; atque illinc à declivi infundibuli apertura excipitur, & foras amandatur.

Infra cerebellum *Medulla oblongata* reliquo tractu usque ad Occipitii foramen pergens, demum in *spinalem* desinit: Verum in caudice ejus adhuc intra Cranium contento, præter Nervos & processus modò recensitos, nervorum etiam Paris noni & decimi origines radicanter: de quibus postea, cum *sympliciter* integram instituemus, erunt propria dicendi loca. Interim circa Paris noni exortum, quod in homine peculiare, atque secus quam in brutis reperitur, annotare subest: Nimirum in homine, infra Paris octavi originem, *protuberantia quædam* utrique medullæ oblongatæ lateri adnascitur. Ex illa, fibræ *quatuor* aut *quinque* distinctæ prodeunt; quarum una aut altera arteriam vertebralem pertranseuntem circumligat, omnes autem in eundem truncum, qui prædicti paris nervus est, coalescunt. Protuberantia isthæc, *Pia matre* avulsa, facile conspicitur, & peculiaris spirituum huic Nervo destinatorum condus videtur.

Cum enim hic *nervus linguae ejusque musculis* impendatur, adeoque *loquela peragenda* potissimum conducatur, in homine, cui vocis & major usus, & frequentior Exercitatio, spirituum penam ingente, quorum copiam semper in promptu sint, opus esse videtur. Brutis verò quibus nulla aut rarior vocis necessitas, talis *protuberantia* deest: quippe illis haud requiritur, ut spiritus ante vocis organa, quasi in vestibulo quodam catervatim aggregentur, quin sufficiat eos è communi medullæ oblongatæ tractu paulatim acciri. Porro, quod hujus nervi *fibræ* quædam utramque *Arteriam vertebralem* circumligant, id, ni fallor, in eum finem ita constituitur, ne fortè inter loquendum, si quando vehementius commoveamur, sanguis concitatus cerebrum torrente obruat: Nimirum hic nervus *Arteriam vertebralem* tanquam *fræno injecto* circumligans, adeoque non linguae tantum, sed & sanguinis Moderator, rapidiorem ejus influxum coercet. Neque alios ob fines, aut diverso ritu, *nervi re-*

currentes, ejusdem muneris parti cuidam destinati, *arteria magna* truncos varie circumligant, ut posthac ostendetur.

Quamprimum inferior hæc Medullæ oblongatæ portio *pia matre* denudatur, *corpora pyramidalia*, alioqui delitescencia, in conspectum veniunt. Hæc in quibusvis animalibus *protuberantia annulari* præditis constanter reperiuntur; item quo hæc protuberantia major est, eo corpora isthæc insigniora apparent: Revera in *homine* & *cane* videntur quasi duo majores Nervi, qui ex *annulo* isto producti, è regione, qua *Par octavum* oritur, in cuspides acutas desinunt. Horum usus si inquiratur, verisimile est spiritus animales in *penu annulari* superabundantes per hæc veluti emissaria effluere, qui tamen spiritus in *Paris octavi* origines juxta positas incurrunt, adeoque proprio ipsorum ritu functionis involuntariæ muniis impenduntur.

Etiam si *Medulla Oblongata* non ultra Cranii limites nomen suum retineat; tamen ipsamet eadem compages est, quæ illinc ulterius in totius *spinae* cavitationem ac ultimos recessus continuata, *spinalis Medulla* appellatur: producitur autem ob hunc finem, ut Nervi in artus & Membra à Capite remotiora distribuendi, ex eadem Medullari substantia, in cujusque partis viciniam exporrecta, commodius oriantur. Revera totus iste *Candex Medullaris*, qui à cerebri fundo usque ad os sacrum continuatur, organorum arcæ pneumaticæ similis videtur, quæ flatum singulis Tibiis destinatum includit; namque pariter in hoc medullari tractu spiritus animales continentur, qui nervos omnes appensos pro data occasione inflant actuantque.

Si totius *originem* spectes, videtur quod hujus Medullæ tum *oblongata*, tum *spinalis* integra compages, substantiæ Medullaris sparsim per *Cerebrum* & *Cerebellum* undique nascentis, ac dein *conglobatus* in utriusque *Meditullis* collectæ, velut *unita congeries* sit: Quippe *medulla* singulas istorum *plicas* & *anfractus* oblinentes quasi totidem *rivuli* sunt, qui illinc scaturientes, in *Meditullis* congregari ac in immensum diffundi incipiunt; deinceps vero uniti, *Medullam oblongatam* quasi *aquoris alveum* pro spirituum animalium *æstu* & *reciprocatione* satis amplum constituunt: qui tamen *alveus* extra Cranium sese ulterius protendens, in *medullam spinalem*, quasi prioris *sinum*, sive *processum*, augetur.

Sicuti autem tractus medullares cerebri & cerebelli *plicas* & *convolutiones* oblinentes, sese in eorum *Meditullia* & caudicem Medullarem explicant, adeoque spiritus è primis illorum fontibus sparsim scaturientes in quoddam quasi *aquor diffusum* congregant; ita ab hoc æquore, æstum, sive spiritus animalis effluxum continuum aut valde crebrum faciente, iidem spiritus in appensos *systematis nervosi* canales emanant.

Circa istam Medullæ hujus partem, quæ oblongo vertebrarum sinu inclusa, & juxta singulas earum juncturas, nervorum processibus quasi nodosis insignita, *spinalis* dicitur, haud multa, præterquam quæ vulgò prostant, consideratione digna occurrunt. Hujus *figura*, *situs*, necnon *corpus ejus* in toto tractu *bifidum* non tantum Anatomicis, verum lanionibus quibusvis passim innotescunt. Nervorum ramificationes è *medulla spinali* profectæ inferius tradentur. Circa *conformationem* ejus peculiare quiddam occurrit. Cum enim *spinalis Medulla* spirituum ab *ἐγκεφάλῳ* in nervos profluentium communis quasi ductus

ductus five *canalis* fuerit; observare licet, quod *hic Alveus* haud usitato ductuum aliorum more, ubi plures rivi influunt, magis intumescit, verum econtra, in quo loco plura & majora habet *emissaria*, magnitudo ejus ampliatur; nam in istis *spinalis medulla* partibus, è quibus *Nervi brachiales & crurales* oriuntur (quorum scilicet origines crebriores amplioresque existunt) truncus ejus multo crassior quàm in reliqua compage evadit. Hujus ratio est, quoniam intra medullares tractus, spiritus animales haud celeri transitu decurrunt, prætereuntque, sed plerumque à fontibus suis sensim seaturientes, cum spatia omnia impleverint, in iisdem commorantur; ac ubi plures spiritus, pro data occasione, operi cuiuspiam impendi solent, illi ibidem in procinctu manentes, promptuaria quædam, ubi diversentur, idonea procudunt. Quare non tantum de hac *medulla*, verum de ipsis *nervis* passim observamus, quod quoties ramus in plures furculos huc illuc emittendos distribuitur, semper in ipso divisionis nodo *plexus* reliquo nervi trunco longe major accrescit, ut mirum sit, unde nervus ita in medio ductu substantiam novam & molem ampliorem acquisiverit. Verum super his, aliisque ad Nervorum doctrinam spectantibus, posthac in sequentibus differere oportebit.

CAPUT XIX.

De Systemate nervoso in genere, ubi partibus ejus (quæ sunt Nervi & Fibra) designatis, totius æconomiae Animalis prospectus exhibetur.

CUM hætenus singulas ipsius *Cerebri*, *Cerebelli*, ac *Appendicis medullosæ* regiones speculati, eorum omnium apparatus & munera, necnon partium, & processuum, vasorumque sanguiferorum ad unaquæque isthæc pertinentium *Usus & officia* designaverimus; jam tempus est sistendi gradum, ac à turbido & vorticoso hoc disquisitionum pelago, me in portum recipiendi: At vero quia nondum littora extrema & oras ultimas me appulisse comperi; quin ultra hoc fretum jam navigio nostro peractum, adhuc *Systema nervosum*, pluresque in illo *sinus*, *meandri*, ac summe *intricati recessus* perlustrandi restiterint: idcirco, etiamnum velis vento datis, procedere, & difficile *vaporositas* pensum aggredi statuiamus; eoque magis, quoniam sine perfecta Nervorum scientia, cerebri ejusque appendicis Doctrina mutila prorsus ac imperfecta relinquetur; neque enim quæ circa isthæc jam tradita sunt, satis intelligi aut illustrari queunt, nec (quod præcipue meditor, & priorum disquisitionum finis est) sine istis præcognitis, *Cerebri & Nervosi generis Pathologia* rite institui potest. Et vero multa sunt quæ à tali incepto quenquam facile deterreant: nempe opus arduum, & periculosa plenum alea; quodque prima fronte plus difficultatis & spinosi laboris, quam jucunditatis aut fructus promittit: Deinde objicient nonnulli, hanc provinciam à prioribus Anatomicis jamjam perfecte ornatam & excultam fuisse, ut eam recolendo, rem satis actam agere

agere videar. Attamen his in promptu est referre, i. quod *Nervorum Anatomia* speculationes jucundiores utilioresque suggerit, quàm ullarum præterea in corpore animato partium Theoria: hinc enim permultarum actionum passionumque in corpore nostro evenire solitarum, quæ alioqui difficillimæ ac inexplicabiles videntur, veræ ac genuinæ rationes depromuntur; nec minus ab hoc fonte, abditæ morborum & symptomatum causæ, quæ vulgo sagarum præstigiis ascribuntur, erui & perspicue satis explicari possunt. Quoad nostras vero observationes circa nervos instituendas, me neque aliorum vestigia calcare, nec prius dicta usque ad crambem repetere, ex sequentibus plane liquebit.

Itaque ut juxta institutum nostrum *Systematis nervosi* explicationem aggrediar; sub hoc nomine comprehendere liceat partes universas, à quibus spiritu animali dotatis, *motus & sensus*, scilicet aut alter tantum, aut simul utriusque in toto corpore peragendi, necessario ac immediate dependent. Ejusmodi autem partes, respectu τὸ ἐγκέφαλον & *medullosa appendicis*, habent se velut *ramosa propago* circa arboris truncum concretescens: supponendo nimirum quod *Cerebri & Cerebelli corticales substantiæ radicum* loco fuerint, quodque *medullaris* ubique *substantia*, pro *stirpe & alburno* sumatur, *germinatio nervosa* in *nervorum & fibrarum* divaricationes, tanquam in ramos, ramusculos, & frondes expansa apparebit: Vel si ἐγκέφαλον præcipuam Animæ sensitivæ partem ac potentiam in se continens, pro luminari cujusdam, tanquam *Salis* aut *astris* corpore accipiatur: *Systema nervosum* erit *radiosa concretio* illud circumambiens. Quippe spiritus animales à cerebro & cerebello, cum medullari utriusque appendice, velut à gemino luminari effluentes, *Systema nervosum* irradiant, adeoque singulas ejus partes, *motus*, aut *sensus*, aut simul utriusque (prout dictum est) organa constituunt.

Systematis nervosi, tanquam *textura radiosa*, partes sunt vel *primaria*, scilicet ipsa *nervorum* corpora, in quæ spiritus animales ab ἐγκέφαλον ac appendice ejus medullari immediate profluunt; vel *secundaria*, quæ sunt *fibræ* membranis, carni musculosæ, tendinibus & parenchymatis quibusdam insitæ, aut intertextæ: quæ item spiritus animales in se continent; verum illos non nisi mediate & secundario à capite per nervorum corpora derivatos accipiunt.

Supra ostendimus spiritus animales solummodo in *Cerebro* ac *Cerebello* procreari, è quibus isti jugiter emanantes, Caudicem medullarem (velut organi musici Arcam, quæ ventum tibiis omnibus insufflandum excipit) inspirant, ac implent: Exinde vero spiritus isti in *Nervos* quasi totidem fistulas eidem appensas, delati, easdem pleno influxu inflant, actuantque; dein qui è nervis exundant, fibras ubique in membranis, musculis, aliisque partibus dispersas subeunt, adeoque corporibus istis, quibus fibræ nervosæ intertexuntur, *vim motivam & sensificam* impertiunt: atque *hi spiritus* cujusque partis *insiti* dicuntur, in quantum scilicet haud uti priores intra *Nervos confluunt*, in perpetuo sunt fluxu, verum aliquanto stabiliores & magis constantes in corporibus subjectis diutius commorantur; atque solum pro data occasione, scilicet juxta *impressiones interius* à Nervis acceptas, aut *exterius* ab objectis inflictas, in lationes diversimodas, pro *motu* aut *sensione* hujus aut illius modi aut generis efficiendis ordinantur.

Profecto, *Spiritus animales* intra *Nervos* velut aquarum rivi à perenni fonte viva scaturigine diffuentes, minime stagnant, non commorantur; sed decursu velut perpetuo dilabentes, novo semper influxu à fonte suppeditato refarciuntur. Interim *spiritus* in *reliquo nervoso genere*, præsertim in membranis & musculoſo genere ſcatentes, ſunt velut aquarum paludes, & lacus extra rivo- rum alveos late diffuſi, quorum aquæ ſtagnantes haud multum ſua ſponte mo- ventur; verum ab injectis, aut ventorum flatibus agitata fluctuationes di- verſimodas concipiunt.

Sed quoniam inter Spirituum & Aquarum motus ac conſiſtentiam non leve diſcrimen eſt, fortasſe rem magis illuſtraverit, ſi utriuſque generis *ſpiritus*, nempe inſlui, inſitique, diverſorum lucis radiorum *actinobiſiſimo* conferantur. Itaque lumen quando in cameram obſcuram intromittitur, totamque eveſti- gio illuminat, concipere oportet, lucis ita celerrime diffuſæ particulas eſſe *duplicis generis*; nempe *aliæ* ſunt corpuſcula ab ipſo lumine emiſſa, quæ ſe qua- quaverſus in orbem diffundunt; ac inſuper *aliæ* particulae luminosae ſunt cor- puſcula velut ætherea, prius intra poros aëris exiſtentia, quæ à prioribus agi- tata, & velut accenſa, contexturam quaſi flammeam, tenuiſſimam licet, in toto diaphano expansam efficiunt. Pari modo *Spiritus Animales* à compage medullari in *Nervos* emanantes, ſunt velut radii ab ipſo lumine diffuſi, atque ſpiritus alii ubique in fibris ſcatentes, quaſi particulae lucidae aëri incluſæ ac inſitæ ſe habent, quæ à prioribus actuantur, atque in motum ab iis ſuſcitatae facultatis tum *ſenſitiva*, tum *locomotiva* actus perficiunt.

Verum, ut melius conſtet, quo ritu ſpiritus animales *Systematis Nervosi par- tes*, tum *primarias*, tum *ſecundarias* irradiant ac citiſſimè trajiciunt; ita quidem ut vix lumen celerius per medium diaphanum feratur, quàm ſpirituum ab una extremitate ſystematis nervoſi ad alteram communicatio inſtituitur, hic paulo inquirere oportebit de *nervorum fibrarumque* nervoſarum *origine*, item de illorum *fabrica* & conformatione, quales nempe poros & meatus, & quo- modo pro ſpirituum animalium trajectione aut commercio diſpoſitos, utraque hæc corpora obtinent.

Quoad *Nervos*, ex ſuperioribus manifeſtum eſt, quod illi omnes è *medullari caudice* aut proceſſibus ejus immediatè producuntur, adeo ut cum hæ partes, *via lata & communes* ſint, quæ tum à cerebro, tum à cerebello ducunt; *Ner- vi* omnes *ſemita particulares* ſint, ab iſdem quaquaverſus in ſingulas corporis animati regiones protenſæ. Quare eadem medulla quæ nervi cujuſque origo eſt, quatenus in filum tenuius protrahitur, ejuſdem nervi materiam conſti- tuit; quæ quidem ut ſolidior & compacta fiat, peculiari *pia meningis* produ- ctione inveſtitur: Nam ſicuti à maſſa argentea inaurata fila omnia producta inaurantur; ita membrana eadem quæ Caudicem medullarem obvelat, cum Nervis omnibus ab eadem productis una producitur, eoſque omnes inveſtit. Porro è medullari iſto principio plures Nervuli ſimul oriundi, velut per manipulos egrediuntur; qui tamen melioris commeatus gratia, ſtatim uni- ti, & extra clauſtra oſſea delati, tunica comuni à *dura matre* aſcita inclu- duntur. Supponimus enim (quod etiam infra clariuſ oſtendetur) *Nervos* om- nes ad partes aut membra quævis particularia deſtinatos, *diſtincte & ſeorſim oriri*, atque ita in toto illorum ductu permanere. Quod autem ſæpe Nervus

unus, quasi truncus apparens, postea in plures ramos abire videatur, ideo est, quia rami isti, revera toto tractu singulares & divisi, in unam quasi fasciam colliguntur; nam aliquoties ramos istos in unum quasi Nervi funem coalescere visos, divisione usque ad originem facta, ab invicem separavimus; neque enim aliter motuum obeundorum instinctus, ita respective ad has aut illas partes, seorsim ab aliis, ad quas ejusdem trunci rami pertingunt, deferri poterint.

Nervorum ductus non uti *Arteriæ* & *Venæ*, perforati existunt; nam illorum compages non modo stylo cuivis impervia est, sed & perspicilli sive microscopii applicatio cavitatem nullam his adesse confirmat. Quod ad *Tubulos olfactorios* attinet, isti ita conditi videntur, non pro spirituum animalium com meatu, verum ut ferositates quædam hac via elabantur. Ipsi autem spiritus in lateribus, ac minime in Cavitate utriusque Tubuli feruntur; cæteri autem Nervi substantia compacta & plane firma constant, ut humor subtilis qui spirituum vehiculum est, illorum compages, non secus ac spiritus vini extensas fidium chordas, tantummodo sensim perreptando, trajiciat. Hinc arguere licet, quod si quidem spiritus animales pro expansione sua nullam intra Nervos cavitatem manifestam requirunt, neque tali iisdem opus esse intra cerebri compagem, quin ventriculos, ita vulgo dictos, in aliud quam hoc munus deputare oporteat.

Sunt autem *Nervi corpora alba, teretia & rotunda*: intra Cranium, & prope origines suas, quatenus solum *pia matre* obducti, *molliores* & disruptui faciles existunt; extra hoc, in quantum plures fere semper colligati, *dura matre* insuper vestiuntur, *duriusculi* & *tenaciores* evadunt. *Nervi* ipsi (prout microscopii ope detegere licebit) per totum poris & meatibus, quasi totidem alveolis densissime excavatis & invicem contiguis instruuntur; ita *Περὶ τῶν* eorum substantia, instar cannæ Indicæ, ubique porosa ac pervia est. Intra hæc spatiosa spiritus animales, sive corpuscula valde subtilia, & ex sua natura semper in motum prompta, blande scaturiunt, quibus tum pro *vehiculo*, tum etiam pro *retinaculo*, *latex aquosus*, & ipse partium valde subtilium, adjungitur. *Humor* iste *fluiditate* sua spiritus per totum systema nervosum diffundit; item *viscositate* sua eosdem, ne protinus dissipentur, velut in systasi quadam ac serie continuata retinet; videtur enim quod sine tali humore spiritus intra nervosum genus consistere nequeunt, quin tenues evanescant in auras. Porro, idem humor non minus pro specierum sensibilibus traiectione requiritur: quippe spiritus animales, velut lucis radios, per totum systema nervosum diffundi supponimus; atque radii isti, nisi humidæ aëris particulæ iisdem admisceantur, rerum iconas sive simulachra non facile transmittunt, prout obvium est in scenographia optica, quæ à nimio Solis fulgore & calore jubare obfuscat. Pariterque à *succi Nervosi defectu* aut *depravatione*, spirituum animalium inordinationes, ac sæpe horrendos cerebri & Nervosi generis affectus oriri, in promptu habemus ostendere.

Succus iste *Nervosus* à cerebro & cerebello in Appendicem medullarem derivatus, exinde per Nervos in totum genus nervosum usque blando allapsu defertur, ac integrum ejus systema irrigat. Ab æquabili hujus emanatione, spirituum animalium per totum expansio dependet; atque horum substantia,

imo ipsius *Animæ sensitivæ hypostasis*, in *eiusdem humoris diffusionem fundatur*. Spiritus animales sibi met relinquentes, huiusce laticis motui obsequuntur, & cum ipso simul eodem cursu circumfluentes, placide exspatiantur; interea tamen pro data occasione iidem spiritus, velut aura super aquas illas commota, lationes alias, easque rapidiores concipiunt: Nam sicuti in fluvio, à ventis ac ab injectis diversimodæ undulationes concitantur; ita spiritus animales ab objectis suscitati, pro muniis *sensus & motus* obeundis, intra nervosum genus ultro citroque tendunt, aliisque modis huc illuc agitantur.

Verum, ad *partes Systematis nervosi* ut redeam, præter ipsos *Nervos*, etiam *fibræ* membranæ, carni musculosæ, parenchymatis, aliisque partibus *sparsim intertextæ*, ac in tendinibus *unitæ*, motus & sensus organa sunt. Quinimo facultatum istarum actus, *fibræ* principalius ac immediatius, quàm *Nervi* exequuntur; nimirum illæ musculum aliasque partes motivas contrahendo *motum* ipsum efficiunt; *Nervi* tantum *motus* istius obeundi *instinctum* ab *ἐγκέφαλῳ* deferunt. Pariterque in *sensatione fibræ* sensibilibus impressiones primo & immediatè accipiunt, easdemque (non aliter quam chordæ musicæ pectinis pollicisve stricturas) intrinseca particularum modificatione expriment, variosque objecti appulsus simili fibrillarum motu, tanquam mobili & fluido caractere repræsentant, cuius Ideam *Nervi* tantum capiti transferunt.

Circa *fibras nervosas* inquirere oportet, undenam illæ *originem* suam habent? Nam planè constat, quod non immediatè ab *ἐγκέφαλῳ*, aut medullari ejus appendice oriuntur; nec minus improbable est, easdem (uti vulgò fertur) à *Nervis* produci: Quippe quod asseritur, *Fibras* esse *Nervorum productiones*, eorumque in minutias discerptorum quasi ramusculos capillares, haud verisimile videtur, quia nempe *Fibræ* in quibusdam partibus juxta positæ, mole sua centuplum ad minus excederent magnitudinem *Nervi* qui ad *partem* istam deferretur: Id quod manifesto liquet ex *tendine* cujusque musculi, quem è fibris unitis conflatum, observare est Nervo eidem inserto longè majorem existere. Et profecto pari ferè ratione inducti opinamur, ipsum quoque *humorem nervosum*, quo membranæ & fibræ musculosæ perfundi solent, non solo Nervorum ductu & comœatu in illas derivari; quia scilicet multo uberius & copiosior aggeritur, quàm ut per angustos istos transitus illuc afferri possit, prout liquido patet in ulceribus strumosis, atque in tendinum partiumque nervosarum abscessibus aut vulneribus, in quibus humor glutinosus in tam ingenti copia exsudat, ut eum *Nervi* omnes totius corporis vix supplere valeant.

Quapropter super his statuendum esse videtur, quod *Fibræ*, Nervorum in capillamenta diremptorum continuatæ portiones minimè fuerint; quodque *Fibræ* omnes originaliter à *Nervis* non procedunt, quoniam aliqua istarum, cordi scilicet & vasis ejus intertextæ, æquè ac *Nervi* ipsi primævæ cum iisdem simul ab initio coexistunt. Pleræque tamen *Fibræ*, quoad productionem suam, à *Nervis* dependent; atque omnes quoquo modo productæ, spirituum animalium copias & supplementa, etiam motuum ab iis obeundorum instinctus à *Nervis* constanter accipiunt.

Itaque ut *Fibrarum genus & natalitia* recolamus; istæ sunt 1. vel *spermatice & primigeniæ*, quarum rudimenta, pariter antiqua ac cor & cerebrum, in conceptu

posita postea sensim accrescunt; quales nimirum, uti dictum est, in ipso Corde, vasis appensis, membranis, & quibusdam aliis partibus, quæ primæ embryonis stamina efformant, reperiuntur: vel 1. *Fibræ aliæ secundario, & per epigenesi* producuntur; cujusmodi potissimum sunt, quæ partes in complementum fabricæ animatæ adscitas, ac imprimis *sanguineas* vulgò dictas intertexunt, quas ad hunc modum progigni censemus.

Cor & Cerebrum, cum *Arteriis & Nervis* iisdem appensis, sunt partes primigeniæ ac summè originales; *istæ* autem pro *aliarum epigenesi, partiumque omnium sensitivarum nutritione & accretione, duplicem humorem* distribuunt; scilicet *unum spirituosum*, & particulis valde activis præditum, qui à cerebro & cerebello per nervorum ductus, in exigua tamen copia, perpetim scaturit: atque *alterum pigrum & molliorem*, qui ubique è *massa sanguinea* per arterias depositus, multo uberius suppeditatur. *Hic posterior* in se plurimum hebes & crassior, à *priore* actuatur, ab eoque velut fermento quodam imbutus, vigorem & vegetationis potentiam acquirit. Enimverò *succus nervosus*, quatenus secum spiritus animales diffundit, unicuique parti præter motus & sensus facultates, etiam formæ & figuræ determinationes impertit. Porro, dum alteri humori arterioso adjunctus, in membri partis enutriendæ molem ac materiam disponitur, quosdam quasi tractus, ipsas nempe fibras, in quibus spiritus animales una adventantes resideant & exspatientur, efformat. Hi *gemini humores*, in quavis parte sensitiva una coeunt, *liquorem verè nutritium*, qui nempe simul *spirituosus ac alibilis* existit, constituunt: Et revera ambo isti succi, scilicet *Nervosus & arteriosus*, una conjugati, habent se velut *semen masculinum & foemininum*, quæ in utero fecundo permista, *humorem plasticum*, cuius virtute animal efformatur & accrescit, efficiunt. Hinc observare est, prout liquoris spirituosius, aut alterius succi dilutioris particulæ, scilicet hæ ab *arteriis*, vel *istæ à Nervis* suppeditatæ, quoad *diversas præpollent*, animalia quæque magis aut minus agilia, activa, & ad motum ac laborem quemvis impigra evadere. Porro, ab unius aut alterius humoris præpollentis vitio ac depravatione, *morbi* hujus aut illius farinæ excitantur, de quibus, ac insuper quæ ad *humoris nutritii* explicationem spectant, erit alibi forsan aliquando fufius differendi locus.

Spiritus animales qui *fibrarum* series ordinatas, & quasi loculos subeunt implentque, illuc per Nervorum ductus confluunt; attamen *Spiritus* qui *fibris musculofo generi* intertextis insident, à *sanguine arterioso*, ibidem copiosius perfuso, *nutrimentum*, imo & *copias quasi subsidiarias* accipiunt: quo quidem, tum ipsi spiritus propter *motus obeundos vim majorem*, & velut *elasticam*, acquirunt; ita ut eorum impetus forti connixu excitatus, *pulveris pyrii explosion* similis videatur; tum etiam spiritus iidem, intra musculos profusius quam in membranis aliisque partibus assolet, continuo absumpti, è *pabulo sanguineo* quadamtenus refarciuntur: Quippe cum *succus arteriosus nervoso*, intra partes sanguineas scatenti, uberius accedit, opinari fas sit, quod iste etiam spiritibus illuc una adductis *particulas* quasdam quasi *nitro sulphureas* superinducat, iisque intime affigat; adeoque propter hanc *copulam summe flatusam*, & rarefieri aptam, ipsi spiritus illic magis activi evadunt; proinde ut in nixu quovis motivo, quo musculum subito intumefaciunt, isti velut *accensi exploduntur*. Porro *spirituum* à valido exercitio absumptorum *cita refectio*, sub hac ratione etiam aliquatenus

à sanguine peragitur, in quantum scil. *particulis spirituosiss* relictis, & per motum viduatis, ejusmodi materiæ in explosionem aptæ nova statim copula adjungitur: Neque enim possibile est immensam spirituum jacturam, quæ in duris laboribus contingit (si isti penitus dispereant) supplementis tantummodo per Nervos ascitis intra breve tempus resarciri posse. Super his, si quando posthæc de musculorum motu dicemus, fusiùs differemus.

Spiritus animales intra singulos musculos juxta fibrarum series dispositi, totidem quasi militum turmæ, seu manipuli distincti videntur; qui omnes veluti in specula constituti, prout nova impressio iisdem, vel exterius ab objectis, vel interius ab *ἐνεργείᾳ* per Nervos advehitur, illico in varias formas & *τάξεις* peculiare, pro motu aut sensu hujus aut illius generis obeundis, ordinantur. Visu dignum est horum gestus in animali recens occiso & cute denu- dato conspiciere: Quippe cum vita periit, spirituum vis omnis per Nervos influa penitus cessavit, usque tamen spiritus insiti in toto corpore è musculis erumpentes eosdem exagitant, atque in varios spasmos & trepidationum motus cogunt.

Ex prædictis colligere licebit, qualis sit spirituum animalium dispositio, sive *διατάξις* in toto corpore animali: nimirum illi in *corticali*, tum *Cerebri*, tum *Cerebelli* substantia procreati, in *utriusque medullæ*, velut intra distincta emporia congregantur; ac in utriusque expansione facta *Anima sensitiva* potentias quasdam interiores exerceri faciunt; attamen *iidem spiritus* spatia ampliora affectantes, *medullam oblongatam* (velut organi musici Arcam, uti dictum est) subeunt, ac implent; intra quam scatentes, *sensibilium impressiones, motuumque instinctus* ultro citroque ferunt. *A medulla oblongata & spinali iidem spiritus*, nisi cum aliàs occupantur, exterius tendentes, versus singulas totius corporis partes emanant; qui tamen ita foras evagantes, siquidem valde angustas pro commeatu vias, nempe teretia *Nervorum* corpora pertranseunt, haud catervatim & denso agmine, at solum ordinatim contracti, & velut per manipulos erumpunt: verum isti ultra nervorum extremitates delati, ibidemque membranas, musculos, aliasque partes sensiles occupantes, in campum quasi amplissimum se dilatant, & acie valde diffusa fibrarum ubivis consitarum poros & meatus incolunt; ubi etiam novo pabulo à sanguine dotati, vegeti magis ac in munia designata expediti evadunt.

Hic forsitan inquiratur, quomodo spiritus animales in corporis habitu, copiis ita numerosis diffusi, per adeo angustos Nervorum canales suppleri poterint; cui referimus, quod qui exterius resident, nec cito evaporant, nec circulatione remandantur. Quare cum Fibræ omnes spirituum influxu ab initio paulatim facto implentur, supplementa perexigua sufficiunt, quæ impendia illorum resarciant: nec enim isti exterius degentes, in quantum à pabulo sanguineo reficiuntur, crebra licet actione, multum absumuntur.

Hinc discrimen annotetur inter *sanguinis & spirituum animalium* distributio- nes. *Iste latex*, quoniam in circulo reducitur, ideo vasis ejus in toto progressu, quoad trunci molem & ramificationes ab eo dimissas, proportionatur, ita nimirum ut *arteria magna rami à Corde* profecti, tantundem sanguinis contineant, quantum propagines ab illis in partes omnes exorrectæ. Attamen quia *spiritus animales* semel progeniti, & exterius lati, illic diutius subsistunt, ac lente

admodum & paulatim evaporant: ideo *vasa illos deferentia*, scil. *Nervi*, respectu fibrarum excipientium in proportione longè minori fabricantur; ne forsan à nimio spirituum animalium supplemento, & *recentiorum* usque in partes nervosas aggregatione nimis densa, *veteranorum* acies prius instructa confunderetur, adeoque omnium perturbatis ordinibus, functionis animalis exercitia susque deque haberentur. Enimvero, si quando spiritus nimis acres fiunt, ut propterea velut æstro perciti, cum tumultu & impetuositate systema nervosum irruant, exinde membrorum summa inquietudo & jactatio indiscontinua excitari solent, quibus aliquando rabies ac furor succedunt.

In *spirituum animalium diataxi* & ordinatione, qualis modo describitur, *Animæ sensitivæ hypostasis*, sive essentia consistit, quæ nempe solummodo est *spirituum illorum* (qui velut Atomî, seu particulae subtiles sibi mutuo adhærentes & concatenatae, sub certa specie configurantur) *systasis quadam*, sive *umbratilis subsistentia*. Porro istius Animæ facultates ab eorundem spirituum intra prædicta *ἐκφύλαξ* & systematis nervosi organa *varia metathesi* & *gesticulatione* dependent. Verum hujus Animæ & potentiarum ejus consideratio peculiarem tractatum exigit, quem post hæc (annuente Deo) instituemus; interim methodi nostræ ratio postulat ut Nervorum censu particulari facto, *νευρολογία* (quantum tenuitas nostra potest) exactam tradamus.

Quandoquidem autem in præmissa *Nervorum & Fibrarum* consideratione generali, *succi nervosi* & *nutritii* mentio facta erat; neque tamen, quæ ad eorum naturas & potentias spectant, satis plene & perspicue traduntur: idcirco hic parum divertere liceat, & data opera inquirere, quales *succi*, sive *humores* in corporis animati partes enutriendas, & per quas vias feruntur; item quo ritu *nutritionis pensum* ab iisdem peragitur: Dein, hac difficultate expedita, in *Nervorum doctrinam* via plana ac facilis ducit.

C A P U T XX.

De liquore nervoso: & utrum iste, an humor sanguineus sit nutritius.

A Quo *Sanguinis Circulatio* innotuit, planèque constitit ipsum nullibi stagnare, ac diu subsistere, sed motu reciproco semper veluti in circulo deferri; in dubium vocari cœpit, utrum latex ejus *nutritius sit*, necne: Præterquam enim quod rapidior sanguinis, velut Torrentis, decursus ripas quas interfluit atterere, illisque particulas quasdam auferre, potius quam aliquid iisdem affigere posse videatur; ipsa insuper *sanguinis substantia*, utpote *retorrida* ac *asperior*, nutritioni prorsus inepta perhibetur. Quare ut succus huic muneri magis idoneus inveniatur, *nervorum*, ductus abditique recessus lustrantur; cumque intra illorum poros & meatus latex quidam scatere deprehendatur, statim rejecto sanguine, iste *nervosus humor nutritii titulo* donatur: quo tamen jure, qualique modo *nutritio* revera peragatur, præsentis instituti erit inquirere.

Atque

Atque hic imprimis, ut *sanguinis* patrocinium suscipiamus, facile erit ostendere, materiam corpori alendo satis aptam, ejusque penum sufficientem in illo contineri; nam præter sanguinis *substantiam sulphuream*, quæ perenni intra Cordis focum accensione, exindeque in vasis deflagratione, *vitam*, ac in perfectioribus animalibus *calorem* producit; etiam *alius* quidam *humor mollis & alibilis* habetur, qui inter circulandum, per singulas corporis partes distributus, accrescendo iis nutrimentum ac molem addit: Quinimo ipsa sanguinis deflagratio, plane ut ignis in opere coquinario, humorem hunc quasi elixat & præparat, quo facilius in cujusque partis alendæ substantiam assimiletur: hinc fit ut propter caloris in sanguine defectum, non minùs quàm excessum, sæpe nutritio præpediatur. Quod autem ejusmodi *succus alibilis* in massa sanguinea contineatur, satis demonstrat laticis ejus *Anatome*, seu *Analysis spontanea*; sanguis enim extravasatus, cum sponte sua in partes secedit, hic *liquor à crassamento purpureo* disjunctus, eidemque innatans, *limpidus* apparet; verum ob contenta sua spissiora, scilicet particulas nutritias, ovi albumini analogas, à leni calore facile inspissatur, & albescit: id quod familiari hoc experimento constat, nempe si in scutella super ignem paululum tantum evaporat, illico totus liquor in *gelatinam albam* concrevit. Hoc liquore, prout sanguis plus aut minus imbuitur, animalia accrescunt, & magis carnosæ aut macilentæ evadunt: Nam & sanguis juniorum animalium à frigore resolutus, multo plus ejusmodi albuminis quam vetustiorum exhibere solet: & quotidie inter menses advertere licet, è carnibus agni aut vituli igne assatis, ejusmodi glutinis plurimum; ex ovilla & bubula, præsertim vetustiore, nihil fere exsudare. Quapropter existimare fas sit, *sanguinem* esse vere *nutritium*; & *materia* ad cujusque partis molem aut substantiam adiiciendæ penum fere totam, aut saltem multo maximam, ex ipso dispensari: si quando autem ab hoc munere suo deficiat, id accidit non ex naturali ipsius ineptitudine, sed quod crasis ejus interdum depravetur, atque uti stomachus, vitio quodam laborans, chylum à se coquendum reiiciat, aut pervertat.

At vero *sanguis*, ut non solus ac unicus est humor qui in corpore animato distribuitur, ita nec integrum nutritionis munus solitariè ac per se exequi posse videtur: nam præter ipsum per arterias & venas diffusum, *latex* alter à *capite per nervos* ubique per totum dispensatur; quem aliquatenus saltem nutritioni conferre ostendetur.

Quoad prius, plures sunt rationes quæ istiusmodi *humorem Cerebro ac Nervoso generi* inesse, & per totos eorum ductus scatere declarant. Nisi enim spiritus animales jugiter emanantes in tali latice, qui illis pro vehiculo est, fundarentur, ipsi non essent contigui, neque Animæ sensitivæ systasin connectere & continuare possent: Nam si olim Hippocrates observaverit, *spasmos* seu motus convulsivos ab *inanitione & siccitate* produci; illud forte hac ratione contigit: nempe quod humore in Nervis aut fibris deficiente, spiritus ab invicem distracti sejunguntur; qui tamen ut mutuos amplexus, & quasi manuum complicationes usque retineant, corpora continentia flectunt, & valde contrahunt, adeoque in spasmos agunt. Præterea *succi nervosi diffusionem*, tendinum partiumque nervosarum vulnera & abscessus, quorum utraque ichorem tenuem, & excretioni merè sanguineæ prorsus ab similem exsulant, testari.

testari videntur: Nec minus è *glangliis & concretionibus strumosis* hoc arguere licebit. Inter dormiendum prædictus humor in Cerebrum ac Nervos uberius influere, eorumque meatus obstruere solet; ideoque evigilantibus, quo illius reliquæ discutiantur, *oscitationes ac pandiculationes* crebræ superveniunt. Denique in promptu esset ostendere, quod à nervosi humoris depravatione, *Melancholia, Mania*, & mirabiles quædam *affectiones convulsivæ* procedunt. Quod vero objicitur, ejusmodi humorem non adesse, quia talis è nervis difficilis effluere non percipitur; quodque item Nervi ligati non uti arteriæ & venæ, supra ligaturam intumescunt; referre licet, quod liquor in nervoso genere scatens valde subtilis & spirituosus sit, quique à lucta & corrugatione circa istas partes, quando asperius tractantur, habita, imperceptus facile evaporare ac diffilari poterit: tum præterea observare est, in quorundam animalium catulis recens natis, quibus succus iste adhuc viscosus, nec ita facile diffilabilis existit, eorum Nervos majores, si vinculis constringantur, supra ligaturam intumescere.

Itaque cum constet humorem quendam cæcos τ ἐγκεφάλῳ, appendicisque tum medullaris, tum nervosi ductus & meatus perreptare; proxime inquiremus oportet, *undenam* illuc iste adveniat, & *quò tendat*; cujusmodi demum *indolis ac usus* fuerit. Circa hæc, *primò* ex superioribus constat, quod prædictus latex spirituum animalium vehiculo inserviens, una cum ipsis è sanguine cerebri ac cerebelli oras exteriores irrigante perpetim instilletur, qui exinde Caudicem medullarem trajiciens, postea leni scaturigine per totam systematis nervosi compagem diffunditur; ita ut *nervosi humoris primi fontes* in Cerebro ac Cerebello existant. Insuper verò huic latici, spirituum animalium copias convehenti, atque ab ἐγκεφάλῳ tantum suppeditato, humor quidam *alius*, tanquam *auxiliarius*, in toto ductu accedit, eumque aliàs defecturum instaurat reficitque.

Hujusmodi *supplementa & subsidia*, quæ humori nervoso ab ἐγκεφάλῳ emananti aliunde accedunt, à *lateribus & extremitatibus systematis medullaris & nervosi* excipi, ac intus admitti censemus. Ex sanguine has partes toto ductu irrigante, *humorem velut secundarium* instillari suprà ostendimus; quippe arteriæ non modo Caudicem medullosum, sed etiam majores nervorum truncos pluribus in locis assequuntur, iisque propagines sanguiferas inferunt. Præterea siquidem spiritus animales intra nervosum genus scatentes, pro motu ac sensu peragendis ultro citroque tendunt, adeoque duplicem aspectum gerunt; probabile est etiam, quod *liquor nervorum irriguus*, uti plerumque *prorsum*, ita aliquando *retrorsum* tendat; proindeque quod *nervorum extremitates* partibus quibusdam implantatæ, ex iis *humorem* quo saturantur, aut saltem *effluvia quædam* imbibunt, eaque non raro in ipsum cerebrum transferunt. Certe extra dubium est, fibras, ac filamenta nervosa, quæ sensorium gustus atque viscera coctioni inservientia obducunt, ab alimentis ingestis libamina quædam immediate excipere, quibus in magna inedia & spirituum exsolutione ipsi cerebro suppetiæ feruntur. Quippe si quando spiritus hujus incolæ, à gravi & diuturno labore plurimum exhausti deficere incipiunt, *σωφροσύνη*, aut Cardiacis vix deglutitis refectio citissima peragitur, longè quidem prius quam sanguinis com-
meatu succus alibilis cerebri oram appellere queat. Porro verisimile est non
tantum

tantum benigna alimenti effluvia per *nervorum extremitates* circa viscera deficientes excipi; verum etiam eadem hac via *materiam* sæpe *infectam*, & quodammodo *malignam*, per *nervos eorumque ductus* τῶ ἐγκεφάλῳ communicari, Enimverò *succi praternaturales*, circa *hypochondria*, *Lienem*, *Vterum*, aliaque viscera congesti, corpuscula vaporosa emittunt, quæ non tantum *massam sanguineam* inquinant, eaque mediante Caput afficiunt, verum immediatius *nervorum ductu* cerebrum scandunt, ipsumque gravi noxa percellunt. Hinc enim ex parte procedit, quod *hypochondriaci* & *hysterica* viscerum inferiorum culpas, per symptomata in cerebro & nervoso genere excitata ita graviter luunt; hinc *opii pilula* vixdum à ventriculo dissoluta, torporem accersit. Verum super his copiosius differere non hujus loci est. Quod restat, post *succi nervosi scaturigines*, & *auctaria* modo detecta, ejus *virtutes* & *influencias* considerare oportet.

Circa *Liquorem nervosum* inquirendum erit, ecquid iste in *transitu* agit, nempe dum intra cerebri & cerebelli medullia, caudicem medullarem, ipsaque nervorum corpora scaturit: *secundò*, dein cujusmodi usibus inservit, cum nervorum finibus elapsus, in *sistematis nervosi partes secundarias* latè diffunditur.

1. Quoad *prius*, *Liquoris nervosi*, dum iste ἐγκεφάλῳ ac utrumque ejus appendicem pertransit, præcipuum munus videtur, *spirituum animalium vehiculo* esse; quos quidem diffusionem suam conducit, & sub eadem systasi continet. Quinimò hic latex varios spirituum, pro motu & sensu peragendis, schematicissimos refert; non secus ac humidæ aëris particulae radiorum lucis configurationes opticas trajiciunt. Præterea item partium prædictarum *nutritio*, & in majorem molem accretio, à *succo nervoso* easdem irrigante aliquatenus dependet, uti mox ostendetur.

2. Attamen maxima habetur quæstio de liquore hoc ultra nervorum fines in *secundarias systematis nervosi partes*, earumque comineatu in totum corpus diffuso; nempe an talis partium solidarum omnium, aut aliquarum, per se *succus nutritivus* sit, uti Authores varie opinantur, vel cuinam alii officio destinetur.

Circa hæc imprimis constat, quod *Cerebrum*, & *Nervi*, cum Succo ex ipsis scaturiente, *materiam*, aut saltem *influenciam* quandam *nutritivæ operi* *contribuunt*; quæ si fortè deficiat (cujus defectus indicium est, si in parte aliqua facultas animalis vacillat) mox ibidem nutritus inhiberi, aut perverti solet. Hoc in *Paralyti* à causa evidente, sine prævia sanguinis dyscrasia excitata, plane cernitur, ubi motus, aut sensus, aut simul utriusque privationi atrophia brevi succedit. Porro in *affectione Scorbatica*, quando labes *succum nervosum* corripuit, ut ægroti Vertigine & Scotomia, cum doloribus vagis, spasmodis, & crebra membrorum resolutione affligi inciperint, statim caro velut in tabidis concidit, ac sine pulmonum vitio, ægri quasi phthisi affecti emarcescunt. *Vulgaris observatio* est, quod ab immodico Veneris usu, etiam à gonorrhœa inveterata, ab ulceribus strumosis, aliisque abscessibus, quibus multum succi nervosi impenditur, totius corporis intabescencia producit. Certe, ni fallor, quædam *Atrophia*, imo & *exanthematum* genera sunt, quæ cum sanguis quoad quantitatem &

crasin non multum in vitio fuerit, omnino à *succi nervosi defectu* aut *iniqua dispensatione* pendere videntur. Denique morborum & symptomatum quorundam consideratio *liquoris nervosi diffusionem*, ejusque in partes omnes magnam *influentiam* ita planè confirmant, ut nullus vel dubitandi locus relinquatur.

Nec minus affectuum quorundam *curatio*, & *remediorum usus* idem hoc raturum faciunt. Nempe hinc ratio petitur, quare emplastra Cephalica in phthisi opem adeo insignem sæpe præstant; non quod seri in pulmones deploentis Catarrhum sistunt, (uti vulgus opinatur;) verum quia cerebrum corroborando, *succi nervosi crasin* prius vitiatam restitunt. Propter hanc causam est, quod affectus quidam liquoris nervosi culpâ excitati, cujusmodi inter alios sunt *crancrosi* & *strumosi tumores*, difficillimè curantur; quia scilicet morbida cerebri ejusque laticis irrigui tinctura (sive eadem innata, sive acquisita fuerit) haud facile emendatur: aliquando tamen, cum morbi radix in cerebro aut nervoso genere delitescens, sponte naturæ, vel fortuito cujusdam remedii usu profligatur; mox aliarum partium symptomata, licet in totum neglecta, non sine miraculi suspitione evanescent. Quanti autem cerebri alteratio pro sanandis gravissimis quibusdam affectibus fuerit, instantiæ quædam ab *arte veterinaria* desumptæ clare ostendunt.

Cum pro *faedo Equorum morbo* (vulgo *Farcin* dicto) quem Helmontius Lui Gallicæ analogum & contagii ejus Authorem asserit) sanando plures medicinæ methodi & administrationum modi incassum tentari solent, certissima curandi ratio, quam sæpius cum bono successu adhibitam novi, in eo consistit, ut *pharmaca* quædam *acria*, cujusmodi sunt *Flammula*, *Hydropiper*, *Ranunculus*, & similia, quæ sale volatili plurimum abundant, in massam contusa, & equi affecti auribus imposita, ibidem 24. circiter horas detineantur: vix credibile est, quo ritu ulcera statim omnia exsiccabuntur, ac morbus velut incantamento sanatus, brevi in totum profligabitur. Quandoquidem hæc applicatio procul à partibus affectis habita, sine viscerum aut sanguinis alteratione, ita ad distans medetur; certe talis energiæ causa tantummodo esse potest, quod ab isto pharmacie genere *Cerebri* & *succi nervosi dyscrasia tollitur*, adeoque prima ægritudinis radice præscissa, ejus surculi & frutices statim emarcescunt. Operæpretium esset, etiam in nostra medicina hujusmodi experimenta tentare. Quinimo suspicari fas sit, quod talis ratio pro *vulgari strumarum sanatione* assignari debeat. Inter nostrates tanquam à majoribus traditum habetur, quod *serie masculorum continuata*, qui *septima nascitur proles*, is hunc morbum *sola manuum impositione sanare possit*; & sane profiteor, me novisse plures, quos nulla pharmacia sublevare potuit, eo tantum remedio intra breve tempus liberatos fuisse: Pauci dubitant quin hic morbus Regis nostri contactu sæpius curari soleat. Talis effectus ratio (si mere naturalis sit) non alia assignari debet, quam quod in ægrotis (saltem adultis) *sperata curationis phantasia*, & *obstinata fides* eam *Cerebro alterationem*, seu potius *corroborationem* inducat, qua diathesis morbida in ipso radicali profligatur. Verum unde digressus sum, inquirendum quid *succus nervosus nutritioni* contribuat, redeam.

2. Dico igitur *secundo*, etiamsi nutritio quadantenus à *succi nervosi influentia*

fluentia dependeat, tamen summe improbabile est, quod solummodo ab hac penu singulæ totius corporis partes enutrientur: præterquam enim quod hoc esset ipsius Animæ regimini, ejusque primariis organis coquinarium nutritionis munus, istarum partium excellentia & nobilitate prorsus indignum imponere; etiam videtur quod *liquor nervosus* huic provinciæ administrandæ omnino impar fuerit: Quippe cum alimenti in substantiam partium solidarum assimilati sæpe dispendia immensa fiunt, præsertim à sudoribus immodicis, item à labore & exercitio diuturnis, quibus homines rustici & operarii quotidie assuescunt, haud possibile est, ut tales jacturæ nutritu solummodo per exiles nervorum ductus suppeditato resarciantur,

Super hac re cum diu ac serio mecum sæpius cogitaverim, quod demum sentio, ut libere & sine velitatione, aut convitio in aliorum opiniones facto, proferam: Videtur imprimis, quod *materies* totius corporis *nutritia* in partes omnes è *sanguine* per arterias distribuatur; attamen existimare fas sit, quod istius *materiæ in nutrimentum conversio*, inque partis alendæ substantiam assimilatio, *succi nervosi*, tanquam *fermenti* cujusdam *spirituosi influentiæ* ac ope peragatur. Quoad prius supra notavimus, quod vasa sanguifera non tantum musculos & viscera, sed etiam *ἐντέραν* & appendicem ejus, imo membranas, ossa, ipsosque Nervos fere ubivis assequuntur, iisque omnibus densos surculos, quasi nutritus excipiendi canaliculos affigunt. Porro sanguini prout *crassamentum purpureum* inest, cujus substantia parenchymatum & musculorum poros infercit enutritque, ita *gelatina candicans* habetur, è qua membranæ partesque albidiores concreescere videntur: Insuper observare licet, quod *sanguis* ipse *concreescens*, *fibras* & *filamenta*, qualia musculis & partibus nervosis intexuntur, in se continet; idemque, si alicubi in vase stagnet, mox in frustra oblonga, albida & dura, quorum substantia plane carnea est, coagulatur; ita ut *sanguis per se carnes producat*, easdem licet rudes ac informes: quippe materiæ nutritiæ ab eo suppeditatæ *configuratio*, & *apta dispositio*, ab *humoris nervosi* adventu & energia dependet: quo autem ritu hoc fiat, modo ostendere nitentur.

Postquam partium omnium stamina jacta sunt, requiritur, *tum* ut ista debita proportionem usque protrahantur, & mole accrescant; *tum* etiam ut spatiola, quæ propter effluvia perpetim decidua relinquuntur, substantia nutritia interjecta continuo expleantur. In istis duobus Nutritionis opus potissimum consistit; quorum utrique peragendo *sanguis materiam* suppeditat, eamque (uti dictum est) inter circulandum singulis concreti partibus exporrigit, & ubique velut præ foribus partis alendæ sistit: quo tamen hac *materies ritè disponatur*, ejusque particulæ, nempe *crassa* & *tenues*, *salina* & *sulphurea*, aliæque diversimodæ indolis, ab invicem secretæ, cum delectu quodam usibus destinatis applicentur, *facultate* quadam *directrice* & *virtute* velut *elastica*, aliunde quàm ab ipso sanguine ascita opus esse videtur: Enimvero sanguis spiritu animali destitutus, ad munia isthæc peragenda impar existit. Quare si quidem constat, succum quendam in nervoso genere scatere, eundemque spiritu animali dotatum ad partes omnes diffundi; quid minus supponere possumus, quàm quod hic liquor subtilis & spirituosus arterioso, qui hebes & crassior est, ubique occurrens, eum actuet, inspiret, atque

ad designata nutritionis opera peragenda quasi instituat ; præsertim cum plane constet , propter hujus succi nervosi defectum aut depravationem, nutritionem semper frustrari , aut perverti.

Itaque liceat , in difficili circa curationis materiam & modum controversia hypothesein hanc nostram , utut paradoxam & valde abstrusam , proponere ; nempe quod *succus nervosus* (quem *seminis masculini* instar se habere diximus) *humori nutritio* copiose ab *arteriis suggesto* , tanquam *alterius sexus genitivo* , ubique in singulis partibus suffunditur ; quodque *iste prior* , elementis activis præditus , hanc materiam crassio rem velut *fermento* quodam imbuit , spirituque animali imprægnat ; cumque adeo ipsam mutua subitione dissolvi, inque partes secedere facit , ejus particulae aliae ab aliis extricatae (spiritu infuso manuducente) corporibus sibi met commensuratis adponuntur , inque illorum substantias assimilantur : interea siquidem *spiritus animales* in magna copia cum succo nervoso diffunduntur ; qui nutritionis opere vacant , aut eidem peracto supersunt , ubique in *fibras* , quasi in *propria dimicilia* diverunt ; ibidemque in *motus* ac *sensus* munia parati commorantur ; quæ quidem ut spiritus isti , fibrarum incolæ , melius exequantur , à sanguine musculorum irriguo *copias quasdam* velut *subsidiarias* acquirunt , propterea ut ipsi vi quadam velut elastica præditi , insigniter rarefieri & velut explodi apti sint.

Enimverò supponimus , quod sicuti *liquor nervosus* , spiritu animali turgidus , *humori arterioso* confert quod idem *nutritivus* fuerit ; ita in hujus compensationem , *spiritus animales* à nutritionis opere residui , ac ubique intra fibras dispositi, ab *arterioso sanguine misturam* seu *copulam* quandam recipiunt ; cujus ope & *συμπαράξει* , iidem spiritus vim suam locomotivam multo fortius ac potentius exerunt : Videtur enim quod eorum *particulis spirituo-salinis corpuscula* velut *sulphurea* à sanguine irriguo adjiciuntur ; cumque adeo spiritus animales *hac copula* instruuntur , ipsi in motum excitati *particulas adscitivas* excutiunt , quæ cum impetu quodam , velut in *pulveris Pirii explosione* , elisæ musculum subito intumefaciunt , ipsumque adeo valide contrahendo nimium motivum vehementem edunt. Super his fusius differendi locus erit, cum de *motu musculorum* agemus.

Interea tamen advertimus , quod *musculi* totius corporis , quoad *motum suum* , analogiam quandam cum *Cordis motu* habent. Enimverò in Corde *spiritus animales* , intra *fibras* & *filamenta nervosa* (quibus hæc pars plurimum stipatur) scatentes , à *sanguine infuso* , & utriusque sinus latera distendente, *corpuscula sulphurea* copiose suscipiunt ; quæ dum iidem spiritus , ipsis ad plenitudinem saturati excutiunt , ac veluti explodunt , *totius Cordis* (lateribus ejus cum impetu quodam intra diductis) *systole* , infertur , qua quidam sanguis ex utroque sinu velut *emboli impulsu* ejicitur. Profecto nisi *spiritus* cordis incolæ *pabulum* & *explosionis materiam* ab ipso sanguine reciperent, eorum penus pauciorum & exilium nervorum commeatu suppeditata , pro motu ejus indistincto peragendo minime sufficeret. Hujus indicium est , quod à *sanguinis* æque ac *spirituum animalium defectu* aut *depravatione* etiam *Cordis motus* deficit , aut diminuitur. Non absimili ritu in *musculis* ac in *Corde* res agitur ; *spiritus* illorum *fibras* incolentes , à sanguine illic multo uberius quam

quam circa membranas irriguo *copulam sulphuream & explosioni aptam* suscipiunt, qua præditi, quoties motus obeundi instinctum à *nervo* tanquam *fomite igniario* accipiunt, ipsi excitati *copulam suam* elidentes, musculum valde inflant, & pro nixu motivo acciando intumesciunt. Haud multum interest, nec magni discriminis ratio est, quod *Cordis motus instinctu perpetuo* citatus, necessario semper repetitur; plerique autem musculi *occasionaliter* tantum, & *pro arbitrio animalis*, potentiam suam motivam exerunt; namque *diaphragma*, & quidam *musculi* respirationi dicati, æque ac Cor ipsum, *systoles* ac *diastole* perpetuò urgentur.

Ex prædicta hypothese, circa succi arteriosi nervosique munia ac usus habita, argumenta quæ *Nutritionis opus* alio modo determinant, facile solvuntur. Nam quod *sanguis* partes solidas deprædare potius quam refarcire perhibetur, hoc illius *morbo & dyscrasia*, & non ipsi simpliciter attribui debet: quippe interdum sanguis accusatur, quod partes solidas nimium infercit, nempe inquantum massa ejus aquosa ac debilis existens, succum alibilem, quem rite coquendo non est, crudum usque & vitiosum, uberi nimis copia circa habitum corporis deponit, adeoque Anasarcam inducit. Interim concedi debet, quod si quidem *sanguis* est, qui male habens nutrimenti vitiosi nimium congerit; ita idemmet ipsa est, dum recte habet, qui *nutritionis munus* laudabiliter præstat.

Quod vero arguitur, *succum nervosum* potius esse *nutritium*, quia propter ejus defectum, depravationem, aut prodiga nimis dispendia, nutritionis actus inhiberi aut perverti solent: Huic facile erit referre, quod impedimenta succi nervosi vitia facta, *Nutritionis formam*, & non *materiam* ejus respiciunt: nempe interdum accidit ut sanguis materiam *alibilem* in debita satis copia & crasi dispense; quæ tamen succi nervosi culpâ haud ritè assimiletur. Quando musculi aut tendinis distensionis nimia motus impotentia cum dolore supervenit, brevi postea, nutritione impedita, *gelatina* circa locum affectum concrevit: quæ tamen non (uti vulgo fertur) è paribus nervosis exsudet: sed *glutinosus humor*, ab arteriis pro alimento suffusus, in quantum à parte læsa non excipi potest, ibidem congeritur: neque putandum est tumores, aut abscessus strumosos humorem solummodo nervosum continere aut profundere, cum materies utrinque magna ex parte sanguinea sit, quæ ob malum *succi nervosi* fermentum, formam quidem alienam, eamque variè degenerem induit.

Hæc Suppositio gemini humoris pro *nutricatus materia & forma*, in solvendis phænomenis, quæ circa affectus cerebri & nervosi generis difficilissima occurrunt, egregii usus esse deprehendetur: quinimo ista *pathologia* serio considerata, velut consequentia quadam necessaria, duplicem succum in nutritionis opere requisitum, inferre videtur, prout aliquando forsitan posthæc ostendemus: Interim hac speculatione dimissa, *pens* nostri Anatomici quod residuum est, *νερβολογίαν* scil. *specialem* aggredemur.



NERVORUM

Descriptio & Usus.

CAPUT XXI.

Quatuor priora Nervorum Paria intra Cranium oriunda describuntur.



Nervorum divisio, sive distinctio, propter varios eorum respectus, multiplex adhiberi solet : nempe quod sint *molles*, aut *duri*; in origine *singulares*, aut *numerosi*; quod *sensui* tantum, aut *motui*, vel simul *utrique facultati* inserviant. Cæterum vulgo distinguuntur, quod nervi alii intra Cranium oriundi, è *Medulla oblongata* procedunt; aliiquæ è vertebrarum internodiis exeuntes, à *medulla spinali* derivantur. His insuper quandam aliam discriminis rationem nobis subjungere visum erat; nempe quod Nervi quidam, tanquam *cerebri* clientelæ & servitia, *actus* solummodo *spontaneos* exequuntur; alii autem, administri & satellites *Cerebelli*, circa *functionis* fere tantum *involuntariæ* Exercitia versentur. Non opus erit juxta singulas hæc differentias, diversimodas Nervorum essentias aut Constitutiones assignare: quin potius ut *particularis* eorum *census*, sive *lustratio* instituat, naturæ ordinem sequuti, singulos ea serie quâ in corpore animali disponuntur, speciatim explicabimus.

Inter Nervos è cranio oriundos, *olfactorii*, seu qui vulgo *processus mamillares* dicuntur, agmen ducunt; utpote qui ante cæteros omnes originem habent, & ultra ipsum cerebrum antrorsum exporriguntur. Hi nervi è cruribus *Medellæ oblongatæ* inter corpora striata & thalamos Nervorum opticorum proficiscuntur; & cavitate manifesta præditi, utrinque pone eadem corpora striata in priorem cerebri ventriculum dehiscunt: adeout humiditas intra cerebri plicaturam scatens, per hos Nervorum Canales in processus mamillares feratur; utrum ulterius pergat, mox inquiretur: quippe his Nervis latis & amplis prope corpora striata exortis, atque illinc sub cerebri basi antè protensis, sensim moles sua augetur, donec in processus rotundos mamillis similes, quibus uterque ossis cribrosi sinus oblinitur, evadunt. Intra hujus ossis lacunar, *Nervi* isti adhucque *molles* & *teneri*, tunicas è *dura matre* sortiuntur; quibuscum in plures *fibras* & *filamenta* divisi, & foramina ossis cribri-

formis

formis pertranseunt, cranio egrediuntur: unde in tubulatas narium cavernas delati, & quaquaversus distributi, membranæ labyrinthos istos obli-
nenti inferuntur.

Si de *natura & usu* harum partium inquiratur, proculdubio *processus mamillares*, ipsorumque radices medullares, cum appensis ejusmodi *fibris & filamentis*, revera *Nervi* sunt, atque ipsi *Odoratus* organo proprie inserviunt. Quandoquidem enim hi *sensui* tantum absque *locali motu* conducunt, ideo (non secus ac nervus alter auditorius) dum intra cranium sunt, plane *medullares & molles* existunt; quo nempe spiritus animales intra teneriorem *Nervi Compagem* facilius commoti, specierum sensibilium Ideas promptius & accuratius communi sensorio convehant: At vero quoniam effluvia, sive halitus odoris nudo organo excipiendi, particulas sæpe asperas & aculeatas cerebro & nervo molliori infestas secum advehunt, ideo in primos illorum occursum, hi *Nervi* cranium egressuri, à *dura matre tunicas*, velut *armaturam* mutuuntur: Porro cum isti halitus (ne forte confertim irruentes sensorium acrius feriant) paulatim & per manipulos tantum admitti, perque diversos narium anfractus traduci debent; ideo hi *Nervi*, quo melius effluvia intra singulas specus scentia suscipiant, ita in *fibras & filamenta* plurima dirimuntur, ut nullus sit narium ductus, cui saltem aliqua istorum non destinatur. Atque ad hunc modum, licet exhalationes in nubeculas quasi disceptæ filamentis nervosis excipiantur, adeoque satis cautum sit, ne densius elevata sensorium obruant aut obscurent; ne quid tamen asperi aut molesti cum illis unà ad cerebrum feratur, præ foribus *os cribrosum* objicitur, per cujus foramina percolatæ omni acredine exuuntur. Denique per *nervum molliorem*, tanquam alterum medium, traductæ, adeoque iterum refractæ, tandem *primo sensorio* lenes admodum & benignæ sistuntur.

Quod verò hi *Nervi* intra *Cranium cavitate aperta* per totum insigniuntur, ratio esse videtur, ut humor aquosus è cerebri plicatura exsudans, inque hos canales derivatus, odorum impressiones, sicubi nimis acres aut igneas, retundat & contemperet: nam sicuti humores oculo inclusi speciem visibilem varie refringunt, quo ista demum sine impetu *Nervum opticum* trajiciens, communi sensorio placide illabatur; ita non improbabile est, *lympham* intra hos *Nervorum ductus contentam* pariter odorum species demulcere, easque sensorio *quodantennis præparare*. Quapropter observare est quod pecora & jumenta quæ herbaceis vescuntur, *processus mamillares* amplissimos & semper aqua tumidos habeant; scilicet ne herbarum odores continue ab iis attracti (ni illorum vis modo prædicto hebetetur) cerebrum imbecillius labefactent aut pessundent. Præterea verisimile est, istum *laticem aquosum* à plicatura cerebri descendentem, non modo in apertos *nervorum & processuum mamillarum* canales influere, verum etiam *fibrarum & filamentorum ductu*, *foramina ossis Cribiformis* pertransire, & narium cavitates ab aëre illuc attracto, spirituque jugiter efflato, nimis siccari aut torrefieri aptas madefacere, & continuo humectare. Nam liquidò constat, prout alibi ostendimus, quod serosi humores cæcos nervorum & fibrarum meatus perreptant, & per ipsos è loco in locum migrant. Quinimo opinari licet, non tantum in humectandas nares laticem sufficientem hac via transudari; verum etiam, si quando serosa colluvies in

Cerebri ventriculi congeritur, non raro superfluitas ejus, sive humorem excrementitium, fibrarum ductu os cribrosum trajicere, & foras amandari. Verum super hac re alibi latius disseruimus.

Nervi olfactorii, qui intra cranium *processus mamillares* appendices habent, in bove, pecore, capra, & similibus quæ *herbaceis* vescuntur, longe majores sunt quam in *carnivoris animalibus*; nempe quoniam illis ad dignoscendas herbarum multiplicium vires, magis exquisito olfactus sensu opus esse videtur. Propterea item, hi *nervi* ampliores sunt in brutis quibuscumque animalibus quam in homine: cujus ratio est, quod illa res tantum sensu, ac imprimis pabulum suum odoratu indice discernunt; *hic* autem multa ab eruditione & discursu addiscit, atque circa alimenta capeffenda *gustu* & *visu* potius quam *olfactu* ducitur. Hi nervi in *avibus*, item in *piscibus* satis conspicui habentur; nam utrique horum æque ac quadrupedes pabulum suum *odoratu indice* explorant, dijudicantque.

Quoad *fibras & filamenta* è nervis mollioribus per foramina ossis cribriformis in narium cavernas protensa, ista in cunctis animalibus, quibus adsunt *processus mamillares*, reperiuntur: ut minime dubitandum sit, *processus istos*, cum hac *appendice ac origine sua medullari*, *odoratus organum* esse: Quodque rem magis confirmat, *filamenta* hæc in *canibus venaticis* longe plura & insigniora sunt quam in ullo præterea animali: at vero præter hos nervulos, è foraminibus ossis cribrosi in nares productos, *duo rami* etiam è *Pari quinto* huc mittuntur, ac in utramque nares distribuuntur. Hujus ratio esse videtur, quod cum nervi modo descripti, sive *primæ conjugationis*, proprie sint *olfactorii*, atque odoratus sensum per se efficiunt; hi tamen Nervis aliis, etiam à quinto *Pari* missis ideo stipantur, quoniam *Odoratus Organum* cum *aliis quibusdam partibus consensum habere debeat*, quem Nervi isti subsidiarii, propter multiplicem *Pari quinti* ramificationem, præstare solent. Imprimis constat, quod *olfactui* cum *gustu* necessitudo quædam sive stricta affinitas intercedat: atque hujus causa eo consistit, quod ex eodem *Pari quinti* trunco, Nervi quidam ad palatum, alii autem ad nares mittuntur. De ratione miri istius consensus, quem nares in *sternutatione* cum præcordiis habent, item quare levis illa titillatio tussim irritat, posthæc dicetur, cum ad nervos quinti *Pari* ac *intercostalis* explicandos pervenerimus. Interea tamen advertimus, quod licet plures Nervi ad Olfactus organum spectant, tamen ipsa *sensio* proprie à *fibris internæ narium tunicæ intertextis* peragitur: namque istæ *fibræ* à sensibili objecto percussæ, juxta impressionis Ideam sese variè movent ac contrahunt; quæ illarum affectio nervorum ductu ad *ἐγκέφαλον* delata, quatenus ibidem communi sensorio sistitur, *sensus perceptionem* infert, *Fibræ istæ sensiles* in variis animalibus diversimode configurantur; quæ ratio est, cur res odoræ haud pariter quævis animalia afficiunt: nam quæ *naribus humanis* objecta, utpote effluviis nimis asperis & aculeatis prædita, summe tetra & foetida habentur, uti imprimis sunt stercora & carnes putridæ; eadem *canibus*, quorum olfactus organum fibris robustioribus, & ad effluvia isthæc proportionatis constat, valde grata, & in pabulum eligenda existunt.

Secunda Conjugatio Nervorum sunt *Optici*, seu *visorii*: de quibus, quo ritu pone corpora striata è secunda crurum medullarium sectione (quam *Galenus*

Nervi optici Thalamum appellavit) oriuntur, & exinde cum ambitu quodam descendentes uniuntur, iterumque sejuncti ac in oculorum orbitas delati, fibris diffusis tunicam scleroticam constituunt, superius in *Cerebri anatomia* ostendimus. Insuper autem observationibus istis modo advertimus, quod hujus Nervi truncus extra cranium paululum indurescens, sit *plurium fibrarum*, seu filamentorum una coalescentium, & *ᾠδὲ ἀλλήλων* productorum, quasi *fasciculus*; eo ut videtur fine, ut spiritus animales in toto nervo scatentes, totidem velut lineis, sive stricturis rectis moveantur; quo nempe speciem visibilem, in oculo satis refractam, illinc radio directo, ac minime intorto aut convoluto, sensorio communi deferatur.

Quoties in affectibus ophthalmicis *puncta nigricantia* aut *assula concatenata* ob oculos versantur, verisimile est hanc apparitionem propterea fieri, quoniam Nervi optici filamenta quædam obturantur, quæ cum lux haud uti reliqua recte trajicere potest, tot quasi *spatiola opaca* in medio diaphano apparent. Hi *Nervi*, quia tantum *sensui* inserviunt, ideo intra cranium *molliores* existunt: attamen quia forsan opus sit, ut hujus nervi truncus, pro diversimoda objectorum *φάσι* ac incurso, modo dilatari, modo constringi debeat; ideo *fibræ* quamplurimæ à *Nervis oculi motoriiis* emissæ, eum ubique ambiunt & circumligant, cumque ipso oculi orbitam ingressæ, partim juxta radicem nervi optici inferuntur, partim ipsam tunicam scleroticam altius penetrant.

Porro *Nervi optici*, non tantum *fibris nervosis* à *Pari tertio* emissis, verum (prout supra innuimus) *vasis sanguiferis* in toto illorum processu stipantur: quorum certe munus est, tum *calorem* velut à foco perennem ubique circa majorem hujus Nervi truncum sufficere; tum forsan, ut spiritibus illic intra nervorum truncos procul à fonte degentibus, (uti in aliis locis assolet,) humoris sanguinei pabulum suppeditetur.

De ipsius *Oculi fabrica*, & *visionis modo*, item de *toto apparatu dioptrico*, hic opportunus differendi locus videatur: verum hoc esset à proposito nostro, nuda scil. nervorum doctrina, longe nimis digredi; cujusmodi *parergo* hic melius supersedere possim, quoniam *Sparta* isthæc ab aliis satis abunde & accurate *ornata* prostat. Interim annotetur, quod sicut in *Olfactu*, ita & in *Visu*, *sensio* haud tam Nervi, quàm *fibrarum*, quæ organo intertextæ sunt, ope peragitur: scil. fibrillæ oculorum membranæ, ac imprimis tunicæ scleroticæ insertæ, ac ad reticuli modum dispositæ, speciei visibilis impressionem suscipiunt, atque rei simulachrum, quale extra objectum est, repræsentando, visionem efficiunt: ipsius autem Nervi munus est simulachrum istud, sive speciem sensibilem, velut *tubi optici ductu* intus transmittere, ac communi sensorio inferre.

Tertia Nervorum coniugatio sunt *Oculorum motorii*, qui in basi Caudicis medullaris pone infundibulum exoriuntur; unde antè juxta *Par visorium* pergentes, cumque aliis nervis oculo destinatis calvaria egressi, versus oculi globum deferuntur; ubi statim in plures ramos divisi, musculis ipsum moventibus prospiciunt, verum in diversis animalibus cum vario discrimine. Quippe in bove, oculum ampliorem sortito, nervus oculi motorius ramum cuilibet è sex musculis communibus impertit: atque præterea è nervis

quarti, quinti, & sexti Paris, rami quidam nonnullis eorundem musculorum distribuuntur: unde conjicere licebit, quod hujusque *terti Paris nervi*, oculorum *motus quibusvis spontaneis* præcipuè, ac fere tantum inserviunt: Adeo ut quoties Animal quosvis ad hoc vel illud objectum percipiendum sensus intendit, hi Nervi oculum ad ejusmodi *intuitum spontaneum* convertant, ac pro libitu componant. Insuper autem advertimus, oculos diversimoda *motuum involuntarium* genera sortiri; quippe in *motu, pudore, iracundia, tristitia*, imo ad omnes & *capitis & cordis affectus*, nobis licet invitis oculi *respective configurantur*. Quare summe probabile est, quod ejusmodi oculorum *motus pathetici*, quorum animal vix conscium est, aliorum Nervorum, scil. è *Pari quarto, quinto, & sexto* proficiscentium, ope peragantur: idque ex eo manifestius apparet, quia iidem Nervi qui ramos oculo accommodant, origines à cerebello desumunt, cujus munus sæpe ostendimus esse spiritus pro *functionis involuntariæ* exercitio dispensare.

Attamen de his *Nervis tertii Paris*, qui proprie *oculorum motorii* dicuntur; observamus, quod in homine, cane, & quibusdam aliis animalibus paulo secus habent quam prout in bove reperiuntur: nam uterque nervus in istis simulac cum reliquis extra cranium deferatur, in quatuor *ramos dividitur*, quorum *tres* exinde in totidem distinctos rectos, scil. *attollentem, adducentem, & depri mentem* feruntur; ramus ejus alter singulari trunco longius pergit, & in medium musculi, oculum ad angulum internum deorsum versus oblique circumducentis implantatur. Ex his vero constat, quod hi musculi, quibus iste Nervus in omnibus prospicit, plerosque oculi motus spontaneos fere ac per se exequendo satis sunt: ubi autem prædictus Nervus in quatuor surculos dividitur, plexum constituit parvum & rotundum, è quo plures exiles propagines *Nervi optici* truncum perreptant, & variè circumambiant; in quem usum ita fiat, supra innuimus.

Quarta Nervorum Conjugatio (quam ordinis & successionis jure quartam appellamus, à *Fallopio* octava & ultima habetur) diversam ab omnibus aliis originem sortitur. Quum enim plerique alii à *Medulla oblongata basi* aut *lateralibus* prodeant, hic in *summitate* eius, pone protuberantias orbiculares, *nates & testes* dictas, radicem suam habet: unde antè juxta latera medullæ oblongatæ deflexus, statim sub *dura matre* reconditur; sub qua aliquandiu incedens, & per idem reliquis oculo destinatis foramen cranium pertransiens, singulari trunco, nec cum aliis Nervis uspiam communicante, totus in musculum trochlearem dictum impenditur. In superioribus hos nervos *oculorum patheticos* appellavimus: nam licet insuper alii hoc nomen mereantur (prout mox ostenditur;) tamen verisimile est, quod proprium horum munus est, juxta *passionum impetus* ac *naturæ instinctus*, à cerebro in cerebellum, & vice versa ab hoc in illud, per *nates & testes*, eorumque processus medullares traditos, remandatosque, *oculos pathetice movere*. Cum enim ostendimus, quod spirituum animalium in devio hoc tramite scatentium diversimodo impulsu ac undulatione, mutua quævis inter *cerebrum & præcordia* (cerebello utrinque mediante) *Commercia* instituantur; necesse erit, hos Nervos in media via radicos, ab omni spirituum ultro citroque tendentium sæpiù percelli, proindeque oculorum motus istarum partium affectionibus obsequi.

obsequi. Cuncta animalia perfecta his nervulis instruuntur ; & revera, cum nullum ex iis non iræ , amoris , ac odio , aliisque affectibus obnoxium fuerit , ita perturbationes istas mero aspectu , ipsoque oculorum gestu , animalcula quævis produnt. Vidimus aliquando Lucium majorem prædæ inhiantem , primo oculos obvolvere , ac torvum intueri ; dein , celeri corporis traiectione facta , minorem piscium gregem invadere.

CAPUT XXII.

*Nervorum Paria , quintum , sextum , ac septimum
explicantur.*

E Quatuor prædictis Nervorum Paribus , *duo priora sensui* tantum , *bina autem posteriora motui* potissimum inservire videntur ; eorumque singularis quisque Nervus peculiari provinciæ destinatur : At verò quæ proxime succedit , sc. *quinta Nervorum Conjugatio* , utriusque facultatis , nempe tum sensus , tum motus exercitia præstat ; neque ipsi provincia tam restricta præfinitur , ut ad unum aliquod membrum solummodo pertineat ; nam & ad oculos , & nares , & palatum , reliquasque totius faciei partes distribuitur ; ac insuper aliquatenus præcordiorum , ac viscerum fere omnium munera & actiones pro parte sua adjuvat.

Hoc Par (quod ab antiquis *tertium* , à nobis *quintum* , idque ordinis seu positionis jure habetur) infra priores nervos , è lateribus protuberantiæ seu processus annularis à cerebello dimissi , trunco amplo & lato procedit : fibris hoc quidem plurimis , quarum aliæ sunt molles , aliæ duriores , simul colligatis constat ; adeo ut magnus ipsius Caudex , prope originem nihil aliud sit , quam *plurimum nervorum fasciculus* , quorum scil. aliqui his partibus , alii autem aliis impenduntur , ac in quibusdam *motus* , in reliquis *sensus* munia exequentur. Quod vero tot nervi , tam variis membris ac ab invicem remotis destinati , unà tamen oriundi , in eundem veluti fascem colligantur , ratio est , ut in partibus universis , quibus nervi isti prospiciunt , *sympathia & actionum consensus* quidam conservetur : Nimirum ista nervorum communio causa est , cur visus & olfactus salivam movent , & palato lenocinantur ; neque alia ratione , juxta varios cerebri conceptus , præcordia afficiuntur , suisque affectus ad singulas faciei partes transmittunt ; unde totius animalis aspectus , sive vultus , patheticè configuratur , prout infra particularius ostendetur.

Interim ut *Nervi hujus brevem hypotyposin* tradamus ; truncus ejus è lateribus annuli majoris prodiens , interdum juxta ipsam originem , sæpius tamen dura membrana prius perforata , in *duos ramos* insignes dividitur. Horum *primus* deorsum recta tendens , per proprium foramen calvaria egressus , in descensu versus mandibulam inferiorem (cujus partibus præcipue destinatur) in plures ramos dividitur ; quibus musculo temporali , item facie & buccarum musculis prospicitur. Porro , ab iis surculi & propagines in labia , gin-

givas, dentium radices, fauces, tonsillas, & extremum palatum, imo & in linguam distribuuntur; ea potissimum ratione, ut nervi ab hoc inferiore *Paris quinti* ramo profecti, præter *sensationum*, nempe *gustus*, & *tactus* diversimodi, munera, *motus* varii generis in prædictis membris ac partibus perficiant; quorum plerique, quales nimirum *alimenti manducationem*, item qui *oris & faciei in risu* aut *ploratu* configurationem respiciunt (uti pridem innuimus) cerebro inconsulto, h. e. in voluntarie, & cerebello (è quo hi nervi derivantur) tantum auspice, peraguntur.

Alter superior, idemque *major Paris quinti ramus*, sub *dura matre*, juxta sellæ Turcicæ latus, aliquanto spatio recta incedit, atque è regione Glandulæ pituitariæ Carotidis trunco, aut Reti mirabili (siquidem hoc adest) propagines quasdam elargitur; dein Nervo *sexti Paris* inosculatur, & exinde furculum, modo unum, modo duos remittit; qui cum furculo altero, à Nervo *sexti Paris* reflexo, uniti, nervi intercostalis radicem, sive Caudicem primum constituunt. De hoc *Nervo intercostali*, qui Nervorum *quinti & sexti Paris* ramificatione inferiore constat, posthæc speciatim dicetur.

Statim à furculis pro Nervi intercostalis radice reflexis, magnus iste *Paris quinti Nervus* in duos ramos insignes dividitur. Horum *minor & superior*, versus oculi globum tendens, ac iterum bifidus, duos ramos à se dimittit; quorum alter ad latus ossis internam oculi orbitam sive angulum continentis vergens in duos furculos dirimitur. Horum alter, perforato osse, juxta processus mamillares in nares defertur: atque hujus nervi munus est sympathiam, & actionis consensum inter nares & quasdam alias partes conservare: Alter autem hujus divisionis ramus in musculum quo bruta nictitant impenditur.

Ramus secundus quinti Paris Ophthalmicus in quatuor vel quinque furculos dividitur, qui omnes supra musculos oculi pergentes, perque glandulas ejus aliquatenus trajecti, fere toti in palpebras absumuntur, nisi quod in transitu duas exiles propagines dimittunt, qui tunicam scleroticam paulo infra tendines musculorum subeunt, ac ad uveam pertingunt; quin & propagines exiles ad glandulas oculi in itinere mittunt. Videtur quod hi nervi è *quinto Paris* in oculorum glandulas ac palpebras distributi, illarum partium *actionibus*, potissimum *involuntariis & patheticis* inserviunt; cujusmodi imprimis sunt oculorum languidi mœrentesque inter flendum aspectus, ac invita lacrymarum profusio: cum enim inferior *quinti Paris* ramificatio, Nervus sc. intercostalis, præcordiis in homine prospiciat, facile accidit, ut à tristi horum affectione istius nervi ramis cardiacis in spasmus actis & corrugatis, etiam prædicti rami ophthalmici ita correspondeant, ac palpebras corrugando, comprimendoque glandulas, ejusmodi oculorum intuitus, tristitiæ ac doloris indices producant. Porro observare est, quod è ramo *quinti Paris* ophthalmico furculus quidam, juxta musculorum capita superius reflectitur; qui ubi per proprium foramen, os oculi orbitam continens trajecerit, recta in narium cavernas defertur. Hinc, ut opinor, ratio desumitur, quare è loco obscuriore in lucem progredientes, ad primum Solis aspectum mox vel inviti sternutemus; nimirum oculis objecto nimis forti percussis, & quo se avertant subito ac inordinate commotis, illico per nervum prædictum eadem affectio cum membrana tubulatas narium cavitates oblinente communicatur.

municatur, quæ proinde contracta & corrugata, (veluti à re acri & vellitante afolet) sternutationem ciet.

Secundus, five major ramus secunda divisionis Nervi quinti Paris, juxta oculi orbitam delatus, iterum in binos ramos dividitur. Horum inferior deorsum reflexus, seque in plures furculos diffundens, palato & supernæ faucium regioni impenditur: ramus alter & superior hujusce secundæ divisionis, ultra oculi orbitam protensus, foramen proprium in osse maxillæ superioris excavatum cum vena & arteria simul pertransit; quæ vasa hic nervus, furculis plurimis emissis, scandit, & varie circumligat; dein ex osse emergens, musculis genarum, labiorum, nasi, & dentium superiorum radicibus ramulos impertit. Itaque in quantum hic Nervus vasa sanguifera genis aliisque faciei partibus destinata amplexatur, & circumligat; ex eo ratio reddi potest, cur à *pudore facies rubore suffunditur*; nam spiritus animales imaginatione rei indecoræ perturbati, mox faciem quasi oculere satagentes, hunc Nervum ἀτάκτως subeunt, proinde ut ejusdem nervi propagines vasa sanguifera amplectentes, eadem comprimendo convellendoque, sanguinem in genas & faciem plus satis urgeri, ibidemque, venis constrictis, aliquandiu sisti ac detineri faciant. Quatenus autem ejusdem *Nervi maxillaris*, è quinto Pari derivati, multæ propagines, ac fibræ labiorum carnes ac cutim intertexunt, hinc ratio evidens patet, cur hæ partes ita valde sensiles existunt, ac insuper cur mutua amasiarum oscula labiis impressa, tum præcordia, tum genitalia afficiendo, amorem ac libidinem tam facile irritant; quia scilicet ejusdem quinti Paris ramificatio inferior has partes in medio ac imo ventre constitutas actuat, ipsasque in parem cum labiis affectionem trahit. Eadem ratio tenet de Cupidine per oculos celeriter admissa, ut cum *Mars videt hanc, visamque capit*.



Modo innuimus multas hujus nervi propagines masticationis operi destinari; ideoque quoniam alimenta ingerenda non modo *gustus*, aut etiam *olfactus* & *visus* examen subire debent, ab eodem Nervo, cujus rami ad palatum & fauces missi, manducationis negotium peragunt, propagines aliæ, velut exploratrices, ad nares & oculos feruntur, nempe ut isthæc aliorum sensuum organa, etiam ad objecta gustus melius dignoscenda, probationum auxiliis quibusdam instruantur. Certe ex Nervi hujus prosapia & multifaria affinitate, etiam in capite valde diffusa, plurimum ejus partium mutua dependentiæ & confœderationes procedunt. Quantum vero hic Nervus in aliis provinciis, nempe in thorace ac imo ventre, ibidemque circa præcordiorum & viscerum motus & sensiones, variasque illorum inter se & cum aliis partibus sympathias faciat, posthæc fusiùs ostendetur, cum de Nervo intercostali, qui in hoc *Paris quinti* Nervo radicitur, speciatim dicemus; ubi ex multiplici hujus nervi communicatione, *sternutationis, oscitationis, visus & ploratus*, plurimumque aliarum actionum merè naturalium rationes facile erit depromere. Interim ad hunc modum Nervi *quinti Paris* superior in capite ramificatio se habet, ac simili ferè ritu in plerisque animalibus divaricatur; excepto tamen quod in nonnullis, sub prima statim origine in tres magnos ramos dividitur; quorum unus mandibulæ inferiori, alter oculo ac naso, ac tertius maxillæ destinatur.

Sequitur *Nervus Conjugationis sexta*, qui ex ima protuberantiæ annularis basi oriundus, & sub *dura matre* statim demersus, per idem foramen cum nervis *tertiæ & quartæ Paris* calvariâ egreditur, ac singulari trunco in oculi orbitam deferitur; ita tamen ut juxta latus sellæ Turcicæ ramo secundo, sive majori *quintæ Paris* inosculetur; unde ramulum modo unum, modo geminum reflexit; qui cum ramis *Paris quintæ* recurrentibus uniti, *intercostalis Nervus* principium constituunt: Deinde Nervus iste antrorsum tendens prope oculi orbitam in duos ramos dividitur; quorum *alter* in musculum oculi abducentem, in exteriori ejus angulo situm inferitur; atque *alter* in varias fibras diremptus, musculo septimo, brutis proprio, impenditur; adeo ut hic etiam Nervus oculi motibus, fere tantum patheticis, aut ab instinctu naturali excitatis, inservire videatur. Nam quoad prioris furculi usum satis constat, in subito timore oculos abducere, quid timendum ad latus aut à tergo sit, respicere, unicuique animali innatum esse: dein quoad alium ejus furculum, quo bruta nictitant, satis obvium est ejusmodi motum, absque intentione prævia, subitum & extemporaneum esse, quo oculus externorum occurrentium injurias evitare satagit.

Septima Nervorum Conjugatio, ab Antiquis pro quinta habita, circa auditus sensum occupatur. *Hujus Paris bini processus*, *mollis unus*, *alter autem durior*, vulgo accensentur; qui revera duo distincti nervi esse videntur, utpote qui origines, licet propinquas, aliquatenus tamen distinctas habent, & ad organa diversa feruntur, interim utrisque in communi quodam usus sive actionis respectu convenientibus: quippe dum *unus nervus auditus actum perficit*, *alter requisita quadam, quo actus iste melius perficiatur suppeditat*. Quapropter contra vulgarem hujus *Paris* descriptionem, qua pro unico sumitur, non multum litigamus. *Hujus Paris processus*, sive *Nervus proprie auditorius*, qui *ramus mollis* appellatur, è latere inferiore protuberantiæ annularis in homine, éque medio annuli minoris in quadrupedibus exoriri videtur. In quibusdam dissectionibus planè deprehendi, quod *mollior hic nervus* originem inferius habens, paulo ascendere videtur priusquam è Caudice medullari prodierit; atque *alter durior nervus* superius (nempe ex linea albida medullari quarti ventriculi fundum obducente) exoriri visus, paulo descenderet, & prope alterius occursum emergeret. Nervus iste mollior in meatum ossis petrosi deferitur, ubi in specum, qui sono excipiendi destinatus, citra cochleam & tympanum consistit, ingressus, in membranam tenuissimam, qua illud antrum obducitur, sese ita explicat, ut quoties aër isti cavernæ insitus aëris externi verberare supra tympanum inflicto commoveatur, impressio isthæc membranam hanc feriens, & spirituum animalium velut undulationem concitans, illico nervi ibidem implantati ductu versus commune sensorium deferatur. Quo ritu & quali organorum apparatu auditus peragitur, si quando de Sensibus differamus, erit opportunior dicendi locus.

Alter hujus Paris Nervus, sive *processus*, qui *durior* existens, *motui* potius quàm *sensui* conducit, os petrosum per foramen sibi proprium pertransiens, juxta meatum auditorium emergit, ubi mox in truncum suum furculum è *Pari vago* illuc elatum asciscit, deinde statim ab isto coalitu in *binos ramos* dividitur: horum *prior* deorsum tendens, musculis linguæ & ossis hyoideos im-

penditur



penditur; *alter* meatum auditorium circumiens, & superius deflexus, in tres *surculos* dividitur; quorum *primus*, divisionis prioris nervo correspondens, labiorum, oris, & faciei, nariumque musculis quosdam *surculos* elargitur, adeoque vocis edendæ organa quædam exteriora, sicut iste prior interiora quædam organa, actuat: *secundus* hujus divisionis *surculus* in musculos palpebrarum & frontis, ac *tertius* in ipsius auris musculos propagines distribuit. Horum omnium munera & usus supra innuuntur; quorum *summa* est, ut quoties sonus intromittitur, præsertim si iste quoque modo inusitatus aut novus, eoque admirandus fuerit, statim naturali quodam instinctu *aures* & *oculi* sese erigunt & aperiunt: istum nempe in finem ab hoc Nervo palpebrarum & aurium musculis propagines inseruntur, ut harum ductu spiritus utriusque regionis incolæ quasi ad excubias vocarentur. *Pari* ratione ab eodem hujus nervi *processu* *duo*, *surculi* *tum* in linguæ ac ossis hyoideos, *tum* in labiorum ac oris externi musculos distribuuntur, ut ipsorum com meatu sono ulterius ad hæc vocis organa transmissio, *vox ejusdem amula*, velut *echo*, officiose respondeat. Quo melius prædictorum Nervorum descriptiones intelligantur, visum est hic *Paris Quinti & Sexti Ramificationes* in *Figura sequenti* repræsentare. *Par septimum* in *Figura 1X.* satis aptè delineatur.

Hæc *Figura Nervorum Paris Quinti & Sexti Ramificationes* exhibet.

- A. Paris Sexti Nervus, (quem ideo prius, quoniam in Schemate extimus est, referimus) è cuius trunca duo *surculi*, a. a. in binos oculi musculos feruntur.
- A. *Surculus à Nervo Sexti Paris pro radice Nervi intercostalis reflexus.*
- B. Paris Quinti truncus, statim in duos ramos majores divisus.
- b. b. Duo *surculi* ab hoc ramo pro Nervi intercostalis radice reflexi.
- C. Divisio Caudicis superioris in quatuor majores ramos, quorum superior c. ophthalmicus, oculi orbitam ingressus, quatuor *surculos* emittit.
 - c. Primus juxta oculi orbitam delatus in nares reflectitur.
 - d. Secundus exteriorem oculi orbitam præteriens, in musculos frontis effertur.
 - e. c. Tertius & quartus, in palpebras & glandulas oculi interiores distribuuntur.
- D. Ramus secundus secundæ divisionis, etiam ophthalmicus, qui oculi orbitam ingressus: & versus oculi angulum exteriorem delatus, in palpebras ac glandulas exteriores distribuitur.
- E. Ramus tertius secundæ divisionis, sive maxillaris, qui oculi orbitam prætergressus, foramen in osse maxilla proprium ingreditur, in quo transitu *surculum* e. per aliud foramen emittit in musculum masseterem, dein è foramine emergens effert.
 - f. *Surculum* in musculos naris;
 - g. g. Multas propagines deorsum mitti in labium superius.
- F. Ramus inferior, sive quartus, secundæ divisionis, qui recta versus oris lacunar descendens, in duos ramos dividitur; quorum
 - h. Primus in gingivas distribuitur.
 - i. Secundus in palatum cum multis propaginibus diffeminatur.
- G. Ramus secundus primæ divisionis Paris quinti, qui recta deorsum versus maxillam inferiorem tendens, in itinere plures *surculos* demittit.
 - k. Propago

- k. *Propago eius in glandulas parotidas.*
 l. *Surculus ad masticatorium internum.*
 m. *Surculus, qui inferioris maxillæ processum circumdans ad masticatorii ex-
 terni partem exteriorē defertur.*
 n. *Surculus alter in prioris oppositum tendens, qui eodem processu circumdato,
 in eiusdem masticatorii partem internam distribuitur.*
 H. *Eiusdem rami maioris Truncus ulterius proventus, in multos surculos diri-
 mitur, quorum.*
 o. *In radicem linguae tendit.*
 p. p. *In totius linguae compagem cum multis propaginibus defertur.*
 q. *In partes sublinguales.*
 r. *Os maxillæ pertransiens in plures propagines dirimitur, quæ partim in la-
 brum inferius, sss, & partim in mentum disspescuntur ttt.*

**Figura Secunda exhibet Nervos omnes, qui scilicet à nervis
 tertii, quarti, quinti, & sexti Paris profecti, oculi musculis
 aliisque partibus impenduntur.**

- A. *Nervus tertii Paris ad tres rectos musculos & obliquum externum.*
 B. *Nervus quarti Paris, sive patheticus, totus in musculum trochlearem.*
 C. *Nervus sexti Paris in musculum abducentem, & septimum brutis pro-
 prium.*
 D. *Nervus quinti Paris, cuius ramus ophthalmicus E. in duos ramos divi-
 ditur.*
 F. *Ramus superior statim in plures surculos diremptus recta tendit versus
 angulum interiorem, ubi glandula & palpebris impenditur.*
 G. *Ramus ophthalmicus inferior, qui in surculos diremptus, pari modo
 glandula & palpebris in externo oculi angulo sitis prospicit.*
 a. *Nervus quarti Paris ad musculum trochlearem.*
 b. *Ramus Nervi tertii Paris ad musculum attollentem.*
 c. *Ramus eiusdem Paris ad musculum adducentem.*
 d. *Ramus eiusdem nervi ad musculum deprimentem.*
 f. *Ramus eiusdem ad musculum obliquum externum.*
 g. *Nervi minores è plexu tertii Paris per tunicam scleroticam in uveam ten-
 dentes.*
 e. *Nervus sexti Paris in musculum abducentem.*
 **** *Fibra seu rami minores à quinto & sexto Pari in musculum septimum,
 brutis proprium.*
 h. *Nervus à ramo ophthalmico superiore in nares abscedens.*
 i. *Nervus ab eodem ramo in supercilia & frontem.*
 H. *Quinti Paris truncus abscissus, qui ad maxillam inferiorem tendit.*
 I. *Eiusdem ramus abscissus, qui ad palatum fertur.*
 K. *Eius ramus maxillaris superior.*

CAPUT XXIII.

Octavi Nervorum Paris Descriptio.

Octava Nervorum Paris Conjugatio, ab Antiquis pro sexta habita, *Par vagum* appellatur, eo scilicet quod Nervus ejus, non uno contentus membro, aut corporis regione, partes diversas ac longe distitas respicere, atque ramificationes suas non modo in vicinia circa Caput & cervicem, sed per totam medii ac imi ventris cavitatem, ac ad pleraque in utrisque viscera exporrigere putatur. Revera hic Nervus provinciam satis amplam habet; attamen non adeo diffusam uti vulgo creditur: nam plures alii nervi, quoniam huic se adjungentes inosculati sunt, ejus pars esse perhibentur, licet ipsi distinctas origines, & rursus à *Paris octavi* nervo abscedentes, divaricationes peculiare & ab eo diversas obtineant. Quare ut unicuique suum tribuamus, hunc *Paris vagi nervum* à carceribus ad metam prosecuti, proprios extensionis ejus *tractus* & *vestigia* indagabimus; & insuper aliorum cum ipso *confæderationes* & *coincidentias* ostendemus.

Itaque *Octava Nervorum Conjugatio* infra Nervos auditorios, è lateribus medullæ oblongatæ, radice ejus fibris numerosis constante, exoritur: in *homine* duodecim ad minus, quarum aliæ majores, aliæ minores sunt, satis conspicuæ habentur; quibus *fibra insignis*, seu potius *Nervus* cæteris longe major, à *spinali medulla* accedit, hisque adjunctus, eademque tunica à *dura matre* ascita involutus, una *Cranio* egreditur, ac si omnes in eundem truncum coalescerent: Iste autem *Nervus accessorius*, quin & aliæ plures *fibræ* sub involucri illo usque distinctæ manent, & postea abscedentes separatim in provincias peculiare feruntur.

Quippe *Nervus iste spinalis*, *Cranio* perforato, conjugationem suam deferens, in *musculos cervicis* & *scapula* deferitur; porro *fibra insignis* è *Paris vagi* origine, mox in *Conjugationis septimæ processum durior* effertur; *duæque aliæ fibræ*, statim relicto *cæterarum consortio*, in *musculos gula* & *cervicis* tendunt: reliquæ autem *fibræ* simul colligatæ, usque sociæ pergunt, & vice aliorum comitum, à quibus deserebantur, satellitium illico novum & quasi succedaneum asciscunt; nimirum *ipsius Nervi intercostalis* modo *truncus integer*, prout in plerisque quadrupedibus habet; modo *ramus* tantum, prout in *homine* & aliis quibusdam animalibus observare est, accedit.

Hic loci, ubi *Nervi intercostalis* seu *truncus*, sive *ramus*, *Paris vagi caudici* inosculatur, *plexus insignis* constituitur, scilicet *Nervi truncus*, ibidem major factus, in tumorem quendam corpori calloso, seu ganglio similem, attolli atque excrecere videtur: hic, cum oblongus sit, à *Fallopio Corpus olivare* dicitur; cujusmodi modo unicum, modo bina, idem Author huic Nervo adesse pronunciat; cum revera in *Paris vagi* trunco unum, alterum autem in vicino intercostali constanter reperiatur.

Circa hujusmodi *plexus* in genere advertimus, ipsos in Nervis, quasi *nodos* in *canna* aut *arboris caudice*, constitutos esse, quoties scilicet *ramus* è *trunco* prodit,

aut aliunde illapsus, in eundem recipitur; cumque eodem sæpe loco furculi quidam abscedunt, aliique adveniunt, plexus ibi major evadit; & adhuc quo plurium furculorum ac propaginum alicubi in Nervo aditus exitusque simul conveniunt, eo magis plexus magnitudo & moles augetur: si quando autem ramus à Nervo quopiam sine plexu constituto procedere videatur, revera sub eadem tunica solum inclusus, non tam ramus quam socius habendus est, utpote qui longo prius ductu, singularis ipse Nervus & satis distinctus simul pergebat, neque ante discessum suum omnino inosculabatur. Ejusmodi vero *plexuum usus* videtur esse idem qui est nodorum in caudice arboris, seu qualis *diverticuli* est juxta compita siti; nempe ut cum spiritus animales una cum succo nervoso itinera diversa instituant, ne mutuo occurrentes confunderentur, alii ab alijs secedere, & donec ordines suos & justam diataxin recuperent, paululum divertere possint.

In dissectione Nervorum qui præcordiis & visceribus distribuuntur, duo *plexus Ganglioformes*, nempe prædictus in *Paris vagi trunco*, atque alter vicinus in *Nervo intercostali* succrescens, sunt velut *bini lapides terminales*, quibus primo perquisitis, exinde cætera pensæ Anatomici fila ultra citraque facile pertractantur. Verum ut *hi plexus* investigentur, *arteria carotidis* truncus utrinque inter cervicis musculos detegatur; dein tractum ejus sequendo, prædicta *corpora olivaria* circa mandibulæ inferioris insertionem in conspectum venient; è quibus utriusque Nervi tum *origines superiores*, tum *ramificationes inferiores* designari poterint. Verum quoniam hic circiter loci, Nervi aliter in *homine* ac in *brutis* configurari incipiunt; quo discriminis ratio innotescat, libet hic utriusque *υδρολογίαν* distincte & seorsim prosequi; atque imprimis *Paris vagi hypotyposin*; ejusque cum *intercostali* aliisque Nervis *confæderationes*, quemadmodum in *homine* reperiuntur, trademus.

Itaque *plexus ganglioformis*, super *Paris vagi* trunco constitutus, Nervum unum aliunde immissum recipit, aliumque à se foras emittit. Huic à *Nervo intercostali* furculus infertur, secus ac in quadrupedibus plerisque, ubi Nervi intercostalis integer truncus *Pari vago* accedit, ac uniri videtur. A *plexu* autem prædicto *ramus insignis* emissus versus *laryngem* defertur, qui cum in *tres* furculos dividitur, *primus* illorum in sphincterem gulæ protenditur; *secundus* sub cartilagine scutiformi demersus, ad laryngis musculos superiores, atque ad musculum, quo laryngis rima occluditur, propagines distribuit; atque *tertius* etiam cartilaginem scutiformem subiens, Nervi recurrentis apici occurrit, eidemque unitur. Talis *Nervi hujus* cum *recurrente inosculatio* in *homine* & quibusvis perfectis animalibus constanter reperitur; cujus ratio inferius subdetur.

Infra prædictum *Paris vagi plexum*, caudex ejus juxta latus arteriæ carotidis ascendens recta deorsum pergit, atque in itinere propagines quasdam exiles eidem impertit, quæ modo vasis truncum circumligant, modo tunicis ejus inferuntur. In *ima cervice* hic *Paris vagi* truncus è plexu vicino Nervi intercostalis ramum admittit, atque in sinistro latere, ibidem circiter loci, *ramum* alium à se in Nervum recurrentem dimittit; qui ramus transversus in sinistro tantum latere protensus in *homine* ac *brutis* omnibus reperitur; exinde vero *Paris vagi truncus* absque ulla insigni ramificatione descendit, usque

usquedum è regione primæ aut secundæ costæ pervenitur ; ubi *plexu altero* constituto, *surculi* plures ac *fibræ* numerosæ versus *Cor* & *appendicem ejus* dimittuntur. Attamen hæc *nervorum cardiacorum divaricatio* non eodem prorsus modo in utroque latere habet.

Nam in *sinistro*, *surculus unus* aut *alter* insignis emissus, unà cum aliis *surculis* è *Nervo intercostali* oriundis, *plexui cardiaco* inferuntur; *fibræ* autem multæ ibidem prodeuntes *vasis cordi* appensis, *auriculis ejus* & *pericardio* distribuuntur. In *dextro latere* *surculus* insignis in *plexum cardiacum majorem*, *alter* in *minorem*, atque *duo* alii *surculi* cum *nervo*, è *plexu medio trunci intercostalis* versus *plexum cardiacum* eunte se associant, ac uniuntur : Insuper *fibræ* numerosæ in *vasa Cordis* & *pericardium* pariter descendunt. Præterea item *Nervus recurrens* in hoc latere superius oriundus, circa *arteriam axillarem* reflectitur, cum in *sinistro latere idem* multo inferius hoc *plexu à trunco Paris vagi* abscedens, *aortæ truncum* *descendentem* circumligat, & exinde sursum retrovertitur.

Nervus recurrens, etiamsi videtur ramus à *Paris vagi* trunco emissus, revera distinctus & singularis *Nervus* usque ab origine *Paris vagi* accessit; tamen melioris conductus gratia, sub eadem tunica cum reliquo *Paris vagi* trunco continetur. In utroque latere circa reflexionis nodos, *surculos* & *fibras* dimittit, qui in *Cordis vasa* distribuuntur. *Nervus reflexus* in ascensu suo ramum à *plexu medio intercostali*, aliumque à *Pari vago*, in *sinistro latere* accipit; uterque autem *recurrens* *asperæ arteriæ* *propagines* plures distribuit; dein *extremitas ejus* cum *surculo*, qui è *plexu Paris vagi ganglioformi* dimittitur, occurrens unitur.

Paulo infra *sinistri recurrentis* à *Paris vagi* trunco abscissum *ramus alter insignis* utrinque dimittitur, qui versus *Cor* delatus, in *postica regione* basin ejus obducens, utrinque occurrit, ac in toto processu *surculos* per totam *Cordis superficiem* dispergit. Prout *surculi* ab his ramis *posticam cordis regionem*, ita à *plexibus cardiacis* *rami* & *propagines* multæ procedunt, qui in *partem ejus anticam* divaricantur.

Sunt autem *duo plexus* è quibus *nervi* in *Cor* distribuuntur : *Superior* & *major* inter *Aortam* & *arteriam pneumonicam* consistit. *Nervi* hunc constituentes sunt *ramus unus* aut *alter insignis*, utrinque è *Paris vagi* trunco; at præcipui & plures *nervi*, ex utroque *Nervo intercostali*, scilicet è medio ejus *plexu* huc descendunt. E *plexu* hoc, *duo* aut *tres* insignes *Nervi*, subtus *Aortam* lati, in *Cordis latus sinistrum* feruntur. Cæterum ab hoc *plexu* *surculus* emissus, *arteriam pneumonicam*, facta velut *ansula*, circumdat; atque hujus *ansulæ* *partem anteriorem* *ramus* è *dextro Paris vagi* trunco descendens, ac *alter* è *Nervo* qui in *posticam cordis regionem* destinatur elatus, conveniunt, & *plexum minorem* efficiunt; è quo *Nervi* in *dextrum Cordis anterioris latus* mittuntur.

Notandum sit, quod in *brutis animalibus*, à *Paris vagi* trunco longè plures & majores *Nervi* in *Cor* & *appendicem ejus* feruntur, quam in *homine*; in quo scilicet præcipui *Nervi cardiaci* à *Pari intercostali* procedunt, prout inferius ostendetur; quare in *brutis* idèò *Par vagum* *Cordi* *majora subsidia* præbet, quia *Nervus intercostalis* eidem vix ulla contribuit. Porro per totum *Paris vagi* tractum,

tractum, unde Nervi cardiaci procedunt, plures exiles propagines utrinque emissæ, *œsophago & glandulis extra pericardium* sitis inferuntur.

E regione Cordis, *Paris vagi truncus* plures surculos insignes utrinque emittit, qui in *pulmones* delati, unâ cum vasis sanguiferis per totas illorum compages distribuuntur, ac in transitu *bronchiorum ductus*, tum *arterias* quoque & *venas* *κατὰ πόδα* assequuntur, & propaginibus quaquaversus emissis, hæc vasa supercandunt & circumligant; dein ejusdem *Paris vagi truncus* juxta tracheæ latera utrinque descendens, multas propagines etiam in *œsophagi tunicas* distribuit.

Infrâ *ramos pneumonicos*, uterque truncus *Paris vagi*, juxta *œsophagi* latera deorsum pergens, in *duos ramos*, scilicet *exteriolem & interiolem* dividitur. *Rami utrique interni* statim ad se mutuo inclinati, rursus in eundem Nervum coalescunt, qui recta versus *œsophagum* dimissus, juxta *exteriolem* orificii ejus partem incedens, *ventriculi fundum* circumdat. Pariter *duo rami externi* ad se mutuo inclinati, in eundem Nervum coalescunt, qui ad ventriculum dimissus, juxta *internam* orificii ejus partem delatus, illinc reflectitur, ac *partem ejus supernam* perreptat. Ab utrisque ramis, juxta oppositas orificii superioris partes delatis, plures surculi producuntur, qui mutuo inosculati, *plexum nerveum*, reticuli instar, constituunt. *Ramus stomachicus inferior*, juxta sinistram partem fundi ventriculi plures fibras & propagines dimittit, qui aliis à *plexu mesenterico & lineari* emissis uniuntur. Porro, in dextra parte ejusdem fundi ventriculi propagines ab *utroque ramo stomachico* emissæ, surculis aliis à *plexu hepatico* sursum emissis uniuntur; atque circiter hunc locum, octavi nervorum *Paris* uterque truncus terminari videtur, quippe ultimum quod illius percipere licet, sunt propagines quædam à ramis stomachicis dimissæ, quæ ramulis & fibris à *plexibus mesentericis* sursum emissis inosculantur.

CAPUT XXIV.

Nervorum octavi Paris, in superiori Capite descriptiones & usus explicantur.

AD hunc modum octavi nervorum *Paris* origo & ramificationes in homine disponuntur: ac simili ferè modo in *brutis* habent, nisi quod rami cardiaci (quoniam in his tantummodo ab hac una conjugatione prodeunt) plures dimittuntur. Horum omnium hypotyposis in *Figura nona* satis aptè designatur. Restat modo, ut descriptionis hujusce vestigia, aut saltem præcipuè notabilia recolentes, *phenomenon rationes* inquiramus.

Hic Nervus statim sub ipso ortu fibris numerosis constat, prout cernere est Figura nona E: cujus ratio est, quia nervi plures hic simul oriundi, ac ab eodem penu spirituum animalium copias derivantes, easdem partibus diversis & ab invicem remotis inferre debent; ideoque laticem suum non singulari trunco, uti vasa sanguifera, assumunt, eumque postea per ramos & surculos huc

illuc

illuc exporrectos æquabiliter distribuunt. Quippe enim spiritus ab eodem fonte derivati, in has partes seorsim ab illis influere, atque influxum suum variè transponere ac immutare opus habent: Quare in hanc rem (ut minimè supponamus valvulas mediis nervorum ramificationibus, velut organi musici Tibiis præpositas) requiritur, ut *Nervi* qui ad diversa munera in distinctis partibus respectivè obeunda destinantur, usque in toto ductu singulares, inter ac inter se distincti spirituum canaliculi existant; profecto melioris conductus gratia, plures simul colligantur, & in eundem truncum coalescere videntur; cum revera isti tum in origine partiti fuerint, tum etiam toto itinere, sub eadem tunica licet involuti, distinguuntur, & ita ad partes respectivas feruntur. Alias quæ fiat, ut spiritus motus obeundi instinctum versus *stomachum* laturo, non una *pulmones aut præcordia* subeant, eaque inordinato influxu actuent? Enimvero liceat nervorum *Paris vagi* surculos à partibus quibus inferuntur, retro versus originem oculis & manu prosequi, eosque ubi in eundem truncum uniri videntur, digito ita separare, ut quod sunt singulares, appareat. Eodem planè modo & *Nervum recurrentem*, aliosque, communi ipsorum tunica dissecta, ab invicem separavimus. Interea tamen haud negamus inter progrediendum, illos fibris mutuo commissis invicem communicari, dummodo concedatur, eosdem, licet simul oriantur, in ipso tamen exortu aliquatenus distinctos esse: Nam & propter originis & progressus viciniam, in actionibus consensum & sympathiam quandam omnes *Paris vagi* nervi habent; attamen quatenus funiculis partitis constant, actiones suas successivè edunt, atque ad has partes seorsim ab illis spirituum influentias evehunt.

Suprà ostendimus, *Paris vagi Nervum*, aliosque ad illius familiam pertinentes, functioni ferè tantum involuntaria inservire. Quare putandum est, cum plures surculi & fibræ ab eadem origine distinctè prodeuntes ad diversas partes feruntur; isthæc quidem viscera & membra, quibus hi Nervi inferuntur, particulares suas actiones, aut *natura instinctu*, aut *passionum impetu* (animali interim vix conscio) excitatas perficere: Quinetiam cum alii quidam Nervi procul oriundi huic *Paris vagi* trunco accedunt, cumque ipso prope originem ejus communicant; propterea hoc fieri videtur, ut *Nervi isti*, affinitate cum *Paris vago* inita, in sympathiam cum ipso, ac in functionis involuntaria *ὁμπαξίῃ* trahantur. Hoc de *Nervo à sp. na accessorio*, & quibusdam aliis liquidò constat, ut inferius patebit.

Interim de fibris *Paris vagi* observamus primo, quod surculus insignis versus *Paris septimi* pro. effum vocalem inclinatus, cum eodem unitur, *Figura nona*, e. Hinc ratio desumitur, quare in omni violenta passione, prout iræ, timoris, gaudii, & similium, inconsulto animalis arbitrio, ac sine prævia intentione, lingua vocem affectus excitati indicem emittit; adeo ut non tantum homines, sed bruta quævis inter fugiendum, aut ovandum ejulent ac strideant.

Secundò, Ab hac *Paris vagi* origine plures fibræ in musculos cervicis distribuuntur, *Figura nona*, f. f. f. quibus parum opus videtur ad motus spontaneos in ista parte excitandos; huic enim penso *Nervi vertebrales* satis prospiciunt. Attamen prædictæ *Paris vagi* fibræ in causa sunt, cur in timore, ad omnem strepitum & periculi suspicionem circumagitur cervix, ac insuper cur in quibusvis animalibus ab indignatione aut fastu, musculis quibus hi Nervi inferuntur,

valde inflatis, intumescunt colla, & crista plurimum eriguntur. Quanti usus pro brachiorum motibus patheticis sit Nervus à spina ad Par vagum accessorius posthæc ostendetur.

Tertio, Reliquæ Paris vagi fibra simul colligata, in eundem truncum coalescere videntur, qui statim, surculo à Neruo intercostali ascito, plexum ganglioformem constituit, Figura nona G. H. Et quidem verisimile est, harum fibrarum quæ in Paris vagi truncum simul complicantur, unam Neruo recurrenti, aliam præcordiis, tertiam pulmonibus, ac demum aliam ventriculo destinari; quæ omnes licet inter se communicent, & melioris conductus gratia una colligentur, usque tamen ab ipsa origine distincti, spirituum animalium diversos ductus constituunt.

Quod autem à Neruo intercostali surculus in superiorem Paris vagi plexum deferatur, Figura nona H. ratio est, ut inter hos nervos arcta quædam affinitas & necessitudo intercedat, eorumque alteruter circa alterius munera afficiatur. Cum enim Paris vagi Nervus præcipuè ad præcordia & stomachum, atque intercostalis ad reliqua immi ventris viscera propagines distribuat; observare est, quod inter hæc omnia non modo commercia quædam, sed sympathia & actionum passionumque consensus habentur; quare necesse est ut Nervi utrisque partibus designati inter se communicent. Porro in homine Nervus intercostalis Cordi ac appendici ejus plures surculos ac fibras quam Paris vagi Nervus impertit. Quare hi Nervi non tantum per superiores hos plexus, aut iterum paulo inferius per surculum à plexu cervicali emissum communicant.

E Plexu prædicto Paris vagi ramus insignis in musculos laryngis emittitur; cujus surculus quidam, cartilaginem scutiformem subiens, Neruo recurrente occurrit, eidemque unitur, Figura nona H. Non difficile erit colligere qualis sit hujus Nervi usus; cum enim Larynx, sive aspera arteria, tum anhelitui reciprocando, tum voci modulandæ inservit, in utrumque munus, quo truncus ejus, qui instar plicarum in folliis habet, modo curtior, modo protractior evadat, ipsi annuli cartilaginei modo sursum, modo deorsum contrahi, seu convelli debent. Ut vox gravis efformetur, isti in imum quantum fieri potest deprimuntur: vocem autem si velis acutiorem edere, annuli superiores sursum elewantur; nempe ut sonus non nisi in ipso faucium aditu refringatur. Huic duplici Laryngis motui peragendo (veluti manus Tibicinis, quarum una Tibiæ foramina inferiora, altera autem superiora modulatur) bini nervi constituuntur: videlicet Nervi recurrentis surculi & propagines, ab infra elati, annulos cartilagineos deorsum movent; & Nervus ab hoc plexu desuper emissus annulos statim superiores sursum trahit. Porro quoniam in utrisque nervis consensus quidam & sympraxis requiritur, idcirco mutuo inosculantur. Quinimo cum uterque recurrens crebras propagines in utrumque tracheæ latus distribuat; videtur quod illa in partem dextram emissæ annulos ejus deorsum movent, pro inspiratione & voce gravi; aliaque in sinistram partem utrinque exeuntes, annulos sursum ferunt, pro expiratione & voce acuta. Porro, sicut instinctus pro motu depressionis à recursus, seu reflexionem nodis traditur; ita impressio pro istarum partium elatione ab hoc plexu ganglioformis Neruo accipitur.

Ramus insignis à plexu medio Nervi intercostalis in Paris vagi truncum deferatur, Fig. 9. i. Quem ob finem ita fiat, supra innuitur, nempe ut spirituum in utrisque

utrisque Nervis degentium commercia denuo iterentur; verum annotetur, in sinistro tantum latere sic habere, ubi *Paris vagi* truncus longo ductu singularis perstat; in dextro autem, ubi Nervus recurrens multo superius abscedit, hic alter è plexu intercostali Nervus plane deest.

E regione primæ aut secundæ costæ plexus alius insignis in trunco *Paris vagi* constitit, è quo plures surculi & fibrae versus Cor, & appendicem ejus dimittuntur, Fig. 9. K. Porro in brutis animalibus hic circiter loci Nervus intercostalis *Paris vagi* truncum relinquit. Proculdubio in hoc plexu quidam spiritus animales secedunt, qui Cordis regioni etiam pericardio, & quibusdam vasis ejus destinantur, dum alii spiritus pertranseunt, qui paulo inferius in posticam Cordis regionem derivantur; iique adhuc ulterius proVecti, pulmonibus, ac demum ventriculo debentur.

Observare est, quod à prædicto *Paris vagi* plexu surculi ac fibrae numerosæ dimittuntur, qui in Cordis auriculas & vasa omnia sanguifera Cordi appensa distribuuntur, Fig. 9. l. m. quæ fibrae ac propagines nervosæ, tanquam hederae repentes, vasorum tunicas densissime obducunt, easque pluribus in locis subeunt, ac varie circumligant. Profecto hæc copiosa nervorum distributio in cordis auriculis & arteriis vim pulsificam efficere, aut saltem excitare videtur; partesque istas, perenni spirituum animalium per hos nervos influxu ita erigi & vigorari, ut indiscontinuum systoles ac diastoles reciprocationem sustinere valeant. Insuper autem, quod densæ nervorum fibrae ac propagines venis æquè ac arteriis inferuntur, ac ista utriusque generis vasa stringunt, ac varie circumligant, opinari fas sit, hos Nervos, tanquam lora sanguiductibus istis objecta, eos pro sanguinis motu juxta passionum impetus varie determinando, modo dilatare, modo constringere, aut huc illuc multifariam diducere; etenim hac ratione efficitur, ut in timore sanguinis excursus inhibeatur, inque aliis affectibus motus ejus respectivè alteretur.

Quod autem plures surculi & propagines pericardio inferuntur, in hunc usum fieri videtur; nempe ut capsula ista, quæ muniminis instar Cordi ab injuriis tuendo constituitur, quoties materies infesta ingruit, aut eam obsidet, se contrahere, ac hostem suum excutere valeat: Videtur enim quod Cordis tremores & vibrationes inordinatæ, quæ quidem manifesto à pulsu ejus naturali differunt, ab hujus membrana succussione violenta procedant.

Quoad ramos Cardiacos ab hoc plexu dimissos, observamus ipsos, quoniam muneri publico destinantur, idcirco utriusque lateris pares coire ac invicem communicare debere, priusquam cordi inferantur; quem in finem ante Cordis basin plexus constituitur, ubi prædicti surculi à *Pari vago*, aliique plures ab utroque intercostali Neruo profecti conveniunt. A plexu illo inter Aortam & arteriam pneumonicam constituto, rami plures emissi Cordis hemisphærium superius obducunt: attamen ex hisce rami quidam, subtus Aortam lati, in ejusdem hemisphærii latus sinistrum feruntur; cumque alii pares in dextrum latus tendunt, unus illorum prius arteriam pneumonicam, velut ansula facta circumligat; dein aliis surculis Cardiacis occurrens, plexum minorem constituit, è quo rami in dextrum & anterius Cordis latus mittuntur. Quod à plexu Cardiacō majori nervi ab invicem discedentes itinera contraria versus Cor instituunt, ideo quidem est, ut isti ad diversas Cordis plagas sine mutuo occurso perveniant, atque in transitu respectivè ejus vasa afficiant; nempe surculi hac via

lati Aorta propagines inferunt, atque ex aliis illac euntibus *unus arteriam pneumonicam* circumligat. Utriusque ratio videtur, ut sanguis, pro varia cordis necessitate, è sinibus ejus aut citius, aut tardius exantletur: Dum enim Nervi prædicti motum ejus tum influxu sustentent, tum etiam instinctu moderentur & attemperent, inde adeo evenit ut vasa quoque isthæc, ab iisdem Nervis affecta, ad requisitas pulsum analogias & proportiones sese ultra componant.

Multi sunt quidem, ii que satis conspicui Nervi qui *Cordi* inferuntur, & exteriorem ejus compagem furculis quaquaversus emissis obducunt; neque tamen putandum est, hos Nervos solitarios indiscontinuum Cordis motum perficere & sustentare: quippe tam exiles funiculi tantæ machinæ perpetuò agitandæ impares videntur. Quinetiam observare est, quod plures Nervorum propagines ac fibræ in *Cordis auriculas*, & *vasa appensa*, quàm in *illius substantiam* distribuuntur. Porro, cuivis conspicienti obvium est, majorem Nervorum copiam *pulmonibus*, *hepatis*, *lieni*, *ventriculo*, aut *renibus*, quàm *ipsi Cordi* destinari; ita ut Anatomici quidam (uti *Follopins* refert) in dubium vocarent, utrum Nervi ulli ad Cor spectent, necne. Verum hoc satis evictò, ut Automati hujus potentiam motivam quorundam exilium nervorum, tanquam *Elateris* ope excitatam, designemus: dicendum erit, quod ipsius Cordis compages, carne valde fibrosa constans, potius *musculus* quam *parenchyma* appellari debet. Quare in eo, uti in musculis aliis, *fibræ insitæ* ac *propria motum localem ac vibrationem* constantem efficiunt, per Nervos autem insertos, *motus sive actionis instinctus* tantum conveyitur, cui muneri exequendo pauciores tum Nervi, tum Spiritus animales per eorum ductus influi sufficiunt. Revera spiritus animales Cordi insitos, ac intra fibras ejus scatentes, illuc per nervos primo influxisse supponimus, eorumque impendia tantum hac supplementi via resarciuntur; attamen ut spiritus animales, qui adeo parca manu in Cor dispensari videntur, *perpetuo huic mobili* actuando sufficiant, isti copias velut *subsidiarias à sanguine arterioso* jugiter accipiunt: Namque alibi ostendimus, quod in corde, sicut in toto præterea musculoso genere, *spirituum insitorum particulis spirituosalinis copula sulphurea à sanguine suggesta* adjungitur; quæ materies, dum spiritus agitantur, denuo elisa, ac velut explosa (non secus ac pulveris pyrii particulæ accensæ ac rarefactæ) musculum, sive Cor ipsum, pro nixu motivo efficiendo inflant, ac intumesciunt; adeoque ab indiscontinua Cordis actione multum hujus *copula sulphurea*, quæ facile à sanguine resarcitur, ac *minus spirituum*, qui *nervorum commeatu* adducuntur, impenditur.

Atque hic jure inquiritur, Utrum *Cordis pulsus* à spirituum animalium per nervos influxu ita necessariò dependeat; ut eo prohibito Cordis actio omnino cesset? Pro hujus decisione experimentum sequens in Cane vivo aliquoties tentari curavimus: circa jugulum, cute per longum discissa, utrique *Paris vagi* trunco seorsim arrepto ligatura valde stricta injiciebatur; quo facto, statim canis torpescere visus obmutuit, & circa hypochondria motus convulsivos cum magno Cordis tremore passus est: verum, hoc affectu brevi cessante, postea sine vigore quovis aut vivido aspectu, quasi moribundus jacuit, ad motum quemvis piger aut impotens, ac alimenta quævis oblata

oblata respuens : nihilominus vita ejus adhuc perduravit , nec postquam Nervi isti penitus dissecarentur , statim exstinguebatur ; quin hoc animal per plures dies superstes , tamdiu vixit , donec præ longa inedia viribus sensim attritis enecaretur. Cadavere aperto , sanguis intra Cordis ventriculos , & vasa illinc undequaque protensa , scil. tum arterias , tum venas , valde coagulatus in grumos concreverat ; nimirum proinde , quia sanguis , licet pro vita utcunque sustinenda aliquatenus circularetur , maxima tamen ex parte , tum in Corde , tum in vasis stagnaverat , cujus stagnationis causam non aliam assignaverim , quam quod præcordiis , prohibito spirituum animalium influxu , solitus motus deficeret.

Quod si ultra inquiratur , Unde *spiritus animales* (præcluso utrinque *Paris vagi* ductu) Cordi adhuc motum ejus perennantes suppeditentur : Dico , hoc fieri posse per *Nervos recurrentes* , utpote è quorum nodis surculi & fibræ plures Cardiacæ procedunt ; atque præterea Nervi utriusque extremitas , Nervo à superiori plexu dimisso occurrens unitur. Verum supra ostendimus , quod *spiritus animales* intra *Nervorum ductus ultro citrove* deferri potuerint ; quare , cum vitæ necessitas urget , spirituum penus , diminutior licet , è plexu prædicto dimissa , à *Nervi recurrentis* cauda excipitur ; ac illinc *commeatu retrogrado* in ramos Cardiacos , & demum in Cor ipsum derivatur. Porro , alter quidam transitus , ac iste forsan magis obviuſ , per *Nervi intercostalis ductum* pateſcit : hac via in homine , æque ac *Paris vagi* commeatu , spiritus à cerebro in præcordia convehuntur ; quinetiam in brutis à *plexu intercostali surculus in Paris vagi truncum effertur* ; adeo ut devio hoc tramite , spirituum animalium (si forsan influxus per solitos canales inhibetur) stillicidia quædam Cordi accieri possint. Utcunque experimentum illud concludere videtur , *Cordis motum* non minus à *spiritu animali* , quàm à *sanguinis influxu* pendere : utriusque privatio totalis vitam aufert ; *spirituum Eclipsis* Cordi potentiam motivam prorsus adimit ; atque à *sanguinis defectu* (quatenus *spiritui* Cordis *insito copula sulphurea* denegatur) Cordis vigor ac vis elastica supprimitur ; ut pulsu sensim debilitato , vita paulatim extinguitur. Proculdubio , in tenore pulsus explorando , semper attendi debet , qualis ipsi alteratio *spirituum animalium* , & qualis *sanguinis vitio* inducatur.

Circa Nervos à *Paris vagi* trunco Cordi porrectos adhuc alia consideratio occurrit , nempe quod illorum ductu , non tantum *solennis & status spirituum influxus* , pro *functione vitali* æquabiliter peragenda convehitur ; verum insuper *motus cujusque anomali* , passionum impetu in præcordiis excitati , instinctus etiam hac via aliquatenus transfertur : Super his , inquam , differere oportet , ac ostendere quo ritu , quoties affectus cujusque impressio imaginationem , seu potius appetitum exercet , illico præcordia nervorum ductu perturbantur , & propter varias eorum affectiones sanguinis motus diversimode alteratur. Verum quia in homine ab *intercostali Nervo* æque , ac forsan potius quam à *Pari vago* irregulares & extraordinarii præcordiorum motus dependent ; ideo hanc speculationem , usquedum istius Nervi Theoria proponatur , differre visum est. Interim ad cæteras *Paris vagi* ramificationes procedemus , quodque jam proximè succedit , in Nervorum recurrentium munera & usus inquiramus.

*Nervus recurrens in sinistro latere, à Pari vago infra prædictum plexum abscedens, & versus Aortam dimissus, circa truncum ejus descendentem reflectitur, unde sursum elatus, Trachea, & laryngis musculis propagines ex utroque Nervi latere emissas longo tractu impertit; dein summitas sive apex ejus cum furculo è plexu ganglioformi occurrente unitur, Fig. 9. n. * * * * h. Dexter autem recurrens longè superius, scil. ab ipso Paris vagi plexu inferiori procedens, circa arteriam axillarem reflectitur, ac pari modo alteri Trachea lateri impenditur, Fig. 9. L. Uterque autem recurrens circa reflexionum nodos, furculos & fibras plures versus Cor dimittit, quæ auriculis, vasis appensis, aut plexibus ejus inferuntur.*

Qui sit præcipuus hujus Nervi usus, supra innuitur, nempe ut utrinque circa arteriam velut Trochleam convolutus, Tracheæ annulos, pro spiritu tum anhelando, tum sonoro reddendo, huc illuc, tanquam plicas follium diduci faciat. Enimverò uterque Nervus, quatenus circa arteriam reflexus sursum in partem movendam effertur, *Tracheæ annulos* per quasdam ejus propagines *deorsum movet*; quatenus item uterque in *Nervum à plexu ganglioformi dimissum* terminatur, Tracheæ plicas per alias ejus propagines *superius ducit*. Hinc ratio reddi potest, cur Nervis recurrentibus præscissis, Animal quodvis statim obmutescit; quia scil. nisi *Trachea moveatur*, spiritus efflatus Cavitatem ejus quasi fistulam in toto ductu æquabiliter cavam, sine ulla refractione pertransiens, sonum non edit.

Circa hos Nervos inquiri debet, quæ sit discriminis ratio, quod *reflexioni nodi* in utroque latere non eodem modo habent; item in quem finem ab *utrisque nodis rami cardiaci* procedunt. Quoad prius, quod *sinister recurrens*, non uti *par ejus*, *arteriam axillarem* circumligat, aliqualis ratio esse videtur, quia sinistra arteria axillaris inferius oriunda, *transitu declivi*, & *non recto*, prout dextra, in brachium deferitur; quare Nervi funiculus truncum ejus circumambiens, non *fixum reflexionis nodum*, sed valde *mobilem* haberet, quippe loco facile dilabi possit. At verò potius dicendum videtur, in alios usus & magis *necessarios* comparatum esse, ut hi Nervi vasa isthæc eo modo circumligent: Cum enim isti, tanquam *fræna* aut *lora vasis sanguiferis* injiciantur, eadem huc illuc convellendo, sanguinis decursum variè determinent; requiri videtur ut recurrens unus *arteriam axillarem*; ac alter *Aortæ truncum descendentem* constringeret: nam quoties opus est sanguinem versus caput paulo uberius proripi, Nervi recurrentes, prædictas arterias sursum convellendo, illud facile præstant: Atqui *sanguis* quadantenus in *superiora* continuo sollicitari debet, qui secus *pondere suo* inferius nimis verget. Quapropter in omni expiratione, cum Trachea plicas suas propius adducens sursum contrahitur, unà funiculi nervei tractu sanguis per Aortam descensurus superne corripitur, simulque in dextro latere arteria axillari pariter succussa, sanguis in toto Aortæ trunco ascendente scatens, paulò celerius sursum propellitur.

Cæterum præter hanc perennem & æquabilem sanguinis versus superiora correptionem, iste interdum *occasionaliter*, à magis intenso & citatiore Tracheæ motu, etiam pleniore & magis celeri cursu versus caput sollicitatur. Quoties enim animalia quævis *ira excandescunt*, illico *voces* talis affectus indices emittunt, easque sæpius increpando acriter intendunt; uti homines irri-

rati rixantur & objurgant, canesque latrant: Ab ejusmodi autem *vocis intentione & objurgatione*, ut Tracheæ annuli superiores, reciprocatione illic facta, sæpius colliduntur; ita sanguis etiam (Aorta fortiter attracta) copioso affluxu sursum urgetur, adeo ut iratis illico vultus & oculos rubore inficiat, ipsique cerebro æstum ac iræ stimulos intendendo, spiritibus excandescantiam majorem inducat. Ob eandem rationem in *bilaritate & gaudio*, in quantum Trachea cantu aut risu exercetur, etiam sanguis versus exteriores, ac superiores præsertim partes uberius suffunditur.

Atque hinc causa patet, quare *Nervus uterque recurrens à reflexionis nodo ramos cardiacos dimittit*; nempe ut in ejusmodi affectibus, quorum indices Trachea sonos aut voces, ope Nervorum istorum edit, Cor ipsum suo quoque modo afficiatur. Ita enim verò quoties rixamur, Cor irritatum illico sanguinem magis accendit, eumque uberius in ejusdem affectus pabulum versus cerebrum propellit. Quinetiam in *risu, ovatione, aut cantu*, istorum Nervorum ductu, Cor in Tracheæ consensum & sympraxin adductum; celeriori statim pulsu sanguinem explodit, eumque aliàs tardiore motu aut stagnatione molestum ac gravem futurum, præpropere foras ejicit; quare ejusmodi actiones, scil. *risus & cantus, cor alleviare dicuntur*, quia sanguinem è Cordis sinubus liberius & promptius elutriari, & insuper succenturiante pulmonum ope, in ipsos exantlari faciunt.

Infra recurrentis sinistri productionem Nervus alter insignis versus posticam Cordis regionem deferitur, qui ambitu quodam circa basin ejus delatus, propagines crebras dimittit, quæ latus sinistrum hemisphærii posterioris obducunt, Fig. 9. o. Dein hic ramus alteri pari è latere opposito versus Cor dimisso, & in posterioris hemisphærii latus dextrum propagines distribuenti occurrens unitur, Fig. 9. q.

Hic Ramus cardiacus postica cordis regioni destinatus, infra cæteros seorsim producit, ut sine aliorum occurso aut implicatione ad provinciam suam solitarie feratur; utrinque pares inosculantur, ut unà comitentur, ac in eadem Cordis actione simul trahantur. Haud plane constat, utrum hi Nervi cum aliis Cardiacis superius oriundis, ad Cordis hemisphærium anterius exporretis conspirent; vel an non hi pares Cordis systolen, & superiores diastolen ejus efficiunt. Utcunque habet, propagines quædam alterutrius proſapiæ cum aliis alterius inosculatæ invicem communicant.

E regione Cordis Paris vagi truncus plures insignes ramos utrinque dimittit, qui in omnes quaquaversus pulmonum lobos, Tracheæ bronchia, ac œsophagi juxta descendens tunicam disseminantur, Fig. 9. s s s. qui in pulmones abeunt, ubique per totas illorum compages, arteriarum & venarum ramificationes atque bronchiorum ductus assequuntur, quos equidem sanguinis ac aëris canales, in toto illorum tractu, varie superſcandunt & circumligant.

Quandoquidem tot insignes Nervorum ramificationes pulmonibus impenduntur, mirum est ipsos à nonnullis insensiles ac per se immobiles statui. Quinimo à plerisque in dubium vocatur, utrum hæc viscera proprio nisu suos ipsorum systoles ac diastoles motus efficiant: Quippe recepta opinio est, istam pulmonum reciprocationem à Thoracis motu omnino procedere, ejusque dilatationi & constrictioni necessaria quadam dependentia obsequi; nempe pectus dilatatum, follium ritu, aërem ambientem in Tracheam co-

gere, qui pulmones irruens ipsos inflat ac distendit; dein eodem pectore ultro subsidente, pulmones ipsius pondere compressos aërem prius intrusum denuo exspirare. Revera, utrunque existimem *diaphragma ac pectoris musculos* respirationi multum conducere; tamen partes istas hoc munus solitarie perficere, & pulmones mere passivos esse, minimè concedo: Nam *respiratio sanguinis ac Cordis gratia* præcipue instituitur, ejusque actus pro varia horum crassi determinari, & pro multiplici pulsus necessitate fere quovis horæ minuto alterari solet: At verò ipsi pulmones sunt (ac minime diaphragma, aut thoracis musculi) quos sanguis è Corde ebulliens pertransit, & juxta temperiem suam atque pulsus tenorem continuo afficit: quare hinc concludere liceat, *ipsos pulmones primos motuum suorum instinctus* concipere, & prædictorum Nervorum ope sese aliquatenus exercere, atque systolen & diastolen moliri, easque juxta propriæ necessitatis sensum designare; cum verò his fibræ pro motu locali requisitæ defunt, ideo diaphragma & Thoracis musculi pulmonum inceptis è vestigio succenturiantur, atque horum connixu respiratio completa efficitur. Cumque adeo *Nervi duplicis generis*, nempe quidam à *spina* diaphragmati & Thoracis musculis inserti, aliique à *Pari vago* in pulmones distributi, organa respirationis actuant; proinde fit, ut ipse respirationis actus, per se *aliis* & involuntarius, pro libitu nostro aliquantulum cohiberi, interrumpi, ac diversimode alterari possit. *Nervorum utriusque generis* in respirationis opere *symp Praxis* posthæc ostendetur, cum de *Nervo diaphragmatis* speciatim dicemus.

Pulmones in respirationis actu sæpe primos esse adhuc amplius constat, quoniam illi ab objectis extraneis & improporionatis irritati, statim motus anomalos & violentos concipiunt: uti cum tussis vehemens propter molesti cujusvis exclusionem cietur; cui motui diaphragma & Thoracis musculi statim obsequuntur. Pariter in respiratione anhela, fuspriosa, aut alias inæquali, primus ejus instinctus plerumque à pulmonibus incipitur; quandoque tamen cum exteriora respirationis organa in motus irregulares excitantur, etiam pulmones eorum anomaliis obtemperare coguntur; ita cum diaphragma quoquomodo affectum risum orditur, pulmones cachinno subsequente eundem perficiunt: adeo cuncta respirationis organa intime conspirant inter se ac consentiunt, ut ex illis inordinate uno licet agente, potius quam *schisma* fieret, cætera illius anomalias imitentur.

Quod autem Nervi arterias & venas per totas pulmonum compages affecuti, earum truncos densa propaginum serie investiunt, & varie circumligant, ratio esse videtur, tum ut vasorum tunicæ constanti spirituum animalium influxu dotatae Cordis motum imitentur; proindeque jugi arteriarum pulsatione, & venarum constrictione, sanguinem in breviori hac sua per pulmones lustratione facile traducant; tum vero potius, ut vasa pneumonica talibus nervorum habenis constricta, sanguinis cursum juxta passionum impetus & instinctus moderentur. Cum enim exterior sanguinis circulatio ab hac interiori dependeat; prout sanguis citius aut tardius pulmones trajicere, aut inibi fisti vel coërceri jubetur, etiam excursus reditusque ejus à Corde, aut versus ipsum in toto peragitur. In gaudio vel ira, quia pulmones sanguinem ex uno Cordis sinu in alterum rapide transferunt; ideo velocior ejus ac uberior effluxus in
partes

partes exteriores succedit : pariter in metu ac tristitia , quatenus pulmones (vasis ejus constrictis) sanguinem per *venas* Cordi tradunt , nec denuo statim per *arterias* repetunt , extrema corporis regio debito ejus influxu destituitur. Attamen hujusmodi *pathetici sanguinis raptus* , propter vasa ejus aliis in locis pariter à Nervis circumligata , quadantenus peraguntur. Si quando *Nervos pneumonicos* à causa morbifica affectiones spasmodicæ affligerint , ita ut motibus inordinatis convulsi , arterias & venas quas amplectuntur , perperam constringant , aut huc illuc contrahant ; propterea *sanguis* , aut *pulmonibus* nimis *exulans* , eos flaccescere ac in se concidere facit , adeo ut aërem copiose attrahentes ipsum haud facile reddant : vel quod crebrius usu venit , *sanguis intra pulmones detentus* , ibidemque stagnans , eos *infercit* , ac diu *rigidos tenet* , ut aërem inspirare nequeant. Utriusque generis symptomata in *affectibus hysteri- cis* & *quibusdam hypochondriacis* passim contingunt. Quinimo interdum ipsa *bronchia* pari nervorum spasmō convelluntur , ac in motu suo præpediuntur quominus debito modo aërem inspirent expirentque , prout in *paroxysmis Asthmaticis* cernitur : cujusmodi affectus sæpe numero à Nervorum vitio sine insita quavis pulmonum dyscrasia producuntur. Aliquoties adverti quosdam ægrotantium casus , in quibus cum uno tempore *materies morbifica cerebrum obsidens symptomata lethargica* aut *vertiginosa* induxerat , paulo postea eadem *materies nervorum* ad pulmones spectantium *origines* aut *medios processus occupans* , sine tussi aut catarrho præviis , *Asthma horrendum* derepente excitavit.

Quod vero ex eodem Paris vagi tractu surculi plures in pulmones , simulque multi alii in œsophagi tunicas distribuuntur ; hinc ratio potest reddi , cur tussis molesta sæpe vomitum & ventriculi subversionem infert ; item cur , vice versa , ventriculi perturbatio ita crebro molestum tussiendo conatum inducit. Novi in hypochondriacis , quod alimenta dyspepta stomacho ingesta , mox tussim inanem & valde pertinacem excitaverint ; interim ut pulmones diathesi quavis tabida satis immunes fuerint. Utriusque autem affectus causa videtur esse , quod cum Nervi in alterutra parte disseminati *spasmo corripereantur* , sæpe qui alterius sunt partis in ejusdem affectus consensum trahuntur. Forſan hinc contingit , quod interdum *Asthma* propter *ventriculi labem* inducitur ; quodque affectus iste (uti *Riverius* observat) sæpius à pharmaco emetico curari solet.

Post tot ramos & surculos à *Pari vago* utrinque dimissos , tandem *truncus* ejus *infra pulmones* in duos ramos , scil. *exterio- rem* , ac *interiorem* finditur , quorum utrique , *versus pares ramos alterius lateris inclinati* , *iisdem uniuntur* , & post mutuam *communicationem binos ramos stomachicos* , scil. *superiorem* & *inferiorem* , constituunt , Fig. 9. t. II. vv. x.

Observatu dignum est , quam miro artificio *uterque Paris vagi truncus* , duobus ramis , velut geminis manibus , invicem commissis , cum alterutro communicant , priusquam ad ventriculum pervenitur ; eo quidem fine , ut utriusque Nervi influentia ad unamquamque stomachi regionem & partem æqualiter pertingat : Cum enim *uterque ramus stomachicus* , scil. *tum superior* , *tum inferior* , è binis ramis ab utroque *Paris vagi* latere prodeuntibus conflatur ; una providetur , ut spirituum qui ventriculo destinantur , *tributa sint certa*

& valde *copiosa* : Nam istius visceris actionem , seu Chylificationem quod attinet , ad illam peragendam , spiritus ex utroque latere influi , in orificium & exinde in singulas ejus partes & recessus , affatim distribuuntur ; eoque factum est , ut stomachus supra menstrui cujusvis chymici virtutem corpora dissolvat. Tum præterea , quantum ad *ventriculi sensationem* , sive ab *ingestis affectionem* ; ista versus ἐγνέφαλον (quo certior fiat commeatus) duplici quoque via , per utrumque sc. *Paris vagi* caudicem , defertur , ut propterea *sensu maxime exquisito præditus* circa objecta sua minime decipiatur ; & inter comesta , si quod hostile ac ipsi adversum lateat , illud sua sponte , aut saltem cerebello tantum conscio , discernat , ac foras exterminet.

Quod ab eodem gemino *Paris vagi trunco* , unde *Nervi cardiaci paulo superius oriuntur* , etiam *rami stomachici procedant* , causa patet , quare tantam sympathiam Cor ipsum cum stomacho habet , adeo ut majori hujus vellicationi illius deliquium succedat.

Uterque *Paris vagi Nervus* in ipso *ventriculo terminatur* : postquam enim *octava Conjugatio* , pro spirituum animalium commeatu , ad præcordia & nobile hoc viscus vim quasi regiam struxerit , sibi limitem ponit ; nec quidem par fuit , ramos ejus ulterius ad viscera imi ventris protendi : quippe indignum videtur , eodem tramite quo ad ipsa vitæ palatia & præcipuam victus officinam ducitur , ad viliora etiam intestina & totius corporis cloacam aditum patescere. Et vero licet *Paris vagi callis amplior & via lata* non ultra ventriculum producitur , quia tamen huic & præcordiis , cum partibus aliis inferius repositis , commercium frequens intercedit ; idcirco inter stomachum & alia , vilioris licet usus viscera , *fibræ quadam* , velut *semitæ minores* , protenduntur in quibus saltem *spirituum manipuli* , velut *exploratores* , aut *internuncii* , ultro citroque discurrunt.

C A P U T XXV.

Nervi Intercostalis Descriptio.

POST explicationem *Nervi* ad *præcordia & ventriculum* protensi , partium internarum serie ducimur ad describendum *Nervum huic affinem* , quique ad finitimam provinciam , nempe ad *viscera omnia imi ventris* infra ventriculum contenta , ramificationes suas exporrigit. Hic *Intercostalis* vulgo appellatur , eo quod juxta costarum radices incedens , in singulis earum interstitiis à medulla spinali ramum accipit. Origo ejus nondum satis detecta fuit ; nam à plerisque Anatomicis pro ramo *Paris vagi* perperam sumitur : cum revera licet *Par vagum & Intercostale* per surculos invicem emissos inter se communicant , tamen quoad utriusque principia , truncos & divaricationes planè distinguuntur. Quod si hæc posterior Conjugatio , peculiaris *Nervi* titulo ei denegato , pro sapiam alienam confiteri debeat , certe *Pari vago* nihil debet , sed *Nervis Parii quinti & sexti* originem suam acceptam refert ; nam bini aut tres surculi à nervis istis versus oculos & faciem euntibus reflexi , in eundem caudicem , qui *Nervi intercostalis truncus* est , evadunt , prout supra innuitur.

Nervus

Nervus intercostalis eo ritu constitutus, & cranio per foramen proprium egressus, mox *plexum ganglioformem*, prope alium similem *Paris vagi plexum*, continet; in quem duo nervosi processus à Pari intra cranium ultimo, seu primo vertebrali feruntur. Ab isto *plexu* surculus unus in *sphincterem gula*, atque alter insignis in *plexum ganglioformem Paris vagi* dimittitur. Deinde hic Nervus juxta vertebrae descendens, in media cervice *plexum alium* longè majorem habet, in quem Nervus amplius à vicino *Pari vertebrali* inferitur; ab eodem verò plures *Nervi* qui *præcordia* respiciunt, quaquaversus distribuuntur: Nam duo vel tres surculi in *diaphragmatis Nervum*, surculus unus in *Nervum recurrentem* mittuntur; præterea fibræ, & propagines numerosæ, & in recurrentem nervum, & versus *Tracheam* feruntur, quæ ipsius & oesophagi tunicis atque vasibus sanguiferis inferuntur; porro ramus in *Paris vagi truncum*, & bini notabiles *Nervi* in *plexum Cardiacum* descendunt; dein paulo inferius Nervus alter solitarius, è trunco intercostali procedens, etiam *plexui Cardiacum* inferitur: Qui rami insignes à *Nervo intercostali* utrinque dimissi, quatenus cum aliis ab utroque *Paris vagi* trunco derivatis una coeunt, ipsum *plexum cardiacum* efficiunt. Attamen hi *rami cardiaci* à *Nervo intercostali*, sicuti & *plexus cervicalis*, à quo procedunt, homini peculiare sunt, atque in brutis animalibus omnino desiderantur.

Truncus intercostalis à *plexu Cervicali* versus claviculam descendit, ubi pectoris cavitationem ingressurus, in artiam axillarem veluti ad rectos angulos incidit, eamque stringit; unde in Thoracem juxta primæ & secundæ Costæ radices demergitur, atque illic tres vel quatuor ramos à *Nervis vertebralibus* proximè superioribus accipiens, *Plexum alium insignem* (qui vulgo *intercostalis* appellatur) constituit. Supremus *Nervorum vertebralium* huic *plexui* accedens, in itinere arteriam vertebralem stringit, ac ferè circumligat. In brutis per hunc Nervum, qui arteriam vertebralem stringit, *plexus intercostalis cum radice Nervi diaphragmatis* communicat, & non alio modo nisi per fibras minores ab infima parte hujus *plexus* in *Nervos vertebrales* emissas. Porro in brutis ramus insignis ab hoc *plexu* in truncum *Paris vagi* effertur. Verùm in homine *truncus intercostalis* Thoracis cavitationem, sine ulla communicatione cum aliis partibus habita, pertransit; nisi quod hinc, in toto descensu, juxta costarum radices incedens, in singulis earum interstitiis, & deinceps usque ad eos sacrum, à vertebrarum internodiis *ramum vertebralem* admittit.

Par intercostale, ubi Thoracis cavitate emensa è regione fundi ventriculi pervenerit, utrinque *ramum insignem* dimittit, qui versus *mesenterium* tendens præcipuos illius *plexus* constituit. Sunt autem *plexus mesenterici* numero septem; videlicet quinque magni superiores, & duo minores inferius siti: è quibus omnibus propagines & fibræ numerosæ in partes quas respiciunt, inque *plexus* vicinos invicem mittuntur. *Nervi mesenterici*, qui in hos *plexus* feruntur, ipsique *plexus*, ac demum fibræ & propagines, quæ tanquam lucis radii ab iis quaquaversus emanant, juxta modum sequentem, tum in homine, tum in brutis perfectioribus disponuntur.

Itaque in sinistro latere ramus mesentericus à *Nervo intercostali* abscedens, & deorsum vergens, in duos surculos insignes dirimitur: horum major superius versus stomachum reclinatus, mox in *plexum*, velut rivulus

lus angustus in stagnum amplum se diffundit. E plexu hoc fibræ & propagines numerosæ per *quatuor* velut *manipulos* egrediuntur. *Primus* horum, qui & maximus fibrarum ejus fasciculus est, in *ventriculum* elatus, partim fundo ejus impenditur, partimque hæ fibræ aliis à ramo stomachico dimissis occurrunt ac inosculantur. *Alter* fibrarum nervearum manipulus ab hoc plexu ad *lienem* progreditur; ubi Nervi vasa sanguifera comitati, eaque varie circumligantes, in penitiorem lienis compagem dispescuntur; è quibus tamen versus lienem euntibus surculi quidam *vasa brevia* assecuti in *Stomachum* feruntur. *Tertia* fibrarum nervearum cohors inter *hunc plexum & hepaticum*, in latere dextro è regione positum, interjecta est. *Quarta* denique fibrarum Conjugatio *hunc & plexum* mesenterii *maximum* ei subditum connectit.

Inferior rami mesenterici, qui è sinistro latere est, *surculus* in plexum succrescit, ad quem ramus proximus vertebralis, Nervo intercostali destinatus, perducit: Ab hoc *plexu* præcipuus *fibrarum nervearum fasciculus* in *renem* sinistrum defertur, fibræque ante renis ingressum vasa emulgentia stringunt, & varie circumligant: porro inter hunc plexum, & mesenterii maximum, plures fibræ protenduntur; hinc etiam multæ propagines in capsulam atrabiliariam distribuuntur.

In *dextro latere* ramus mesentericus à trunco intercostali dimissus, & pariter bifidus, in *surculo* ejus *superiore plexum hepaticum* continet; è quo maximus fibrarum nervearum fasciculus versus *hepar* effertur; cujus numerosæ propagines vasa sanguifera comitatæ, arteriæ hepaticæ truncum valde stipant, & veluti facto reticulo investiunt: Quæ fibræ & propagines superius elatæ, in *hepar*, in *cystin felleam*, *ductum choledochum*, *pylorum*, & *pancreas* disseminantur. Porro multæ quæ hujus Conjugationis sunt *fibræ*, propaginibus & fibris ab utroque Nervo stomachico dimissis occurrunt, iisdemque inosculantur. *Alius* fibrarum nervearum *manipulus* inter hunc *plexum & lienarem* oppositum, *alterque* inter *hunc & maximum mesenterii plexum* protenditur; quinimo inter *hunc & Renalem* ejusdem lateris subjectum, per *surculum* amplum dimissum, communicatio quædam habetur.

Surculus inferior rami mesenterici dextri pariter ac in latere opposito habet, prope capsulam atrabiliariam *plexum* satis notabilem continet; cui statim Nervus intercostalis ramum suum vertebralem inferius acceptum impertit. Ab hoc *plexu* præcipuus fibrarum Nervearum fasciculus, *Reni* destinatus, vasa sanguifera, pari modo ac in latere opposito est, amplectitur; item multæ fibræ & propagines ab hoc *plexu* ad *vicinos*, sc. *hepaticum* & mesenterii maximum protenduntur; quinimo ab eodem fibræ quædam in *capsulam atrabiliariam* disperguntur.

Ad hunc modum *uterque ramus mesentericus*, à *Pari* intercostali profectus, & statim bifidus, *binos* in *utroque latere plexus* immediate constituit. In medio horum, *plexus omnium maximus*, velut *Sol* inter *ceteras planetas*, consistit; è quo *surculi* & fibræ numerosæ in omnes mesenterii partes disperguntur; quæ quidem in toto processu vasa sanguifera assequutæ, eadem varie superscandunt & circumligant. Porro inter hunc plexum & singulos quatuor prædictos, peculiaris fibrarum fasciculus producitur: Insuper in sexu fœmineo hinc propagines quædam in uteri glandulas, Testes vulgo dictas, feruntur.

Attamen

Attamen à ramis mesentericis, qui priores plexus constituunt, nulli insignes rami, sed tantum minores surculi, in hunc plexum mittuntur. Quinimo *Præcipuus Nervus* qui huic inseritur, & spirituum copiis in ipsum convehendis primarius & via lata esse videtur, à *plexu* quodam *exiguo*, longe inferius juxta intestinum rectum nato, effertur; qui *plexus* una cum altero vicino suo, quos *mesenterii plexus minores* appellamus, mox describetur: interim, ut ad eos ordine perveniamus, *Nervi intercostalis* ductum sequemur.

Infra ramos mesentericos, à quibus prædicti *plexus superiores* constituuntur, *intercostalis truncus* inter lumborum musculos descendit, atque *ramum* quemlibet *vertebralem* in descensu admissum partibus quibusdam internis impendit.

Ramus enim *vertebralis*, *trunco intercostali* juxta renes utrinque adductus, in *testes foemineos*, dein aliquot sequentes in *ureteres* feruntur: E regione vigesimæ septimæ vertebrae, ramus unus *vertebralis*, & bini alii ab *intercostali trunco* profecti versus rectum intestinum tendunt, ibidemque ternis paribus ab altero latere emissis occurrunt; qui omnes simul uniti, *plexum*, qui *abdominis infimus* est, constituunt. A plexu hoc Nervus insignis, sursum elatus, in maximum mesenterii plexum effertur, qui in itinere surculum unum, & deinde alterum, à Nervo intercostali utrinque dimissum accipit; idemque prope metam suam propagines quasdam in *glandulas uterinas* distribuit.

Cæterum à *plexu prædicto infimo* Nervus versus superiora circiter unciae spatium incedens, *plexum alium minorem* in vicinia constituit; è quo Nervus unus *sursum*, & alter ex opposito *recta deorsum* tendit. Prior horum in plexum mesenterii maximum defertur, atque in toto transitu intestinum rectum & coli partem subtendit, iisque multas exiles propagines inserit. Alter autem ab hoc plexu Nervus, versus anum sub intestini recti parte inferiore descendens, ei crebras item propagines impertit; adeo ut *hic plexus* omnium qui intra abdomen sunt *minimus*, tantum istius Nervi gratia, qui sc. intestino recto colique parti substratus, plexui mesenterii maximo inseritur, constitutus esse videtur.

A *plexu vicino infimo*, cui *hic minimus* originem debet, duo Nervi prodeuntes, atque in pelvim dimissi, *bino ibi plexus*, sc. in alterutro latere unum, efficiunt, in quos nervi ab osse sacro asciti & prioribus inosculati coeunt; è quibus vero nervi in partes adjacentes distributi, singulis excretionibus, sc. *urinae*, *stercoris*, & *seminis* illic loci factis, prospiciunt: nam *duo nervi intestini recti* extremitatem subeunt, totidemque in *uterum*, aut *prostatas*; unus autem, isque insignis, in *vesicam* defertur.

Ut vero ad *Par intercostale* redeamus, postquam uterque ejus truncus tres ramos, è quibus inferiores prædicti abdominis plexus mediate aut immediate constant, emiserat, recta versus os sacrum descendit, atque in itinere propaginem adhuc unam aut alteram in ureteres dimittit: quamprimum autem ad principium ossis sacri pervenitur, ambo Nervi ad se mutuo inclinati, intra ejusdem ossis curvaturam demerguntur, ibidemque juxta declivitatem ejus, & deinde in suo descensu, super ipsum duobus aut tribus processibus simul connecti videntur; atque ita demum *uterque nervus* in *fibras minutas* desinit, quæ in *sphincterem ani* distribuuntur: quandoque tamen prope unum

processum transversum uterque Nervus in *plexum rotundum* coeunt, è quo singulari plexu similes fibræ minutæ producuntur. Porro istis fibris ab *intercostali Paris* ano insertis multæ aliæ à *Nervo ultimo vertebrali* occurrunt, ac mutuo inosculantur.

CAPUT XXVI.

Nervorum Paris intercostalis, qui in priori Capite describuntur, quoad eorum munera & usus explicatio: ac imprimis eorum ramificatio superior expenditur.

Nervi intercostalis principium, sunt bini vel tres surculi à Nervis quinti & sexti Paris reflexi, at in eundem truncum uniti, Fig. 9. D. a. a. b. Hic admirari subest Nervi hujus natales velut *mutuatitios*; succrescit enim ut *frutex super alio frutice*, ideoque ramificatione duplici, scil. tum propria, tum ista parentis sui, communes utriusque virtutes ac influentias dispensat: qua ratione efficitur, ut inter *cerebri conceptus præcordiorum affectus*, necnon inter *actiones passionisque* fere omnium totius corporis partium, quæ ad functionem involuntariam pertinent, *consensus & commercia* quamcitissima habeantur. Nam in quantum Nervi intercostalis truncus à Paris quinti & sexti Nervis prope origines eorum procedit, id indicio est, tum spirituum animalium influxus, tum motuum obeundorum instinctus, in ipsum à *Cerebello* potissimum derivari; è cuius nempe *annulari processu* prædicta nervorum Paris oriuntur. Quatenus autem idem intercostalis nervus in illorum Caudicibus, & non immediate in cerebello radicitur; hæc ratio est, cur oculi, necnon oris & faciei partes, quibus *Par quintum & sextum* prospiciunt, adeo prompte, & cerebello inconsulto, eodem velut actu, præcordiorum & viscerum motibus, quos Nervus intercostalis efficit, cor respondeant; & vice versa, illarum actioni horum motus è vestigio obsequantur. Ex. gr. in *sternutatione*, quamprimum fibræ nervosæ nares oblinentes à vellicatione corrugantur, illico Nervi intercostalis commeatu, diaphragma propter inspirationem altiore aliquandiu deprimitur; dein narium spasmo remittente, etiam septum violenter retractum *involvitur* fortiore cum vehementi aëris exsufflatione præstat: Pariter è contrà, cum à *titillatione* super costas facta diaphragma spasmo affectum cachinnos movet, unà facies & ora in risum pathetice configurantur.

Nervus intercostalis Cranio elapsus illico plexum Ganglioformem constituit, Fig. 9. G. Eodem ritu habet in trunco *Paris vagi*. Quis sit plexuum horum usus in genere, supra ostendimus: & eadem plane ratione hic loci in trunco intercostali, ubi Nervos quosdam aliunde in se recipit, aliosque in partes vicinas à se dimittit, Plexus hic, quasi nodus in caudice arboris fruticescentis excitatur:

excitatur ; nempe ut pro multifaria spirituum tendentia , spatium quod instar diverticuli sit , concedatur. Quoad *Nervos adventitios* , observare est, per eos spirituum copias subsidarias tantum à spinali medulla , sed multipliciter & crebro aditu huc transmitti : quare in hoc plexu , iterumque in sequenti , dein paulo inferius , juxta singulas vertebrarum juncturas , *ramus vertebralis* ad utrumque *Pari intercostalis* truncum accedit : Id quod ob plures usus ita institui videtur , Scil. *primò* , ut Nervus intercostalis , iterata hac ad partes solidas appensione , quasi crebro fulcimine ad longum iter conficiendum firmior evadat , cum alioqui funiculus ejus nimia protensione facile dirumperetur. *Secundò* , Hac ratione efficitur , ut Nervi , qui functionis spontaneæ , quique involuntariæ executores sunt , & certiora invicem commercia habeant , & in mutua interdum subsidia excitentur. Hinc *respiratio* & alii quidam actus , imprimis qui circa ἀποδίωξις versantur , utriusque regiminis participant , ut *voluntatem modo sequantur, modo ipsam licet invitam trahant*. Porro , si quando spirituum animalium penus in alterutra provincia deficiat, eorum supplementa ab altera petantur : nimirum (prout suprà innuimus) si spirituum per *ductus ordinarios* , scil. *nervos internos* , versus præcordia influxus præcludatur, illorum commeatus ad vitam sustinendam requisitus per *ramos vertebrales* substitui potest : quinimo probabile est , in *Apoplexia partiali* ac in *Incubo* , cum cerebello affecto , spiritus ad Cor destinati in ipso fonte eclipsin patiuntur , per isthæc emissaria , nempe ramos vertebrales *Pari intercostali* insertos , subsidia quædam extemporanea pro Corde actuando deferri. *Tertiò* , Rami vertebrales ita crebra insertione Nervu intercostali adjunguntur, aliquatenus forte eum quoque ob finem , ut humiditates superflue aut excrementitiæ circa spinalem medullam congestæ per istos processus amandentur : enimverò humorem quendam intra ἐγκέφαλον , appendicem medullarem , ac systema nervosum scaturire , supra ostendimus , ipsumque (si quando aquosior fiat, aut ultra modum exuberet) sæpe in partibus istis colluviem serosam progignere : quapropter cum Nervi intercostalis rami in mesenterium, renes, intestina, & quasdam partes genitales terminentur ; in has cloacas humiditates superfluas , non modò *proprias* , at insuper *alienas* , scil. à *Nervis spinalibus acceptas* , ipsos transferre probabile est.

Quoad *Nervos* qui velut *emissaria* à prædicto Plexu ganglioformi in alias partes feruntur , observamus primò , quod *surculus insignis hinc in gulæ sphincterem defertur* , Fig. 9. γ. Hic Nervus in sphinctere gulæ , aliis affinibus à *Pari quinto* superius oriundis , ac in palati ac oris partes distributis correspondet, iisque in manducationis opere succenturiatur : cum enim *Pari quinti* maxillares rami pro alimentis ingerendis masticationis negotium suum peregerint, Nervi hujus etiam à *Pari quinto* mediatè oriundi pensum succedit, quo nempe, reſerata gula , cibi masticati in ductum ejus protrudantur.

Surculus alter ab hoc plexu in similem Pari vagi plexum juxta positum protenditur, Fig. 9. α. Hujusce insertionis ratio , ubi de *Pari vago* egimus , superius traditur. Cæterum de illa illic insuper observare est : cum inter hos plexus communicatio tam propinqua intercedat , cumque ab uno eorum in musculos laryngis , ac ab altero in musculos gulæ surculi mittantur ; rationem hinc assignari posse , cur in *affectibus hystericis* & quibusdam *hypochondriacis præfocatio-*

nis sensus in gutture symptoma ita crebrum & familiare existat. Enimverò Spasmus in Nervo quopiam incipiens, ejusdem ductu ulterius prorepere solet, adeoque partes modo has, modo illas successive invadere: si quando igitur Spasmus in utrovis *Paris vagi* aut *intercostalis Nervo* alicubi oriatur, & exinde sursum aut deorsum tendens, ad alterutrum plexum pervenerit, illico ambo affectis, musculisque in tota vicinia contractis, in gutture *mola*, seu tumor globi instar, cum præsocationis sensu excitatur.

Nervus intercostalis paulò inferius descendens, in Cervice plexum alium majorem, homini proprium continet, cui Nervus insignis vertebralis inseritur, item è quo Nervi plures præcordiis destinati quaquaversus emittuntur, Fig. 9. T. Inter Hominem & Brutum, quoad partes principales, nempe *Cerebrum & Cor*, haud tam magnum discrimen occurrit, quàm est circa *Commeatum ab uno ad alterum*, sive commercium quod istæ partes ad se mutuò habent: in utraque specie, propter functionis vitalis Exercitium, spiritus animales ab *ἐνφύω* in præcordia constanti emanatione derivantur; quali eorundem influxui Nervorum *Paris vagi* ductus sufficiens videtur: quare in plerisque brutis tantum hac via, & vix omnino per ullos *Paris intercostalis* nervos, aditus ad Cor aut appendicem ejus patescit. Verum in homine, nervus intercostalis, præter officia ejus in imo ventre huic cum cæteris animalibus communia, etiam ante pectoris Claustra *internuncii specialis* loco est, qui *Cerebri & Cordis sensa mutua ultra citraque refert*. Cum enim præter *vagi Paris* nervos, etiam in præcordia humana attensos, (qui certe ad functionis mere vitalis munia exequenda satis videntur) totidem insignes rami à prædicto plexu intercostali mittuntur, quodnam muneris genus his attribui potest, nisi ut spiritus animales contineant, quorum opera & ministerio *Cerebri & Cordis mutui respectus & affectiones* invicem communicentur? Dum hanc utriusque speciei differentiam perpendo, succurrit animo, *bruta* esse velut machinas apparatu simpliciore & minus operoso fabricatas, proindeque tantum *unius generis motu instructas*, sive ad idem prorsus agendum determinatas. Attamen in homine diversimodæ motuum series, & velut rotarum intra rotas complicationes apparent. Enimverò prædicti plexus commeatus *cerebri conceptus* statim afficiunt Cor, ejusque vasa, & reliquum una cum diaphragmate appendicem commoveri faciunt. Hinc sanguinis motus, ejusque in corde accensio, simul cum pulsu & respiratione alterantur: proinde vero à corde alterato, non modo eorundem Nervorum ductu inpressiones in cerebrum retorquentur, verum & ipse sanguis, cursu suo immutato, fluctuatione diversa aut inassueta cerebrum appellit, adeoque spiritus animales variis impulsibus agitando, conceptus alios, & subinde alios produci facit: adeoque propter has *reciprocas Cordis & Cerebri Affectiones*, quæ longa serie vicissim propagari solent, *cogitationum & phantasmatum multiplicitas* oritur. Hinc veteres tum *Theologi*, tum *Philosophi*, *Sapientiam in Corde posuerunt*: Certe prudentiæ & virtutum opera à mutuo, quod Cordi cum cerebro intercedit commercio plurimum dependent: quippe ut cogitationes circa appetitus aut judicii actus rite eliciantur, sanguinis fluctus in pectore coerceri, ejusque ac ipsius cordis inordinationes à nervis tanquam habenis regi, inque motus aptos & requisi-
tos componi oportet. Super hoc plura dicenda suppetunt, nisi quod hæc speculatio ab instituto nostro aliena ad *pathologiam*, sive de *passionibus anima* doctrinam,

doctrinam proprius spectat. Interim huc referre libet observationem unam aut alteram ab Anatomia desumptam.

Cum nuper cujusdam à *nativitate fatui* cadaver diffecaremus, nullum in Cerebro, nisi quod mole perexiguum esset, defectum aut vitium reperire potuimus. Præcipua autem discriminis nota, quam inter illius & viri cordati partes advertimus, hæcce erat, nempe quod prædictus Nervi intercostalis plexus, quem Cerebri & Cordis internuncium & homini proprium diximus, in Stulto hoc valde exilis, & minori Nervorum satellitio stipatus fuerit.

Dum hæc scribuntur, *Cercopithec*i Anatomen instituimus, cujus Cerebrum parum ab eo, quod in Cane aut Vulpe cernitur differebat, nisi quod proportionem ad sui Corporis molem habita, longe esset capacius, ejusque anfractus ampliores existerent. *Prominentia Orbiculares Nates & Testes dictæ*, item *protuberantia annularis* à Cerebello dimissa, ad earundem partium figuram & magnitudinem in Homine propius accedebant. Quod autem præcipue notatu dignum occurrebat, hoc erat; scil. quod Nervus Intercostalis, licet pariter ac in cæteris brutis assolet, eadem cum *Paris octavi* trunco vagina inclusus, per collum ferebatur; tamen iste ab hoc Nervo prope claviculam abscedens, antequam plexui juxta superiorum costarum radices posito inferebatur, aliquot Surculos in Cor & appendicem ejus, atque fibras quasdam in diaphragmatis Nervum mittebat: quæ forsan ex parte ratio est, cur hoc *Animal* præ cæteris bestiis adeo *solers & mimicum* existat, atque *hominis* non modo *gestus*, verum *passiones* quasdam & *mores* tam apte referre & imitari possit. Verum unde digressi sumus, ad Nervi intercostalis explicationem procedamus.

In quem usum *plexui ejus Cervicali ramus vertebralis inseritur*, supra innuimus. Hujus nempe eadem ratio est ac aliorum vertebraliū, qui cum Nervo intercostali fere in toto ductu ejus communicant. Cæterum ex eo, quod diaphragmatis Nervus in eodem nervo vertebrali, unde ramus in hunc plexum venit, radicatur, ex eo, inquam, ratio desumitur, cur *diaphragmatis motus* cum *præcordis*, imo & *Cerebri conceptibus* intime conspirat: cujusmodi sympathia diaphragmatis cum aliis partibus siquidem in Homine insignior & magis arcta requiritur, observare est, quod non modo ramus vertebralis inter plexum & nervi diaphragmatis radicem intercedit, *verum bini, & interdum tres Nervi ab hoc plexu in ipsum Nervi diaphragmatis truncum mittuntur*, Fig. 9. e. e. Revera hanc non modo diaphragmatis cum præcordiis *συμπάξις* derivare liceat; verum causa genuina hinc etiam patet, cur *Risibilitas sit propria hominis affectio*: nam quoties jucundo aut mirabili quopiam conceptu imaginatio afficitur, statim Cor ovare, ac veluti sarcina sua excussa alleviari gestit: quocirca ut sanguis è dextro ejus sinu in pulmones, & per consequens, è sinistro in Aortam celerius exantletur, diaphragma, nervorum ab hoc plexu exeun-
tium commeatu instigatum, rapidiore systole sursum retrahitur, ac iteratos veluti subsultus edens pulmones evehit, eosque tum aërem tum sanguinem crebriori ipsorum allisu explodere facit: dein quatenus idem Nervus Intercostalis, qui cum Diaphragmatis Nervo inferius communicat, etiam cum Nervis maxillaribus superius continuatur, *cachinno in pectore edito, oris & faciei gestus pathetice correspondent*.

Vnus aut alter surculus insignis, ac multa fibra nervea ab hoc plexu in Nervum recurrentem feruntur, Fig. 9. 2. Certe hujus communicationis ratio videtur esse, ut diaphragma & Cor ipsum (in quæ scil. Nervi ab hoc plexu mittuntur) adhuc magis cum aspera arteria (quam Nervus recurrens afficit) in variis actionibus ejus , ac præsertim in *risu, ploratu, & cantu* conspirent. Porro, cum Nervi recurrentes, Aortæ truncos sursum convellendo, efficiant ut sanguis propter affectus quosdam excitandos versus caput citatius proripiat, possunt illi, in isto munere defungendo, Nervorum ab hoc pluxu admissorum socia opera multum adjuvari.

Ab hoc plexu cervicali plures fibrae & propagines exiles in vasa sanguifera, necnon in Trachea & oesophagi tunicas disseminantur, Fig. 9. ib. Priores quod attinet, quæ ad Tracheam pertinent & vasa sanguifera; illarum munus est, ut istos sanguinis ac aëris inspirati expiratione Canales, pro ratione & modulo quibus pulsus & respiratio peragi debent, respective contrahant ac dilatent; quo melius utriusque motus, juxta Cordis exigentias, retardetur accelereturve. Deinde in oesophagi juxta positi tunicas ab hoc plexu fibræ numerosæ protenduntur, ut hac ratione inter *Cor & Stomachum*, propter Nervos à plexu hoc æque ac à Pare vago ad utrumque exporrectos, *admirandus iste Consensus* producat.

De ramis Cardiacis ab hoc plexu dimissis non opus erit amplius differere, postquam modò innuimus, istos homini peculiares quasi internuncios esse, qui cerebri & Cordis impressiones reciprocas ultra citraque ferentes, *gemino faciunt Commercia regno*. In quantum vero Nervi duplicis generis, scil. Paris vagi ac intercostalis, præcordia humana respiciunt, ne unius gesta ab istis alterius discrepent, ideo rami Cardiaci, qui utriusque familiæ sunt, partim in eodem plexu communicant, partim per propagines emissas mutuò inosculantur, priusquam in ipsum Cor distribuantur.

Infra plexum cervicalem, truncus Intercostalis in Thoracem demersus, tres Nervos vertebrales superius oriundos admittit, aliumque plexum qui vulgo Intercostalis, sed magis proprie Thoracicus appellatur, constituit, Fig. 9. 3. Hic loci Nervus intercostalis, in provinciam suam ultimam & ampliorem, scil. ventris imi viscera, transiturus, adeoque *itineris subsidium* sibi & quasi *viaticum* quærens, in hoc plexu à Nervis vertebralibus auctaria, sive copias adventitias congerit, aliasque recentes subinde inferius, juxta singula vertebrarum internodia, recipit: quippe magno spirituum penu, quos plexibus mesentericis aliisque abdominis partibus impendat, opus habet.

Quod hic Nervus Plexum Thoracicum ingressurus arteriam subclaviam stringat, Fig. 9. 4. quodque superius ramus vertebralis in eundem plexum missus arteriam vertebralem circumliget, Fig. 9. 5. utriusque ratio videtur, ut sanguis, propter viscerum inferiorum (quibus Nervus intercostalis deinceps inservit) usus & necessitates, uberiori affluxu deorsum propellatur: id quod Nervi isti, utraque vasa sanguifera versus plexum suum convellendo, facile præstant; adeo ut hunc sanguinis raptum in oppositum illius, quem Nervi recurrentes perficiunt, moliantur. Et revera, cum sanguis & sursum & deorsum tendens, versus utramvis metam modo nimis influere, modo deficere soleat; ideo *Nervi tanquam incitamenta* ejus aut *remora*, tum in superiore, tum in inferiore

Circuitus regione, circa vasa sanguifera varie disponuntur. Quo ritu hic plexus Thoracicus in brutis animalibus habeat, postea speciatim ostendetur: Nervus intercostalis in homine, tum in hoc plexu, tum in toto per thoracem descensu, quasi, *penus sua parcus*, & *aliena avarus*, plures Nervos vertebrales accipit, nullum vero furculum à se dimittit: quidquid autem spirituum ab influxu superno residuum est, aut à laterali supervenit, totum hoc in largitionem visceribus imi ventris impendendam reservatur. Quo tamen ritu & quibus Nervorum ductibus illud in partes singulas dispensetur, in sequenti explicabitur.

CAPUT XXVII.

*Nervi intercostalis Ramificatio inferior, ad partes
& viscera imi ventris pertinens, explicatur.*

Postquam *Par intercostale* Thoracis cavitatem pertransierit, nullis spirituum impensis, nisi in plexu cervicali erogatis, tandem è regione ventriculi utrinque ramum insignem dimittit, quorum uterque statim bifidus, duos in utroque latere plexus peculiare constituit; plexus autem alter medio istorum quasi utrique lateri communis emergit: è plexibus qui sinistri lateris sunt, unus renem, atque alter ventriculum cum liene; illorum vero qui lateris oppositi sunt, unus renem dextrum, atque hepar & viciniam ejus respiciunt: In medio horum Plexus mesenterii proprius, & maximus, velut Sol inter ceteros planetas collocatur: Porro ab his ad se invicem, ac in partes vicinas fibrae numerosae, velut radiorum structura, densissime emittuntur. Fig. 11. hac omnia satis planè exhibet.

Super his primò in genere disquirendum erit, Propter quem finem tot plexus, nervei, cum fibris & propaginibus fere innumeris, circa mesenterium & Abdominis viscera distribuuntur: cum enim in his partibus fibrae & propagines nerveae ita densa serie quaquaversus ferantur, ut multiplici occursum varie implicentur; mirum videri possit, si illarum singulae ad usus quosdam destinantur, ac non fortuito potius, & quasi temerario naturae lusu huc illuc spargantur. Et quidem vix putet quispiam, totidem vasa propter motus aut sensus munera illic loci peragenda comparari: nam viscera isthac, nisi summe vellicata & spasmo affecta, parum aut nihil, cujus conscii sumus, *per-sentiunt*; eorumque motus nihil fere aliud sunt, quam *vermiculationes* obscurae, aut leves *corrugationes*, ut iisdem efficiendis non major nervorum apparatus quam pro lento Testudinis progressu requiratur. Quare hinc nonnullis in mentem venit, succum quandam, ac istum forsan *nutritium*, hoc multiplici ductuum nerveorum com meatu dispensari: cujusmodi tamen munus si his fibris circa mesenterium dispersis assignetur, quidni istis circa *pulmones* & *præcordia*, ac imprimis circa *asperam arteriam*, pari modo divaricatis, idem nutriticus sive excipiendi sive importandi officium concedatur? At vero summe improbable est, succum nutritium in Tracheæ aut bronchiorum tunicis contineri, quem nervi exsugant; neque liquidò magis constat, quare plures

plures nervi pro succo alibili his pectoris, illisve Abdominis partibus advehendo destinantur, quàm opus sit pro musculoſo genere. Interea tamen, licet inficias imus *totam materiam nutritiam* per hos aliosve Nervos ultrave deferri; attamen intra hos ductus nerveos humorem, qui spirituum animalium vehiculo, quique materiæ nutritivæ fermento sit, perpetim scaturire existimamus: quo cum *humore nervoso* versus intestina & reliquas corporis sentinas eunte, verisimile est quod serositates superflue & excrementitiæ sæpe una dilabantur, adeoque foras amendantur.

Veruntamen quoad *Nervos mesentericos*, & *plexus* in quos terminantur, atque *fibras* ab his densissime exeuntes, opinari fas sit, diversimoda hæc vasa revera spirituum animalium primo *canales*, deinde *condos*, ac demum *emissaria ultima* existere. Si inquiratur ob quem finem tam ingentes spirituum copię ad has partes ignobiliores designentur; dico, hoc fieri propter *motuum* & *sensuum* actus, qui adprime (scilicet pro ipsa vita tuenda) necessarii sunt, ibidem obeundos: Licet enim *motus localis*, qui semper muscoli tanquam vectis ope peragitur, visceribus imi ventris minime conveniant, tamen *motus intestini* ab iisdem fere continuo & multifariam eduntur: sc. pro chyli subactione, necnon partium & particularum, quæ tum illius, tum liquoris sanguinei sunt, aliarum ab aliis secretionem, & singularum versus metas designatas protrusione, *fibræ* & *propagines nerveæ* in viscerum membranas & vasorum tunicas, imo & in parenchymatum texturas protensæ, varie contrahi; scil. hæ sursum, illæ deorsum convelli, modo plures simul, modo seorsim aut successive huc illuc deduci solent. Revera indiscontinua horum viscerum actionis indicium est, quod in somnis æque, ac forsan magis quam in vigilia culinare nutritionis opus peragitur; dumque aliarum facultatum organa feriuntur, his nulla conceditur quies: quin *Nervi mesenterici*, quasi molendinum perpetuum circumagerent, pro humore alibili præparando, eodemque versus omnes partes exportando, semper occupantur.

Porro his partibus, ad quas prædicti Nervi pertingunt, *sensio exquisita*, non minus quam *facultas motiva* competit: nam quicquid heterogeneum aut noxium chylo aut sanguini permixtum visceri cuiquam affertur, illico spiritus istius partis incolæ, noxæ admoniti, velut conjuratione inita valde tumultuantur, ut quod hostile aut molestum est foras excludant. At vero quoniam spiritus animales ad intestina, atque viscera iisdem affinia, Nervi intercostalis ductu affluentes, à *Cerebello* procedunt, ideo facultatis utriusque, nempe tum sensitivæ, tum loco motivæ negotia, quatenus *Cerebro inconsulto*, ac *animali vix conscio* peraguntur, non ita palam advertuntur, proindeque minoris quam aliarum partium *actus spontanei* æstimantur.

Quoad ipsum vero nodum sive œconomiae ritum, quo spiritus animales ad viscera imi ventris destinati exercentur, statuendum erit, quod eorum copię in plexus omnes mesentericos, Nervorum à *Pari intercostali* missorum ductu influunt; ubi ob plenitudinem aggestæ, velut in totidem promptuariis sive condis, exinde in varias partes, prout occasio requirit, distribuendæ asservantur. Quod tamen spiritus à plexibus istis, non per *ramos singulares* amplioresque, (prout in musculis factum est) sed per *fibrarum* quasi *turmas* in propria sua pensa emanant, ratio est, quoniam hic res secus ac in musculoſo genere

genere peragitur : nam ubi musculus parti movendæ affigitur , ejus fibræ insitæ totum contractionis sive nixus motivi opus perficiunt ; sufficit autem Nervo, usque nova spirituum supplementa, & pro data occasione, motus obeundi instinctus convehere ; in membranis vero & visceribus , ubi muscoli desunt, ipsæ *fibræ nerveæ* densissime insertæ , ac fere in singulas subjecti partes quasi totidem funiculi distributæ , partim per se & proprio Marte *tractionis negotium perficiunt* ; & partim fibras viscerum insitas , incerto ritu dispositas in motum sollicitant ; quas insuper in actione sua determinant , easque , velut totidem digiti singulis plectri chordis præpositi , moderantur. Licet enim membranæ ac ipsa viscera fibris quibusdam insitis prædita sint ; istæ tamen , non , uti in musculis habet , unius generis & positionis existunt ; sed in eadem parte quædam sunt rectæ , ac aliæ obliquæ ; hæc sursum , istæ deorsum tendunt , aliæque in orbem feruntur , itaut motus diversimodi in eadem membrana aut viscere , modo simul , modo successive aut vicissim peragi debeant : quare Nervi distincti non modo ad singulas fibrarum series , verum ad universas subjecti partes requiruntur , quæ sc. motum hic loci inceptum illic fistant ; aliumque de novo inchoent , aut alium cum alio complicant. Revera motus qui in musculoso genere perficitur , similis videtur rudi ac simplici cuidam operi textorio , ubi radio semper eodem ritu trajecto , Trama stamini subducitur : Sed intestinorum & viscerum motus apte comparantur Texturæ plurimum variegatæ , pro cujus artificiosa magis compage texenda , aut plures simul manus , aut machina diversimode versatilis , ac plusquam mille motuum generibus instructa adhibetur.

Circa Nervos plerosque mesentericos , atque propagines & fibras nerveas quæ ab iisdem per manipulos egrediuntur , hæc duo imprimis considerare oportet : nempe quid sit illorum cujusque *officium* pro *motu* , aut *sensu* , aut simul utrisque in parte quapiam excitandis : dein *secundò* , quæ sit cujusque eorundem cum aliis nervis , plexibus , aut nervorum fasciculis *communicatio* , propter quam simul in diversis partibus *sympathia* & *actionum consensus* oriuntur. Iuxta binos hosce respectus , modo singula vasa nervea ad viscera imi ventris pertinentia particulatim expendemus.

Itaque in latere sinistro Ramus supremus mesentericus statim bifidus ad figuram Literæ Y , in surculo superiore plexum stomachicum , qui & lienaris est , ac in altero inferiori plexum renalem continet : Porro circa divisionis nodum propagines quasdam ad maximum mesenterii plexum dimittit, Fig. 11. F. G. Hinc ratio patet , quare Ventriculo cum Liene , mesenterio , & cum Rene tanta affinitas intercedit , ita ut Vomitus tum Lienosis , tum Colicis , tum Nephriticis symptomata valde crebra & familiare existat : quippe cum spasmus in parte quapiam aut viscere , quod Nervus mesentericus respicit , incipitur , mox aliæ partes , ad quas ejusdem Nervi plexus aut surculi pertingunt , in consensum trahuntur.

A superiori hoc Plexu Nervorum fasciculus versus stomachum elatus, fibras suas partim fundo ejus inserit, partimque eas fibræ aliis à Nervo Stomachico dimissis obviam mittit, Fig. 11. n. Prioris ratio est, quod cum ventriculi plures sunt tunicæ , in iisque diversimodæ fibrarum series disponuntur , quarum omnibus debito spirituum animalium influxu actuendis Nervi stomachici à *Pari vago* derivati haud sufficiunt ; opportunum erat ad exteriora istius visceris , velut pomœria,

nempe ad fundum ejus extimum nonnullas spirituum copias à regimine alieno, scil. à prædicto abdominis plexu nerveo suppeditari: in hujus vicem, spiritus etiam ab eodem ramo stomachico per fibras alias dimissas deorsum labi, & in hunc plexum lienarem accieri poterint. Præterea item, ut Nervi adventitii cum prioribus è propria Ventriculi ditione existentibus apte conspirent, observare est, quod utrique non modo intra ipsius visceris confinia inosculantur, verum extra ipsum in mutuos amplexus ruunt, atque velut focias manus jungunt.

Planè videtur, quod filamenta nervea, à prædicto plexu ad ventriculi fundum delata, *motuum & sensuum* actibus ibidem obeundis inserviant: quo tamen munere *alter fibrarum manipulus hic in Lienem protensus* (Fig. 11. §.) defungatur, non ita facile constat; quoniam viscus facultate quavis animali prorsus destitui perhibetur. Cum alibi in Lienis usum inquirebamus olim, statuere visum erat, ejus officium esse, *sanguinis fecem, & particulas acido-salinas*, quæque *fixioris naturæ* sint *secernere*, easque proprio sinu exceptas amplius *coquere*, ac in *fermentum acidum convertere*; quo rursus sanguini per venas tradito, latici ejus acumen & asperitas, necnon virtus activa seu fermentativa, concilientur. Quapropter tota lienis compages textura fibrarum quasi reti-formi constat; nempe ut intra spongiosas ejus cavitates & densos meatus sanguinis fæculentiæ uberius excipi & contineri possint. Dico igitur, quod pro *fermenti lienosi* confectione, & dispensatione idonea, præter *arterias* quæ materiam adducant, & *venas* quæ ejusdem fermentatæ portionem quandam continuo reorbeant, etiam multis *Nervi* opus esse videtur, qui scil. tum fibratam lienis texturam convellendo, fæcem atram in eo reconditam conquassare, ipsamque adeo à putredine & coagulatione vindicatam natura acida & fermentativa imbui faciunt; tum etiam quod Nervi isti vasa sanguifera modo contrahant & constringant, modo aperiant & dilatent; ut pro data occasione sanguinis fæculentiæ modo uberius, modo parcius ex arteriis in lienem deponantur, etiam ut fermenti in liene confecti plus aut minus, juxta passionum aut instinctus naturalis exigentias, cruori suffundatur. Nemo *hypochondriacus*, quin abunde sentit *nervo splenicis* quosdam *motus perficere*; nam magnæ perturbationes istæ, quæ in latere sinistro excitari solent, uti cum modo inflationes, modo partium interiorum constrictiones, ac interdum succussiones variæ, cum dolore vago hac illac excurrente percipiuntur, sunt tantum *spasmi & corrugationes*, quibus *Nervi splenis* passim afficiuntur. Nec tantum in lienis procinctu Nervi ejus spasmis correpti tumultus cient, at longe ulterius sæpe in ipsum Cor, imo in totum corpus inordinationum suarum effectus transferunt. Novi Hypochondriacum, cui statim à liene perturbato, præcordia deorsum attracta immaniter comprimi & constringi viderentur, adeo ut ipse valde tristis ac animo dejectus, etiam de summa pectoris angustia & constrictione conquestus, sese usque moribundum putaverit. Cujusmodi affectionis causa proculdubio fuit, quod cum fibræ plures à plexu lienari exeuntes, fibris aliis ab ultima *Paris vagi* extremitate dimissis uniuntur; facile accidit, ut priores spasmis affectæ conjuges suas, & per consequens ipsum *Paris vagi* truncum, à quo Nervi in præcordia mittuntur, unâ contrahant, ac deorsum convellant: certe prædictorum utrius-

que generis Nervorum, scil. quorum hi lienem, illi præcordia respiciunt, *supra* efficitur, ut *cordis tremor*, *oppressio*, alique graves affectus, *lienosis* ita passim obveniant. Porro in quantum sanguinis fermentatio à liene dependet, juxta hujus influentiam iste circuitum suum, modo placide, modo perturbatè agit. Dum lieni, nulla perturbatione agitato conquiescere & vacare licet, sanguis etiam in Hypochondriacis satis tranquille movetur; sin autem commoveatur idem & excitetur (uti assolet in passione quavis, corporis motu violento, aut à pharmacìa) statim Nervi ejus spasmo affecti iteratis contractionibus ipsum magis concutiunt; adeo ut facultati fermentativæ sinu ejus excussæ, in sanguinem uberius refluant, quæ *laticem* ejus mox *turbidum*, & quasi *limo inquinatum* reddunt, ipsum tanta denique acrimonia & mordacitate asperant, ut cerebrum & Cor veluti aculeis pungat, uratque; unde *Splenicis*, præterquam quod ratio obscuratur, etiam animi affectus, præsertim *tristitia*, *odium*, ac *ira* plurimum intenduntur.

De *Nervis splenicis* adhuc alia conjectura adducimur, ut credamus istos, præter *facultatis motiva* exercitia, tum proprium humorem lieni instillare, qui istius visceris virtutem fermentativam promovet; tum etiam (quia Nervi, prout supra ostensum erat, utraque via, scil. prorsum & retrorsum, spiritus, ac interdum humores convehunt) eosdem lienis implantatos ab eo *humorem acetosum*, & quasi *vitriolicum* sæpe imbibere, à cujus acrimonia ac insigni vellicatione in spasmos aguntur.

In quantum verò *plexus nervus lienem respiciens, cum ventriculo, mesenterico, hepate ac rene propinquus, cumque præcordiis, aliisque partibus longe dissitis remotius communicat*; hinc causa patet, quare non modo singula isthæc viscera & partes propter lienis delicta plectuntur; verum, & vice versa, cur lien indispositus à morbo quovis, aut molestia in qualibet istarum partium excitata pertubari solet: adeo non prorsus de nihilo est, quod *symptomata ubivis infestantia*, cum illorum causa ignoratur, passim *lieni ascribuntur*; siquidem ipse non tantum proprias inordinationes aliis partibus affigat, verum insuper peculiare illarum noxas luit: Quod tamen perperam *vaporibus* hinc inde transmissis ascribitur; cum ejusmodi cujuscunque affectus ratio formalis plerumque in communicatione per Nervos facta consistit.

Inferior lateris sinistri Plexus propter Renem juxta positum constitutus videtur, in quem præcipuè fibrarum ejus fasciculus deferitur, Fig. 11. 24. 2. 2. Certe quod hi Nervi vasa emulgentia assecuti, eadem amplexantur, & complicatione varia ac crebra circumligant; id eum in finem ita constituitur, ut propter arteriam ita constrictam, ac à Nervorum tractionibus crebro succussam, serum à sanguine facilius præcipitetur: Quare observare est, in summa rerum difficultate aut discrimine, cum præ timore animus omnesque Nervi intenduntur, quod frequens & copiosior mictio, eaque non rarò dolorifica, provocari soleat.

Plexus renalis, præter Nervum ei cum plexu superiore communem, alium recentem & peculiarem à Nervointercostali, seu potius, eo mediante, spinali medulla accipit, Fig. 11. 25. Hinc est, quod lumbi magnum consensum cum renibus habent, ac eorum affectus dolore gravativo & late diffuso ita passim luunt. In quantum hic Plexus cum mesenterii maximo communicat, *affectio colica &*

nephritica multum affines existunt, ut sæpe difficile sit earum paroxysmos ab invicem distinguere.

In dextro latere Ramus mesentericus, pariter ac in sinistro, bifidus, duos plexus continet: horum superior (quem Hepaticum dicimus) plures fibrarum nervearum fasciculos à se dimittit; quorum maximus versus hepar elatus, arteriam hepaticam velut reticulo è fibris conflato investit, Fig. 11. ♂. e. Observat Doctissimus Glissonius, quod *Arteria hepatica* solummodo vasorum, nempe capsulae communis, pori biliarii, & venae portae truncis impendatur; quibus irrigandis, & calore succoque nutritio actuandis, sanguinem arteriosum confert; cui tamen regerendo vena socia omnino deest: quapropter illa sanguinem haud pleno & libero influxu, sed paulatim, & statò semper dimenso, partibus istis membraneis inferre debet: secus enim periculum esset ne à sanguineo latice affatim irruente, siquidem haud denuò statim per venas remandatur, inflammatio excitaretur, aut saltem ne ab hujus torrente extra ripas suas transfuso, aliorum in hepate rivorum decursus pertubarentur: In quantum verò Nervi tanquam habenae, arteriae truncum constringunt, ipsi sanguinis influxum moderantur, eumque juxta partium quibus destinatur exigentias varie dispensari faciunt.

E nervorum turma versus hepar eunte, quidam in pancreas, aliique in vasa cholidocha, duodenum, & pylorum deflectunt, iisdemque densas propaginum series inserunt, Fig. 11. π. π. Horum munus videtur esse partium istarum ductus excretorios convellere, & propter humorum turgescientium evacuationes per occasionem faciendas succutere. Porro his fibris sursum elatis, cum plures aliae ab utroque Nervo stomachico dimissae uniantur, ratio patet, cur à vellicatione circa ventriculum facta, bilis flava è cysti fellea in duodenum emulgetur; quæ propter ejusdem intestini spasmus exinde in ventriculum sublata, vomitu rejicitur: quippe Nervi stomachici, sive à pharmaco, sive ab alia re molesta, ad evacuationem superius faciendam irritati, proindeque sursum retracti, una Nervos ad hepar & vasa cholidocha pertinentes, utpote ipsis alligatos, adducunt, ac in spasmis superioris consensum trahunt. Hinc accidit, quod non tantum stomachus primò laceffit, spasmò suo bilem ad se trahat, ac in proprium sinum proliciat; verum & bilis sponte turgescens, adeoque in duodenum suffusa, quatenus intestini hujus Nervos irritat, ac dein eorum consensu ventriculi vasa nervea irritando, vomitionem cholericam non raro inducit.

Plexus hepaticus cum lienari per fibras utrique interjectas communicat, Fig. 11. θ. Cujus ratio videtur esse, ut cum plexus unus ventriculi finem, sive extremitatem dextram, atque alter sinistram respiciat; quo in utrisque consensus & erga stomachum *sympaxis* sustineatur, ambo per Nervos velut internuncios inter se communicant. Certe horum Nervorum ductu videtur fieri, ut dolores *hypochondriaci* è sinistro latere in dextrum sæpius transcurrant; quatenus nimirum spasmus in plexu lienari inceptus ad hepaticum traduci solet.

Inter Plexum hepaticum & mesenterii maximum, plures fibrae manipulatim protensa interjiciuntur, Fig. 11. εε. quarum certè officium est commercium & sympathiam quandam sustinere; qualis nempe requiritur, tum ut *chylus* ab intestinis versus hepar usque in debita proportionem sufficiatur, tum *bilis* è vesica fellea

fellea ad intestina, propter excretionem proritandam, opportune dilabatur. In ea namque opinione sumus, quod *vena mesaraica* chyli portionem quandam ab intestinis exsugentes, eam per hepatis regionem in venam cavam immediate transferunt, quo quidem sanguis in trunco ascendente venæ cavæ succo nutritio recente imbuatur, non secus ac ipse in trunco ejus descendente, eodem per vasa Thoracica suffuso reficitur. Quare necesse est, ut inter hæc viscera stricta admodum affinitas intercedat, eo magis, quoniam & bilis à cysti fellea ad intestina non continuo, sed propter usus quosdam, per occasiones & intervalla suffundi debet: Nervi enim exigentiarum, quæ utriusque sunt partis, optime conscii, eas ambas mutuis officiis admonent, & pro re nata in actionem sollicitant.

Observare est, quod in dextro latere, inter plexum hepaticum & renalem Nervus amplius protendatur, Fig. 11. µ. Adeo ut inter hos plexus major & immediatior consensus, quam inter istos alterius lateris pares habeatur. Cujus ratio non facile patet, nisi forsan in eum finem ita constituatur, ut cum à renibus intermingendum serosæ excretionis nixus peragitur, una pyloro & vasis cholidochis deorsum attractis, chyli & fæcum alvi versus inferiora protrusio irritetur. Certe hæc plexuum horum connexio potissimum in causa est, cur *paroxysmo nephritico vomitus saepe immanis supervenire soleat*, quodque à tali vomitione vasa cholidocha, quasi ab emetico assumpto irritata, plurimum inaniantur.

Plexus mesenterii maximus in medio cæterorum positus, Solis instar, fibras nerveas, quasi radios, quaquaversus in orbem dispergit, Fig. 11. ⊙. easque non modo in singulos quosque plexus, quasi totitem planetas, cum peculiari aspectu sive *active-collæ* projicit, verum insuper in pleraque intestina, vasa sanguifera, aliasque partes circumcirca positas distribuit: proculdubio à filamentis hisce nerveis, quæ à Plexu ad intestina, velut *linea à centro ad peripheriam* feruntur, intestinorum actio quævis, & præcipue *peristalticus vermiculationis* motus dependet; in quantum scil. hæ fibræ successivè agunt, & motum quemvis inceptum, *progressis velut spinali*, usque ulterius promovent.

Quod ab hoc Plexu multa fibra ac propagines exeuntes, Aortæ trunco juxta descendenti inseruntur, quodque istæ versus intestina protensæ vasa sanguifera associant, eaque variis in locis supercandunt; hinc inferre liceat, Nervos etiam in Abdomine, tanquam *habenæ & lora vasis sanguiferis* injici, qui scil. eadem aut stringendo, aut convellendo, sanguinis cursum, juxta viscerum inferiorum exigentias, modo retardare, modo incitare possint.

A plexu mesenterii maximo fibra ac propagines quadam insignes in glandulas uterinas sive testes fœmineos mittuntur, Fig. 11. T. T. In quas etiam aliæ propagines à Nervi intercostalis trunco, ibid. v. v. aliæque à Nervo qui inter hunc plexum ac Abdominis infimum intercedit, exeuntes conveniunt, ib. ♯. ♯. Ita ut spirituum penus à triplici promptuario in eas partes feratur; quod sane multo amplius est quam in sexu altero fieri contingit, cum ad testes viriles vix ullum Nervum pertingere deprehendimus. Revera uterus, præterquam quod pars valde sensibilis sit, etiam diversimode, & in partu validissime moveri solet: quare huic & fibræ insitæ robustiores, ac etiam Nervi varii generis & originis conceduntur.

Plerique abdominis plexus, præsertim vero infimus & affinis mesenterii maximus, in passionibus hystericis vulgo dictis, sæpenumero afficiuntur, (prout

mox declarabitur.) Itaque siquando tales affectus ab utero procedant , causa patet , quare prædicti plexus in consensum trahantur. At vero alibi ostendimus , passiones istas mere convulsivas esse , & non raro absque uteri vitio excitari. Porro illud symptoma in paroxysmis ejusmodi valde frequens , nempe quo velut globus ab imo ventre efferri , ac circa umbilicum impetuosè exsilire percipitur , ut perinde uteri ascensus perhibeatur : Dico id nihil aliud esse quam immanes horum plexuum spasmos. Sæpe quidem in foeminis , ac interdum etiam in viris novi , cum affectio convulsiva invaderet , primo molem in hypogastrio assurgere visam , dein circa medium Abdomen intumescantiam ita immanem successisse , ut viri fortis manibus , utut validissime nitentis , haud comprimi aut inhiberi potuerit. Proculdubio admirandi hujus affectus causa est , quod intra *Paris intercostalis* nervos spiritus animales influi , quoties *ἀταξίας* sive *motus convulsivos* ineunt , primo (uti plerumque assolet) circa Nervi extremitates , nempe in *plexu Abdominis infimo* , effervesce , ac velut explodi incipiant ; quæ illorum affectio , cum sursum perreptans ad *plexum mesenterii maximum* deferatur , adeo ut spiritus ejus incolæ pari inordinatione corripantur , nihil mirum est , si ista medii Abdominis intumescantia , ac velut materiæ cujusdam nitrosulphuræ explosio cietur. Enimvero haud probabile est , symptoma istud ab utero ascendente ac sede sua dimoto excitari posse , quia præterquam quod hæc pars in loco suo fixa & ligamentis firmiter stabilita est , etiam moles ejus in virginibus ita parva est , vix nuce juglande major , ut licet in ventrem elata , ejusmodi intumescantiam minime producat. Nec magis verisimile est , ejusmodi affectum è *musculis Abdominis spasmis* correptis cieri : isti enim , utut convulsi , sese ac partes subjectas sursum , aut deorsum , aut ad latus contrahunt , verum se eminus efferre , ac umbilici regionem cum impetu in altum attollere nullo modo possunt. Ut supponamus vero spiritus animales in *plexu mesenterii maxime* efferos & ad explodendum aptos fieri , (quales revera sunt ubicunque motus convulsivos ineunt) isti ibidem densius conglobati , effervescantia sua ac rarefactione insigni , *plexum* istum cum tota vicinia ejus immaniter inflent ac attollant , simulque viscera imposita cum vibratione quadam sursum propellant. Plenior hujus symptomatis explicatio ad *Cerebri & Nervorum pathologiam* spectat.

Interim annotemus , alium quendam affectum , sc. *dolorem Colicum* , ad *plexum abdominis* , & imprimis ad hunc *mesenterii maximum* pertinere. Enimvero opinari subest , acerrimos cruciatus qui in morbo isto excitari solent , non à materia excrementitia intestinorum cavitatibus inclusa , neque semper ab humore acri eorum tunicis impacto , attamen sæpius à *succo nervoso* acrimonia quadam imbuto , atque intra hunc *plexum stagnante* provenire ; unde propter hujus cum *plexibus* tum *hepatico* , tum *lienari* consensum ; doloribus istis vomitio cerebra & immanis supervenit. Verum speculationibus hisce pathologicis ad propria loca delegatis , quod primò institutum erat , Nervi intercostalis ductum ulterius prosequamur , quo quidem ad *binos abdominis plexus minores* , ac *infimos* ducitur.

Infra Nervos mesentericos , è quibus *plexus superiores* constituuntur , uterque *intercostalis descendens* , tres aut quatuor *propagines singulares* emittit , qui in *ureteres* feruntur. Harum usus esse videtur , canales istos urinarios convellere & succutere , ut

serum in renibus secretum versus vesicam propere magis alliciatur : porro si quando materies viscida aut limosa ureterum ductibus adhæreat, aut calculus major infixus eorum cavitates obstruat, nervorum hic illic toto tractu insertorum ope isti convulsi ac corrugati, molem quamvis in transitu impeditam deprimunt, & semper ulterius promovent.

Iuxta Vertebrae è quibus *Nervi crurales* procedere incipiunt, tres distincti rami, utrique nervo *Intercostali* adducti, exinde in imam ventris cavitatem feruntur, ubi plexum qui *Abdominis infimus* est constituunt, Fig. 11. D. F. O. O. Quod hic tot *Nervi*, nempe 6. ampliores una coeunt plexum non nisi exiguum constituunt, scil. minorem quam superius in *Nervi* ramo singulari excitatur; ratio est, quoniam hic plexus, quasi tantum diversorii loco esset, spiritus influos non diu hospitatur, quin eos in transitu solum excipiens, statim ad alios plexus hic, illic, supra, è latere, ac infra positos, ac in officia diversimoda constitutos demandat; namque hinc præcipuus commeatus, & quasi via lata, ad maximum mesenterii plexum ducit; insuper hinc *Nervi* multifariam exeuntes, tres alios plexus constituunt, qui partibus ac viis quibus singulae ab imo ventre excretiones, nempe *stercoris*, *urinae* & *seminis*, peraguntur, prospiciunt.

Primis itaque *Nervus* ab infimo hoc Plexu in mesenterii maximum emissus, paulo antequam eo pertingit, duas insignes propagines glandulis uterinis impertit; in ascensu autem quatuor alios ramos, velut subsidiarios, sc. binos in utroque latere à *Pari intercostali* admittit, Fig. 11. X. Adeo *Nervus* hic spirituum animalium, Plexui mesenterii maximo & glandulis uterinis destinatum, præcipua commeatus via esse videtur; qui tamen ductus, non immediate, sed ambage facta, prius ultra metam suam progreditur, & demum, velut retrocessu quodam, in partes designatas effertur. Cujus ratio est, quod intestinum omnium motus, sc. vermiculationes, semper deorsum versus intestinum rectum dirigi, ac etiam uteri actiones illac tendere oportet: Ideo enim par fuit, spiritus animales ab infra, quò motus vergit, suppeditari. Nimirum simili ritu *Nervus* hic mesentericus ac bini recurrentes, prius inferius delati, in provincias suas ascendunt; nempe ut versus terminum istum infra positum, veluti ad *Trebleam*, partes respectivas convellant.

Porro in hunc finem, nempe ut spirituum intestina quædam actuantium influxus inferius derivetur, Plexus alter Abdominis, nempe minimus, huic è vestigio additur. Quippe super *Nervo* hinc circiter uncia spatium elato, plexus exiguus succrescit; è quo *Nervus* unus in Plexum mesenterii maximum emissus, intestini recti summitatem & *Coli* partem subtendit, Fig. 11. §. a. Atque alter *Nervus* ab hoc Plexu descendens, ejusdem recto intestino parti imè subjicitur, Fig. 11. b. cui etiam duæ propagines, à plexibus in pelvi positis elata obviam fiunt, Fig. 11. d. d. Non difficile erit hujus Plexus & Nervorum ejus usus assignare: quippe omnes isti ductus nervei circa intestini recti officia & motus occupantur. *Nervus* ascendens, ejusdem recti intestini, necnon coli inferioris, ac dein (mediante Plexu mesenterii maximo) quorundam aliorum intestinum vermiculationes deorsum instituendas dirigit; atqui *Nervus* descendens in oppositum alterius, intestini recti partem inferiorem sursum contrahens, præcavet ne excrementa versus anum delata subito ac improvise foras elabantur. Deinde, quatenus duo nervi è bi-

nis plexibus intra pelvim locatis (qui Plexus ramum vertebralem insignem immediate admittentes , functionis spontaneæ participes existunt) huic Ner-vo descendentem obviam fiunt , cumque ipso inosculantur , ab omnibus simul efficitur , ut excrementa præ foribus cohibita , cum opportunum erit , *appetitum jubente* , ejiciantur. Natura , ut turpitudinem vitet adeo sollicita est , ut pro excrementis egerendis vasa nervea apparatus æque insigni constituat , ac pro muniis maxime splendidis ubivis obeundis.

A plexu abdominis infimo duo Nervi in pelvim dimissi, illic utrinque Nervum vertebralem insignem recipiunt ; adeoque duos plexus, nempe unum in alterutro latere, constituunt , Fig. 11. C. C. K. K. Hi plexus prope ostia , ductibus præcipuis excretoriis præposita collocati , illis occludendis referandisve inserviunt : utrique *ramus vertebralis* velut *subsidiarius* accedit ; quo quidem efficitur , ut præter spirituum copias adauctas , eorum ab his plexibus emanantium *actus* aliquatenus *spontanei* evadant. Quo ritu & quem ob finem Nervus ab utroque plexu ascendens intestino recto impenditur , modo ostensum erat. Porro bini utrinque descendentes in *uteri collum aut prostatas* feruntur , Fig. 11. e. g. Proculdubio quidquid *sensus* aut *motus* circa *actus venereos* perficitur , spirituum per hos Nervos influxui debetur. In *viris* jucunda humoris genitalis profusio , inque *fæminis* ejusdem non minus voluptaria receptio , à Nervorum istorum actione dependet. Denique ab eodem plexu *Nervus alter descendens ac in furculos quosdam diremptus, utrinque in vesicam & sphincterem ejus distribuitur* , Fig. 11. f. Certe ab his nervis *miſtionis opus* peragitur , ac si quando eadem dolorifica sit , iisdem *sensus molestus* imprimitur. In quantum autem Nervi singulis excretionibus dicati utrinque ab eodem plexu procedunt , in tantum omnium *actus* inter se aliquatenus affines existunt , ita quidem ut si ductus aliquis excretorius debilis aut male affectus fuerit , dum à quopiam altero excretio peragitur , iste tesseram suam , quam reservari oportuit , invicem dimittit. Hoc notius est quam ut instantiis adductis rem illustrari opus sit.

His Nervis & Plexibus ita constitutis , *Pari intercostali* non multum negotii præterea relinquitur. *Circa principium ossis sacri ambo trunci ad se mutuo inclinati, per furculum unum aut alterum transversum inter se communicant, deinde in fibras minutas desinunt, quæ in sphincterem ani distribuuntur* , Fig. 11. q. r. s. Simili ritu *Par intercostale* habet ac supra de *Pari vago* observavimus ; sc. uterque Nervus ad stadii sui metam perductus , antequam penso ultimo accingantur , sese in mutuos amplexus inclinant. Circa extrema utriusque *Paris* munera etiam hæc conformitas annotetur ; quod cum viscera chylicationi dicata , nempe ventriculus & intestina , eodem ductu , eademque perpetua cavitate ad extremum usque continuantur : *Prima hujus cavitatis ostia, nempe Ventriculi orificia, ab infimis Paris vagi ramis inter se junctis custodiuntur ; ejusdem autem ostio ultimo, nempe ani sphincteri, Paris intercostalis extremitates* , etiam prius inter se commissæ præponuntur. Huic vero parti , quasi nunquam ipsi satis provisum esset , præter Nervos ab utroque plexu proxime superiore huc missos , atque has extremas *Paris intercostalis* productiones eidem impensas , *etiam ramus ac fibra quedam à Neruo vertebrali inseruntur* , Fig. 11. i. k. Quarum nempe accessu efficitur , ut *musculi hujus ostiarii* occlusio vel apertio spontanea evadat. Revera plures Nervi , ac isti diversi generis , in sphincterem ani distribuuntur :

nimirum

nimirum quia succus nutritius, ejusque recrementa foetida, tanquam materies quædam spagyrica, intra intestina, velut *matracium*, digeruntur; ideo Natura quæ Chymiam optime callet, circa vasis orificia bene obturanda multum sollicita est.

Ab eodem Neruo, sc. ultimo vertebrali, è quo ramus in sphincterem ani fibras dispartit, duo alii Nervi procedunt, qui in penem feruntur, Fig. 11. l. m. Horum *major*, qui peramplus & longus est, in corpus ejus nerveum, alter *minor* in musculos ejus distribuuntur. Hoc membrum, quia nervos tantum à Spinali medulla accipit, juxta nostram hypothesein, spontaneo tantum voluntatis arbitrio intumescere ac moveri debuit: quod tamen propter humoris generalis turgescentiam, sæpe invito erigitur ac spiritu inflatur, idque ea potissimum ratione, quia ab hoc *Pari vertebrali*, unde *penis Nervi* oriuntur, processus nervosus in *Par vertebrale* proxime superius protenditur, in quo sc. plexus in pelvi positus, & prostatici Nervos impertiens, radicatur, *Fig. 11. l. K.* in quem plexum etiam Nervus insignis à *Pari intercostali* implantatur. Cum itaque inter *prostatas*, quæ multum à nervis intercostalibus dependet, & *ipsum penem* (propter utriusque radices processu nervoso commissos) communicatio habeatur; usu venit, quod *hujus actio istarum partium affectioni* obsequatur: istæ autem partes, sc. *prostate*, non tantum à seminis turgescencia moveri aptæ sunt, verum & Nervi intercostalis commeatu, juxta impressiones sensibus aut Cerebro factas, actione nimis importuna irritari solent; in cujus consensum illico penis excitatur.

Circa Nervos qui ad testes spectant, non multa hic dicenda occurrunt; nam in illis ductuum nerveorum ingens satellitium sæpius frustra quærivimus; aliquoties in *homine*, itè in *vulpe, cane, vitulo*, ac demum in *apro & cercopitheco* sedulo rimati, non nisi unicum Nervum, è *Pari vertebrali* profectum, qui etiam magna ex parte musculo *cremasteri* impenditur (*Fig. 11. N.*) eo pertingere deprehendimus: adeo ut licet præclarus humor intra partes istas conficiatur, tamen non facile constat, materiam ejus illuc per Nervos derivari; neque enim *succum genitalem* magis quàm *nutritium* per Nervos dispensari putamus. Enimverò videtur, quod *arteria liquorem spirituosum testibus* pari modo ac Cerebro instillant; quare procinctu eorum hæc vasa sanguifera plurimum devaricata, in canaliculos velut serpentinis contorquentur; quo *humorem testibus destinatum* subtilient, eumque omni crassitie & sæculentia exutum, ac vere sublimatum, in illorum compagem insinuent: quippe ubi non secus ac intra *Cerebri corticem*, liquor iste spirituosus, *sale volatili partis insito* imbutus, in *Clyssum nobilissimum*, sc. *humorem genitalem* transit. Verum de seminis natura & origine fusius disserere hujus loci non est. Cæterum, quia vulgo objici solet, *semen succo nervoso* & spirituum copiis à Cerebro petitis constare, ideoque largiora ejus dispendia Cerebro & Nervis cito magnam debilitatem ac enervationem inducere; dico hoc fieri, quia post magnas seminis profusiones, propter ejusdem humoris instaurationem (cujus Natura magis quàm pro individui commodo sollicita est) mox à sanguine liquoris spirituosissimi tributa majora in testes deponenda exiguntur: quapropter Cerebrum debito ejusdem spirituosissimi liquoris penu & affluxu defraudatum elanguescit; spiritusque influi ipsius & systematis nervosi, quoniam in ipso fonte deficiunt, valde de-

pauperantur & flaccescunt. His accedit, quod etiam ipsi spiritus animales, qui prostates actuant, à medulla spinali accersiti, circa actus veneros multum absumuntur; adeo ut ob hanc insuper rationem lumbi enerventur.

C A P U T XXVIII.

De Neruo spinali ad Paris vagum accessorio; item de Neruo Diaphragmatis.

Postquam Nervos *Paris vagi* & *Intercoastalis*, qui ad præcordia & viscera omnia mediæ, ac imi ventris, necnon ad quasdam alias partes functionis involuntariæ executrices protenduntur, explicavimus: Proximè his succedunt Nervi quidam alii, cum prædictis in origine, aut in ejusdem muneris exercitio communicantes, scil. *Nervus spinalis*, & *Nervus Diaphragmatis*; de quibus ordine dicemus.

Suprà ostendimus, quod *Paris vagi nervus* in ipsa origine *fibris numerosis* constat, quibus alter insignis Nervus è longinquo oriundus accedit, cumque ipsis inosculatus, simul cranio egreditur. Circa Nervum hunc, quoniam ortus & distributio ejus valde anomalus habentes nondum ab aliis Anatomicis notantur, operæ pretium videtur paulo diligentius inquirere. Itaque si Nervi hujus principium indagare velimus, illud in latere spinalis medullæ cum acuta cuspide incipiens, juxta sextam aut septimam cervicis vertebra[m] deprehenditur, Fig. 12. c. c. In ascensu vero mole auctus, Caudici medullari nusquam inferitur, sed in toto tractu lateri ejus utrinque accumbit, cui fibræ quibusdam admissis superficie tenus annectitur. Iste ad hunc modum è cervice assurgens, ac intra cranium delatus, *Paris vagi* fibræ adjungitur, quibus in unum truncum coalescere visis inosculatur, ac eodem foramine cranio egreditur; quo perforato, Nervus spinalis, denuo statim *Paris vagi* trunco abscedens, extrorsum reflectitur, Fig. 9. & ♂. Advena seu peregrinus hic Nervus, sodali suo post breve commercium relicto, super musculos Cervicis defertur, quibus propagines quasdam impertit, cumque Paris decimi furculo quodam inosculatur; exinde verò ulterius provectus, longo ductu solitarius incedit; donec ad musculum scapularem pervenerit, cui ferè totus impenditur, Fig. 9. D. Hic Nervus non tantum in *Homine* & *quadrupedibus*, ast etiam in *volucris* & *piscibus* constanter reperitur; in illisque vice brachiorum alis & pinnis movendis destinari videtur.

Circa hujus Nervi usum, ejusque originis Anomalæ rationem, ad hunc modum conjicere liceat: In quantum iste musculorum, qui cervicis & brachii sunt, motibus obeundis destinantur, idcirco à spinali medulla exoriri debuit: quod vero non directò & propiori via in provinciam suam effertur, sed longa ambage circumductus priusquam penso suo accingitur, *Paris vagi* nervo in origine sua communicat: certe hoc propterea fieri videtur, ut nervus iste spinalis, in *Paris vagi* partes & τὰς αὐτῶν accitus, functionis tantum involuntariæ actus perficiat. Et quidem observare licet, quod præter motus sponta-

neos, quibus Cervix & brachium cum prævia hoc aut illud agendi intentione occupari solent; etiam istæ partes, præ alio quovis membro juxta passionum impetus, animali haud conscio, *motibus patheticis & extemporaneis* afficiuntur: Nam cuncta ferè vivencia, non modo ad quemvis strepitum circumagunt cervicem, ut quicquid timendum ingruat aspiciant; verum illa quovis modo perterrita, ictu oculi citius, pedibus, aut alis, aut pinnis, aliave parte analoga, in motum rapissime confitis aufugiunt. Nec solum timori, verum aliis subinde affectibus, collum, & brachia morigera existunt: nam brutis animalibus æque ac homini iracundia aut superbia inflatis (prout alibi innuimus) *intumescit collum, ac juba attolluntur*. Quoad hominem vero, brachia & manus ejus ita passionibus, & quibusvis ferè Cerebri conceptibus obsequuntur, ut inter alia quævis agendum, ista variis gesticulationum modis, quorum minime arbitri sumus, continuo agitentur: nihil ferè cogitamus aut loquimur, quin unà manus huc, illuc jactentur: dumque lingua hæsit, aut vox faucibus hæret, dextra exeritur, quasi gestu suo animi sensa celerius depromere satagens. Profecto quod partes istæ, nempe brachia & manus, quadantenus in cunctis animalibus, eminentius vero in Homine, cum cerebri & Cordis affectibus in motu suo ita proprie conspirant, in causa esse videtur hic Nervus, è spinali medulla ad *Paris, vagi* originem accedens, cumque Nervis ejus communicans, ab iisque *functionis involuntariæ* velut *tesseram* accipiens.

Hæc de Nervo spinali, qui etiam tanquam frutex super aliis fruticibus accrescens, nullibi peculiarem originem habet; sed variis fibris susceptis, maxima ex parte in medulla spinali, atque partim in *Paris vagi* Nervo (prout ostensum est) radicatur. Circa *Diaphragmatis nervum* (de quo proximè dicendum erit) multa non minus observatu digna occurrunt. Quoad *originem* ejus observare est, quod *Nervis brachialibus cum gemina aut tripla radice oriatur; nempe duo vel tres surculi, è prædictis Nervis profecti, eundem truncum, qui Diaphragmatis nervus est, coalescunt*. In homine surculus ejus primus, qui & maximus, è Nervo secundo vertebrali producitur; cumque ab eodem Nervorum vertebraliump manipulo hic loci prodeunte *primus brachialis* exoritur, in principio ejus prædictus surculus radicatur: quare cum in Brutis primus *Nervus brachialis* è quarto quinto vertebrali exoritur, etiam Diaphragmatis Nervus originem suam longe inferius incipit: bini alii surculi ex ipsis Caudicibus Nervorum brachialium, qui proxime succedunt, oriuntur, *Fig. 9. Y. φ.* Truncus autem qui ex surculis istis conflatur, per Cervicis ductum & Thoracis cavitatem, sine ulla ramificatione usque ad Diaphragma singularis pergit, *Fig. 9. x.* ubi in tres aut quatuor surculos denuo expansus, in utroque latere carnosæ sive musculosæ ejus parti inseritur: Adeo ut si quidem Diaphragma sit *musculus*, atque propriis fibris utrumque suum, nempe *systoles & diastoles* motum perficiat; utriusque Nervi munus solummodo existit, spirituum animalium copias pro indiscontinua istius partis actione requisitas deferre, ac insuper motuum varie obeundorum instinctus illuc convehere.

Quoad *primum* hujus Nervi usum, scil. pro spirituum animalium com meatu, res pari modo in hoc musculo ac in Corde peragitur. Spiritus in Dia-

phragma per Nervos influi, copias subsidiarias, nempe *copulam sulphuream* à sanguine suscipiunt, à ejus usque vicissim iteratis *explosione*, & *novi susceptione*, perpetui hujus mobilis actio dependet. Circa *motuum instinctus* gemini hujus Nervi ductu transmissos, observare licet, quod isti præsertim in homine *duplicis generis* existunt: scil. Diaphragmatis *actio*, aut mere *naturalis*, pro respiratione peragenda, juxta Cordis & pulmonum usus continuo recipitur, & pro illorum exigentiis in tenore suo multifariam alteratur; vel *secundò* Diaphragmatis *motus* quidam *anomalus & irregularis*, propter appetitus nutum, vel ob aliarum partium instigationes excitari solet: in quem dum cætera respirationis organa conspirare coguntur, ipse respirationis actus vario modo interruptus inæqualis evadit.

1. Quoad prius horum, scil. musculi hujus motum, *ἀλίσσιν* observare est, quod Diaphragma cum musculis Thoracis, & utraque partes cum pulmonum & Cordis actione in motu suo conspirant: quo inter hæc omnia talis *σύμπασις* sustineatur, observare est, quod à Nervis vertebralibus, in quorum ramis Diaphragmatis nervus radicatur, tres vel quatuor rami in plexum intercostalem dimittuntur, *Fig. I X. Θ*; cumque ab hoc plexu Nervi in musculos Thoracis feruntur, hoc modo inter hos & Diaphragma communicatio & actionis consensus efficitur. Itaque Diaphragma musculos Thoracis secum ducens, propter alios Nervos cum præcordiis conspirat: isti in homine à Nervo intercostali profecti superius describuntur, atque in brutis à plexu inferiore *Paris vagi* nervus in plexum Thoracicum dimittitur, cui insuper totidem furculi, & fibræ quædam in Diaphragmatis nervum protensæ, talis commercii vicem præstant.

2. Diaphragmatis *motus anomali & irregulares* à variis causis & aliarum partium instigatione diversimoda procedunt, qui item in homine multo insignius quam in brutis animalibus eveniunt; quia nimirum in illo communicatio per Nervos à plexu Cervicali *Paris intercostalis* in Diaphragmatis Nervum protensos, notabilis existit; cujusmodi & Plexus & Nervi in brutis desunt.

Quoad ipsas vero *anomaliarum* species, in quas Diaphragmatis motus perverti solet, observare licet, quod pro libitu nostro respirationem aliquanto spatio sistere, eam mox corripere aut protrahere possumus: In *risu*, *ploratu*, & *cantu* ejus modo systole, modo diastole intensior, & cum vibratione iterata sursum aut deorsum facta crebrior evadit; cujusmodi illius actus, propter ista propiora commercia inter Diaphragmatis nervum aliasque respectivas pectoris & faciei partes habita eduntur: quinimo hinc efficitur (prout supra ostendimus) quod *homo peculiariter sit animal risibile*; porro (quod etiam alibi innuimus) ex sympathia, quæ inter oris & faciei partes per istos Nervos cum Diaphragmate intercedit, optima *sternutationis ratio* potest reddi, atque problema illud Aristotelicum facile solvitur. Cur nempe *homines*, aut *soli*, aut *maximè*, *præ cæteris animalibus sternutant*? Enimverò sternutationis actus cum ob finem institui videtur, ut homo non tantum *emunctæ naris sit*, verum ut illi *torpor omnis* à vicinis sensuum organis, imò & *toto anteriori Cerebro excutiat*: id quod facile succedit, si membranæ & ductus nervei, nares ac os cribriforme oblinentes, velut extimæ spongiæ liciniæ, fortiter expressi & corrugati humiditates suas deponere coguntur: nam hæ partes ita inanitæ, statim
instar

instar spongiæ compressæ humores alios excipiunt, eos nempe à partibus vicinis derivantes : interim ut colluvies ita circa narium cavernas deposita foras excernatur, illinc à vehemente aëris sive spiritus exsufflatione abripi & abstergi debet. Quapropter observare est, quod dum narium partes internæ, utpote valde sensiles, à re acri aut pungente vellicatæ corrugari, proindeque humorem irriguum deponere incipiunt, statim propter com meatum illinc per ramos *Paris quinti* in truncum intercostalem, & exinde Nervorum ductu, qui à plexu ejus cervicali in Diaphragmatis Nervum protenduntur, ejusdem actionis, sive spasmi consensus, usque in septum transversum producitur; adeo ut eodem velut actu, quo nares corrugantur, etiam Diaphragma cum diastole intensa & diutius & protracta deprimatur; ut pectore quantum fieri potest dilatato, aër copiosius inspiretur: dein quamprimum spasmus membranarum intra nares & sinciput contractarum remittere incipit, illico *septum* cum impetu resiliens aërem inspiratum violenter explodi facit, qui humorem intra narium cavernas expressum fortiter abstergit ac secum foras rapit.

Adhuc circa Diaphragmatis nervum inquiri debet, *quæ ratio est*, quod *iste semper à Nervis brachialibus* procedat, & cur non potius immediate à spinali medulla oriatur. Profecto hinc sequi videtur, quod *brachiorum motus Diaphragmatis actionem* quodammodo respiciat; aut è contra, quod hæc ab illo dependeat. Revera inter hæc duo respectus sive habitudo quædam intercedit; quod equidem hoc argumento facile constat: brachia, sive crura interiora, in cunctis animalibus propter labores & exercitia maxime ardua constituuntur; quippe horum nixu homines pugnant, res operosas & difficillimas aggrediuntur, atque bruta cursum peragunt, & loca acclivia cum magna defatigatione ascendunt. At vero satis notum est, quod à nimio labore & vehementiori corporis motu respirationis actus valde intenditur, ut spiritus fere deficiat, ac sæpe delinquere periclitetur. Hujus ratio est, quoniam à validis exercitiis sanguis in Cordis sinus plus nimio cogitur, qui ne ipsum suffocet, sed in pulmones exantletur, respiratio valde crebra & anhela instituitur. Itaque hinc inferre licet, quod *exercitia corporis juxta præcordiorum status* regulari debent, sive quod *brachiorum motus diaphragmatis actionem observet*, sc. ne ista violentiore motu concita, sanguinem in Cordis sinus plus urgeri faciant, quam Diaphragma respirationem maxime crebram instituens, exinde in pulmones proliciat. Quo hæc regula à cunctis animalibus perpetuo observetur, ita cautum est, ut *Diaphragmatis Nervus*, respirationi potissimum conducens, *Nervis brachialibus*, qui in corporis motu principales sunt, *quasi frenum alligetur*; adeoque hos, siquidem officii sui immemores, tempestitiva moneat, & à corpore amplius movendo, quamprimum respiratio vacillat, desistere jubeat. Quare observamus, quod siquando jumenta supra vires suas in labores aut motum urgentur, sæpe aut *cordis noxa letalis*, vel *Diaphragmatis morbus immedicabilis* succedit; nam à tali immodico labore aut animal elanguescens brevi emoritur, ubi vulgo dicitur ejus *Cor effractum esse*, vel Diaphragmatis tono prorsus labefactato, *respiratio postea semper difficilis & anhelosa* evadit: hoc passim in equis, qui pleno ventre in cursum nimis rapidum impelluntur, evenire solet.

CAPUT XXIX.

De ratione discriminis quod inter Nervos Paris vagi ac intercostalis in homine ac in brutis animalibus intercedit ; item de reliquis Nervorum paribus tum intra Cranium , tum è medulla spinali oriundis : etiam nonnihil de vasis sanguiferis quæ ad spinalem medullam pertinent.

H Actenus Nervos omnes ad præcordia & viscera , necnon ad plerasque alias partes , quæ functionis involuntariæ organa sunt , protensos , juxta ritum quo isti in *homine* conformantur , descripsimus ; eorumque munera ac usus , ac in omnibus phænomenôn maxime notabilium rationes subdidimus. Priusquam ad reliquas Nervorum conjugationes procedimus , ostendere oportet sub quo discrimine Nervi prædicti in *brutis animalibus* reperiuntur , & in quem finem talis cujusque illorum discrepantia instituitur.

Supra innuebatur *Paris vagi* truncum in *quadrupedibus* , vasa nervea plura quàm in *homine* ad Cor & appendicem ejus mittere : Cujus ratio satis obvia est , quia scil. Nervi cardiaci in brutis fere tantum ab hoc Pari , & vix omnino ab intercostali procedunt ; quare cum isti solum unius originationis sunt , ideo plures requiruntur , qui tamen omnes multo pauciores sunt , quàm iidem in homine , à gemina stirpe , sc. ambobus Nervis , profecti : in quantum bestia prudentia carent , & variis diversisque passionibus non multum obnoxia sunt , ideo non opus erat , ut spiritus ab ἐγκεφάλῳ in præcordia derivandi , duplici commeatu , sc. uno pro functionis vitalis exercitio , & altero pro affectuum impressionibus reciprocandis , potirentur ; quin sufficiat eos omnes , in quæcunque ipsorum munera destinatos , eodem usque tramite deferri.

In plerisque Brutis, *Nervus Intercostalis* à Plexu ejus ganglioformi , fere sine ulla ramificatione , usque ad Plexum ejus thoracicum solitarius perstat : in quo tamen transitu non eodem ritu in omnibus habet ; nam in quibusdam *singularis* , & seorsum à *Paris vagi* trunco defertur , nec toto itinere , nisi superius per surculum à Plexu ganglioformi dimissum , cum eo communicat : in plurimis vero , *Nervus intercostalis* mox à plexu ejus ganglioformi in vicinum *Paris vagi* plexum transit , Fig. 10. C. ubi cum utrique Nervi coalescere videntur , illinc ambo sub eadem communi capsula involuti , quasi unicus truncus essent , simul feruntur , donec è regione primæ costæ pervenitur , ibidemque plexu constituto , *Nervus intercostalis Pari vago* abscedens , in plexum Thoracicum defertur , simulque *Nervus* alter inter hunc & istum plexum protenditur : qui Nervi cum unus sub , & alter supra Arteriam subclaviam defertur , facta velut ansula , truncum ejus constringunt , Fig. 10. g.

Etiam si

Etiamsi Nervus intercostalis, à jugulo ad summitatem Thoracis, cum *Paris vagi* trunco sub eadem vagina defertur; haud tamen eidem unitur, sed utrique in toto hoc tractu usque distincti manent, & membrana dissecta, facile ab invicem secedunt, nisi quod fibrillis quibusdam ab invicem emissis in quibusdam locis connectuntur: quatenus autem hoc ritu Nervus intercostalis, *Paris vagi* trunco adjunctus, sub tegmine ejus incedit, solum *tutela* & *melioris conductus* gratia ita constitui videtur: quare in quibusdam, forsan ubi truncus intercostalis major est, aut transitus ejus stadium brevius, quasi tali præsidio non opus esset, ipse solitarius descendit. Vidimus hunc Nervum in uno latere *Paris vagi* præsidio obtectum fuisse, in altero solitarium processisse.

Sive Nervus intercostalis ab inferiori *Paris vagi* plexu abscedit, sive non, utcunque inter hunc & plexum Thoracicum in plerisque brutis, forsan omnibus, ramus protenditur, qui in transitu Arteriam vertebralem circumligat, quo certe inter *præcordia* & *exteriora respirationis organa sympraxis* sustinetur: quinimo ab hoc inferiori *Paris vagi* plexu quandoque surculum & fibras ad rami brachialis principium, in quo Diaphragmatis nervus radicitur, deferri observavimus: quandoque etiam, licet rarius, à plexu thoracico propagines quasdam versus Cor & appendicem ejus emissas vidimus. In Cercopitheco, supra hunc Plexum thoracicum, surculos quosdam & propagines à Nervo intercostali versus præcordia extensos prius innuimus.

Circa hos Nervos infra præcordia, in ventriculum & viscera inferiora ubi-vis distributos, nullum fere discrimen, quo in homine ac brutis differunt, advertere licet. *Diaphragmatis nervus* in quadrupedibus inferius consistit: cujus ratio est, quia *Nervi brachiales*, è quibus iste procedere debet, inferius oriuntur; quoniam scil. *Brutis longiora colla*, utpotè *jugo destinata*, tribuuntur. His ita de Nervorum in utraque specie differentia præmissis, quod superest, ad *reliqua eorum Paria* explicanda transeamus.

Itaque ex illis intra Cranium oriundis, *Par nonum* fibris etiam multis in origine constat (prout supra ostendimus) è quibus una colligatis truncus existens, versus linguam defertur, per cujus integram compagem, nempe à basi usque ad apicem trajectus, in toto tractu propagines exiles in utrumque latus dispescit, Fig. 9. ☉: adeo ut nihil magis obvium sit, quàm quod hic Nervus *linguæ motus* pro *Sonorum articulatione requisitos* perficiat, prout Nervi à *Pari quinto* in hoc membrum lati *Saporibus dignoscendis* inserviunt: pro utriusque facultatis, sc. tum motivæ, tum sensitivæ exercitio, linguæ textura insigniter fibrata, duplicis organi virtutem præstat; itaque à binis nervis, præter spirituum supplementa, tum motus instinctus, tum sensibiles impressiones deferuntur.

Quo prædictus *Paris noni* Nervus linguæ motus facilius exequatur, ante linguæ ingressum surculum unum deorsum mittit, qui surculo è *Pari decimo* in musculum sternothyroideum destinato occurrenti unitur: atque alter conjugationis nonæ ramulus in musculos ossis hyoideos distribuitur, Fig. 2. ☉. ☉. Revera hi surculi tanquam funiculi dimissi, musculis qui ad linguæ basin affiguntur movendis conducunt: qui equidem musculi, tanquam *vectes linguæ suppositi*, ejus motum facilitant.

Nervus decimi Paris, licet intra Cranium cum multis etiam fibris exoriri videatur, tamen illinc in spinæ claustra ossea dimissus, non nisi intra primam ac secundam vertebra emergens, extra deferretur. Statim ab egressu duos Nervos in plexum Nervi intercostalis emittit; in quem finem, supra ostenditur: præcipuus vero truncus ejus deorsum latus, & furculum à *Pari nono* productum suscipiens, musculo sternothyroideo impenditur: porro hic Nervus ramos exterius reflectit, qui in musculos cervicis versus occiput protensos distribuuntur; adeo hoc Par, quasi tantum è vertebralium Nervorum censu esset, *ramos quosdam Nervo intercostali impertit*, cæterique omnes furculi & propagines ejus *musculorum cervicis motibus* peragendis inserviunt, *Fig. 9. H. *. II. Δ.*

Hæc de Nervis intra Cranium oriundis, qui (prout ostensum erat) à Cerebri aut Cerebelli partibus existentes, ad functionis spontaneæ, aut involuntariæ munera destinantur, atque potissimum in *sensuum organa*, aut *facultatis vitalis & naturalis viscera* distribuuntur. Restant plures aliæ Nervorum conjugationes, quorum radices sive origines in *medulla spinali* (quæ quidem oblongata tantum exterior productio est) consistunt. Hi Nervi spinales, præterquam quod *Pari intercostali* ramos quosdam elargiuntur, fere in totum musculoso generi impenduntur, eorumque munus est, *spirituum copias & motuum obeundorum instinctus extra deferre*, atque *sensibilium impressiones intus convehere*. Inquantum medulla spinalis à Cerebro derivari videtur, sitque tanquam via lata & regia ab eodem producta, absque compitis ullis aut tractibus à Cerebello huic insertis, ideo spiritus animales intra Nervos ejus scatentes functionis spontaneæ actus fere tantum exequuntur.

Unaquæque Nervorum spinalium paria describere, & singulorum divaricationes recensere, eorumque usus & actiones explicare, esset opus immensi laboris actædii; cumque hæc *ὑπολογία* sine exacta musculorum notitia satis intelligi aut addisci nequit, ab institutione ejus particulari merito hic superfedendum erit: sufficiat vero circa hos Nervos, eorumque principium medullare, in genere tantum, quæ imprimis notabilia & præcipue notatu digna occurrunt, advertere.

Quoad Nervos igitur è spinali medulla productos, observare est, quod in utroque ejus latere, prope limbum exteriorum quatuor vel quinque fibræ in margine superiori, totidemque in inferiori oriuntur; utrique manipuli *piam matrem*, sive infimam medullæ spinalis tunicam, & dein membranam proximam sive *duram meningem*, quæ omnium velut capsula communis est, cum fibris distinctis pertranseunt, postea tamen utriusque marginis fibræ membranam tertiam (tres enim medullam spinalem investiunt) pertranseutes, una coeunt, & tunica ipsis è secunda membrana ascita investiti, in unum quasi truncum evadunt, qui truncus vertebrarum internodio exiens, iterum in plures Nervos ad varias partes destinatos dirimitur. Ad hunc modum in toto medullæ spinalis tractu singuli Nervi vertebrales natalitia sua habent; istis verò in locis ubi Nervi brachiales & crurales egrediuntur, tum medullæ spinalis crassities & latitudo augentur, tum fibrarum manipuli ampliores existunt. Hæc omnia in *Fig. 12.* satis apte repræsentantur.

Nervi brachiales non modo proximis vertebralibus longe majores sunt, ut
velut

velut chordæ nerveæ amplæ ac latæ appareant ; verum ut melius pro validis brachiorum , aut crurum anteriorum motibus una conspirent & connituntur , observare est , quod plures eorum per *processus nerveos transversos* invicem connectuntur. Hi processus in quadrupedibus (quorum crura anteriora in nixus difficiliore & indefatigabiles destinantur) concinno modo intercussatim producantur , uti cernitur *Fig. 10. 11.* Harum usus videtur , non modo in pluribus simul nervis actionis consensum , verum & mutuum robur sustinere ; nempe ut spirituum manipuli alii alios exsuscitent , & pro virtute locomotiva fortiter exercenda se invicem suffulciant , ac mutuo sibimet succenturientur. Non absimili ritu circa *Nervos crurales* res habet , ubi chordæ nerveæ insigniter amplæ , è vertebrarum juncturis productæ , dum versus femur descendunt , in toto tractu , quæ superiores sunt , processus nerveos usque ab inferioribus emissos suscipiunt. *Fig. 11. p. p. p.*

Adhuc amplius circa *medullam spinalem* advertere liceat , quod sicut *Nervos* ordinata serie & diatxi velut militari manipulatim ac quasi per turmas emittit ; ita *vasa ejus sanguifera* non minus insigni artificio disponuntur : nam quæ in superficie spinalis medullæ , quæque juxta ambitum ejus *Arteria & vena* , aliique *sanguinis ductus* feruntur , rariora quædam & summè notatu digna continent.

Primo observare est , quod *vasa sanguifera* totam *medulla spinalis* pariter ac *oblongata* compagem densa propaginum serie investiunt ; quod cuipiam inquirenti manifestius fiet , si prius arteriis vertebralibus atramentum injiciatur : nam à tali injectione aliquoties iterata , facile patebit vasorum plexus veluti retiformes superiorem medullæ tractum obducere. Quo tamen ritu hæc vasa utrinque ab arteriæ vertebralis trunco procedunt , ac qui insuper *sanguinis ductus venosi* totæ medullæ spinali , ac *arteriosi* ejus portioni inferiori destinantur , non ita plane constat ; quia sc. vertebrarum claustra ossea non sine difficili negotio , præsertim in adultis animalibus , perrumpuntur ; eoque opere ut plurimum vasorum ortus & ramificationes deleri solent : verum ut recondita hæc accuratius rimemur , varias *embryonum* dissectiones instituimus , nempe in quibus vertebrae adhuc molliores quoquo modo dissecare , iisque medullam integram eximere , atque ossium recessus quosvis penitus introspicere licebat ; porro vasis omnibus , quo illorum tractus & divaricationes melius perciperentur , liquores vario modo tinctos injecimus. Atque huic indagini successus optatus aderat : nam cito cum plurima admiratione deteximus , quod ejusmodi vasa , scilicet *arteria* , *sinus* & *vena* , quæ ἐγκέφαλον respiciunt , cum apparatu non minus insigni disposita , etiam ad *medullam spinalem* pertinent.

Cum olim *Capita* seorsim à *spina* dissecaremus , *arterias vertebrales* tantum ad ἐγκέφαλον spectare , juxta vulgi sententiam opinabamur : Cumque in abscisso medullæ oblongatæ Caudice tres rami arteriosi (prout in prima & secunda *Tabula* , jam alias expositis , superius describuntur) apparerent , idcirco in utriusque Figuræ explicatione *arteriam vertebralem cum triptici ramo in occiput efferrî pronuntiavimus*. Verum enim vero *Arteria vertebralis* , superiori *spina* parti , sanguinis æque magna tributa ac ipsi ἐγκέφαλον pendit , atque *medius iste ramus arteriosus* , qui in Figura prima litera T. in secunda vero S. insignitur ,

minime in caput ascendit, verum ab isto arteriarum vertebralium concursu versus spinam descendit, ac à communi sanguinis per plures arterias confluxu ibidem facto, laticem pro medullæ spinalis summitate irriganda deorsum convehit. Quare hic loci non modò istum errorem nostrum corrigere, at vasorum omnium quæ spinæ destinantur, quæ sc. plurima stupenda continent, exactam descriptionem tradere opportunum videtur. Cum itaque hæc vasa triplicis sunt generis, sc. *Arteria*, *Sinus*, & *Vena*, singula eorum particulatim exponemus; ac imprimis de *Arteriis* dicemus.

Arteria, quæ sanguinem versus spinam conducunt, alio modo *supra Cor*, alióque *infra ipsum* disponuntur. Quoad *præ*, cum *Aorta* truncus ibi statim in plures ramos fissus, regione spinæ abscedit, ideo è ramis ejus axillaribus *Arteria vertebralis infra* utrinque producitur, quæ recta in occiput ascendens, furculum in cujusque vertebræ commissuram emittit: *Infra Cor* vero, in quantum *Aorta* in toto descensu suo spinæ incumbit, è basi ejus, juxta singula vertebrarum internodia, duæ arteriæ in spinam suscipiuntur; adeo ut si *Aortæ* truncus per longum dissectus aperiatur, foraminum duplicium series per totum ejus tractum concinno modo, velut in *capite muræna*, dispositæ apparebunt.

Rami arteriosi, qui tum *supra*, tum *infra Cor* versus spinam feruntur, statim bifidi, furculum unum musculis vicinis impertiunt, atque alterum juncturis vertebrarum inferunt; qui intra septum osseum delatus, statim in tres ramulos finditur, quorum *bini Caudici medullari*, atque *alter membrana* specum osseam antè succingenti impenditur. Tab. 13. Fig. 111. a. b. c. d. e.

Quoad propagines *Caudici medullari* destinatas, illæ mox duplici via tendentes, ac utrique fibrarum nervearum manipulo obviam factæ, versus earum origines ascendunt; adeoque arteriola una *posterio-rem* medullæ superficiem assecuta, vasa capillaria in ipsam distribuit: altera autem propago arteriosa, quæ major & præcipua est, quamprimum *medullæ anterioris* marginem attingit, exinde obliquo transitu in mediam ejus fissuram defertur, ubi pari alterius lateris propagini occurrens, eidem unitur, ac ab isto coalitionis nodo *Caudex arteriosus*, quasi ductus communis, ab utraque propagine vertebrali conflatus, in ea fissura, per unius vertebræ spatium descendit, ac in brevi isto transitu arteriolas tum in utrumque latus dispensat, tum inter medullæ latera eas *pia matri* innixas altius inserit: cumque adeo in toto medullæ tractu, præcipuus cujusque arteriæ caudex in fissura media defertur, primo aspectu videtur, quasi idem truncus totam medullæ compagem à Capite ad caudam subdueret. Tabul. 13. Fig. I. Porro veluti à singularum utriusque lateris propaginum concursu, *Arteria spinalis* *supra medullæ* fissuram descendit; ita ubi *Arteriarum vertebralium* trunci coeunt (quod interdum in *occipite supra medullam oblongatam*, & non raro in *cervice supra spinalem* fieri contingit) *Ramus arteriosus*, cæteris aliquanto major, deorsum protenditur. Hunc olim (uti modo innuimus) pro tertio arteriæ vertebralis ramo ascendente perperam cepimus. Cæterum aliquoties adverti, quod in brutis, ubi *Arteriæ vertebrales* cum angulo acuto *supra Caudicem medullarem* coiverint, isti mox ab invicem discedentes, ad utrumque medullæ marginem recta protenduntur, unde statim reflexi iterum in mutuos occur-

sus feruntur, adeo ut inter binas ipsorum coalitiones *figura Rhomboides* describeretur, uti est Tab. 13. Fig. I. C. Cujus ratio proculdubio hæc est, nempe ut sanguinis versus *ἐγκεφάλου* euntis, flumine ejus parumper diviso, rapidior decursus inhibeat.

Tertius Arteriæ cujusque vertebralis surculus in specus osseæ cavitatem anteriorem delatus, ac statim bifidus, in dextram lævamque tendit, ac utrinque surculo proximo ejusdem lateris, & per processum transversum, istis alteris eodem modo unitis, inosculatur; adeoque omnes hujus census arteriæ in toto spinæ tractu velut *catena annuli* se mutuo excipiunt, & sub eodem ductu flexuoso continuantur. Si Arteriæ vertebralis trunco ac plerisque Aortæ foraminibus atramentum injicitur; omnes hæ arteriæ eodem tinctæ, cum jucundo spectaculo, velut *instita reticularis* apparebunt, prout cernitur in Tab. 13. Fig. III.

Hujusce *plexus arteriosi* summitas in cranium delata, duas propagines recta emissas *reti mirabili* inserit, & binas alias utrinque lateraliter exeuntes *dura meningi* impertit: ejusdem extremitas inferior usque ad *os Sacrum* protensa, in vasa minuta, quæ ossium membranæ inserviunt, desinit.

Si inquiratur, ob quem finem hæ arteriæ ita crebra inosculatone concatenatæ intra spinam disponuntur: propter *tres usus* hoc ita institui videtur. Sc. *primò*, hæc vasa (sicuti & sinuum ductus) repetitis ambagibus eo ritu divaricantur, ut à sanguine ita in crebros quasi vortices contorto, *calor constans*, tanquam à *Balneomaria*, circa medullæ spinalis ambitum suppeditetur; quale quidem muneris genus *plexus Choroëides* intra cerebri plicaturam præstat. *Secundò*, hac ratione providetur, ne sanguis in medullam spinalem destinatus, illuc ubertim nimis influat, aut à debito influxu deficiat; nam sanguis Caudicem medullarem uberius influxurus, è ramulis *c. d.* in hæc emissaria *c. f.* divertit, atque in defectu ejus, penus subsidiaria è plexu medio per canalem *e.* in vasa *c. d.* evocatus, in eundem Caudicem medullarem derivatur. *Tertius* hujusce *plexus arteriosi* usus videtur esse, ut à ductibus ejus sanguis in membranas distribuatur, qui sc. ubique ab istis per vasa capillaria effertur; cujus item reliquiæ per canaliculos à *sinubus* emissos resorbentur. Porro ab hoc condo, si necessitas urget, penus quædam in cerebri exigentias accitur; quare hinc vasa minuta in rete Mirabile desinunt.

Hæc de *Arteriis* circa spinam distributis: vasa secundi generis sunt *Sinus*, qui propter medullæ spinalis, non minus quàm ipsius *ἐγκεφάλου* usus, *arterias & venas intercedunt*, atque hic implicatione magis concinna ordinantur. Ratio autem cur Sinus ad nobiliores has partes, atque præterea vix ad ullas in toto corpore requiruntur, hæc est; nempe ut circa corpora isthæc sanguinis extravasitio, aut stagnatio quævis omni modo inhibeat: attamen *vena* interdum non satis deplentur, ut sanguinem ab *Arteriis* depositum illico excipiant, adeoque eluvionem ejus quamvis prohibeant; quapropter *sinus*, velut excipuli magis idonei, ei muneri destinantur, utpote quorum receptacula ampliora sunt, ac cito inaniuntur; proindeque sanguinem ab utraque substantia medullari, ne sc. ipsam in *capite* aut *spina* inundet, commodius derivent.


Quoad *Sinus vertebralis* Figuram, ductus ejus *plexui arterioso* conformes huic

in toto spinæ tractu subjiciuntur : pari enim modo in *utroque sinu*, qui intra specus ossæ cavitatem ab occipite in os sacrum protenditur, *vas unum excipiens*, per cujus statim bifidos canales sanguis ab utraque medullæ superficie in sinum reducitur ; atque *aliud deferens* habetur, cujus ductu idem in venas exportatur. Porro in plerisque animalibus (licet non omnibus) Sinus utriusque lateris super vertebrarum internodia per processus transversos connecti videntur, adeoque inter se communicant : *uterque Sinus* in summitate sua in *sinus Capitis laterales* continuatur, porro ab eo tum in *venam jugularem*, tum in *vertebralem* ductus utrinque patescit, Tab. 13. Fig. I V.

Quis sinus prædicti usus in genere sit, modo innuitur ; nempe ut sanguis ab arteriis in spinali medulla depositus, illinc è vestigio exantletur, ac intra sinuum cavitates ampliores retineatur, donec in venas deplexiores factas transferri poterit : at vero quæ circa istorum canaliculos deprehenditur, *diversimodæ implicationis, crebraque inosculationis* ratio esse videtur, ut sanguis, si forte intra sinus partem aliquam uberius aggestus, ibidem stagnare, aut in medulla regurgitare aptus fuerit, per ista crebra emissaria huc illuc in medium, aut in latus oppositum proliciat : pari modo de sinibus circa spinam habet, ac cum rusticus in agro suo crebras porcas transversim factas ad derivandam uliginem quamvis effodit.

Restat alius sinuum vertebralium usus, cujus supra mentionem fecimus, nempe ut sanguis juxta corpus medullare, per horum (uti & plexus arteriosi) mæandros varie intortos traductus, *calorem* pro spirituum animalium celeri traiectione requisitum velut à *Balneomaria* suggerat. Quo flexuosi sinuum tractus & complicationes melius conspiciantur, tinctura quædam venis vertebralibus injiciatur ; atque statim ea sinuum ductus pervadens, ipsosque insigniens, *scalæ longioris*, cum *multis appendiculis*, apparentiam exhibebit.

Quinimo demum, per istas *sinuum appendiculas* ad *tertium vasorum spinalium genus* manuducitur, quæ nempe sunt *Vena*, in quas sinus omnes sarcinam suam immediate convehunt ; quo nimirum ipsi continuo inaniti sanguinem usque recentem excipere possint : Quare per singulas vertebrarum commissuras *ramus venosus* in *sinum* protenditur, qui extemplo sanguinem in eo depositum, ac versus Cor reducendum auferat. *Vena* huic muneri designatæ, ad arteriarum exemplar, alio modo *supra Cor*, alioque *infra ipsum* disponuntur. Quoad prius, ramus à venæ cavæ trunco infra subclavium profectus, arteriam vertebralem comitatur, & per processus foramina ascendens, inter singulas vertebrae ramulum *sinui* inserit. Tab. 13. Fig. II. h. h. h. Dein vero hujus venæ summitas, versus occiput delata, in sinus truncum continuatur, perque ductum alium in venam jugularem dehiscit : Insuper vero, tanquam hæ communicationes pro sanguine elutriando adhuc minus sufficiant, etiam *inter utrasque venas rami transversi* protenduntur, Tab. 13. Fig. II. i. i. i. Adeo multiplicia prostant diverticula, quibus satis superque provideretur, ne sanguis propter quamvis occasionem versus Caudicem medullarem regurgitet. Infra Cor, quia venæ Cavæ truncus non uti Aorta immediate spinæ incumbere, eidemque propagines recta inferre potest, ideo venam sine pari dimittit, è cujus trunco rami bijugi emissi, ac etiam bifidi, & *musculis* utriusque lateris & *ipsi* *spina* prospiciunt : Infra renes, cum venæ Cavæ prope spinam deferri spatium



spatium conceditur, vena Azygos definit, atque à majoris venæ, pariter ac ab arteriæ trunco, *vasa lumbaria* immediate procedunt.

Hæc de *vasis sanguiferis* ad *spinam & posteriorem iuncturæ partem* spectantibus nuper observata, & hîc *appendicis loco* inserta, referri debent ad aliam hujus *farinæ doctrinam* superius in capite octavo traditam. Interim ad instituti nostri, *Agrologiæ* sc. quod residuum est ut redeamus, non multa præterea circa Nervos observatu digna occurrunt: Enimvero isti, quoad majores & præcipuas ramificationes, quo ritu eos descripsimus, tum in *homine*, tum in *brutis animalibus* ferè constanter habent. Interdum accidit, licet hoc etiam rarius, circa minimarum propaginum & fibrarum divaricationes varietatem quandam evenire: attamen quoad stamina primaria, eorumque protractus, cujusque nervorum paris configuratio in omnibus usque eadem, aut similis existit. Modo restat, ut nervorum Theoriæ hactenus orationis stylo exaratae, adeoque intellectui tantum objectæ, demum sensus (quem illi magis respiciunt) prospectui ac arbitrio sistantur. Quapropter Nervorum *Paris vagi*, ac *intercostalis*, necnon aliorum qui præcipuæ sunt notæ, ipsiusque *medulla spinalis delineationes ichnographicas*, palam exhibendas curavimus: Horum Icones ab exemplari mortuo licet desumptæ; tamen post plures dissectiones, & à collatione crebra quoad singulas cujusque partes instituta, quasi ad vivum describuntur; quarum lineamenta, cum notis characteristicis, ut melius & distincte magis percipiantur, cujusque figuræ protractum ampliorem, ac eorundem in corpore animato nervorum schematismo fere parem procudi fecimus: porro, quoniam utriusque simul lateris & cavitatis interjectæ contenta in proprio situ describi non possunt, ideo hic supponitur spinam cum medulla oblongata, sive totum Caudicem medullarem in medio dissectum evolvi, ejusque latus utrumque cum Nervorum paribus in toto tractu oriundis ad exteriora projici.

Tabula Nona.

Exhibet Nervorum *Paris quinti & sexti* origines, ab iisque *Nervi intercostalis* radices profectas; porro ejusdem *Nervi intercostalis*, & *Paris vagi*, atque nervi è spina ad *Par vagum* accessorii origines, & ramificationes usque ad ventriculi regionem productas: Insuper hic Nervorum *Paris septimi, noni, decimi*, atque *Nervi diaphragmatis* principia & distributiones repræsentantur; atque in toto tractu è regione Nervorum præcordiis & visceribus insertorum, origines Nervorum *Vertebralium*, eorumque cum prioribus communicationes describuntur. Totum hoc Tabula sequens exhibet, prout in Homine diversum ab aliis animalibus reperitur.


A. Nervus quinti Paris, cum duobus ejus ramis A. A. quorum superior rectè antrorsum tendens, in musculos oculi & faciei, in nasum, palatum, & totius oris partem superiorem propagines distribuit; insuper binos musculos reflectit a. a. qua Nervi intercostalis due radices sunt: alter quinti

- Paris ramus inferior, deorsum vergens in maxillam inferiorem ejusque partes omnes dispergitur.
- a. a. *Dua propagines à superiore quinti Paris ramo dimissa, quæ cum surculo altero b. à Nervo sexti Paris reflexo coeuntes, Nervi intercostalis truncum D. constituent.*
- B. *Nervus sexti Paris, recta antrorsum in oculi musculos tendens, è cujus trunco surculus b. qui tertia Nervi intercostalis radix est, reflectitur.*
- b. *Tertia Nervi intercostalis radix.*
- C. *Nervi auditorii, sive Paris septimi origo, cum duplici ejus processu, scil. molli & duro.*
- c. *Ramus ejus mollior, qui totus in partem auris internam distribuitur, scil. in musculum mallei elevatorem, & cochleam.*
- c. *Ramus ejus durior, qui integer extra cranium emergens, & propagini e. octavi Paris inosculatus, cum ea Nervum singularem constituit, qui statim dividitur in plures surculos: horum*
1. *in musculos linguae & ossis hyoidis absumitur.*
 2. *rursus in plures propagines, quarum superior.*
 3. *in musculos faciei & oris.*
 4. *in musculos auris.*
 5. *in musculos auris.*
- D. *Nervi intercostalis truncus, à tribus prædictis radicibus constans, in plexum ganglioformem transiturus, qui plexus Nervi intercostalis, extra Cranium producti, supremus nodus esse videtur.*
- E. *Nervi Paris vagi, sive octavi, origo multis fibris constans, quibus Nervus Q. è spina oriundus accedit, cumque iisdem inosculatus una cranium pertransit, quo traiecto, denuo abscedit, & communicatione cum vicinis quibusdam nervis habita, in musculos scapulae ac dorsi impenditur.*
- e. *Surculus octavi Paris, ramo auditorio occurrens.*
- f. f. f. *Aliae propagines Paris vagi in musculos cervicis.*
- G. *Ejusdè Paris ramus principalis, in plexum ganglioformem proprium demersus.*
- H. *Plexus ganglioformis superior Paris vagi, qui surculum k. è plexu altero Nervi intercostalis vicino admittit.*
- h. *Ramus è plexu prædicto Paris vagi in musculos laryngis, cujus surculus insignis Cartilaginem scutiformem subiens, Nervo recurrenti occurrit, eisdemque unitur.*
- i. *Surculus è plexu cervicali Nervi intercostalis in truncum Paris vagi immissus.*
- K. *Plexus inferior Paris vagi, è quo plures nervi ad Cor & appendicem ejus procedunt.*
- l. *Surculus insignis ad plexum Cardiacum dimissus.*
- m. *Fibra nervosa in pericardium & vasa cordi appensa distributa.*
- n. *Nervus recurrens sinister, qui Aorta trunco descendente circumligato, sursum versus cartilaginem scutiformem reflexus, in ascenso multas propagines **** asperæ arteriæ impertit, ac demum surculo h. è plexu ganglioformi dimisso occurrit. Hic recurrens à reflexionis modo propagines quasdam versus Cor dimittit.*

- L.** Nervus recurrens in latere dextro, qui multo superius reflexus Arteriam axillarem circumligat.
- O.** Ramus insignis è trunco Paris vagi in latere sinistro versus Cor dimissus, cujus statim bifidi surculus unus vena pneumonica truncum circumligat, alter posticam Cordis regionem attingens, in plures propagines qua superficiem ejus obducunt, dispescitur: huic par ramus cardiacus ab alterius lateris trunco emissus occurrit.
- P.** Rami prædicti surculus, venam pneumonicam circumambiens.
- Q.** Ejusdem ramus alter multas propagines Cordi impertiens; qua propagines superficiem ejus posteriorem obducunt.
- r. r. r.** Propagines exiles è trunco Paris vagi emissa, qua longo tractu œsophago inseruntur, extra proprium situm reflexæ.
- S. S. S.** Surculi plures resecti, quorum ramificationes in pulmonum substantiam distributæ, vasa sanguifera variè stringunt & circumligant.
- T. T. T.** Truncus Paris vagi dividitur in duos ramos, scil. exteriorem & interiorem, quorum utrique versus pares ramos alterius lateris inclinati, iisdem uniuntur, & post mutuam communicationem duos ramos stomachicos, scil. superiorem & inferiorem constituunt.
- V. V.** Rami interni, qui uniti in X. rami stomachici inferioris principium constituunt.
- VV. VV.** Rami externi, qui in figura huic adjicienda uniti, ramum stomachicum superiorem efficiunt.
- X.** Ramorum internorum coalitio.
- F.** Origo Nervi Paris noni cum multis fibris, à quibus unitis Truncus constans versus linguam defertur; in progressu tamen duos surculos dimittit.
- ⊙. ⊙.** Surculus primus deorsum tendens, & ramo Paris decimi unitus musculo sternothyroideo impenditur.
- ⊙. ⊙.** Surculus secundus in musculos ossis hyoidis.
- ⊙.** Hujus Nervi truncus in lingua corpus transiens.
- ⊙.** Plexus Ganglioformis Nervi intercostalis superior, qui hujus Nervi Cranio egressi supremus est.
- æ.** Surculus è Plexu hoc in plexum vicinum Paris vagi.
- b. b.** Duo processus nervosi, per quos hic Plexus cum Nervo Paris decimi communicat.
- γ.** Surculus in Sphincterem gula dimissus.
- Γ.** Plexus medius, sive Cervicalis, qui homini proprius juxta mediam cervicem in trunco Nervi intercostalis consistit.
- δ.** Ramus insignis è secundo Pari vertebrali in hunc plexum, quo hic cum Nervo diaphragmatis, in prima radice sua communicat.
- ε. ε.** Duo rami ab eodem Plexu in truncum Nervi diaphragmatis.
- ζ. ζ.** Plures fibra nervosa è Plexu cervicali in Nervum recurrentem, ac in vasa sanguifera; item in Trachea ac œsophagi tunicas disseminantur.
- θ.** Surculus ab eodem in Truncum Paris vagi.
- χ.** Surculus alter insignis in Nervum recurrentem.
- κ. κ.** Duo rami insignes versus Cor dimissi, quos ramus alter λ. paulo inferius oriundus assequitur: hi deorsum lati inter Aortam & arteriam pneumonicam, paribus ramis alterius lateris occurrentes, Plexum cardiacum

cum Δ. constituunt, è quo Nervi præcipui qui Cordi impenduntur, procedunt.

- λ. Ramus paulo inferius à Trunco intercostali profectus, qui cum prioribus Plexui cardiaco destinatur.
- Δ. Plexus iste prædictus cardiacus.
- μ. Ansula ab eodem profecta, quæ Arteriam pneumonicam circumligat.
- ν. Ansula inferior venam pneumonicam stringens.
- Σ. Nervus intercostalis in cavitatem Thoracis demersus, ubi arteriam axillarem stringit.
- ξ.ξ.ξ.ξ. Quatuor Nervi vertebrales in Plexum thoracicum dimissi, quorum superior Arteriam vertebralem stringit.
- ο.ο.ο. Tres rami insignes à Cardiacæ plexu dimissi, qui anteriorem Cordis regionem obducunt, sicut Nervi p. q. è trunco Paris vagi profecti, ramificationes parti ejus posticæ impertunt.
- ω. Arteria vertebralis à Nervo vertebrali circumligata.
- ς.ς.ς. Propagines nerveæ anteriorem Cordis regionem obducentes.
- τ.τ.τ. Propagines, & fibra nerveæ in posticam ejus partem distributæ.
- Θ. Plexus inferior, propriè Intercostalis, sive Thoracicus dictus, cui præter Nervum Intercostalem quatuor vertebrales inferuntur: horum supremus in descensu arteriam vertebralem circumligat.
- I. Nervus intercostalis per thoracis cavitatem juxta costarum radices descendens, ubi in toto progressu à singulis vertebrarum internodiis ramum admittit.
- H. Nervus Paris decimi, multis fibris in origine constans, inter primam & secundam vertebralem emergit, ubi statim duos processus nervosos b. b. in Plexum superiorem Nervi intercostalis emittit.
- *. Ramus ejus, qui surculo noni Paris unitus, in musculum Sternothyroideum, aspera Arteria immediate incumbens, impenditur.
- Π. Surculus reflexus in musculos cervicis posteriores.
- Δ. Surculus in Nervum spinalem Patheticum.
- φ.φ.φ. Propagines ab ejusdem Nervi ramo præcipuo in musculum Sternothyroideum.
- I. Nervi vertebralis primi origo, quæ in hoc, pariterque in cunctis aliis vertebralibus, multis fibris constat, quarum manipulus unus à medulla spinalis margine inferiore, ac alter à superiore prodiens, obviam facti, in eundem truncum coalescunt, qui statim in Nervos multifariam distributos dirimitur.
- ρ. Surculus ab hoc Nervo in ramum decimi Paris.
- σ. Surculus alius in spinalem Patheticum.
- ς. Ramus insignis sursum in musculos cervicis emissus.
- T. Surculus à Nervo incurvato in musculos cervicis anteriores.
- 7. Nervus ab hoc Pari, in Nervum primum brachialem, è quo Nervus diaphragmatis radicem supremam habet.
- M. Origo Nervi secundi vertebralis, è quo ramus supremus brachialis procedit, & in quo Diaphragmatis Nervus primo radicatur. Hic Nervus brachialis in quadrupedibus juxta quartam aut quintam vertebralem oritur, proindeque Diaphragmatis radix inferius consistit.
- ν. Ramus iste vertebralis brachio destinatus.



- Y. Diaphragmatis Nervus, cuius radici surculus δ. è plexu cervicali accedit, & paulo inferius ab eodem plexu duo alii rami, e. e. in truncum eius pro-
tenduntur. Hæc communicatio Homini propria est.
- φ. Diaphragmatis radix altera, è Nervo secundo & tertio brachiali.
- χ. Diaphragmatis Nervi truncus inferior extra locum remotus, qui in proprio
situ Thoracis cavitatem sine ulla communicatione trajiciens, recta ad
diaphragma pergit, ubi in tres surculos expansus, musculosa eius parti
inseritur.
- ψ. ψ. ψ. ψ. Cateri Nervi brachiales, è quorum radicibus Nervi in Plexum interco-
stalem.
- ω. ω. ω. ω. Nervorum vertebraliū origines, è quorum singulis radicibus ramus in
Nervum intercostalem defertur.
- ϣ. ϣ. Nervi spinalis ad Par vagum accessorii origo ultima, cum cuspidē acuta
incipiens.
- ♀. Eiusdem Nervi truncus ascendens, qui in toto ascensu per latus medulla
spinalis incedens, Nervorum vertebraliū origines medias pertransit, &
à Caudice medulla fibras accipit.
- ♂. Eiusdem Nervi Truncus descendens, qui Pari vago abscedens, extrorsum
reflectitur, & post communicationes cum Nervis noni & decimi Paris
habitas, totus in musculos scapula impenditur.
- Γ. Eiusdem Nervi processus inferior.

Tabula Decima.

Eorundem Nervorum qui in priori Tabula describuntur, origines
& ramificationes exhibet, prout illarum aliquæ secus in
Brutis animalibus ac in Homine reperiuntur.

- A. Nervi intercostalis truncus Cranio egressurus.
- B. Plexus Ganglioformis superior, in trunco Nervi intercostalis excitatus.
- C. Nervus intercostalis è Plexu prædicto proprio emergens, inque alterum
Paris vagi Plexum vicinum dimissus.
- D. Surculus è plexu superiori in sphincterem gula.
- E. Virique Nervi eadem vagina inclusi, quasi idem truncus essent, versus
Thoracem descendunt, è quo trunco apparente hîc loci ramus in Ner-
vum recurrentem emittitur.
- F. Plexus inferior in trunco Paris vagi, seu potius in communi utriusque
Nervi vagina consistens.
- f. E plexu hoc surculus in ramum brachialem intermedium, in quo ramo dia-
phragmatis Nervus radicem habet.
- G. Ab eodem plexu Nervus intercostalis abscedens, & arteriam axillarem
subtergressus, Plexui Thoracico inseritur.
- g. Ramus alter duos Plexus intercedens, & arteriam axillarem superans,
adeo ut bini hi Nervi, facta velut ansula, Arteriam circumligent.
- H. Surculus insignis è prædicto Paris vagi plexu in Plexum cardiacum.
- i. i. i. i. Exinde plures fibræ nervosæ in vasa cordi appensa & pericardium dimit-
tantur.


- k.k.k.k. *Nervi brachiales majores, qui paulo inferius producuntur in Brutis animalibus quam in Homine: proindeque Diaphragmatis nervus inferius oritur.*
- L. L. L. *Nervi brachiales per processus nerveos transversos, & se mutuò intercussantes, invicem communicant.*
- M. *Nervus Diaphragmatis tribus radicibus constans, cum in Homine sunt duae tantum.*
1. *Ejusdem Nervi radix prima.*
 2. *Radix ejus secunda.*
 3. *Ejus radix tertia, quae mediate, scil. per rami brachialis truncum, cui insigitur, cum Plexu Paris vagi communicat.*
 - n. *Nervus è ramo secundo brachiali in plexum intercostalem delatus, qui in transitu arteriam vertebralem circumligat.*
- N. *Surculi, & propagines ab utrovis Nervi recurrentis nodo versus Cor & appendicem ejus dimissae.*

Cæteri Nervi & ramificationes illorum pariter habent in priori Figura, quæ eorundem in Homine hypotyposin refert.

Tabula Undecima.


Exhibet Nervorum Paris vagi & intercostalis ramificationes inferiores, ventriculo scil. & totius Abdominis visceribus distributas; item Nervorum vertebralium, qui priorum è regione consistunt, cumque aliquibus eorum inosculantur, origines describuntur. Horum configuratio in Homine ac quadrupedibus ferè similis existit, ut hæc Tabula sit utriusque communis.

- A. *Ramus stomachicus inferior, qui ex ramis Paris vagi utriusque lateris interni simul unitis conflatur, & ventriculi fundum obducens, propagines in toto tractu quaquaversus dispergit.*
- B. *Ramus stomachicus superior, qui ex ramis Paris vagi utriusque lateris externis simul unitis constat, & ventriculi summitatem perreptat.*
- C. *Ramorum exteriorum coalitio.*
- D. *Plexus nerveus è fibris utriusque Nervi stomachici juxta orificium simul unitis, & velut in reticulum contextis.*
- a. a. *Extremitates utriusque Nervi stomachici, qui illic Nervis hepaticis occurrunt, cumque iis communicant.*
- E. E. *Nervus intercostalis in utroque latere juxta costarum radices descendens, ac in toto descensu è singulis Nervis vertebralibus e. e. ramum accipiens.*
- F. *Ramus è Nervo intercostali lateris sinistri prodiens, & versus plexus mesentericos dimissus.*
- G. *Idem Nervus mesentericus, bifidus, ramum majorem in plexum, qui & Stomachicus & Lienaris est, ac minorem in plexum Renalem emittit.*
- H. *Par rami Mesenterici è Nervo intercostali dextri lateris prodiens, & versus plexus mesentericos inclinatus.*
- I. *Hujus Nervi, pariter bifidi, ramus major in plexum Hepaticum, & minor in plexum Renalem.*



- h.* Plexus Mesentericus sinistri lateris primus, qui & stomachicus & Lienaris est; è quo plures Nervorum fasciculi, sive conjugationes numerosae multifariam emittuntur.
- ℥.* Plexus Mesentericus Renalis sinistri lateris, in quem, præter surculum mesentericum.
- β. β.* Duo alii Nervi è Nervo intercostali immediate inferuntur.
- γ. γ. γ.* E plexu hoc prope capsulam biliariam consito, plures Nervi & fibra in Renem mittuntur.
- δ. δ.* Nervi & fibra, quibus hic plexus cum plexu mesenterii maximo communicat.
- ζ.* Nervorum fasciculus primus, è priore plexu *h.*, in Lienem tendens, quem affectus, exinde fibras quasdam in ventriculi fundum reflectit.
- ν.* Nervorum conjugatio secunda è prædicto plexu in ventriculi fundum, cujus fibra cum surculis & fibris Nervi stomachici inferioris communicant.
- ξ.* Nervorum conjugatio tertia inter hunc plexum & vicinum hepaticum *Α.*
- ο.* Quarta Nervorum conjugatio inter hunc & plexum mesenterii maximum *Θ.*
- ♀.* Plexus mesentericus Renalis dextri lateris, in quem (similiter ac in Pari ejus,) præter ramum mesentericum.
- Κ. Κ.* Duo Nervi è Nervo intercostali producantur.
- λ.* Nervi & fibra inter hunc plexum & maximum mesenterii.
- μ.* Ramus insignis inter hunc plexum & vicinum hepaticum.
- ν.* Insignis Nervorum & fibrarum cohors è Plexu hoc in Renem, qui vasa emulgentia scandunt, & variè circumligant.
- ♂.* Plexus mesentericus superior dextri lateris, qui & hepaticus.
- ο.* Magna Nervorum conjugatio ex hoc plexu in hepar & cystin felleam, è qua plures item surculi in pylorum & Pancreas distribuuntur. Hujus Nervi & fibra in ascensu versus hepar Arteriam hepaticam velut reticulo facto obducunt, & truncum ejus ferè ascendunt. Horum surculi cum Nervorum stomachicorum apicibus *α. α.* conveniunt.
- π. π.* Surculi circa pylorum distributi.
- ρ. ρ.* Alii surculi in Pancreas dispersi.
- ς. ς.* Nervi inter hunc Plexum & mesenterii maximum protensi. Hic Plexus cum Renali vicino per *μ*, & cum stomachico per *θ*. communicat.
- Plexus Mesentericus maximus, è quo ingens Nervorum fasciculus ...:.. sub magna mesenterii glandula oriundus, exinde quaquaversus in plurimas prapagines & ramos dispescitur, inque omnia intestina (per rectum) distribuuntur. Nervi & fibra quaquaversus protensi, arteriis & venis mesentericis toto ambitu inmituntur, easque variè stringunt & circumligant.
- τ. τ.* Propagines nervosæ ab hoc plexu in testes foemineos, sive glandulas uterinas, quæ ramis nervorum vertebralium Paris vigesimi & vigesimi primi in easdem partes emissis occurrunt, cumque iis inosculantur.
- υ. υ.* Rami vertebrales in Testes foemineos.
- ϑ.* Plexus mesenterii infimus longe infra priores consitus, & pro origine sua tres utrinque Nervos ab intercostalibus inferius oriundos habens.
- φ. φ. φ.* Tres Nervi utrinque à Nervo intercostali in plexum mesenterii infimum dimissi.

- x. x. Nervus ab isto plexu directe in maximum mesenterii plexum protensus, qui in transitu fibras aliquot ab intercostali Nervo utrinque accipit, sc. 4. 4. 5. 5. 5. & ipse surculos duos in testes foemineos mittit.
- †. †. Duo rami à nervo predicto in testes foemineos.
- ‡. Plexus alter exiguus paulo supra hunc infimum consistens.
- ω. Processus nervosus à plexu predicto infimo in vicinum perexiguum protensus.
- a. E. Plexu minimo ‡ Nervus insignis in plexum mesenterii maximum elatus, qui in toto ascensu intestinum rectum & coli partem subtendit, iisque propagines crebras inserit.
- b. Ramus alter ab eodem plexu deorsum missus, qui eiusdem intestini recti partem inferiorem subtendit, eique propagines crebras impertit.
- C. C. Duo Nervi è Plexu mesenterii infimo D deorsum missi, qui circa imam ventris cavitatem in pelvim dimissi, binos ibidem plexus K. K. scil. unum in alterutro latere consitum, subeunt.
- K. K. Plexus gemini intra pelvim consiti, quorum Nervi excretionibus singulis, scil. urina, stercoris & seminis, ibidem factis prospiciunt; hi Nervos d. d. versus plexum infimum mesentericum emittunt.
- d. d. Nervus à predicto plexu utrinque juxta latus intestini recti ascendens, ei propagines inserit, quibus geminis Nervus alter (b) è plexu minimo descendens occurrit.
- e. e. Duo Nervi ab eodem plexu in uterum.
- f. Nervus ab eodem plexu in vesicam.
- g. Nervus in glandulas Prostatas.
- h. Nervus è radice vigesimi octavi Paris vertebralis in musculum ani.
- i. Par vigesimum novum vertebrale, à quo
- k. Nervus in sphincterem, & reliquos musculos ani.
- l. Nervus insignis utrinque ab isto Pari in penem.
- m. Ramus alter breviter in musculos penis.
- L. L. Nervus intercostalis infra renes.
- m. Nervulus à ramo vertebrali in testis virilis musculum cremasterem.
- n. Par vertebrale 21. cujus origo ponè renes consita delitescit. Ab hoc Nervo plures utrinque propagines in testes foeminei sexus mittuntur, qui surculis aliis mesentericis eidem parti distributis occurrunt.
- o. Nervus è Pari vertebrali 22. è quo etiam surculi quidam in testes foemineos.
- p. p. p. p. p. p. p. p. Nervi in crus destinati, quorum qui superius oriuntur, in descensu ramos à Nervis inferius oriundis suscipiunt.
- q. Nervi intercostales, juxta principium ossis sacri ad se mutuo inclinati, per processum transversum communicant.
- r. Processus alter transversus, intra ossis sacri curvaturam duos intercostales Nervos connectens.
- s. Uterque Nervus intercostalis in fibras minutas desinit; quae fibrae in ipsum sphincterem ani distribuuntur.
- t. Nervus è Pari 24. Vertebrali, qui in glandulas inguinales defertur.
- v. v. v. & c. Propagines è Nervo intercostali utrinque in ureteris Corpus dimisse.



- X. Nervus qui ad Testem & Musculum cremasterem destinatur, ubi abdomine egreditur, abscissus.

Tabula Duodecima.

Exhibet integram medullam Spinalem, specu ossea exemptam, & membrana investiente dissecta semi exemptam, ut nervorum omnium vertebraliū origines & productiones conspiciantur.

- A. A. Medulla spinalis summitas, ubi à cohaesione cum medulla oblongata abscinditur.
- P. Arteria Spinalis per totam medullam descendere visa, qua tamen ab arteriis, inter singulas vertebrarum commissuras in ipsam illatis conflatur.
- C. C. Nervus spinalis à quinta vel sexta cervicis vertebra ad Paris vagi originem accedens.
- D. D. Membrana medullam investientis dissecta & evoluta portiones.
- E. E. E. Nervi spinales à superiori medulla margine per manipulos emissi, quibus Pares fasciculi etiam è margine inferiore elati occurrunt, omnesque intra vertebrarum juncturas in eundem truncum coalescunt: dein extra illas iterum sejuncti, in provincias respectivas feruntur.
- F. f. Nervi intra cervicis regionem producti.
- G. g. Nervi humero & brachio destinati, ubi & medulla amplior, & Nervorum fasciculi majores existunt.
- H. h. Nervi circa dorsum & lumbos exeuntes, ubi & medulla corpus iterum gracilius, & nervorum fasciculi paulò tenuiores sunt.
- I. i. Nervi ad crura destinati, ubi & corpus medullare, & nervorum fasciculi denuo ampliantur.
- K. Nervi esse Sacro exeuntes.

Tabula Decima Tertia.

Figura I.

Exhibet Arteriæ vertebralis ramificationes, utrinque in superiorem medullæ spinalis partem, inque posteriorem medullæ oblongatæ regionem exporrectas.

- A. A. Medulla oblongata posterioris regio.
- B. Communis ductus ab utrisque arteriis vertebralibus unitis constans.
- C. Figura Rhomboides, quam in Brutis gemina Arteriarum vertebraliū coalitio describit.
- D. Arteriarum vertebraliū supra medullam spinalem coalitio prima, è qua loco arteria spinalis descendit.
- E. Arteria spinalis.
- F. F. Due Arteriæ vertebrales à ramis axillaribus profectæ.
- G. Medulla spinalis.

- f. f. f. f. & c. *Surculi arteriosi in musculos cervicis.*
 g. g. g. g. *Surculi in medullam spinalem missi, qui ab utroque latere in arteria spinali juxta singulas vertebrarum commissuras cœunt.*
 h. h. h. h. *Surculi arteriosi, qui sinuum canales affecuti, plexum Arteriosum, qualis in Figura tertia describitur, constituunt.*
 f. f. *Dua arteria in spinam ab Aorta dimissa.*

Figura I I.

Exhibet venas vertebrales, quæ arteriis supradictis pares sunt; item sinus vertebralis portionem superiorem, ac utriusque inter se ac sinus laterales capitis, & inter venas jugulares communicationes.



- A. *Sinus tertius Capitis abscissus, ubi in sinus ejus laterales transit.*
 B. B. *Sinus Capitis laterales.*
 C. C. *Specus rotunda, ubi sinus lateralis utrinque in venam jugularem cecidit.*
 D. D. *Vena jugularis.*
 E. *Sinuum vertebraliū commissura superior.*
 F. F. *Sinus vertebralis utrinque intra cranium perductus, ibidemque in sinum lateralem transiens.*
 G. G. *Utriusque venæ vertebralis truncus, à vena cava profectus, ac ibidem incipiens.*
 H. H. *Uterque sinus vertebralis truncus ibidem abscissus, qui inferius per totum spinæ ductum continuatur.*
 h. h. h. h. h. h. *Anastomoses utrinque intra vertebrarum commissuras, inter venam vertebralem ac sinum vertebralem.*
 i. i. i. i. *Ductus venosi, qui extra vertebrae anterius protensi, à vena unius lateris ad parem alterius feruntur.*
 I. I. *Sinuum & venarum omnium in summitate spinæ communicatio.*
 k. k. *Ductus venosus è sinuum & venarum concursu utrinque in venam jugularem.*
 l. l. l. l. & c. *Sinuum utriusque lateris juxta vertebrarum internodia commissura.*
 m. m. m. m. & c. *Ductus venosi, sanguinem è medulla spinali in sinus reducentes.*
 n. n. n. n. & c. *Canales venosi, sanguinem à musculis cervicis regerentes.*

Figura I I I.

Exhibet Arteriam spinalem, quæ intra specum osseam, juxta anteriorem medullæ superficiem, ab occipite ad os Sacrum, ad formam institæ reticularis, producitur.

- a. a. a. a. *Surculi arteriosi ab arteria vertebrali, intra processuum spinalium foramina ascendente, versus spinam missi.*
 b. b. b. b. & c. *Surculi arteriosi ab Aorta versus spinam missi.*
 c. c. c. c. & c. *Propago arteriosa à quolibet predicto surculo in medullam posteriorem protensa.*

d. d. d. d. & c.



- d. d. d. d. &c. *Propago altera à quolibet predicto surculo in medullam anteriorem protensa.*
- e. e. e. e. &c. *Surculus quilibet predictus arteriosus, quamprimum intra specum osseam defertur, statim bifidus ramulum in utramque partem emittit, qui utrinque cum proximo ejusdem lateris, & per processum transversum, cum pari alterius lateris ramulo communicat.*
- f. f. f. f. *Arteriarum utriusque lateris per surculum transversum commissura.*
- g. g. *Surculi arteriosi osse sacro exeuntes.*
- h. h. *Propagines arteriosae in occipitis meningas.*
- i. i. *Surculi arteriosi cum nervis Paris septimi cranio egredientes.*
- k. k. *Surculi in Rete mirabile protensi, qui in progressu inter se mutuo, ac demum cum arteriis carotidibus inosculantur.*

Figura IV.

Sinus spinalis divaricationes in toto ductu ejus exhibet.

- A. *Sinuum utriusque lateris commissura suprema.*
- B. B. *Canales ab utroque sinu vertebrali in sinus capitis laterales protensi.*
- C. C. *Canales à communi sinuum & venarum vertebraliarum concursu in venas jugulares producti.*
- D. D. *Vena vertebrales.*
- e. e. *Communicatio inter sinum spinalem & venam vertebralem.*
- f. f. f. f. *Ductus venosi ab utroque sinu in vena vertebralis truncum.*
- g. g. g. g. &c. *Ductus pariter venosi, qui inferius in ramos vena Azyga, ac ultimo in vena cava propagines lumbares continuantur.*
- h. h. h. h. &c. *Ductus venosi, qui sanguinem à spinali medulla excipientes, in sinus reducunt.*
- i. i. i. i. &c. *Sinuum utriusque lateris, iuxta singulas vertebrarum iuncturas commissurae.*

Figura V.

Exhibet sinus spinalis Iconem in cane, qui non uti in vitulo, ove, porco, & plerisque aliis, commissuras in toto ductu habet, sed tantum in parte infima & suprema, ubi per tres aut quatuor processus transversos inter se communicat.

Haecenus de Cerebri, Cerebelli, eorumque Appendicis tum medullaris, tum nervosi Anatomia, simulque de partium singularum usibus & muniis copiose disseruimus. Tandem restat, postquam Fabricae hujus, tanquam Regalis cujusdam palatii, non modo atria & exteriores porticus, sed & intimos recessus ac conclavia lustravimus, ut jam proxime inquiramus, quanam hujus Basilica sit Domina, sive Incola, in qua parte illa potissimum resideat, & quo regimine ac oeconomiae ratione familiam suam disponat ac moderetur: dein animadvertere oportet, qui defectus & quae Anomaliae ipsi, vel partibus ejus & potentiis accidunt; tum quibus mutationum seu morborum injuriis obnoxiae fuerint illius ades, nempe cerebrum,

cerebrum, & Nervosum genus. Enimverò ipsa operis ratione, & promissi quod suprà feci pacto ac fide teneri videor, ut post nudas observationes Anatomicas, ac Animalium partiumque animatarum historias, demum Coronidis loco, *Anima Brutorum* Theoria quædam adjiciatur. Profecto par & æquum foret *ψυχολογίας* hoc atque illud alterum *pathologia* pensum aggredi; nempe ut amœnioribus ejusmodi speculationibus, Anatomix superius institutæ asperitates ac sensa duriora (veluti carnibus sceletis superinductis) emolliantur; & ipse Lector ex longo & salebroso itinere fatigatus, refici paululum ac recreari possit. Revera enim, quicquid Operis nostri jam peractum est, sine forma aut nitore, tanquam ædificii fundamentum in ima tellure positum videtur; in cujus fabrica humo adhuc defossa, nihil elegans aut concinnum emicat, verum omnia quasi ruderibus saxisque impolitis aspera ac incondita apparent. Superstructura quidem huic basi imponenda speciem fortè aliquam ac ornatum promittat, à quibus intuentium animi unà demulceri possint ac erudiri. At verò ejusmodi opus nimis immensum ac arduum existit, quàm ut tenuitas nostra illud peragendo fuerit. Quinetiam minimè decet me in cœpta ulteriora provehi, antequam priora hæc periculosam illam, cui subiciuntur, experta sint aleam. Vereor equidem, ne fundamentum modo jactum pro sustinenda altiori fabrica nimis debile ac infirmum evadat; utcumque illud, priusquam ipsi inædificetur, aliquandiu ventis ac procellis patens, probationem quandam subeat.





D E RATIONE MOTUS MUSCULORUM;

Studio GULIELMI CROONE , M. D. è Coll. Med. Lond.
ac Societatis Regalis Socii.

Εν πᾶσι τοῖς φυσικοῖς, ἐν εἰ τι θαυμαστόν.

Arist. de Part. Animal.



E motu musculorum acturus non necessum esse arbitror, ut ipsorum fabricam ac constructionem hoc in loco fusiùs enarrem : Quippe quæ jamdudum à pluribus Anatomicis, ac præcipuè à Divino illo Vesalio , ac Hieron. Fabr. ab Aquapendente , clarè copiosèque tradita sit. Quantum verò ad institutum meum opus fuerit, suo ubique loco interferam. Nihil tamen adducturus sum nisi quod optimorum Anatomicorum fide, aut saltem nostrâ qualicunque observatione exploratum perspectumque sit.

2. Duæ ergo duntaxat, quod sciam, hætenus obtinuerunt apud Medicos ac Philosophos de motu Musculorum sententiæ ; Altera, ipsos moveri à spiritibus (quos propterea vocant animales) in cerebro quidem elaboratis, deinde ad imperium animæ seu voluntatis, per nervorum canales in singulos musculos traductis, decernit: Sed alii hanc rem aliter explicant. Veteres enim cum Galeno, motricem nescio quam facultatem cum spiritibus hisce vectoribus per nervos in musculum deferri volunt ; Musculum autem continuò spiritibus his illustratum (ut verbis utar Bauhini) optemperare, partemque pro imperio voluntatis movere: de qua hoc tantum dixerim, omnino me ipsam non intelligere.

3. Recentiores autem, uti vir ille incomparabilis Renatus Cartesius, & ex ipso Cl. V. Henrius Regius, & post hos alii, hanc spirituum per nervos transmissionem longe alia ratione exponunt : quorum quidem opinionem per partes impræsens non deducam, quoniam jam omnibus satis innotuit.

4. Altera verò sententia illorum est, qui sic omnes musculos partibus movendis attensos esse dicunt, ut eorum fibræ in perpetua quadam, ac forti tensione constituentur ; ac proinde quidem semper quilibet musculus se na-

turali sponte contrahat, quotiescunque per virtutem, nervi interventu, è cerebro delapsam, eum vigorem nactus sit, ut vim sui Antagonistæ superare possit. Et in his quidem est D. D. Scarborough, summi ingenii ac eruditionis medicus.

5. Quid in utraque sententia desiderari posse videatur, prius veniam præfatus, breviter edisseram: Ac ista profectò Cartesii, ut ab ipso in posthumo illo de Homine Tractatu explicatur, multa in se præclara habet, & omnis veræ Philosophiæ Principis ingenio dignissima: quia tamen haud pauca assumit, quæ ipsa rerum fide minus constare existimo (uti illud, nervis valvulas quasdam inesse, deinde, spiritus animales venti instar habere, ac ab ipsis violenter irruentibus musculos, veli ad modum, inflari ac distendi,) igitur huic assentiri nequeo: Præterquam enim, quod ejusmodi valvulas nulla hæcenus Professorum subtilitas assequi potuit, quis, obsecro, eas in nervo intelligat, qui, uti sentit Cartesius, ipsaque Anatomia testatur, ex infinitis quasi funiculis filamentisque communi membrana inclusis contextitur? Quòd si porrò musculi fabricam spectemus, nervique in ipsum inserti exilitatem cum ejusdem mole carnea, nullisque cavitatibus donata conferamus, neque ipsum spiritibus è nervo exiguo quasi flatu quodam ita distendi posse, neque adeo quicquam cum velo commune habere advertemus.

6. Quod ad alteram nunc sententiam attinet, puto equidem eam partim esse veram, multisque experimentis confirmari: Enimverò, si principium musculi (ut à Galeno olim, & recens à clariss. illo Anatom. Aquapendente observatum est) supernum abscideris, totus ad caudam fertur; si medium, versus utramque extremitatem conglobatur; si finem inferiorem, ad caput retrahitur: Adhæc, musculus excarnis (ut idem ille annotavit) naturalem quandam contractionem perpetuò affectat. Denique & illud accedit, quod si cui, vel invito maximè ac retinenti, brachium flectas, musculi superiores, seu cum illud propria sponte incurvamus, tumescunt: hoc autem spiritibus animalibus, qui tantum ex mandato animæ è cerebro exire creduntur, minimè attribuas.

7. Cum vero ipsi hujus opinionis autores, musculorum in corpore partem longè maximam suos habere antagonistas, viribus sibi æquipollentes, fateantur; certè, vim illam insignem esse oportet, quæ æquale in antagonista musculo robur pervincat; atqui ea nondum ab ipsis explicata est: Veruntamen sic illam explicari posse spero, & ad leges etiam mechanicas exigi, ut nobis aliam planè contrahendi musculi causam, hac ipsa quidem si non potiore, saltem in agendo priorem suppeditet: Interim autem cum Galeno, qui virtutem illam in musculis sponte se contrahendi primus annotavit, confiteor hanc quoque unà cum istis, ad motum musculi perficiendum operam non levem adferre: nam per se non sufficere, ipse Galenus eodem hoc argumento usus contendit.

8. Principio autem illud ostendam, omnem musculorum motum à spirituofo quodam liquore è nervis exstillante administrari; eâ tamen ratione, ut motus iste hinc solummodò primùm inchoetur; deinceps verò ab aliis duabus causis admodum valentibus postea absolvatur. Quod dum facio, mihi hic nonnulla paulo altius repetenda sunt.

Nolo autem me frustra torquere in modo illo quo anima agit in corpus investigando, quem nemo fortè mortalium intelligendo unquam consequi valebit: Profectò ita se rem habere, vix credo quisquam est qui dubitet: Attamen non ab ipsa immediate, verùm intercedente aliquo instrumento materiali, grandes illas musculorum machinas tractari, id quidem ex eo manifestum est, quòd in convulsionibus omnes illorum motus, absque animæ ope præstari videamus: nisi etiam animam ipsam à morbo affici, ac in rabiem quandam agi putes, unde tam inclementer corpus suum distrahat, ac furialibus modis convellat.

9. Quinetiam illud, quicquid sit, à quo omnis musculus suum motum oritur, per nervorum certè canales traduci necessum est: Namque iis incisus vulneratisque, aut demùm valdè ligatis, sensus motusve, aut quidem uterque continenter musculo perit: Præterea, si nervum secueris, pars musculi superior versùs cerebrum, sensum motumque retinet; & viceversâ: sin verò medulla spinalis, unde nervi quamplurimi in varias corporis partes educuntur, secta sit, nervi infrà sectionem orti sensum ac motum amittunt, alii non item. Ex quibus utique necessariò consequitur, spontaneam illam fibrarum musculi contractionem nihil efficere, nisi porrò vis illa, tandem quæcumque sit, è cerebro per nervos accesserit. Unde meritò cum Galeno admirari licet, quemadmodum nervus, mole quidem exiguis, tam immensa virtute præditus sit.

10. His insuper alia quoque adjicienda sunt: Quo enim quisque musculus est mole amplior, usuque frequentior, fortiorque, eò majorem nervum sortitus est; & è contra. Deinde, illud maximè annotare convenit, nervos ut plurimum in musculi capita ac principia implantari, deorsumque spargi: nonnulli quidem in mediam eorum partem se insinuant, semper autem ad inferiora feruntur: Nullus unquam, Galeno dicente, in finem inseritur: quippe musculi omnes sese versùs caput solummodò contrahunt. Fateor equidem, in longissimis quibusdam, ubi nervus principio immissus per totam ejus longitudinem commodè duci nequibat, alium interdum qui cerebro aut spinali medullæ propinquior sit, ex partibus vicinis quasi in subsidium venire, musculumque versùs finem perforare; ita tamen, ut medullæ ejus divaricationes superiora petant. Et quæ profectò nervorum in musculum immersione, aperte colligitur, ipsos iis movendis inservire. Quod idcirco mone-re placuit, quoniam eandem planè arteriarum venarumque rationem esse, paulò infrà videbimus.

11. Cùm ergo tam luculenter constiterit, vim quamdam per nervos in musculum deferri, absque qua ipse quidem ad motum inhabilis ac ineptus sit; restat, ut cujusmodi jam illa sit, breviter inquiramus: Si nervum itaque attentius contemplamur, omnem ipsius fabricam è substantia quadam medullari succo perfusa; membrana duplici, quæ medullam istam involvunt; ac infinitis demùm funiculis intra membranas hæc medullamque à principio ejusdem usque ad extrema capillamenta extensis, conflari animadvertemus; præter hæc autem, nihil omninò, quod sciam, in nervis conspicitur: Deindè etiam paulisper cogitemus, quemadmodum hi nervi intra musculos disseminentur: etenim ceu caudex herbæ in minores semper ac minores

res ramulos diffusi, tandem in flexus quosdam membranofos abeunt, in quibus omninò disperduntur & evanescunt.

12. Quò autem sequentibus lucem majorem afferamus, pauca hic de natura spirituum (sic enim vocabulo à Chymicis accepto, particulas subtiliores & actuosas istorum liquorum quibus corpus irrigatur, rectissimè appellant) dicenda sunt. Notum est itaque, succum alimentorum particulis, quibusdam subtilioribus refertum esse, quæ per frequentem sanguinis, cui admiscetur, circuitum, paulatim è crassis ac terrestribus, quibus implicitæ sunt, evolvuntur: hoc est, ut appellationibus Chymicis etiamnum utar, è statu fixitatis ad statum volatilitatis perveniunt.

Hujusmodi particulæ in sanguine arterioso admodum abundant, licet cum maxima aliarum copia permixtæ: dum verò is per arterias cerebri fertur, liquorem ex se Mercurialem, h. e. sale ac sulphure volatili exquisitè imprægnatum, lenta quadam destillatione in cerebri medullam deponit, qui exinde in omnes totius corporis nervos depluit; per hos autem pedetentim incedens quaquaversum dispensatur, ac tandem tardiori circulatione in venas effunditur, denuoque ad cor redit. Spirituosus hujusce generis liquoribus singulæ in animantis corpore partes vehementer turgent, etsi pro varia partis temperie, ac fermenti in ipsa peculiaris ratione varii sint. Omnes autem ubicunque sunt, caloris nativi ac circulationis beneficio in constanti motu ac agitatione existunt: & hæc ipsa agitatio id ipsum est quod vitam appellamus.

13. Qui materiam hanc spiritûs nomine indigitarunt, eam sub forma halitus cujusdam aut venti existere voluere; adeoque musculorum intumescentiam ac contractionem à velocissima ejus inflatione proficisci: Atqui id certe nullo prorsus idoneo argumento innititur. Ubinam enim, obsecro, ad halitus hosce excipiendos specus excavantur, aut unde tanta eorum copia, ut musculos nulla cavitare præditos tam subitò inflent? Quod sibi faciendum putavit magnus noster Harvæus de spiritibus vitalibus agens, idem quoque ipse, confusus oculorum testimonio, fecerim. Negavit quippe, tales extra sanguinem dari, quòd eos in dissectionibus nuspiam repererit. Quoties igitur spiritus animales dico, liquorem istum nervosum, subtilissimum, actuosissimum, summeque volatilem intelligo; planè ac cum spiritum vini, aut salis, aut alios hujus generis appellamus. Quamobrem spiritus in nervis animales vocatos, nihil aliud esse præter rectificatum hujusmodi ac prædivitem succum, planè persuasum habeo: cum ipsa *αὐτοψία* contestetur, talem omninò esse nervum, qualem suprà descripsimus; non autem tubulorum ritu excavatum, ut alterius sententiæ autores affirmare videntur: Nimius sum, si ea hîc recenserem, quibus Vir Cl. ac eruditiss. Glissonius, liquorem hunc quem loquor spirituosissimum, continenti circuitu per nervos deferri adstruxit. Illud saltem attigerim, in omni Musculo spiritus non unius generis inesse: alius enim est in tendine ejusque fibris, alius in carne musculosa, alius demùm qui per nervos effluit.

14. Si ea quæ jam dicta sunt, cum iis quæ modò differebamus conferantur, omninò arbitror, animam spirituosos hosce liquores, ad omnes tam sensationis quàm motûs actiones præstandas adhibere. Quod inde etiam ampliùs confirmatur, quòd à vini aut alicujus alijs liquoris spirituosissimi largiori haustu

omnes,

omnes corporis motus multò agiliùs obiri videamus : contrà autem lassitudo, sive à morbo, sive ab exercitio vehementi, non aliunde quam à defectu spirituum proficiscitur. Reliquos autem usus, quibus præterea serviunt, in præsens misso facio.

15. At quoniam sensationis explicatio non parùm ad ea quæ dicturus sum, illustranda conducit, obiter indicabo, in quo ea mihi consistere videtur. Ne itaque longum faciam, puto liquorem hunc rectificatissimum, summèque volatilem, prout in membranis corporis hospitatur, unà cum istis membranarum sensus esse instrumentum; quatenus autem in cerebri ac nervorum medulla est, motui producendo inservire: Utriusque rationem non aliunde quàm ab experimentis ducendam censeo. Sive ergo receptissimam Anatomicorum sententiam, sive quod potius est, omnem Medicorum ac Chirurgorum praxin excutiamus: certè ex omnibus corporis partibus, unicam esse membranam, quod immediatum tactus organum sit, comperiemus. Etenim medullam cerebri sensus instrumentum non esse, ex eo liquet, quòd frustula ejus insigni magnitudine, absque ullo dolore, in magnis capitis vulneribus exempta fuerint: in aliquibus etiam, quibus sensus superstes erat, aut in lapillos per partes indurata, aut tota in lapidem versa est, ut bovi isti Suevico, de quo Cl. Bartholin. in *Histor. Anatom.* Cent. 6. contigit. Iure profectò mirabatur Vir Cl. unde ipsi motus remanserit, & quod ipse optimè suspicatus est, sententiam nostram præclare confirmat; erant enim in lapideo isto cerebro foraminula hinc & inde, in quæ paleæ immitti possent, exsculpta: per quæ spiritus animalis ex arteriis in nervorum medullam liberè commearet. Quibus accedit, in nervorum vulneribus, ipsorum pariter medullam absque ullo omninò cruciatu innoxie contrectari; in membranarum autem sensus exquisitissimus habetur.

16. Existimo autem istos Anatomicos rectissimè sentire, qui omnes in corpore membranas sensiles à cerebri tunicis oriri volunt; quod ab ipsa, quantum videre possum, autopsia comprobatur: unde patet, quomodo istius membranæ beneficio, quæ omnibus totius corporis musculis obtenfa est, illiusque singulos privatim musculos investit, ac demùm nervorum qui per omnes sparguntur, universis fere partibus sensus attribuitur. Præterea illud valdè annotandum est, omnes istas corporis membranas, quod suprà de musculis dicebatur, in summa quoque tensione existere: ac etiam liquore quodam proprio admodum subtili, sive spiritu vivifico impleri, qui per omnes earum fibras perpetuò transit, ipsasque in debito tono conservat. Nec quisquam hoc nimium esse ad concedendum putabit, qui minutula illa animalcula omni suo apparatu instructa cogitat, vel exilissimis fermè harum fibrillis minora.

17. Intelligendum verò est, membranas hasce dum tensionem suam ac tonum debitum obtinent, videri posse se ad modum companæ aut vitri purissimi habere, quorum ea est indoles, ut si partem aliquam ferias, reliquæ universæ tremulâ quadam vibratione concutiantur; & hoc pacto omnia sensuum objecta, vel intercessu membranæ istius nervi qui ad certum alicujus sensus organum spectat, vel communis illius qui totum corpus involvit, per lineas, quantum fieri potest, rectas, ad cerebrum deferri

autumo : in quo varii distinctique objectorum motus ab anima percipiuntur ; quod quomodo fiat, infra Sect. 26. clariùs dicam. Hinc etiam mirus ille nervosarum partium consensus oritur : ac fortasse ex his lucem quoque aliquam perdifficili isti quæstioni fœnerabimur , cur sensus , pereunte motu , in Paralyfi supersit , & contrà. Namque si iste membranarum tonus , vel universum , vel ex parte corrumpatur , ac naturalis , qui fuit, particularum sinus ac ordo turbetur, vel accedente nimia humiditate , vel ex vulnere, aut alio quovis modo ; tum quidem vibratio illa ac undulatio particularum , ex qua sensus fit , interrumpitur : ut in campana aut vitro , cui fissura accidit , sonum istum tinnulum ac acutum , in raucum quendam & ingratum strepitum permutari notamus. Contrà , cum illæsis membranis, extraneo quodam succo medulla diffluit ac vitatur , illicò motus petit , quem à generoso isto liquore in nervis , quo medulla ipsorum continuò irrigatur , produci jam proximè demonstrare conabimur : Quod autem tonus quidam ac vigor tum substantiæ medullaris nervorum , tum etiam in membranis ad sensum ac motum requiratur , ex somno patere videtur : in quo latex hic spirituosus per nervos membranasque interiores ac majores tantummodò (ut ipse sanguis per vasa majora , unde dormientes pallent) suum circuitum perficere existimandus est. Hinc tonum debitum minoribus ac exterioribus ad sensum motumque efficiendum præstare nequit ; ac adeò si oculos dormienti aperias , non videri , ob nimiam membranarum laxitatem ac flaccescentiam.

18. Ex iis quæ superius dicta sunt , abundè constat , aliquid in musculum deduci absque quo nullus ipsi motus conficitur ; esse verò illud materiam quandam summè mobilem , tum per ipsos nervos , tum etiam per musculorum fibras decurrentem, præter ea quæ jam ad hoc probandum allata sunt, etiam ad oculum ostendi potest. In maciatis enim recens animalibus carnes, detracto corio, materiam hanc, sive spiritus, quos vocant, tumultuariò cursantes, exteriori musculosæ carnis superficiem variis modis secundum omnes fibrarum ductus pertrahere : Esse verò illius motum celerrimum , tum ex hoc quod jam commemini , tum alio quoque experimento manifestum fit ; quoties enim cubitum fortè ad duram aliquam materiam ex improvviso allidimus, tremor quidam seu vibratio dolorifica, ab ipso cubito ad extremos usque digitos quasi ictu oculi pervolat : Consimiliter , ac cum bacillus è ferro longior , in altera extremitate percussus, tremulam omnium particularum vibrationem edit, quam manu alteri admota facilè sentias.

19. Quo hæc autem rectiùs intelligantur , pauca de musculi constructione prælibanda sunt. Is ergo ex infinitis fibris tendinosis quasi chordis conflatur ; quæ in utroque ejus extremo coeunt ita intorquentur & coalescunt invicem , ut funem aliquem grandiore ex innumeris aliis minoribus textum referant : intra verò musculi corpus , ceu stamen in fila discerptum à se invicem distant. Omnia autem inter ipsas spatia ac intervalla carne ubique inferciuntur. Quibus si membranas duas musculum regentes , ac omnes fibrilis ex se emissis sibi invicem colligantes , singulosque ab aliis disparantes , ac etiam exquisita sua lævitate summam movendi facilitatem ipsis tribuentes addideris , ac denique vasa in ipsum derivata , nervos , arterias , venas , lymphæductus adnumeres , integrum musculum cernis.

20. De Fibris autem tendinosi tria summoperè notanda sunt : Primò, ex iis potissimum musculos constare : quod ex eo liquet , quòd octuaginta librarum pondo alligatum istius musculi tendini , quem gracilem internum in homine vocant , ab humo sublatum facillè sustinuerim, altera musculi extremitate manu apprehensa. Nec dubito quin multo majus pondus , si ad manum fuisset , sustulisset, nisi verò totus ferè ex firmissimis hisce fibris constitisset, tantum ponderis nunquam extollere potuisset : Taceo hoc idem quoque in musculo excarnato clarissimè cerni , adeo ut nullus musculus, quicquid dicant aliqui , tendine suo, diviso saltem ac in fibras soluto , careat.

21. Secundo , hæ de quibus agimus fibræ , non modo pro ratione sitûs partium movendarum varios ductus obtinent ; verùm etiam , quod à nemine hactenus satis observatum est, Fibræ ejusdem musculi, iisdemque motibus destinatæ , variis omnino implicationibus contorquentur , ac sibi invicem interferuntur : ut in semi-nervoso corporis humani videre est, quem veluti ex aliis intra se inclusis musculis conflare putes. In aliquibus fibræ rectè à capite ad caudam incedunt, in aliis plus minusve, per lineas quidem spirales aut *ελικοειδείς* obliquantur ; quarum ordinem duntaxat simplicem per musculi corpus ductum , aliqui obtinent. Aliis autem duplex series contingit: quæ utrinque ex tendine quodam recto, qui ab initio ad finem musculi pergit, enascuntur. Credibile est sane, cuique fere musculo peculiare artificium inesse, ut in cordis potissimum fabrica (quod Hippocrati *μὲν ἀσιν καὶ ταίχυσος*) luculenter apparet : ut tum ad motum præstandum , tum ad figuram decentem toti corpori conciliandum foret opportunior. Atque optarim hercle , ut alii , quibus ad id otium est , hanc rem curiosius attingant. Haud dubitem enim , totam musculi contractionem ac motum, quibuscunque causis accadat , hinc multum adjuvari.

22. Tertio, olim proditum est à summo isto Anatomico Vesalio, in aliquibus musculis fibras hasce plures esse ac magis à se distitas quàm in aliis: Quin etiam in diversis ejusdem musculi locis aliter ab invicem distare. Quantum ego oculis usurpare possum, semper prope istam musculi partem, quæ in ipsius contractione tumescit , spatia sive intervalla inter singulas fibras laxiora sunt ; prope utcumque autem extremum (quod musculi fabrica omnino requirebat) constringuntur. Quod etiam magis confirmat summus Vesalius : qui ventrem musculi illic proprie ponendum esse ait , ubi fibræ musculi invicem minus compinguntur ac copiosiore carne continentur.

23. Quod autem superius de nervis monui , similiter de spinali medulla accipiendum est ; quam si in aqua per dies aliquot maceres , apparet ipsam ex infinitis quoque funiculis ac filis , caudæ instar equinæ , constare : ac probabile est , non aliam esse cerebri (ut supponunt quidam Cartesiani) texturam.

24. Post jacta hæc fundamenta , hypothesein nostram de ratione motûs musculorum explicandam aggredior : nihil enim in re obscurissima fidenter affirmo , sed nudam duntaxat hypothesein proponere institui , idque breviter ; ac proinde non pauca , quibus hæc omnia fusiùs probari possent , consultò omisi ; namque eam vel rejicere vel ulterius , posthac excolere animus est , prout futuris vel meis vel aliorum experimentis magis minusve congruere animadvertam. Esto in Fig. 1. musculus aliquis ante contractionem ABCD, ejus fibræ ab A , rectà porriguntur ad tendinem C ; suppono autem juxta ea quæ

quæ Sect. 12. & in fine Sect. 13. & Sect. 16. antè tradita sunt, harum fibrarum singulas, ut fibram x T C, & singula quæque intervalla sive spatia inter hæc fibras ut o a C. ABC, quæ ubique carne repleri & incrustari diximus, non tantum latice quodam spirituoso sui generis turgere, unde nutriuntur & incrementum capiunt; verum etiam hosce spiritus, tum intra singulas fibras, tum quoque intra singula ista spatia ordinatim quidem ac continuâ serie ita dispositos esse, ut accedente aliquo impulsu, omnes intra proprios suos cancellos, id est, intra poros ductusque sibi per totam musculi longitudinem excavatos, per rectas lineas ab A ad C, aut à C versus A, ferantur; aut alias peculiari quodam modo juxta Sect. 21. incurvatas. Neque posse ipsos, dum omnia se rectè in corpore habent, extra hæc spatia evagari. Hoc autem non inique à me peti, ex primo illo Sectionis 18. experimento satis elucescit. Postquam hæc scripsissem, incidi in locum Cl. Fallopii in Obs. Anatom. ubi hoc pluribus argumentis à Cl. V. fusiùs probatur, è quibus pauca hic propter summam viri auctoritatem exscribam: Exemplo sunt musculi (inquit de partibus agens quæ motu moventur voluntario) qui seipso contrahunt & extendunt: cum autem in unaquaque particula motus certus sit & determinatus ad aliquam positionem, necesse erat, ut corporis substantia ad istam positionem esset directâ, ne incerto motu ageretur: ea directio est coordinatio minimarum particularum ad ipsam positionem dictam; hinc duo sequuntur, ut dentur meatus ordinati ad illam positionem, & ut fibras habeat illud corpus: Fibrae autem nihil aliud sunt quàm minimæ illius substantiæ aliqua serie ac ordine compactæ. Cumque motus voluntariè agens sit spiritus, hic necessariò requirit meatus in quibus sedeat; indeque necesse est etiam ut spiritus isti contenti & dispositi sint ad eandem positionem motûs: ac adeò ordinatam locationem requirunt. Hinc patet, pro ipsis ordinatos requiri meatus; at ordinati meatus in aliquo corpore necessariò efficiunt fibras, &c.

25. Cæterum ut pergam ad reliqua, sit S E, pars trunci medullæ spinalis è cerebro prodeuntis, & ex infinitis, ut dixi, fibris conflata, ex qua ad E pronascatur nervus aliquis grandior EFG, qui circa G in varias propagines finditur: earum quæ musculum ABCD perfodit, in ipsumque eo se modo quo Sect. 11. dictum est, diffundit, esto q r N, cuiusque flexus membranosi intelligentur esse punctula 3. z. m. k. n. 4. 8. t. aliique intra musculi habitum innumeri. Sumantur jam duæ lineæ, H q r N. S q P y, quarum prior à puncto cerebri H, per medullam spinalem ac nervum EFG, per ramum ejusdem q r N, usque ad N &c. continuatur. Posterior autem à puncto S circa punctum q ab illis deflectens, in alium ejusdem nervi ramum q P y, usque ad y produci-tur: Suppono autem eas sic intra spinalis medullæ ac nervi EFG. membranas incedere, ut se nullibi contingant. Porro utramque harum linearum fibras minutissimas infinitas, eodem modo extensas repræsentare volo. Concipiendum est autem eandem planè rationem esse reliquarum fibrarum, quæ in tota medulla spinali & omnibus corporis nervis existunt.

Quas inter fibras, substantiam quandam medullarem ubique impactam esse, fatentur quidem Anatomici, & res ipsa ostendit. Illa verò quæ superiori Sectione de spirituum per tendinosas musculi fibras ordinatione ac τὰς dicta sunt

sunt, pariter de spiritibus qui in fibrillis hisce, ac etiam spinalis medullæ, nervorumque tunicis, & medulla spongiosa insunt, proportionem intelligi debent. Tandem esto arteria quæ ad musculum eundem procurrit, & intra ipsum divaricatur I K O, vena socia sanguini revehendo dicata L M N.

26. His positis, existimemus animantis corpus nihil aliud nisi machinam quandam aut *αὐτόματον* esse, animamque, quæ in nobis est, ab ipso tantisper cogitatione amoveamus, vel saltem ut spectatorem tantum fabulæ hujus quæ in corporis scena peragitur, in cerebro assidere fingamus. Certissimum est, ex sola spirituum fluctuatione quæ in cerebri medulla sunt, ac caloris vi continuo agitantur, musculos quoslibet hujus machinæ absque ulla omnino animæ ope aut concursu mechanice moveri posse: quod à motibus convulsivis, Sect. 8. supra satis probatum fuit. Et admodum verisimile est, omnes infantum recens editorum motus penitus ab eadem causa provenire. Illa autem quæ postmodum accedit concinna ac decens membrorum corporis inflexio, usu ac institutione comparatur. Quod ex historia pueruli sylvestris in Lithuania nuper capti (ut alia taceam) manifestum sit: qui ursinis planè motibus (apud quos degebat) ac incessu fuit. Notissimum quoque est, infantes pedum usum nescire, donec tenelli eorum gressus à parente aut nutricula conformentur. Quod non eò dico, quasi motus isti quos usu ac aliorum imitatione didicimus, minus essent mechanici, aut accedente aliqua actione animæ, non per solos motus corporeos, pure ac mere efficerentur; sed quod machina hæc nostra, aliter in motibus ordinatis ac regularibus, aliter verò in istis quos dixi inconditis afficiatur. Quæ sanè ut rite intelligi queant, notandum est, sensum (quod Cartesiani facile concedunt) esse actum animæ quo motum quendam in particulis sive fibrillis cerebri excitatum percipit: quomodo autem motus in ipso fieri contingat, supra Sect. 17. explicatum est. Quibus jam addo: Cum omnis sensatio in membrana aliqua fiat, omnes verò membranæ sensoriæ à cerebri meningibus oriantur, eoque modo se habeant quo ibi dictum est, necessariò illud consequitur, ut percussio sive motus in membrana organi sensus ab objecto factus, tandem ad cerebri membranas perducatur. Sciendum porro est, eas infinitas ex se fibras in totam cerebri substantiam quaquaversum emittere; cumque à diversis sensuum organis aliæ producantur, etiam intra cerebrum separatæ ac distinctæ sunt, ut de fibris spinalis medullæ ac nervorum monuimus: Et quam rationem fuisse diximus spirituum intra fibras musculorum ac nervorum; eadem planè & hæc est. Quia verò ipsæ membranæ pulsari nequeant, quin fibrillæ hæc simul moveantur, hinc à variis membranarum in organis sensuum, adeoque harum fibrillarum cerebri ictibus universæ rerum ideæ in cerebro existunt, & ab anima percipiuntur: Namque (quod alias fusiùs ostendi) ea est animæ in hac machina conditio, ut omnis particularum motus, qui in organo aliquo sive externi sive interni sensus sit, ab ipsa necessariò percipiatur.

27. Percipi dico, quia nonnulli præter hujusmodi perceptionem nihil omnino aliud negotii animæ concedunt; indèque opinantur, omnia quæ in animantibus contingunt *παυόμιστα*, ex principiis purè mechanicis utcunque explicari posse. Equidem gravissimas hic difficultates se offerre ultrò fatentur;

at profecto (ut ipsis videntur) non minores in altera sententia futurae sunt, quæ vim quandam spiritus animales huc & illuc, in illum vel istum vel alium nervum aut muscolum, pro arbitrio impellendi attribuit : Namque, exempli gratia, cum adest brachii aut cruris movendi voluntas, unde novit anima, qui nervi musculive in hac corporis fabricatione ad istum usum destinantur ? Quicquid sit, sive hæc sive altera hypothesis pro vera habeatur, neutra tamen illa quæ de modo sentiendi dicta sunt labefactabit : utramque igitur ad motum musculorum explicandum adhibere possumus. Redeamus ergo jam ad Fig. 1. & concipiamus à quacunque sit causa, adesse animo voluntatem movendi muscolum A B C D, partemque ipsi adnexam. Dico primum, in hoc casu istas tantum fibrillas quas repræsentare diximus lineam H q r N, impulsu aliquo, undecunque sit, sive ab ipsa anima volente, sive à causa materiali, in extremitate superiori H, agitari, immotâ prorsus alterâ S q p y, & reliquis universis. Hinc enim fit, ut vis movens, quam supra ex cerebro per Nervos exire probavimus, perveniat ad ramum G r N, indeque muscolum A C B D, cui is inferitur; non autem ad musculos illos, ad quos pertinent rami S q P y, S q P Z. Et eandem planè rationem in cæteris omnibus corporis musculis movendis aut non movendis spectare debemus. Quod autem certarum partium motus à certis medullæ spinalis, nervorumque fibris pendeat, primò à textura nervorum ac medullæ spinalis, de qua Sect. 23. dictum est, suaderi potest : deinde vel unicâ hac instantiâ haud parum confirmatur : Vidi (inquit Laurent.) adolescentem nobilem, qui vulnere in spinali medulla accepto, statim cruris ac pedis dextri motu privatur, superstite utriusque brachii & totius ferè corporis motu : propterea quod illæ fibræ (ut ipse quoque Laurentius differit) quæ ad has partes pertigerunt, læsæ ac incisæ fuerint ; aliæ autem minimè. Hinc etiam quatuor digiti distenduntur, variisque motibus flectuntur ab unico extensore musculo, in quem unicus tantum nervorum surculus (ut annotat Highmorus) implantatur. Cæterum, penes animam esse (ut ex ista hypothesis philosophemur) fibrillas solas lineæ H q r N, aliis non agitatis, movere, haud certè magis mirandum est, quam posse eam in nervi ramulum q r N, ita spiritus transmittere, ut solus musculus A B C D, moveatur, cæteris, ad quos pertingunt ramificationes q P y, q P z, quiescentibus ; id quod omnes fatentur : aut ex infinitis, quæ in memoria sunt, rerum ideis, quamcunque velit ad contemplandum pro lubitu seligere : Illæ enim ideæ sunt tot diversi motus (ut maximè probabile est) in diversis totidem cerebri particulis seu fibrillis conservati : Certè, nisi materiales essent, non possent à morbo deleri, ut in his quos omnium rerum occupavit oblivio. Si vero ex altera hypothesis loquamur, animadvertendum est, omnes istas Ideas, distinctis quidem locis, & certo quamque ordine in cerebro collocari : quod hi faciliùs concesserint, qui nōrunt quam distinctè separatèque infinita propemodum Horizontis objecta in parva oculi camera depingantur ; deinde ex mania constat, quæ istius ordinis perturbatio quædam est, idearumque confusio. Notandum etiam hunc ordinem non alium esse, quam qui à diversis temporibus sumitur, in quibus una post aliam in cerebrum pervenit : & hinc etiam diversas in eo sedes obtinere. Illud autem hinc apertè constat, quod res aliqua fortè conspecta, aliam à se & naturâ & tempore longissimè alienam,

cujus

cujus utpote ante aliquot annos ne minima quidem inciderat cogitatio, sæpiissime nobis in memoriam revocet. Inde proculdubio quod ambarum ideæ diu antea & loco & tempore conjunctæ fuissent; & cùm jamdudum in cerebro simul latuissent, alterâ per hanc occasionem evocatâ, non potuit altera non apparere: hinc etiam memoria (uti vocatur) localis tota pendet. His præmissis, existimo dici posse, ab impulsu alicujus objecti externi vel interni, primò in fibrillis cerebri talem motum excitari, qui ab anima perceptus in ipsa necessariam movendi cruris voluntatem efficit, ac simul (nihil prorsus ad hoc conferente istâ voluntate, sed cum illo impulsu necessariò semper co-existente) ex mechanica partium constructione ad istum cerebri locum præcisè defertur, in quo sunt aut vocum ideæ quæ crus aut brachium movendum significant, aut ideæ cruris ac brachii moti, aut ambæ simul. Ideæ autem istæ à prima usque infantia cum in cerebro locum occupant, ubi erant extremitates fibrarum lineæ H q r N, aut S q P y: quia cùm primum ista membra movere ex aliis didicimus, fuimus ad hoc faciendum sermone admoniti, aut conspectu ac imitatione eorundem in aliis motuum instituti. Idea namque cujusque rei faciendæ ex necessaria fabricæ hujus corporis ratione ad eam cerebri partem devenire censenda est, in qua sunt extremitates fibrarum ad id requisitæ. Quod ne durius sonet, considerare nos jubent paulisper duo illa è multis quæ in corpore nostro sæpiùs contingunt; Sternutationem dico, & perpetuum istum deglutiendi conatum, qui in uvulæ procidentia adest: quorum alterum (ab Aristot. parva Epilepsia vocatum, quodque magno plurium musculorum nixu peragitur) plumula quandòque aut levissimo stramine narium membranam tangente excitari videmus: Alterum verò ab uvulæ extremitate membranam œsophagi pariter attingente accidit. Ex his apertè constat, ita comparatam esse corporis structuram, ut quoties membrana narium sic, uti diximus, afficitur, motus quidam ad cerebrum delatus istas duntaxat fibrillas exagitet, quæ diaphragma cæterosque, qui in sternutatione moventur, musculos ad agendum proritet. Consimiliter cùm membrana œsophagi eos tantummodo qui deglutationem efficiunt. Quod certè mechanicè omnino præstari, sive eo quo Sect. 26. innuimus, sive alio aliquo modo fiat, est manifestissimum: Namque vel affirmare oportet, animam sua sponte animales spiritus in nervos musculosque sternutationi aut deglutationi servientes propellere; atqui hoc verum non est, quia hæc vel maximè contra voluntatem nostram contingunt; deinde quæ obsecro est ista scientia, quâ anima ex perceptione affectæ narium membranæ spiritus in musculos sternutatorios, œsophagi autem in deglutientes mittere novit? Sin dicamus hoc ab anima necessariò fieri, perinde est ac si id mechanicè tantùm absque ulla ejus ope accidere dixeris. Hæc fortasse, aut his similia ad hanc hypothesin excogitari possent: Utcunque sit, inquam impulsu illo quem accipit hujus nervi extremitas H, in cerebro, non modo quassatur tota illa fibrarum series, quam per lineam H q r N, repræsentari suppono, ab isto puncto H, usque ad extremos istos membraneos flexus, in quos nervum intra musculum desinere dixi, verùm etiam per istam concussionem, gutulas admodum multas ex punctis 3. z. m. K. n. 4. 8. aliisque propè innumeris, generosi istius quem dixi liquoris eodem momento exprimi, & in totum musculi habitum exstillare opinor.

Cum enim jam satis probatum, sit, vim quandam è cerebro per nervos ad vehi in musculum, nec si oculis fides habenda sit, quicquam in nervis appareat, quod huic usui magis convenire queat, quam opulentissimus ac spirituosus iste succus, constanti circuitu per omnes nervos traductus; quid, obsecro, magis verisimile est, quàm vim illam cum hoc liquore deferri, aut potius esse hunc ipsum liquorem, sive spiritum animale fibrarum impetu è nervorum ramulis excussum? Quod si sit, illud quoque admodum probabile erit, ex admistitione liquoris hujusce sive spiritus cum spiritibus sanguinis, continuo spirituosarum omnium particularum, quæ in vitali totius musculi succo insunt, magnam agitationem contingere, uti cum spiritus vini spiritui sanguinis humani admiscetur. Namque omnem animantis partem vivifico quodam ac spirituofo liquore turgescere, supra quidem monui, ac omnibus est in confesso; ac nemo ferè tam in Chymia hospes est, qui nesciat, quanta particularum commotio ac agitatio, ex variis inter se permistis liquoribus accidere soleat. Ut in exemplo modò allato, ac etiam in aqua communi, oleo vitrioli, aut butyro antimonii spiritui nitri affuso, aliisque ferè hujus generis infinitis cernere licet. Hic autem simile aliquid etiam evenire, neque hæc temerè confingi, Primo docet summa illa in sanguine ad fermentescendum aptitudo, ut è cordis motu claret: beneficio fermenti cujusdam, prout à Cartesio, Hogelando, Regio explicatur: aut flammæ vitalis (uti vult Clariss. Entius) sanguinem perpetuo rarefacientis perficitur. Ostendit præterea vis illa, quam in tota sanguinis massa fermentanda obtinet materia seminalis, ut in Hirquitallientibus, castratis, ac cæstro Venereo percitis observare possumus. Præcipuè vero ex affectibus hystericis, ubi sanguis, corrupti seminis miasmate inquinatus, miram fermentationem concipit, unde in pulmonum vasis (ut explicat eruditiss. Highmorus) turgescens, suffocationis periculum minatur; quinimo omnem nervorum succum eadem labe infici probabile est. Cæterum materia hæc seminalis ex optimorum Anatomicorum sententia, nihil aliud est præterquam redundantia quædam laticis nervosi, supra quam quæ in vesiculis seminariis glandulisque vicinis ad futuram prolem colligitur. Si quis miretur, è tantilli liquoris aspergine tantam in succis istis, quibus repletur musculus, tumultuationem cieri; meminerit, illum unico momento ex infinitis propemodum nervi intra musculum propaginibus ad puncta 3. z. m. &c. egredi, & hinc luctam illam & conflictationem in pluribus partibus musculi simul vehementer accendi. Quinetiam virtutem maximam in exili admodum materia delitescere, ex unico (si alia non suppeterent) croco metallorum addiscimus; nam post aliquot annorum infusiones, unde vomitus sæpè immanes ac purgationes excitatæ sunt, vix quicquam ipsi ponderis decedit.

28. Porro, cum antè ostensum fuerit, omnium qui in partibus musculi sunt spirituum motum intra certa quædam spatia contineri, ac præterea spatia hæc (ubi venter est musculi) ampliora ac patentiora esse: consideremus, unum illud spatium A B C: inquam, agitationem illam spirituum quæ sit à diversis liquoribus intra musculi membranas tumultuantibus, necessariò ipsos impellere magno nisu per lineas rectas versùs A & C. Cùmque intervalla sive spatia semper minora versùs extrema offendant, in se reflectuntur, ac in laxioribus circa medium musculi B, sive ventrem (ubicunque sit) in majore quantitate

quantitate colliguntur : & hinc musculus circa ventrem incipit tumescere. Quod idem de reliquis omnibus fibris pariter accipi debet.

29. Dixi, hinc incipere musculi extumescantiam, quod absque alia quoque causa in subsidium ascita, ex se quidem hæc non satis ad ipsum movendum valeret : Quamobrem cum ferè omnes fateantur istiusmodi esse animæ in spiritus animales imperium, ut ipsos ad varios membrorum motus præstandos quoquò velit transferre, & in quolibet pro libitu nervos, per nudum voluntatis actum propellere possit, ut e. g. in nervum E F G N, ad musculum A B C D, movendum; quidni etiam arbitrari licebit, ipsam per eundem volendi actum, sanguinem quoque arteriosum, eodem momento per arteriam I K O, copiosius in eundem musculum protrudere? Certè qui in hac hypothese sunt, ultro concedunt, esse præterea animæ suum in totam sanguinis massam imperium, ut ex variis affectibus, ira, lætitia, pudore, libidine, & aliis abundè patet : in quibus omnibus sanguis non modò in corde vehementer commovetur; sed etiam ad diversas corporis partes protruditur. Et quia ex altera hypothese, de qua Sect. 27. in fine actum est, dici potest, materialem istam in cerebro ideam, quæ animam in singulis passionibus afficit, eodem etiam instanti sanguinem arteriosum in certas corporis partes mechanicè impellere : Ideo secundum hanc non absurdè qui dixerit, eandem ideam, quæ in animo excitat musculi A B C D, movendi voluntatem, ac spiritus simul animales ad illud præstandum in nervum E F G N, mechanicè deduxit, pariter eodem temporis momento intercedente nervo, qui infinitis ramusculis in cordis aurículas inseritur, majorem è corde sanguinis copiam per arteriam I K O, in eundem propellere. Sed restat adhuc alia non minus mechanica, utque mihi videtur, valdè probabilis ratio sanguinis arteriosi citius ac copiosius per arteriam I K O, in musculum movendum A B C D, advehendi. Nam oborta, quam dixi, in toto musculi habitu particularum tumultuatione ac effervescencia, primò istæ particulæ jam celerius agitatae, majorem motus gradum acquirunt, deinde ex hoc motu atque agitatione, à se invicem magis recedere, ac majorem locum occupare nituntur, ut in omni fermentatione contingere videmus : hinc necessum est, ut omnes pori carnis musculosæ magis laxentur ac aperiantur; adeoque musculus A B C D, tumescere incipiat; ex quibus omninò consequitur, sanguinem è corde semper cum impetu quodam in omnes corporis arterias simul expulsum, minorem resistantiam offendere in arteria I K O, quàm in alia quacunque. Primum enim, ob majorem celeritatis gradum in particulis omnibus musculi A B C D acquisitum, istæ faciliùs sanguini arterioso locum cedunt, ac multò minori vi ab ipso in musculum exundante repelluntur : Accedit deinde, ex poris ita apertis & dilatatis, longe ampliores ad majorem sanguinis quantitatem excipiendam, intra musculum patere; unde liquet, forte ut sanguis & celerius & copiosius è corde per arteriam istam I K O, in musculum A B C D perveniat : Idem prorsus in inflammationibus contingit, itemque in doloribus, quos Medici propterea trahere dicunt, ab effervescencia humorum in parte excitata. Denique quia caro circa ventrem cujusque musculi (ubicunque sit) ut Sect. 22. è Vesalio diximus, copiosius incrustatur; idcirco ibi potissimum musculus intumescit, idque eodem quo Sect. 28. modo dictum fuit.

30. Quod verò planè insignis sit arteriosi sanguinis opera in musculis movendis, à quacunque tandem causa in ipsos deferatur, ante omnia ratio illa arterias venasque in musculos implantandi vehementer admodum suadet. Quare ex usu erit, id quod de arteriis venisque supra innui, observare. Arteriæ
 „ (inquit Aquapendens) ac venæ velut rami per totum musculum divarican-
 „ tur : & mox. Si verum sit ex Aristotele, sensum absque calore non esse, meri-
 „ tò insignes arteriæ per musculi substantiam disseminantur. Imprimis autem
 „ considerare debemus eas una cum venis in musculos inferi, eodem prorsus
 „ ritu ac modo, qua supra Sect. 10. de nervis est dictum, quod præclare ob-
 „ servavit Spigelius, cujus hæc sunt verba : Eâdem, inquit, ratione (de ner-
 „ vorum insertionem modo loquutus) vena ac arteria spargitur. Semper enim aut
 „ principium aut medium ingreditur, finem nunquam, nisi in longissimis,
 „ quibus à vicinis ramus transmittitur. Nunquam autem superficiales sunt,
 „ sed semper (ut clariss. idem Anatom. affirmat) ad interiora penetrant,
 „ præsertim venæ, quibus etiam hoc peculiare est, ut communi suâ tunica,
 „ quam habent, dum extra musculos incedunt, careant; sicque simplicissimæ
 „ sint. Quantum autem sanguinis, & quàm facile in universos corporis muscu-
 „ los per arterias continuò advehatur, certe vel hinc manifestum est, quod om-
 „ nis musculi caro (quæ maximam ejus partem facit, & ex qua totius corporis
 „ moles potissimum constat) nihil aliud esse videatur, nisi ista sanguinis per
 „ fibrarum intervalla fluentis portio, quæ earum frigiditate crassescens intra
 „ ipsas sistitur, carnemque musculosam constituit : hoc vero ita esse, ex iis qui
 „ fame enecantur apparet, in quibus vasa sanguine quidem turgent, musculi
 „ autem penitus collapsi fere omni carne spoliantur : namque tantisper in hoc
 „ casu sanguinis circulatio continuatur, donec nihil amplius boni aut spirituosum
 „ in musculis sit, quod à venis resorptum, perque ipsas ad cor delatum, in eo fer-
 „ mentescere velet. Deinde idem liquidò cernitur in his quos febres diuturnæ
 „ ad summam maciem redegerunt, qui postquam edomito morbo convalescere
 „ cœperint, brevissimo quidem temporis spatio alimentis instaurari videmus :
 „ denique in Equis quibusdam carnis musculosæ compages, levi quovis motu
 „ facile dissolvitur, ac eliquatur, pastuque iterum citissime reficitur. Quare ex
 „ pulcherrimo hoc cum nervis quoad insertionem consensu, eodem jure argu-
 „ mentari licet, ipsos musculis movendis inservire, quo omnes Anatomici à ner-
 „ vorum insertionis modo contendunt, ipsos ad eundem usum à natura desi-
 „ gnari. De Lymphæ ductibus autem nihil memoratu dignum ad hanc rem ad-
 „ ferre possum. Secundò, optime ab Aquapend. annotatum est, tensionem mu-
 „ sculi ac penis in eo convenire, quod uterque rigescat : jam vero penis tensio-
 „ nem non ab inflatione aliqua (quod de musculo etiam Veteres sensisse diximus)
 „ provenire, sed à sanguine per arterias copiosius irruente, ibique per materiæ
 „ semineæ, h. e. laticis nervosi admistionem æstuante & effervescente, quod nos
 „ etiam de musculo affirmamus, satis constat. Tertio demonstrat Fallopius
 „ (vir, si quis alius in confectionibus versatissimus) nullam in toto corpore
 „ partem motu voluntario se movere, nisi quæ, præter fibras, carnem etiam
 „ habeat; ac alibi se explicans, veram se carnem intelligere ait, talemque quæ
 „ in musculis tomenti modo fibris impacta est. Putat enim verò vigorem
 „ movendi, partim à caliditate hujusce carnis accedere; at calor, obsecro,
 „ nisi

nisi à sanguine, eoque, ut dixi, magis copioso, cum pars movetur, quàm alias? Secus enim perpetuus afforet se movendi conatus. Plura autem hac super re paulo inferius dicentur. Quartò, posita hac causa, videtur per eam haud incommode explicari posse rationem contractionis ac intumescentiæ musculi; quod sic amplius ostendo.

31. Postquam ea quam modo loquutus sum sanguinis eluvione innudatus est totius musculi habitus, omnesque ejus pori tam in carne quàm in fibris tendinosus probe oppleti, non poteritis non valde distendi. Advertendum est enim tantum sanguinis ex arteria *I K O*, ac tanta velocitate exire, ut vena socialis *L M N*, ipsi revehendo impar sit, adeoque in hoc musculo *A B C D*, sanguinis circulatio ad tempus planè inæqualis reddatur: quod item in tensione penis modo dicta, & cunctis inflammationibus, partiumque inde enatis doloribus accidit: hinc partes sic affectæ duriores ac tensiores evadunt. Quo autem hoc melius percipiatur, cogitemus arteriam *I K O*, è trunco illo majori *I K O*, ubi cordis impulsio est vehementior, sanguinem in minores ramos, indeque in habitum musculi cum impetu quodam effundere, unde patet arteriam *I K O*, continenter impleri: Venam autem *L M N*, eundem per ramos exiles ægre intrantem paulatim recipere, ut ex se iterum versus cor transmittatur, adeoque hanc perpetuo depleri: Atqui, sanguis in habitum musculi copiose effusus, vasa intra ipsum necessariò comprimet. Ac quoniam major est in arteria *I K O*, à novo hoc sanguinis impulsu renitentia, quàm in vena *L M N*, è qua lente admodum, ut prius dixi, elabatur; idcirco ista compressione vena *L M N*, cum suis omnibus propaginibus, magis quam arteria *I K O*, coarctatur: sanguisque haud eadem proportionem per venam *L M N*, è musculo exit, quàm ab arteria *I K O*. immittitur. Ut taceam venas etiam eo comprimi facilius, quod tunica saltem simplici intra musculos incedant, ut supra annotatum fuit. Hinc vero musculus *A B C D*, suis membranis conclusus durescere incipit, ac ad latera *R. Q.* tumere; secundum autem longitudinem *A C*, contrahi. Cùmque caput *A*, prorsus immobile sit, tendinis extremum *C*, versus *A*, adducitur.

32. Accedo jam ad demonstrandum, hujusmodi intumescentiæ musculi, quamvis exigua fingatur, non tantum satis valere ad quodlibet corporis membrum attollendum, sed etiam ad aliud quodcunque pondus tendini in *C*, appensum, quod ab ipsius capite *A*, ac fibris per ipsum decurrentibus sustineri possit: quantum autem illud sit, conjecturâ saltem ab experimento Sect. 20. assequi licebit. Quare esto in Fig. 2. secundus cubitum flectentium musculus (Brachæus dictus) *M E O*, principium ejusdem in osse humeri *M*, venter *E*, tendo autem, quo lato quidem ac carnosio in ligamentum articuli, & cubiti radiique appendicem inseritur, sit *O*. Pondus movendum (adjuvante etiam bicipite, de quo eadem est ratio) esto tota illa ossium carniūque compages ab osse cubiti *T*, ac radio *V*, usque ad extremos digitos. Quoniam autem omnis harum partium moles circa articulationem ossium humeri cum ossibus cubiti radiique tanquam centrum rotatur, idè musculus hic incommodam admodum insertionem nactus videtur, centro utpote nimis propinquam. Illud tamen non obstat, quominus ex principiis nostris clarè intelligatur, quemadmodum hoc totum pondus, etsi vel centies esset gravius, facile moveri posset.

posset. Accipiamus ergo in ventre musculi punctum aliquod, putà E ; dumque musculus tumescit usque in M D O, cogitemus hoc punctum E, progressum esse in D, cubitumque proinde parum inflexisse. Tum facto in ipso articulo O, centro, semidiametro O E, ducatur circulus E I N, tangat ipsum in puncto E, recta E D, & ad punctum in tangente D, continuetur radius O q, ac loco curvæ lineæ O A D, intelligamus rectam O q D. Erit itaque spatium à puncto E, dum musculus tumescebat, transmissum recta E D. Pars autem secantis extra ambitum circuli q D, ostendit spatium à cubito prope centrum motûs peractum, dum introrsum flectebatur. Jam concipiamus vim illam quâ E, versùs D, movetur, vicem tantilli cujusdam ponderis habere : Dico, semper majorem futuram proportionem velocitatis motûs puncti E, ad velocitatem ponderis attollendi, quàm est gravitatis ejusdem ponderis (quàm maxima-cunque sit) ad gravitatem vel minimi ponderis in E, trahentis ab E, versùs D, cujus locum vim intra musculum agentem obtinere modò supposui ; unde consequitur musculum M N O, extumescentem facile pondus Cubiti attra- here, quod ita ostenditur.

Esto pondus Cubiti

Vis movens in E,

Sitque

Sumatur e multò minor
quam d : Ergo

Sint autem
Fiat quoque

Sed per 35. e. 3.
Ergo

$$\begin{array}{ccc} a. & & b. \\ \frac{b}{a} & = & \frac{e}{d} \\ \frac{c}{c} & = & \frac{c}{d} \\ \frac{e}{c} & = & \frac{f}{qD} \end{array}$$

$$\frac{ED}{qD} = \frac{e}{f} = \frac{c}{e} = \frac{c}{d} = \frac{a}{b}$$

33. A duabus hisce causis omnem musculorum motum primariò inchoa- ri opinor : Totaque vis illa ac momentum, quo singuli musculi suos anta- gonistas superant, ab iis pendet. Ac de nervorum quidem efficacia res ferè extra dubium est, ut nullus adeo ambigat, quin ipsi principem locum in motu musculi inchoando obtineant, quia his læsis omnis hujus machinæ usus tollitur. Meritò autem quæri potest, annon ista vis sive liquor è nervis exsi- liens, istiusmodi in se acrimoniam habeat, licet minùs vehementem, quam in liquoribus Ptarmicis videmus : cujus beneficio in tendinosum musculi ca- put extillans omnes ejus fibras ad se statim contrahendum velut aculeis qui- busdam exstimulet, ut cum sternutatio à pharmaco excitatur, aut uti materia carnis intra nares retenta, à solis luce rarefit, hominèmq; sternutare facit. Neque aliter medicamenta purgantia, vomitumque provocantia operari vi- dentur : dum enim ventriculus ac intestina eorum virulentia irritantur, fibras suas carneas validè constringendo id quod noxium & ingratum sentiunt, ma- gno conatu ejiciunt : ac memini sanè levissimo attactu liquoris cujusdam peracris, quem ab honoratissimo viro nostrique temporis ornamento maximo D. Boyl acceperam, musculum ex humano femore excisum, momento se con- trahere;

trahere: ex quibus confici videtur, laticem hunc nervosum cum solis fibris tendinosi movendo musculo satis esse. Equidem haud inficior, non nihil fortè hinc ad fibrarum contractionem accedere, sed non antequam priores illæ causæ ita eas adjutarint, ut possint æquipollentem se contrahendi vim, quæ in musculo antagonistâ est, exsuperare. Huic itaque objectioni non una ratione obviam ire licebit: namque primò, si non ita sit quod modò dixi, nondum sanè apparet, quo pacto fibrarum virtus illa se contrahendi in altero musculo, ex influxu laticis nervosi ita viribus augeatur, ut musculum suum contrahere possit, dum interim incolumis manet æqualis ipsi virtus in musculo antagonistâ; quod profectò id ipsum est de quo maximè quæstio instituitur, ut Sectione 7. subinnui. Secundò, annotavit excellens Anatom. Fallop. omnem corporis partem, quæ motus voluntarii capax est, fibris donatam esse: atqui istas fibras unà cum suo nervo ad motum concipiendum non sufficere, idem ille ostendit: Est (inquit) necessaria propensio atque apta natura, subjecti corporis ad concipiendam hanc movendi facultatem; quæ quidem propensio à carne dependet, quoniam video corpora quædam fibrosa cum adjunctis nervis à quibus facultatem habent communicatam, & tamen se ipsa non movent. Et paulo post: Hoc idem pluribus exemplis confirmare possem, sed unum hoc mihi satisfacit, omnes membranas, quæ seipsas movent, carneas esse factas. Si dicant eum esse carnis impactæ usum, ut sint tanquam *ὀπμοχλίων*, seu potius Trochlea per quam fibræ veluti funes chordæque ducantur; optimè hanc excusationem amolitur hæc Fallopii observatio: quippe, si fortè id esset aliquid in musculis artus moventibus, tamen ad membranas contrahendas haud opus est: namque hæc cum ex infinita fibrarum contextura fiant, non aliter quàm fibra aliqua singularis aut corium validè extensum contrahuntur: ad quod nihil certè quod Hypomochlii Trochleæve vicem habeat, requiri satis notum est. Cum itaque in panniculo carnosio omnes partes fibrosæ sint, omnesque transmissam habeant per nervos facultatem, ac etiam sentiant; cur non omnes etiam moventur? sed ex tantum quæ carnem habent fibris incrustatam. Quibus adjicere quoque possem, istos musculos, quorum meminit V. Cl. Deusing in erudita sua de motu musculorum Exercitatione: Sunt (inquit) muscoli qui unà secum movent solam cutim, ut labiorum, faciei, &c. vel aliud quid leve duntaxat commovent, ut muscoli linguæ, laryngis, &c. talium fibræ vix in visibiles tendines coalescunt. Equidem omnibus ritè perpensis, opinor magis fabricæ musculi congruere, ut ejus movendi ratio è principiis istis mechanicis quæ Sect. 3. 2. allata sunt, quàm ex aliis quibuscunque deducatur; adeoque is sit carnis infarctæ usus, quem superius adstruxi. Attamen illa ad particulares quorundam musculorum motus demonstrandos respectu peculiaris cujusdam quem obtinent sitûs, ut à Doctiss. Charlerono, aliisque factum est, rectè adhiberi non negem.

34. Ex dictis modò consequitur, haud tantum à nervis, verum etiam à sanguine in carnem musculosam copiosius per arterias illato, omnem ejus motum inchoari: His autem jam tertia illa succedit, quæ à spontaneâ fibrarum contractione proficiscitur: Quo enim magis intumescit musculus versus Q, & R, eò major ipsi conceditur se contrahendi facultas. Accidit autem interdum, tertiam

hanc causam ab externa vi adjutam agere per se, ut in casu Sect. 6. cùm alter alteri subito brachium flectit. Imò multum ad hoc facit sanguinis advenientis calor, ut è musculo cocto apparet, qui vix quartam pristinae longitudinis partem servat. Taceo aculeatam fortè vim, qualem Sect. 33. diximus in latice hoc nervoso inesse, unde fibræ nonnihil irritentur: certè ex attactu liquoris D. Boyl haud parum se contraxit musculus, nempe quia antagonistâ caruit. Prætereo denique ipsam illam humoris copiam quo musculus turgescit, aliquantulum hanc contractionem adjuvare, eodem ritu quo ille Venetus immani magnitudine columnas funibus aquâ aspersis dimovit. Atque ita omnibus his causis validè simul agentibus musculi finis versus originem pertrahitur.

35. Hæc autem ægrè ab iis assensum impetrabunt, quorum animos ista de spirituum inflatione occupavit opinio; quippe vix crediderint velocissimas illas, quas videmus, membrorum agitationes ac citissimas tensionum ac relaxationum alternationes in musculis antagonistis hinc provenire posse. At, inquam, hæc omnia etiam momento temporis ab hisce causis præstari: Simul enim ac nervi fibrillæ H E G, ad cerebrum protensa concutuntur, continuo istæ liquoris guttulæ ex omnibus ejus propaginibus excidunt, ut embolo syringis vel levissimè intruso, liquor statim exsilit: namque summa intelligi debet totius corporis à succis spirituosus ac vitalibus plenitudo. Ut verò aqua oleo vitrioli affusa, ita liquor hic in sanguine momento effervescentiam concipit; eodemque planè instanti sanguis per arteriam I K O, quasi aqua è siphone aperto epistomio effluit. Ad extremum non citius tumere incipit musculus, quin se etiam contrahant fibræ; adeò ut cuncta simul ac semel, ictu quasi oculi contingant. Ea autem quam dixi effervescentia admodum repente cessat, spiritusque actuosi momento fere per membranas musculi dissipantur; ac nisi novus statim accesserit, sublatâ circulationis sanguinis inæqualitate, per fibrarum antagonistæ contractionem musculus statim retrahitur & flaccescit, sanguisque illicò majori copiâ per venam L M N, elabitur: hinc etiam exercitia nimis violenta spiritus absumunt, eosque per sudores erumpere faciunt. Quinetiam membra post vehementiores corporis motus (præsertim in his qui iis non sunt assueti) valdè dolent ac languent. Quam citò autem affluat sanguis iterumque refluat, subita illa ex cogitationibus Venereis penis erectio, ejusdemque ab exitu seminis flacciditas, totius faciei ex pudore suffusio, momentanea quasi in consternatione ex omni corporis parte ejusdem ad interiora secessio, aliaque hujusmodi docent. Ad hæc, quò minor est attollendi ponderis ad vim moventem proportio, ed citius conficitur spatium E D, & q D. Hinc magna pondera vesicæ appensa ejusdem inflatione, aut aquæ in eandem immissione satis celeriter elevantur. Deinde, dum pars brachii, quæ articulationi vel centro propinqua est, transit per illud spatium minus q D, alterum ejus extremum spatium longè majus eodem tempore emetiri putanda est. Denique si quis attentè consideret, istos quos tantoperè increpant spiritus, nusquam extra sanguinem & laticem nervosum in corpore reperiri, atque adeò reipsa liquores esse, eo forsitan minus à veritate aliena quæ diximus existimabit.

Fig. 1.






Fig. 2.







PATHOLOGICÆ
CEREBRI,
ET NERVOSI
GENERIS SPECIMEN:

In quo agitur de MORBIS CONVULSIVIS,
& de SCORBUTO.



P R Æ F A T I O.



UOD cerebri, & nervosi generis Pathologiam integram pollicitus, demum unius, aut alterius tantum morbi rationes exhibuerim; te monendum imprimis (CANDIDE LECTOR) velim, non me vafra illa fraude, qua rerum venalium institores merces suas extrudere conantur, prodromas hasce theorias oculis tuis subjecisse: cum enim istis solenne habetur, si fortè aliquid melioris notæ possideant, id illico ostendere, pergalis præfigere, in lucem dare, & obviis quibuscumqueingere, ut ita tandem offuciis fidem, & vilioribus postmodum distrahendis decus præstruant. Contrariam ego penitus insisto viam, nimirum ut quæ magis dubiæ videbantur indolis, in specimina præponerem; & ubi censuram, & judicia imprimis formidanda duxeram, illa utique deposcerem & provocarem: neque enim tam docere alios, quam ab iisdem discere, nec tam famæ velificare, quam veritati, quæque ipsi in proximo consistit, Philosophiæ famulari, & faciem prætendere in votis habeo.

Quemadmodum autem inter universas corporis humani ægitudines, illæ quæ cerebrum, ejusque appendicem tentant, cognitionis semper arduæ, & impendio intricatæ, jure merito haberi solent;

ita in tota hujusmodi morborum turba nihil abstrusius, quodque nobis vindice dignis magis implicaretur, quam de veris convulsionum causis, & earundem rationibus (si ita loqui liceat) formalibus disceptatio. Quapropter *Averrhoës* non dubitabat pronuntiare, quod *verba Medicorum in hoc accidente, universaliter sint propinquiora, ut sint verba musicorum, quam ut sint demonstrativa.* Item *Galenus*, qui rarò admodum in assignandis rerum utut abditarum causis hæsitavit, ingenuè fatebatur ἡ τῆς δ' ἀνεκῶς ἐστὶν ἡ αἰτία τῆ νοσήματι ἐπ' ἑσπῶν τὰ μόρια χαλεπὸν εἶπαι. Nec tantum antiquiores Medici veritatem hanc sublatam ex oculis, aut alta caligine involutam invidi quærebant, verum & recentiores plerique in eundem lapidem gravissimè offenderunt. Quidam nuperioris seculi vir doctissimus, *Iohannes Crato* exclamat, optatque, *utinam ante vitæ nostræ exitum veram dignotionem mali Epileptici, verumque remedium aliquis ostenderet.* Cæterum licet affectionum spasmodicæ causæ, à nullis serio reddantur, tamen earundem *Ætiologia* quædam apud Authores passim traditur. Hi vero potius quod vulgò fertur, quam quod ipsi senserint, aut quod animo veritatis avido satisfaciat, scriptis mandarunt: Non absimili quippe ritu hanc rem peregerunt, ac imperitiores chorographi, qui loca tantum plana, & facile accessibilia exactè dimetiuntur, interim sylvis obtecta, montibus inæqualia, aut præcipitiis abrupta sine radio adhibito, juxta populi æstimationem supputasse satis ducunt. Ita cum Medici plures, convulsionum causas repletionem, ac inanitionem, & quidam alii partium nervosarum solummodo irritationem esse dixerunt, nihil hinc planè declaratur, aut quod instinctus modum enarraverit, quo præter, vel contra naturæ, aut appetitus normam spasmi peraguntur, aut quod ullatenus explicarit, unde in affectu isto facultati motrici impetus, robur, ac celeritas penè infinita, & suprâ omnes naturalis potentiæ vires accesserint. Quapropter facilem mihi spero veniam, si quandoquidem in ejusmodi phænomenis huc usque frustra defudatum est, ego Harioli, & conjectoris partes suscipiens, novas & non prius auditas rationum syllogas in medium produxerim. Profecto (quicquid alii senserint) spiritus animales revera existere, ipsiusque animæ corporeæ hypostasim constituere; eosdem motus, & sensus proxima & immediata instrumenta esse; quin & nixus motivos ab eorum explosionibus excitari, prout ubique in sequenti tractatu supponimus, ita in Physiologia nostra aliquando forsan in lucem proditura, rationibus non contemnendis speramus non evicisse. Super hac igitur hypothese, (ut opinor satis firma, ac ad rem nostram

nostram maximè accommoda) scil. spirituum animalium virtute elastica, sive explosiva, doctrinam spasmoden exstruendam curavimus. At quia fœtus hic noster faciem adhuc insolitam, & præ notionum raritate, quasi monstrosam quiddam & τερατώδες ostentat, idcirco (quemadmodum infelices partus tractari solent) in mediam viam, & tantum non in profluentem, ceu exposititium abjicimus. Porro ejusdem fortunæ vires subit disquisitione quædam alia de scorbuto instituta, in quantum scil. doctrinæ spasmodicæ hæc plurimum affinis, eidem hypothese innititur, ejusque velut appendix est. Quos quidem præproperos, & quasi abortivos partus, si pro sua humanitate hospites illi, qui in eosdem fortè inciderint, enutriendos, tollendosque curaverint, justior tandem aliquando succedet proles, quæ uterum unde nascitur feliciter sequatur, & parentis suæ, scil. humanæ animæ memor, ejus imaginem juxta & indolem expressius referat; saltem (quod huic Pathologiæ accidisse vereor) cerebri morbos non ita describat, ut in eorundem sortem veniat, & numerum auxisse videatur.

C A P U T P R I M U M.

De Spasmis, sive motibus Convulsivis in genere.

IN tractandis *Affectibus Convulsivis* plerique Medici distinguunt inter *Spasum*, sive *Convulsionem*, & *motum convulsivum*; per *illum* nempe intelligentes *contractionem constantem*, qua membrum rigidum & inflexile evadit; per *hunc* autem *motus celeres*, & *concussiones*, quæ interjecta quiete, alternatim cessant, redeuntque: verum nec illi qui has discriminis notas constituunt, nec cæteri Authores eas perpetuò observant: quippe per vocabula *Spasmi* & *Convulsionis* quælibet *πάθος παρωδές* non raro designant: Quare melioris discretionis gratia, priorem affectum cum Cardano *Τέτανον* appellabimus, alterum vero *Spasum*, seu *motum Convulsivum* in genere.

Ut autem *Spasmi*, sive *motus convulsivi*, & *irregularis* natura, & causæ rectius innotescant, præmittendum esset, quo pacto *functio motiva regularis* in corpore animato peragitur: verum hujus plenior consideratio, quoniam ad cerebri, & nervosi generis *Physiologiam* spectat, in alium differetur sermonem: In præsentī, quantum ad rei propositæ elucidationem facit, verbo annotetur, *spiritus animales* esse proximum *motus regularis* instrumentum, ipsorumque actionem, seu vim motricem in eo tantum consistere, quod densius agglomerati in parte motiva, ibidemque in spatium *peragi-*

Eius duplex principium. amplius expansi, eandem inflent, & intumefaciant, quæ proinde, quoad longitudinem contracta illico ad se partem sibi appensam attrahit. In nervorum descriptione nostra pridem edita, innuimus huiusmodi motum esse duplicem, scilicet *spontanæum*, & *mere naturalem*; *hujus* instinctum à *cerebello*, ac istius à *cerebro*, utrumque autem per *nervorum* ductus veluti *canales* deferri, cum ad *musculos*, tum ad *fibras membranis, parenchymatis*, aliisque

partibus motivis intertextas; denique in hisce omnibus, tam expedite varias peragi actiones, quascunque aut *necessitas naturalis*, aut *voluntatis imperium* exigit, ea solum ratione, quod inter spiritus animales, qui animæ sensitivæ hypostasim constituunt, intra prædictas partes continuata serie dispositas, ubique eadem est *communicatio officii, intima conjunctio, & celerrimum commercium*. At vero inter motum à musculo, eumque ab aliis partibus editum, discrimen hoc notabile occurrit; quod in his actio sæpissimè intra corporis motivi terminos circumscribitur, ita ut ejusdem tantum membrana, aut visceris pars una aliam moveat, & deinceps hæc à vicina moveatur: in genere autem musculofo plerumque pars movens in uno membro, & movenda in alio proximè confita est (quamquam & inter partes musculo-

Duplex item subiectum, fas quædam, uti *cor & diaphragma*, propriè seipsas ferè tantum movent:) Hinc *membrana & viscera* motum quasi *intestinum, & vermicularem* habere dicuntur; qualis ubicumque incipitur, spiritus ibidem densius agglomerati, & expansi, primò partem istam, dein ultra pergentes, aliam, & mox ulteriorem intumefaciunt, proindèque partem illam quæ à tergo est trahunt, adeoque intumefactionem, & propterea motum à loco in locum transferunt; simili ferè ritu ac lumbrici, aliaque reptilia progressus suos faciunt. Huic autem *membranarum, ac viscerum functioni motiva*, si frequens, aut indiscontinua fuerit, spiritus copiosi requiruntur, qui tamen sine tumultu, aut magno impetu pensa sua satis tranquille exequuntur: Et quidem observare est, *spiritus animales* in *viscera membranacea* haud multo parcius, quam in *musculos* influere; prout arguere licet ab istarum partium sensu exquisitiori, & in iisdem multiplici nervorum insertionem, & diversimoda per plexus & fibras divaricationem; licet interea *musculi* uberiori sanguinis influxu irrigantur: Quoad motum vero in genere musculofo peractum, *spirituum agglomeratio & rarefactio* per totam partis motivæ compagem subito ac simul explicatæ, tanto cum impetu, ac robore peraguntur, ut *tractio musculi* in nixu motivo, vim *trochleæ, aut vectis* excedat; cumque vis ista tantum à spirituum partis motivæ insitorum expansione, sive rarefactione dependeat, nihil minus concipere possumus, quàm spi-

Musculi motus spirituum explosio quadam. ritus ita expansos, *pulveris pyrii ritu*, veluti *ignitos explodi*. Enimverò supponere licet, spirituum, fibras musculo intertextas incolentium, *particulis spirituo-salinis* alias diversi generis *particulas*, à *sanguine arterioso* inter easdem fibras ubique interfluo, *nitrosulphureas* accedere, illisque intimè accrescere: dein quoties *particulæ* utriusque generis, velut *nitrum & sulphur* combinata, propter motus instinctum per nervos advectum, tanquam à fomite igniario commoventur, protinus ab invicem *elise*, & velut *explosæ*, musculum subito inflant, proindèque tractionem validissimam efficiunt: enimverò in hunc finem ita constitui videtur, ut *musculi* multo

uberius

uberius quam *viscera membranacea* sanguine arterioso perfundantur: nimirum ut spirituum *copula elastica*, per motus valde crebros, ac interdum continuos absumptæ, ac perpetim deciduæ, subinde statim nova à *latice sanguineo* substituatur: interim ut ipsi *spiritus* in minori copia per nervos exiles suppeditati, usque in eadem statione, tanquam *militēs veterani*, diutius persistant, & sæpe *copulam* multiplicem impendant. Secus enim, unde jumentis, dum per plures horas, imo per integrum aliquando diem, cursu citiori musculos ferè omnes exercent, spirituum penus pro tanto labore sufficiens derivatur? aut quis credat paucos spirituum manipulos, per exiles nervorum *pari vagi & intercostalis* propagines cordi adductos, proprio Marte adeo robustum, & indiscontinuum ejus motum efficere posse? illis, equidem necesse videtur, *copias subsidiarias* perpetim à sanguine accedere, easdemque semper protinus *explodi*. Certe ob hanc rationem & cordis, & cæterorum *musculorum* virtus motiva robustior, & supra *organum* quodvis *mechanicum, elastica* evadit: nempe in quantum spiritus animales, ubique in musculoso genere agentes, sibi met *copulam explosivam* adsciscant.

Quod si *Explosionis* vocabulum, in *Philosophia* ac *Medicina* adhuc insolitum, cuiuspiam minus arrideat; proinde ut *Pathologia* *παρὰ μὲν* huic basi innitens, tantum *ignoti per ignotum explicari* videatur: facile erit istiusmodi effectus circa res tum naturales, tum artificiales, instantias, & exempla quamplurima proferre; ex quorum analogia motuum in corpore animato, tum regulariter, tum *ἀνωμαλῶς* peractorum, rationes aptissimæ desumuntur. Nam præter *Nitri* cum *Sulphure*, cum *Tartaro*, & cum *Antimonio* mixturas, quæ omnes cum detonatione igniuntur; atque *Aurum fulminans*, & compositionem ex *sale Tartari*, *Nitro*, & *Sulphure*, quæ absque ignitione actuali, tantum penitus excalescentia, cum fragore vehemente exploduntur; etiam huc referri possint multi liquores, qui simul commissi, aut quibusdam corporibus affusi, motus violentos, & plane explosivos ineunt, concitantur: *Spiritus nitri*, & liquor *Antimonii glacialis* invicem confusi; quin & alteruter *limatura ferri* immixtus, ebullitionem maximam cum calore & fumo atrato concipiunt. Vulgo notum est quanta effervescencia, & impetus planè explosivi à *salibus fixis deliquatis*, ac *acetosis* cujusque generis simul permixtis oriuntur: Nec minor explosionis effectus cernitur, quando liquor *sale volatili imbutus*, uti *Spiritus C. Cervi* aut *sanguinis*, *stigmati salino* vel *fixo*, vel *acetoso*, vel *nitro-sulphureo* admovetur; scilicet particulae aliæ ab aliis vehementer elisæ, cum impetu dissiliunt, & quaquaversus longe proferuntur; quæ proculdubio, si intra corporis cuiusdam spatia, uti musculi fibras coercerentur, ipsum subito intumescerent, adeoque motus localis instrumentum constituerent. Super his paulo apertius in *physiologia* nostra olim differuimus, atque rem adhuc fusius, & accuratius explicatam forsan aliquando publici juris faciemus.

Interea tamen ne videar sententiam hanc, revera novam, tanquam mei unius cerebri fœtum, omni patrono inopem exposuisse; libet hic *Clarissimi Gassendi* assertionem proferre; quæ ut hypothese huic nostræ aper-

autoritas

Gassend.
phys. sc. 3.
lib. 11.
cap. 1.

autoritatem aliquam conciliare. Itaque ἀπολογώτατ' ille vir animo perpendens *quanta sit vis illa sive robur, quo non modo brachium, aut crus, sed tota etiam animalis machina movetur, regitur, attollitur, transfertur, subjungit: Ecquis facile capiat tenue illud, quodcumque est, intra Elephanti corpus, quod seu animam, seu spiritum, seu aliud quodvis principium motus concipimus, posse illam tantam molem agitare, ac ad tripudium etiam velox, concinnumque componere? ac tanto magis, quanto ubi tenue illud intra id corpus non amplius viget, tanta externa vi opus sit, ut vel minimum loco emoveatur: sed nempe ad hoc quoque primum facit eadem natura animæ igneæ, quæ tametsi sit flammula pertenuis, sui tamen mobilitate idem proportionem præstare intra corpus valebat, quod flammula ex pulvere pyrio intra tormentum bellicum: dum scilicet non modo globum tanto propellit impetu, sed tanta etiam vi depellit totam machinam. Quod vero ad spiritus attinet, qui (instar pulveris pyrii explosi) agitationem istam subeunt, dubium esse, inquit, an alii sint qui adveniunt ex cerebro, an qui in ipsis tendinibus quasi connati haberi possint? Verum tametsi utrique concurrant, videntur tamen ad hoc munus illi præsentius destinati, qui sunt connati tendinibus. Non pluribus hic opus est, ut declaretur functionem motivam à spirituum animalium copula elastica, ejusque decisione pendere. Attamen ex hoc supposito (quod quidem maxima cum probabilitate supponimus) facile sequetur, motus convulsivos multo magis à tali causa procedere: Quisquis enim in membris, aut partibus affectis, subitas intumescencias, violentas & validissimas contractiones, quinimo interdum totius corporis concussionem, jactationesque impetuosissimas considerabit, nihil minus concipere potest, quam plures spirituum animalium glomeres, velut fulguris è nube erumpentis, explodi. Porro hinc etiam Elencho velut reciproco arguere licebit, & quia motus ἀσπασμῶδεις sunt explosivi insuper & regulares, à spirituum explosionibus produci: quo tamen ritu, quot modis, & quibus de causis spiritus animales explosi affectiones ἀσπασμῶδεις pariunt, præsentis instituti erit paulo fusius, & quantum res ita difficilis & abstrusa patitur, apertius demonstrare.*

Spasmodi
rum causa
conjuncta,
Non reple-
tio aut
inanitio.

In recitandis aliorum, circa spasmi naturam & causas, sententiis non multis hic moror. Quæ apud antiquos diu celebris increbuit opinio, affectionem hanc tantum à repletionem, aut inanitionem produci (utcumque huic stabiliendæ præter autoritatem Hippocratis, proferatur exemplum de corio, aut fidiū nervis, qui aut madido aëre impleti, aut nimis sicco inaniti contrahi solent) facile ex se concidit; quia supponere videtur (id quod nemini fragilitatem nervi experto credibile esse potest) nimirum ipsos nervos quoquo modo abbreviatos atque contractos, posse vi quadam musculos ad se attrahere. Quod si referatur repletionem, aut inanitionem respectu solidarum partium quæ convelli solent, intelligi debere; è contra observare licet, ubi musculi & nervosum genus humore aqueo maximè irrigantur, uti in Anasarca; aut eodem plane destituuntur, prout in tabe, vel marasmo, haud propterea motus convulsivos excitari. E recentioribus plerique solummodo irritationem nervosarum partium, convulsionis esse causam statuerunt, conjecturam inde opinor petentes, quod ἀντεψία pateat ab ipsa vellicatione, soloque tactu nervorum spasmos induci: Et quidem planè observavimus in dissectione vivi catuli, cultro nudatis nervorum spinalium caudi

*Aliquate-
nus ab ir-
ritatione
dependet.*

Cum itaque, ut prædicitur, *motus convulsivi* ob *duas* potissimum causas ^{Spasmo-}
excitentur, hinc totidem illorum *species* constituuntur. Nam 1. interdum ^{rum du-}
accidit *convulsionem* sine procatarxi, aut copula heterogenea prius ascitis, ^{plex cau-}
tantum à *causa evidenti solitaria* induci: ita namque *passio vehemens* cerebro ^{sa, ac dua}
impressa, *solutio continui* alicubi in nervoso genere contingens, pathemata ^{sunt spe-}
spasmodica nonnullis, quibus Cerebrum & nervi debilioris sunt consti- ^{cies. Irri-}
tutionis, subito intulere: quippe spiritus animales, objecto impropor- ^{tatio.}
nato ipsos fugante, partes continentes exagitant, quin & copulam suam,
licet idoneam, vehementer elidendo, easdem inflant; proindeque alias
hisce annexas convellunt: *Spasmi* hoc ritu excitati, quoniam in iis spiri-
tuum copula naturalis vehementius eliditur, quodam modo sunt explosivi,
qui tamen cito desinunt, & sæpissime sine viscerum, aut membrorum ja-
ctationibus, cum *tremore* tantum & horrore aliquo in spirituum deliquia
transeunt. Verum 2. *convulsionem* quarum paroxysmi sunt graviores, atque
diutius persistunt, aut crebrius repetunt, omnino à causa procatactica,
sive dispositione prævia pendere, & ab alia, præter irritationem, causa
conjuncta exoriri videntur. Ideoque in hoc casu *particu'as heterogeneas*, & *Copula*
valde explosivas spiritibus in hac aut illa corporis regione agentibus accrescere explosiva
supponimus: deinde ex iniqua hac combinatione, & *irrequieta hujusmodi ma-* ^{praterna-}
teria & *spirituum collisione*, crebras, *vehementesque explosiones editas*, paro- ^{turalis.}
xysmos ἀσπασμώδεις inducere.

Enimvero præter *copulam elasticam*, quæ spiritibus à sanguine arterioso ubivis accedit, & à cujus explosione ordinata *impetus motivus*, juxta appetitus

nutum aut *natura instinctum* in partibus quibusvis nervosis perficitur (prout alibi declaravimus) : etiam aliufmodi interdum corpuscula naturæ efferæ, & *pulveris nitrati* magis æmula spiritibus adveniunt, iisque intime adhærent : cujus materiæ à spirituum amplexibus, cum frequentia & subita divortia contingant, à mutua particularum elisione corpora continentia varie instantur, adeoque in *motus convulsivos* aguntur. Revera quoties *affectio spasmodica* habitualis evadit, ut paroxysmi convulsivi non raro sua sponte, & sine causa evidenti, passim vero levi quavis occasione oriuntur, talis morbi procatarxis in hujusmodi mala spirituum animalium diathesi consistit : Neque enim tantæ ægritudini excitandæ *colluvies serosa*, aliique minus efferi humores, licet in ipsis cerebri ventriculis, aut circa nervorum origines depositi, sufficiunt : Quippe in defunctorum capitibus non raro cerebri medullia, ipsaque nervorum principia aquæ limpide prorsus immersa vidi; quibus tamen dum vixerunt, nec *Epilepsia*, nec *motus convulsivi* adfuerunt : Quin potius ad hos motus producendos requiruntur *corpuscula* maxime activa, qualia sunt *salina* & *sulphurea*, quæ cum spiritibus combinata, & dein subito erumpentia, particularum mineralium combinationes, violentasque explosiones imitentur. Quandoquidem enim in motu regulari & ordinario (prout modo innuimus) musculi *impetum motivum*, & *vim elasticam* concipere nequimus, nisi *spirituum animalium explosio* quædam supponatur; certe multo magis pro *insultibus epilepticis*, aliisque *convulsionibus admirandis*, quæ passim eveniunt, excitandis, eorundem spirituum, cum aliis particulis valde efferis *complicationes*, eorumque ab invicem *elisiones* vehementes requiri, asserere licebit. Circa ejusmodi vero *copulam spasmodicam*, quia differt à *naturali* & *ordinaria*, quam in motu regulari adesse, & ubivis à sanguine suppeditari alibi ostendimus, inquirere oportet *undenam illa provenit*, & *quo ritu*, quibusque *in locis* spiritibus accrescere solet.

Copula
explosiva
spasmodica
immediate non
à sanguine
verum à
Cerebro.

Quoad prius, observare licet *explosiones spasmodicas* non solum in *musculis*, quibus solis quæ *motum regularem* efficiunt, limitantur, sed etiam in *membranis*, scilicet *ventriculo*, *intestinis*, *mesenterii*, aliisque *partibus* fere *exsanguibus* passim contingere : porro *explosiones ipsas* in *affectione convulsiva*, licet, *contra appetitus nutum*, & *natura morem* excitantur, longe *vehementiores* esse, & *diutius persistere*, quàm in *motu regulari*. Ex quibus constare videtur, *copulam explosivam spasmodicam* aliunde quàm *motus regularis effecticem* advenire. Et quidem probabile est illam non uti hanc à *sanguine arterioso* inter *fibras musculosas* ubique interfluo profluere, verum à *cerebro* cum *liquore nervos* irrigante descendere, & dein juxta *horum origines*, *medios processus*, *plexus*, *extremitates*, quasi in morbi convulsivi mineram congeri. Profecto nihil evidentius liquet, quàm *affectus spasmodicos*, ob noxam imprimis cerebro affixam, & exinde in varias systematis nervosi partes transmissam, sæpissime oriri : hinc enim accidit, quod *passio vehemens*, uti *timoris*, *ira*, aut *tristitiæ*, *spiritus* ἡ γυναικῶν hospites afficiens, ita crebro *pathemata dicta hysterica*, ac *hypochondriaca* ordiatur : Porro quod in malis *februm crisis*, cum sanguinis recrementa adusta in *caput* transferuntur, convulsionem passim succedant : Porro & hæc ratio est, cur *Vertigo*, *capitis inflatio*, *mentis torpor*, *aliaque*
supreme

suprema regionis accidentia, *spasmodum* in *visceribus*, & non raro in toto corpore subsequens procemium esse solent. Quapropter minimè dubitandum est, quin *particula heterogenea, & explosiva* è *sanguine* unà cum succo nervoso *cerebro* instillantur, quæ postea in *nervosum genus* detrusæ inibi spiritibus accrescunt, iisque diathesi convulsivam inferunt. Revera affectus *παρωδεις*, qui aut *universales* sunt, aut saltem plures simul corporis partes occupant, hoc tantum ritu ferè oriuntur. Interim tamen haud negamus, quin *Spasmi particulares*, qui se intra quosdam locos, capite nullatenus affecto, continent, aliis interdum modis inducantur. Nam siquidem *nervi* ab utroque fine, scil. *radice*, & *extremis ramentis*, humorem suum imbibunt (quod & *Doctissimus Glissonius* verisimillimum esse statuit, & à nobis non sine summa probabilitate in *ιστοριαι* nostra ostenditur:) profecto hinc quoque inferre licebit, etiam particulas spasmodicas non tantum à nervorum principiis, sed aliquatenus per illorum extremitates intus admitti: Id quod fortassis aperte satis & plane constat, quòd ex *liene* male affecto *Spasmi* circa ipsius regionem exorti *hypochondria*, & non raro *præcordia* infestant. Novi quibus à *tumore*, vel *ulcere* in *mesenterio*, *utero*, aliisque visceribus existente *Convulsiones* cum in parte affecta, tum circumcirca eam increbrescere solebant: cuius ratio videtur non aliunde petenda, quàm à particulis heterogeneis in loco affecto uberius congestis, quæque simul in fibras nerveas per totam viciniam confitas irrepentes, iis motum convulsivorum, velut *pulveris pyrii igniendi fomitem* suppeditant: at verò *Spasmi* ob tales *παρωδεις* oriundi haud sese solent longè latèque diffundere, neque semper ad caput ascendere.

Interdum
à nervi
finibus
suscipitur.

His ita præmissis de affectionis spasmodicæ *causa interna & proxima*, quam scil. potissimum, ac sæpius ipsi *capiti*, quadamtenus item *nervorum extremitatibus* ortum debere statuimus; modo restat ut varias in utroque genere *causas remotiores*, & multiplicem hujus morbi apparatus particularius designemus. *Ægritudo igitur Convulsiva* plerumque originem suam à *capite* desumit: nimirum quoties *particula heterogenea & explosiva* à *sanguine* in *cerebrum* aut *appendicem* ejus medullarem suffusæ, illinc postea in *nervosum genus* derivantur, ibidemque spiritibus accrescunt: hoc autem fieri contingit variis de causis: *plures enim sunt rationes, modique* quibus *materies morbifica* in *caput* admittitur; *plures* item quibus in *banc*, aut illam *systematis nervosi regionem* deducitur; & juxta varias ejusmodi *causæ morbificæ translationes*, diversæ *motuum convulsivorum* species constituuntur.

Spasmodi
causa re-
motiores.

Igitur quod *particula heterogenea & spasmodica* intra *ἐγκέφαλον* admittuntur, & *sanguinis mittentis*, & *cerebri suscipientis* vitio imputandum est.

1. Cum *sanguis* materiam morbificam capiti suffundit, vel tota ejus massa depravatur, uti frequenter accidit in *febris malignis*, item in affectione *scorbutica, cacoehymica*, ac imprimis *originaliter morbida*: vel *sanguis* ex se *insons*, & incorruptus corpuscula maligna aliunde accipit, eaque postea *cerebro* affigit; ita in magnis viscerum impuritatibus, ac præcipue cum partes aliquæ *abscessu* aut *ulcere virulento*, vel *fermento noxio* afficiuntur; talibus enim *μιασματων νοσων* *mineris* particulae noxiæ in sanguinem ebulliunt, ejusque com meatu postea in *cerebrum* deponuntur: ita ob *Lienem*

1. Mater-
ries mor-
bifica in-
tra caput
aggritur
vitio, tum
sanguinis
mittentis.

uterum, aliaque viscera male affecta morbi convulsivi excitantur; qui tamen immediatius à cerebro, istarum partium labes, per sanguinis commercium suscipiente, dependent.

Tū cerebri 2. Attamen 2. *sanguis*, utut vitiosus, & seminio morbo imprægnatus, fuerit, haud facile inquinamentum suum capiti allinit, nisi etiam *cerebri*, *ejusque appendicis* constitutio aliquatenus in vitio fuerit; quandiu hæ partes bene conformantur, & vigore pollent, se suaque tuentur: foribus oclusis, nil præter liquorem spirituosum suis usibus dicatum, purum, purumque admittunt: sin vero aut *cerebri meatus*, & *pore* nimis laxantur, aut *spiritus ostiarii* ab excubiis suis cessant, vel avocantur, unà cum *succo nervoso* materies heterogenea & morbifica irrepat, ac in regimine animali

Cerebri malignitatem suam explicat. Quod spectat ad ipsius *Cerebri malam dispositionem*, eadem aliquando *hereditaria* existit: ita parentibus *epilepticis*, aut *convulsioni* obnoxiiis oriundi, in eisdem affectus plerumque & ipsi proclives sunt: & quidem constitutio cerebri à partu multis modis fieri potest vitiosa; nam aut ipsius *intemperies* justo est *humidior*, aut *siccior*, vel alterius

qualitatis excessu, aut *defectu* peccat. Interdum *pore* sunt *laxiores*, vel *consistentia* ejus nimis *dura* aut *mollis* est: quin & *partium cerebri* & *appendicis* ejus *conformatio* indebito more habere potest: Cæterum aliquando *cerebri* & *nervorum* indoles originaliter sana & firma ex *accidente* vitatur, & *diathesin* morbidam acquirit: *longa intemperantia* has partes enervat: quin & *febres malignæ*, & *morbi chronici* eas plurimum debilitant: porro *accidentia externa*, uti *frigoris* & *caloris excessus*, *vulnus*, aut *plaga* earum crases sæpe pervertit, & impressionum morbidarum magis capaces reddit. Quod vero spectat ad *spirituum animalium acrias*, propter quas particulae heterogeneæ & spasmodicæ *cerebrum* absque *repulsa* subeunt, illique facilius coherent, observare est *spiritus animales* quibusdam ab ipsa nativitate *teneriores*, & *cito dissipabiles* existere, ita quidem ut nihil *sensui*, aut *imaginationi* fortius & vehementius oblatum tolerare possint, quin statim in confusiones adigantur: propter hanc rationem *foeminae præ viris*, earumque aliæ præ aliis *affectibus* dictis *hystericis* obnoxia fiunt. Porro interdum *passio violenta* *spiritibus* utut mediocriter firmis ejusmodi prostrationem ac inordinationem imprimit, ut postea nihil fortiter sufferre, nec cuivis injuriæ resistere valeant: ita passim accidit *subito timore*, aut *ingenti tristitia* regimini animali impressiones morbidas affigi, quæ postea vix unquam delentur: hinc enim *mulieres* sæpe *affectiones* dictas *uterinas*, & *viri hypochondriacas* primo contrahunt, iisque postea fere semper assuescunt.

2. Materies mor- bifica intra caput admissa, quomodo disponitur. Ex his constare videtur quibus modis & ob quas causas materies spasmodica intra *ἐγκέφαλον* admitti solet: jam proximè videamus quid de illa fiat postea; siquidem ista materia ad cerebrum advecta affectus convulsivos aut non semper, aut non eodem prorsus modo inducit.

Interdum à cerebro regitur. 1. Interdum accidit *particulas heterogeneas & explosivas* in cerebrum admitti, quæ tamen exinde sine magna noxa, & priusquam genus nervosum subeunt, rursus exterminantur: quippe *vena* & *lymphaductus*, sæpe quod superfluum & regimini animali inimicum est, resorbent, & vel foras convehunt, vel in emunctoria deponunt. Dum talis materia parumper in cerebro

cerebro agitur, particulae ejus spiritibus nonnullis affixae, ab iisque demum elisa, vertiginem & scotomiam cient; at vero quia nervorum ductus haud subeant, affectiones spasmodicae minimè succedunt.

2. Quando *materies morbifica* intra *γαστήρα* admissa, non exinde statim relegatur, saepenumero noxam suam, priusquam *nervoso* generi inferatur, haud prodit; nam intra *cerebrum* spiritus animales admodum vegeti, & spatium liberius nacti, *copula* cujusvis *heterogeneae* complexus evadunt; quos equidem intra angustos nervorum canales evitare nequeunt: porro ipsa *materies morbifica*, siquidem è *cerebro* per vasa excretoria amandari non potest, exinde mox in *systema nervosum*, utpote partem ignobiliorem dimittitur, sin verò invitis facultatum superiorum praesidiis, talis materia intra *cerebrum* diutius commoretur, ejusque spiritus incolas valde inficiat, *Epilepsiam* inducit, prout infra speciatim ostendetur: attamen multo crebrius labes è *cerebro* absque magna noxa ejus, in *nervosum* genus traducitur: hoc autem non uno semper modo fieri contingit.

Interdum in genus nervosum detruditur. In cerebro manens caducum infert.

Enimvero *particula heterogenea liquori nervoso* immixtae, ac versus nervorum principia delapsae, eadem non simul omnia, neque haec aut illa, prout fors tulerit, indifferenter subeunt, verum in *aliorum* ductus praeter *alii*, idque non sine aliqua ratione diriguntur. Namque observamus *symptomata convulsiva* sedem plerumque aliam in *pueris* ac in *adultis*, aliamque in *tenerioribus* ac in *robustis* sibi eligere.

Materia spasmodica in nervosum genus delapsa.

In *pueris*, qui *affectibus cordis*, & *membrorum exteriorum exercitiis* nondum assueverunt (quibus scil. utrisque causa morbifica longinquius à *cerebro* profertur) *materies spasmodica* in nervos proximos, eos scil. *tertiū quinti & sexti paris* saepius incurrit; quare illis *faciei*, ac *oris* partes maximè convelluntur: rarumque est & inassuetum iis *viscera*, & *praecordia*, prout in *adultis* attolli, motuve inordinato affici: E contra in *profecta etatis hominibus*, additi ad nervos *paris vagi*, & *intercostales*, uti ad istos *spinalis medulla*, magis patente, partes quas nervi illi respiciunt, frequentius convelli solent: hoc tamen cum discrimine, quod in *tenerioribus*, & iis qui sunt valde *παθηταί*, quibus ob *passiones animi*, *praecordia* & *viscera* saepius perturbantur, *materies spasmodica nervorum interiorum* ductus apertiores promptius subit; illique propterea *spasmi* in *abdomine*, & *thorace* excitatis, magis obnoxii redduntur: Hinc enim est quod *mulieres passionibus dictis hystericis*, ac *viri quidam hypochondriaci* molestantur: sicut postea, cum de affectibus istis particulatim differemus, fusius declarabitur.

In pueris nervos priores afficit.

Secus in adultis.

Cum *materies spasmodica* quorumvis nervorum capita adpellit, vel ibidem subsistens vertiginem tantum, partiumque ad quas nervi isti pertingunt, leviores spasmos, & subsultus creat, vel in nervorum ductus altius prolapsa paroxysmos convulsivos atrociores parit: eadem vero in processus nerveos delata, per caudicis, sive trunci unius aut plurium propagines, modo *omnes*, modo *aliquas* tantum ceteris patentiores disponitur; atque *spiritibus* tum intra ipsos nervos, tum intra *fibras appendices* confitis paulatim accrescit: nimirum par ratio est, & similis fit apparatus in dispositione ad paroxysmos convulsivos, ac si *pulveris pyrii* successivè explodendi grana per longas series jacerentur. *Spiritus* ad hunc modum

Quo ritu iuxta nervorum principia subsistens, aut in ductus altius prolapsa spiritus afficit.

copula heterogenea imbuti, tum intra nervorum *truncos*, tum intra *fibras membranis*, & *musculis* intertextas, potissimum vero intra *plexus nerveos* hospitantur; cumque illi aut *gravati* ob nimiam *plenitudinem*, aut data aliqua occasione exagitati, copulam suam excutere coguntur, particulae elisae & ab invicem profluentes partes continentes valde inflant, adeoque *impetum* aut *irritationem* *motivum* contra appetitus, & *natura* iussa, & *leges* exerunt. Porro *spiritus* ad *motus convulsivos* obeundos semel incitati, à systematis nervosi extremitate una, aut altera, ut plurimum vero in *sine* explosiones ordiuntur. Illi autem, qui primò explosi sunt, proximos quosque prædispositos, velut *traduce ignario* corripunt: adeoque longa, & continuata spasmodorum serie, à mera una ad alteram affectionem inceptam propagant: nam *convulsio* ab imo *abdomine*, aut à *pede*, aut *manu* exorta, sensim ad superiora, & plerumque ad ipsum *ἐγκέφαλον* prorepat: idemque affectus cum à *cerebro* (prout in *Epilepsi*) orditur, illinc pariter deorsum ad viscera remota, etiam ad membra & artus exteriores derivatur.

Materies spasmodica convulsiones, aut continuas, aut periodicas infert. *Materies morbifica* in capita nervorum influens pro varia sui copia & dispensatione, diversimoda convulsionum genera producit: nam primo observare est, abundante, & exuberante materia, interdum *systematis nervosi*, aut quorundam ejus partium *totos ductus* occupari, ita ut *spiritus animales* tum influi, tum insiti, *copula heterogenea*, ejusque supplemento perpetuo saturati, in *spasmos continuos* urgeantur. Novi quibus muscoli omnes, ac tendines in toto corpore *contracturis* & *subsultibus* sine intermissione afficiebantur: Novi alios, quibus *brachia*, & *crura*, cæterique artus in varias flexiones, & distorsiones perpetuo cogeantur: quin & alios vidi, qui saltare, huc illuc discurrere, pedibus, manibusque humum conturdere necesse habuerunt; quod ni facerent in immanes viscerum, & præcordiorum convulsiones incidebant. 2. *Particula heterogenea & explosiva*, si minori copia cum spiritibus combinatae sint, ipsis sine tumultu, aut perturbatione adhærent, donec post aliquod tempus utraque particula iterum diffilientes, ac ab invicem elisae paroxysmos convulsivos cient; cujusmodi *paroxysmi* sunt vel *periodici*, & *statis horis* exactè repetunt: quod accidit ob *materiam morbificam aequali dimenso* generi nervoso quotidie suffusam; proindeque circa idem temporis spatium, ad *plenitudinem explosivam* etiam quotidie aggestam; vel *vagi & incerti*, in quibus scil. particulae heterogeneae minori adhuc copia suffusae, non nisi longo tempore ad *saturationem explosivam* assurgunt; quarum interim cum *plenior aggestio*, tum *explosio* ob *plures occasiones*, sive *causas evidentes* modo *crebrius*, modo *rarius* solent accidere: hinc fit ut *affectio spasmodica* nonnunquam causae evidenti in totum ascribatur, cum revera nisi *procatarxis convulsiva* præcesserat, talis causa nullam excitasset.

spasmo à causa evidenti. Itaque ut de *convulsionum causis evidenter* nonnihil dicamus, supra observavimus, si vehementiores fuerint, & *cerebri*, ac *nervosi generis* constitutioni teneriori, ac imbecillae acciderint, eas interdum *solitarias pathemata convulsiva* inferre: at vero quoties *affectio spasmodica* gravior, & *habitualis* facta, sæpius redire solet, licet *causa evidens* in propatulo sit, & effectus culpam sustineat, nihilominus suspicari licet *procatarcticam* intus latere, &

in efficiendo potiore existere: nisi enim spiritus copula heterogenea imbuerentur, in explosiones involuntarias, & præternaturales nec tam facile, nec tam crebro adigerentur.

Causarum evidentium duplex ordo sive classis occurrit; aut enim ejusmodi *Causa* sunt quæ *procatarxi* a *la*gent, eamque citius ad plenitudinem explosivam *evidens* perducunt, uti sunt *mala victus ratio*, & *errata in sex non naturalibus*, quæ ^{dupl. x,} *sanguinem & succum nervosum* inquinando, particulas heterogeneas majori ^{scilicet im-} copia spiritibus ad saturationem suggerunt, proindeque accessiones spas- ^{plens, &} modicas eo citius accerunt. *Vel 2. causa evidens* dicitur quicquid spiritus de- ^{irritans.} repente exagitant & irritant, ut statim explodantur, efficit, & copulam suam, qualiscunque fuerit, elidant: atque hujus generis plurima sunt, quæ spiri- *Causa ir-* tibus modo intra *ἐγκέφαλον*, modo intra *systema nervosum* consistit, acci- ^{ritans ciet} dentia, motus convulsivos instinctu diversimodo (prout in regularibus as- ^{spasmos} solet) aut directos, aut reflexos cient. ^{directos,} ^{aut refle-}

1. Prioris generis potissimum sunt violenta animi perturbationes, quibus spi- ^{ritus} *Cerebri* i *cola* agitati, atque confusi, alios intra *nervosum genus* scatentes, & sæpe prædispositos ad explosiones irregulares incitant; ita vehemens timor, ira, aut tristitia non modò incommoda valetudine affectis i *nsultus epilepticos*, aut *hystericos* inducunt: sed interdum aliis quibuscunque *cordis palpitantem* & *tremorem*, quin & *membrorum & artuum convulsiones horrificas* accerunt.

2. Quoad alterum causa evidentis genus, quo scilicet *Spasmi* actu r. fl. x. inci- tantur; hoc quidem, nec infrequenter locum habet, quoties gravis molestia, cum *fibrarum & spirituum irritatione nervoso generi* alicubi exhibetur: quippe eadem molestia mox cum primis spiritum fontibus, nempe cerebro aut cere- bello communicata, exinde motus inordinati, ac violenti præter animi arbitrium incepti, h. e. convulsivi, retorquentur; ita namque *lumbrici*, *pharmaca*, aut *acres humores*, intestinorum tunicas inmaniter vellicantia, istarum partium, & non raro membrorum externorum spasmos inferunt.

Hæc de singulis causarum, conjuncta, procatarctica, & evidentium generibus, à quibus morbi convulsivi habituales facti, & cum gravioribus paroxysmis re- petere soliti exoriuntur: cum vero alteram hujus morbi speciem assignavi- mus, ubi paroxysmi à causa evidenti solitarii, seu fere tantum ab irritatione, spiritibus nondum copula explosiva præoccupatis, dependent; jam proximè disquiratur quibus, & quot modis hoc fieri contingit. Super his in communi statuitur *insultus spasmodicos*, à mera irritatione productos, aut leviores esse, & cito pertranseuntes, aut gravissimos, & non raro lethales, prout quando ve- nenis assumptis, aut *ὕπερναθίς* superveniunt. Porro adnotetur cum mate- ries morbifica, sive irritativa ipsis nervorum caudicibus, aut plexibus infe- derit, eam non raro etiam explosivam evadere, utcunque spasmos etiam à mera irritatione productos (prout supra annotavimus) explosiones quas- dam esse. Itaque his prælibatis, rem propositam expediamus.

Partium nervosarum irritatio, quæ motus convulsivos efficere solet, variis in *Causa ir-* locis, variisque ex rebus, quæ spiritibus & fibris incongrue, atque i *imica* sunt, ^{ritans di-} contingit. Quoad res spirituum naturæ adversantes, observare est præter vene- ^{stingitur} na, & qualitatatum tangibilium excessus, qui ab extra infliguntur, multa quæ in- ^{quoad loca} tus in nobis gignuntur, scilicet varia sanguinis, & succi nervosi recrementa, ^{affecta,} quoad sub- ^{miasmata}

iecta. *miasmata febrilia, humores præternaturales, salinos, aut sulphureos, quinimò lumbricos, calculos, cum pluribus aliis nervoso generi infesta esse, & irritationes*
Loca affecta sunt *spasmodicas passim ciere. Quoad loca affecta, sive materia irritativa sedem;*
nervorum principia, *licet hæc in qualibet systematis nervosi parte noxam inferat, ut plurimum*
extremities, & defigitur: *Porro talis materia, quæ spiritus irritans, causa evidentis loco*
medii processus & esse solet, non raro, prout modo innuimus, etiam procataretica rationem
plexus. *subit, quatenus nimirum particulæ heterogeneæ ab illa emissæ, fibras ner-*
Causa irritans ut *veas subeunt, & cum spiritibus combinatæ, eos ad explodendum aptio-*
nervorum *res, & procliviores reddunt.*
origines afficit.

1. Igitur interdum accidit *humores malignos, & nervoso generi infestos è sanguine in cerebri regionem suffusos, & exinde demum in posticam capitis regionem delatos, nervorum origini incumbere;* ubi si disrupta pellicula, quæ medullam oblongatam investit, in nervorum truncos nudos incidunt, eorumque fibras altius subeunt; propterea quidem *motus convulsivi* non modo in *partibus capiti vicinis*, verum aliquando in valde *remotis*, & non raro in toto *systemate nervoso* oriuntur: Hoc passim observare est in *malis februm crisis*, materia morbifica in caput translata; item in *affectibus cephalicis*, in statum pessimum, ac lethalem evedtis. Revera cum plurimum hoc ritu defunctorum capita aperuerim, reperi in omnibus posticam *medulla oblongata* regionem sero acri & *salsugineo* immersam.

Ut nervorum extremitates.

2. Quemadmodum systematis nervosi *extremitas interior*, sive origo, ita non raro *exterior*, sive *finis* à vellicatione illic facta, *spasmos* sive *motus convulsivos* suscipit, eosdemque quaquaversus transfert: hoc in *membris exterioribus* passim fieri testantur *tendinum ac nervorum punctura*. Nec minus à vellicatione in visceribus facta *spasmi* circumquaque excitari solent, si quando *pharmaca*, aut *humores acres*, necnon *lumbrici* in *ventriculo*, aut *intestinis* scattentes partes membranaceas vellicant, adeoque sensationem molestant primis sensoriis imprimunt; exinde statim ob spirituum excandescantias *motus convulsivi* modo in *partes affectas*, modo indifferenter in *alias quasunque* retorquentur: nam à graviore visceris cujusdam noxa sæpe *spasmi* non tantum *partes affectas*, & vicinas occupant, verum in *faciei ac oris* musculos, necnon in *membra exteriora* transferuntur. *Calculus ureteri* impactus haud tantum in isto ductu, verum in *tota vicinia contractiones* immanes accersit. Porro *symptomata* quædam *hysterica*, aliaque *hypochondriaca* nonnunquam hac ratione inducuntur: quatenus nimirum *vellicatione* in visceris cujusdam membranis facta, illico *spasmus* retorquetur.

Ut medios processus & plexus.

3. *Materies irritativa*, quæ *spasmodorum causa evidens* esse solet, interdum *medios nervorum processus* occupat; & propterea *partes* modo *supra*, modo *infra* illius sedem ad *motus convulsivos* incitantur: Hoc de nervorum plexibus satis constare videtur, cum enim *succi nervosi recrementa acria* in iisdem congeruntur, non raro *spasmi* per totam viciniam procreantur: hac ratione *affectio colica*, atque *hysterica*, nulla viscerum istorum culpa tantum ab humore in *mesenterii plexibus* deposito non raro progigni, ac excitari videntur (quod equidem posthac, cum de affectibus istis particulatim agemus, planius

planius ostendetur) Pariter ob *plexus ganglioformes* humore acri & irritativo obfessos, *præfocatio in gutture*, necnon variæ *præcordiorum contractiones* inferuntur. Porro *affectiones spasmica* ab humore acri intra *totos nervorum caudices*, & corporum nervosorum meatus scatente non raro dependent. Vidimus quosdam *convulsionibus admirandis*, ac *perpetuis affectis*, ut necesse habuerint (prout supra retulimus) membra huc illuc, actare, & distorquere, saltare, discurrere, humum manibus, aut pedibus contundere, aliasque gesticulationes stupendas exerere, haud secus ac si *sagarum præstigiis* læderetur, cuiusmodi *passionum causa* genuina in eo consistere videtur, quod *succus nervosus* genus irrigans, instar *aquæ stygiæ* accerrimus, ac à debita crasi degener factus, spiritus insitos influosque continuo irritaret, ac velut æstro quodam afflaret.

Ex his quæ circa varias *convulsionum causas* differuimus, multiplices earundem *species & differentia* eliciuntur: Nam primo annotavimus respectu *originis*, pathemata spasmodica sæpissime à *capite affecto*, seu materia morbifica in *nervorum principia* influente, derivari; quandoque tamen, licet rarius, eas à tali materia in *nervorum extremitates* irrepente pendere.

Spasmodi
rum diffe-
rentia res-
pectu Ori-
ginis.

2. Quoad *morbi & symptomatum productionem*, observamus eandem aliquando à *causa evidenti solitaria*, uti passione subita, & vehementi produci: Sæpius vero *procatarxim*, sive dispositionem præviam requiri: porro causas interdum ita coincidere, ut *causa procatartica* etiam *evidentis* vicem suppleat; quin etiam è contra, ut *hæc illius* loco fuerit.

Causarum.

3. Quoad *morbi extensionem*, *affectio convulsiva* distingui potest in *universalem* qua spiritus fere totum systema nervosum, ipsumque *ἐγκέφαλον* actuan-
tes, successive exploduntur: & *particularem*, in qua spiritus intra privatam quandam ditionis animalis regionem afficiuntur.

Morbi ex-
tensionis.

1. Prior ista cietur quando spiritus animales intra primos ipsorum fontes, nempe *Cerebri*, & *Cerebelli* medullia irritantur, unde ipsorum explosiones violentæ accidunt: quapropter tum animæ *functio quævis interna*, scilicet sensus, & imaginatio obscurantur, ejusque *facultas exterior locomotiva* pervertitur: Hujusmodi *affectio spasmodica universalis*, in qua scilicet præter artuum & viscerum spasmos, *interiores animæ potentie* eclipsin patiuntur, iterum *duplex est*: nempe aut *primaria*, quæ ab *ἐγκέφαλῳ* incipit, oriturque in quantum spiritus hujus incolæ *particulis nitrosulphureis* imbuti primo exploduntur, eorumque accensio cæteros in *appendice tum madullari, tum nervoso* scatentes corripit, ibique *explosiones convulsivas* concitat, prout cernitur in epilepsia.

2. Vel *passio isthac universalis ἀνορθωτική* inferens, *secundaria* est, quæ scilicet alicubi in *nervoso genere* inchoata, exinde spirituum copiis successive affectis, factaque velut *aquarum undulatione*, demum ipsi *ἐγκέφαλῳ* traditur: hoc passim accidit in paroxysmis, qui dicuntur hysterici, in quibus ob spasmum principio in imo ventre incipientem, moles, sive intumescencia in *abdomine* excitatur; dein eodem affectu per nervorum ductus superius lato, *ventriculus*, ac mox *præcordia* contrahuntur, ac tandem *spasmo caput* impetente, patientes corruunt, iisque notitia omnis adimitur; denique morbo in *nervos alios* reflexo, membrorum *exteriorum* motus convulsivi succedunt.

2. Quod vero spectat ad *spasmodum particularem*, in cujus paroxysmo ægrotantes animo constant, hic quidem varias differentias sortitur. Quoad *materia sedem*, quæ circa nervorum *principia*, *extremitates*, aut *medios processus* contingit, spasmodum (uti ostendimus) diversitas oritur: Quinimo prout ista *materies morbifica*, nervorum principia obsidens, circa *medulla oblongata caput*, *medietatem*, aut *caudam* defigitur; propterea accidit modo tantum *faciei*, aut *oris partes*, modo *imi*, aut *medii ventris viscera*, ac modo *artus exteriores* potissimum, ac ferè tantum convelli.

Insultus duratio nis. Porro *convulsio*, quoad *insultus durationem*, ejusque *magnitudinem*, distingui solet in *continuum*, ac *intermittentem*: Prior sicut supra innuimus, dicitur *τέτανος*, sive *contractio permanens*, uti cum pars una, aut simul plures *constanti tensione contractæ* aut *distortæ* in eodem situ præternaturali aliquandiu detinentur; sic quandoque musculus, aut membrum, puta oculus, labium, gena, à recta positione distorquentur, nec statim facile reduci possunt: cujus causa interdum est *resolutio*, sive *paralysis* in quibusdam aliis musculis; qui cum relaxantur, oppositi nimis fortiter agunt, & partem, quæ inter utrosque velut in æquilibrio consistere debuit, versus se totam corripunt: aliquando tamen talis *contractio permanens* excitatur propter tendines humore seroso impacto obsessos, qui proinde rigidi evadunt: Hujusmodi affectus in *scorbuto* familiaris existit, ut ægri quandoque nullum membrum aut articulum extendere possint, sed velut in orbem, seu globum contrahantur. Nonnunquam tendines in dorso, ob talem humoris incursum, ossa extra debitum situm trahunt, & *gibbositatem*, vel corporis *incurvaturam* pariunt: *Tetanus* distingui solet in *universalem*, cujus tres sunt species; scil. *ἐμπροδόνος*, *ὀπίδόνος*, *τέτανος*, ita propriè dictus; & *particularem*, qui membrum quoddam, vel articulum privatum respicit: Super his postea speciatim dicemus.

2. *Convulsio intermittens*, aut *brevi* est & *momentanea*, quæ per crebras vi-ces, & quasi per *subsultus* peragitur, prout observare est in *horrore* & *tendinum concussionibus*, quæ semper crebra *motus*, & *quietis* alternatione interstinguuntur: vel *spasmodum insultus*, eorumque *intervalla* diutius protrahuntur: ita usitatum est *paroxysmos convulsivos*, quando repetunt, *aliquandiu perdurare*, ac *rursus desinere*; tales autem *periodi* modo *certe* sunt, atque *statim horis eveniunt*, modo *rara*, ac *incerta*, atque pro variis datis occasionibus diversimodè contingunt. Plures sunt aliæ hujusce affectus differentia, quæ postea cum de singulis convulsionum speciebus particulatim dicemus, melius elucescent.

C A P U T II.

De Epilepsia.

HActenus *Spasmodum*, sive *Convulsionum* in genere *naturam causas*, & *differentias*, juxta hypothesein plane novam, & insolitam, sed rationi

(ut opinor) satis congruam tractavimus: jam proximè incumbit præcipuas istius affectus species particulatim explicare; inter quas *Epilepsia* prærogativam facile meretur, ejusque consideratio methodi, sive ordinis jure quodam præcedere debet; quippe hic morbus in corpore humano quasi imperium amplissimum nactus, non modo in totum ἐγκέφαλον, sed plerumque simul in omnes systematis nervosi partes tyrannidem exercet: quapropter ab affectionis immanitate, *morbis Herculeus*, ab insultus more tanquam à numine immissi, admodum stupendo, ὄσσην ἱερὴν, sive *morbis sacer*, ab antiquis appellabatur; cui accedit cujusdam nostratis, haud infimæ notæ Theologi conjectura; nempe plures, qui in novo Testamento pro *Dæmoniis* habentur, tantum *Epilepticos* fuisse; morbi quoque hujus à Christo Salvatore *curationem*, *spiritus mali ejectionem*, sive *exorcismum* dici: Revera in hoc affectu *materia morbifica* adeo obscura aut prorsus nulla vestigia apparent, ut merito hic *spiritus malefici afflatum* suspicemur: saltem probabile est, quoties diabolus præstigiis suis miseros mortales affligere permittitur, ipsum non posse ex alia pharetra graviores sagittas torquere, aut sub meliori larva, quam monstri hujusce morbi insultibus miracula ostentare.

Epilepsia symptomata uti sunt plurimum stupenda, ita illorum *causæ*, & *ipsius morbi* ratio formalis difficillimè explicantur. Enimverò inter Authores tum de *parte affecta*, tum de afficiendi modo, res variè controvertitur: plerique hujus *sedem* in *cerebro*, aut *ventriculis* ejus; alii in *meningibus*, quin & nonnulli in *medio*, aut *imo ventre* collocant; quo tamen jure, mox inquiretur: Interim ut missis aliorum opinionibus, recti ratiocinii filo vera *morbi hujus Theoria* investigetur, *primo descriptionem* ejus, simul cum integro Phænomenon censu exarare; *secundo*, istis ritè perpensis, *morbi subiectum*, & *partes præcipuè affectas* eruere; *tertio* demum *rationem* & *modum*, quo morbus iste generetur, cum veris *symptomatum causis* subicere nitemur.

Primo, quoad *morbi ideam*, *insultus epilepticus*, universalis, ac *immanior* tantum *convulsio* esse videtur, in qua scil. spiritibus *cerebri* incolis primo irregulariter commotis, & velut confusis, cæteri omnes τὸ ἐγκέφαλον *appendicem* tum *medullarem* tum *nervosam* incolentes, simul *motus convulsivos*, sive *contractiones* inordinatas ineunt, easque aliquādiu cum crebris subsultibus continuant: *morbi accessio* ut plurimum ex improvise aggreditur, ægrosque nihil tale cogitantes opprimit, atque ictu oculi citius sensu & intellectu orbos in terram præcipitat; quippe non tam *cadunt*, quam cum impetu quodam *prosteruntur*, ut sæpe pars primo in terram aut corpora adjacentia allisa livore aut vulnere afficiatur; prostratis supervenit *stridor dentium*, cum *spuma oris*, sæpe etiam *capitis concussio*, & crebra ad humum allisio; *brachia* & *crura*, quinimo *cervix* & *dorsum* aut statim rigida fiunt, aut variis flexionibus huc illuc distorquentur; aliqui *pectus* immaniter contundunt, alii *brachia* & *crura* valide exerunt; eaque, ac totum aliquando corpus huc illuc impetuosè jactant; plerisque autē *præcordia* & *hypochondria*, necnon totus inferior venter *intumescunt*, & valde *inflantur*: post aliquod tempus modo brevius, modo longius hæc symptomata, quasi tragœdia peracta, derepente cessant, & tunc ægroti denuo ad se redeunt, ac mente constant; superstiti vero post paroxysmum *capitis dolore*, cum *torpore*, & *hebetudine sensuum*, & non raro *verigine* & *scotomia*.

*Epilepsia
descriptio,
seu morbi
historia.*

Paroxysmi epileptici repetere solent, quandoque stasis temporibus *diei, mensis, aut anni*; ut plurimum vero juxta majores *anni τροχός*, aut *luna*, aut *solis* *ὕψους*, vel *aspectus oppositos*, certius redire, & gravius affligere solent: quandoque accessiones sunt incertæ, & vagæ, pro occasione & varietate causarum evidentium: sunt autem *paroxysmi* modo *leviores*, qui cito pertranseunt, itaut ægroti vix in terram præcipitentur, nec *ἀναδυσία* corripiantur; modo *graviores* sunt, quibus correpti plurium horarum spatio insensiles decumbunt, & velut dæmoniaci, horrendis symptomatis torquentur: aliquando, licet rarius, signa quædam paroxysmi prænuncia lapsuros commonefaciunt, ut sunt *capitis gravedo, oculorum coruscatio, aurium tinnitus*: interdum in parte quadam exteriori, *brachio* nempe, aut *crure*, aut etiam in *dorso*, vel *hypocondriis* spasmus præcedit, qui exinde instar *aure frigide ascendens*, & versus caput perreptans, caducum inferre videtur: Morbo huic *pueri, & adolescentes* magis quam maturæ ætatis homines, aut senes obnoxii reperiuntur: quicumque insultum ejus semel perpeffi sunt, nisi remediorum ope curantur, postea vix per totam vitam ejus labe prorsus immunes sunt; paroxysmi quo sæpius repetunt, eo graviores usque evadunt, qui cum frequenter iterati valde atroces existunt, *memoria, imaginationis, & rationis* usum, & dein totius functionis animalis robur ac vires enervant; donec hujus œconomia valde perversa, functio demum vitalis labascatur, & sensim aboleatur. Explicatis ad hunc modum hujus morbi telis, & apparatu malefico; jam proximè inquiramus in qua *parte sedem* figat, sive quod sit proximum ejus subjectum.

Morbi
subjectum
sive sedes
inquiri
tur.

2. *Epilepsie accessio & invasionis* modus planè innuere videntur *sedem ejus primariam*, sive partem præcipuè affectam alicubi intra caput contineri: quod autem *paroxysmus* nonnunquam in partibus remotis incipiat, & exinde versus caput ascendat, hoc quidem ita fieri videtur tantum, & ex *accidenti* contingit, cum interim *causa morbifica* circa ipsum *ἐγκεφάλου* subsistit (prout inferius declarabitur:) verum quod à primo morbi insultu statim *ἀναδυσία* cum membrorum & viscerum ferè omnium contractionibus succedit, hoc manifesto indicio est, una *totam ἐγκεφάλου compagem, & nervorum omnium origines* à causa morbifica occupari: At vero etiamnum explicatu difficillimum videtur, ubi *causa* ista, sive *materies morbifica* præcipuè subsistit; neque enim probabile est, eandem per cunctas cerebri partes diffundi, nec tamen in quo loco singulari ea defixa, cæteras omnes partes ita subito in ejusdem noxæ consensum trahat.

Hanc alii
meningas,
alii cere-
bri medi-
ullium
statuunt.

E variis super hac re Authorum sententiis, *duæ* præ cæteris magis probabiles videntur, & pari verisimilitudine assensum vendicant. Quarum una asserit *cerebri medullium*, atque *latera & meningas ipsum investientes* esse primariam *Epilepsie* sedem: Prioris ratio in hoc fundatur, quod ubi spirituum animalium fons, & ipsius animæ sensitivæ origo consistit, ibidem hujus morbi causa poni debet; nempe cum principes facultates primo læduntur, cæteræ omnes ejusdem noxæ facile participant: verum enimvero ut concedam in *Apoplexia*, & *spirituum deliquio* ita habere, attamen in *convulsione* (cujusmodi affectus est *Epilepsia*) non sequitur *fibras & nervos* omnes convelli, quia *cerebri medullium* prius convellitur: quippe hoc cum sit

mollis

mollis & fluidæ substantiæ, atque motus & sensus expers, *contractionis*, sive *affectionis spasmodicæ* minimè capax videtur: quapropter alii *cerebrum* & quamvis ejus partem à morbi hujus culpa eximentes, causam ejus omnino in meningas rejiciunt; asserentes scil. *membranas cerebrum investientes*, ac imprimis illarum *processus cerebri*, ac *cerebri fissiombus instratos*, siquidem à materia morbifica vellicantur, *spasmos*, sive *convulsiones immanes concipere*; dein à *meningibus istis contractis & diductis una cerebrum inclusum* valde *comprimi*, & *constringi*, itaut poris, & meatibus ejus constrictis *avari noxia* inferatur, simulque nervorum caudices, quibus utraque meninx appenditur, in consensum illarum perducti, etiam motus convulsivos ineant: Et quidem ad hunc modum *Epilepsiæ ratio formalis* fortè explicabilis videtur; at vero cum rem altius perpendo, etiam ab hac sententia discedere visum est, quia nimirum haud constat *quo ritu*, & *quam ob causam*, imminente caduco, *meninges istæ spasmos* adeo horrendos concipiant. Quinimo nec liquet, quomodo ab iisdem, utut *convulsis*, *paroxysmus epilepticus* inducatur.

Quoad prius, impossibile videtur *meningas*, quoad totas earum *conca-
vitates* ita *contrahi*, ut instar marsupii arctius constricti, contenta sua undique convellant, ac in spatium angustius contrahant, quippe *dura mater* pluribus in locis *calvaria* firmissimè cohæret; quin & isti *pia mater*, juxta *sinuum
processus*, mutuo membranarum nexu, & ubique præterea vasorum *continuitate* colligatur: hinc facile patet, *utramque membranam*, quoad magnam sui partem, *immobilem esse*, ita ut *spasmos universales* nequaquam ineant: quod vero ad spasmos minores attinet, ut cum *meningis hujus*, aut *istius*, vel simul utriusque portio quædam convellitur, revera tales evenire concedimus: nam sæpius audiivi *cephalalgia* graviori affectos, de magna partium sub *calvaria latere*, modo *dextro*, modo *sinistro* confitarum *constrictione* immaniter queri, nec tamen exinde ullus *caduci insultus* sequebatur: porro ut membranæ istæ insigniter læsæ vellicationes maximas subeant, haud propterea tamen *paroxysmus epilepticus* induci solet: Novi enim *abscessu* in *dura matre* excitato, & postea disrupto, cum à pure foetidissimo *meninx tenuior*, & *cerebri cortex* exederentur, ægotantem primò in *stuporem*, & demum in *Apoplexiam lethalem* incidisse, qui tamen in toto morbi decursu, *symptomate* quovis *epileptico* immunis degebat: Item memini *duram matrem*, *terebello* à chirurgo imperito adhibito valde dilaceratam; in alio casu eam cum parte *calvaria* per vulnus abscissam, ut portio quædam *cerebri* extuberaret; nec tamen cuilibet horum *pathemata* quævis *epileptica* supervenerunt: Quapropter nec verisimile est, *sanguinem*, aut *humores*, vel (si quispiam ita contendat) *vapores meningibus* istis impactos, majorem noxam inferre, quam aut *plagam*, aut *vulnera* iisdem inflictæ, aut *saniem* ibi suffusam: præterea *Epilepsia leviori affecti*, si quidem vix concidunt, ac per totum morbi insultum adhuc animo constant, *membranas* ita *contrahi*, & *cerebri globum* arctius compingi perciperent, si ejusmodi quæpiam affectio subesset; verum illi è contra *cerebrum* quasi *inflatum*, & *spiritus* cum efferatione quadam *exsistentes*, ac velut *explosos* persentiscere videntur.

Et quidem, uti verisimillimum, arbitror *paroxysmum epilepticum* à *spi-
rituum animalium cerebri incolarum* (qui nempe sunt primum & immedia-
tum

Asseritur
meningas
non esse
primariò
affectas.

Spiritus
animales
intra

Cerebri
meditul-
lium con-
sitos esse
primariū
morbi
subjectū.

tum huius morbi subjectum) *subita quadam rarefactione, & explosione concitari*: qua scil. *cerebrum ipsum inflatur*, adeoque *insensile redditur*, simulque *nervi appensi in convulsiones aguntur*: hinc enimvero contingit huius morbi *accessionem ita derepente incipere, & perfectè terminari*, sine magna *materia morbifica aut provisione, aut reliquiis*; quia nempe *labes non tam partibus solidis, quàm ipsis spiritibus infertur*.

Suprà ostendimus, quo ritu *copula heterogenea & explosiva particulis*, uti videtur, *nitrosulphureis constans, spirituum animalium particulis spirituosali- nis accrescens*, ab iisque ob plenitudinem, aut irritationem denuo *elisa & explosa, symptomata convulsiva producit*: quamvis autem ejusmodi *copula spasmodica*, è sanguine in cerebrum primo exstillatur; plerumque tamen *spiritus ibi nonprehendit, aut cum iis saltem illic non diu hospitatur*: quin potius versus *appendicem nervosam* illico detrusa, *spasmos particulares*, & juxta loca affecta respectivos accersit: interdum vero, si quidem *materies spasmodica uberior & potens atque cerebri constitutio imbecillis fuerit, copula heterogenea spiritibus non tantum in nervoso genere, sed etiam intra ipsum* *ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ* *consistis affixa, diathesin epilepticam infert*; atque *spirituum & copula istius particula explosiva* ab invicem *elise caduci paroxysmum cient*. Quandoquidem enim urgente *epilepsia insultu ἀναίδνοια* plerumque *symptoma primum, & ferè pathognomonicum* existit, inferre licet *spiritus animales intra ipsum cerebri medullium scatentes, ante alios affici*; proindeque partem eam esse *principalem morbi sedem*: dein quatenus *agrotantis casus*, sive in humum projectio, atque *membrorum & viscerum spasmi* sæpissimè *ἀναίδνοια* isti succedunt, sequitur *spiritus animales etiam systematis nervosi incolae, eadem copula explosiva imbuunt*, cumque ipsis *cerebri incolis* in consensum trahi, ab iisque ad explosiones pariter inordinatas excitari; licet aliquando (tota *spirituum* tum in cerebro, tum in nervoso genere consitorium *serie*, instar *longioris pulveris pyrii tractus*, ad explosiones prædisposita) *spasmus* exterius & è longinquo, forsan in membro quodam, aut viscere incipiens, posterius in *cerebrum* traducatur, prout infra plenius ostendetur. Interim ipsius *cerebri regio semper huius morbi sedes primaria statuatur*: atque pro affectus *causa conjuncta* supponere debemus, non *aquam* in *cerebri ventriculis* congestam, nec *humorem crassum, aut viscidum* ejus poris & meatibus impactum, tales enim *cause* sensim gignerentur, & proinde signa quædam paroxysmi imminuentis prænuntia ederent; porro *accessione morbi finita*, talis materia non ita brevi tempore penitus discuteretur, quin à reliquiis ejus functionis animalis impedimenta quædam manerent, quod equidem in *Epilepsia*, nisi inveterata, rarius contingit: attamen pro *caduci insultu excitando* nihil minus suspicari licet, quam *spiritus animales*, qui intra medullarem cerebri substantiam scatentes, *sensus interioris, imaginationis, & appetitus actus* perficiunt, *copulam heterogeneam nactos inordinate explodi*, proindeque istis *extra ordines & stationes suas perturbatis*, superiores regiminis animalis facultates *eclipsin* pati; dein ab hac majori *spirituum explosione*, velut à *fomite igniario*, *spiritus alios, appendicis medullaris, & nervosa hospites*, etiam in *explosiones prædispositos*, similes *ἀναίγιας* concipere, pariterque *explosos, corporum continentium motus convulsivos* ciere.

Quam

Quamvis enim *cerebri medullarum* semper esse *primariam Epilepsia sedem*, & ab initio, fere tantum in illa regione, materiam morificam congeri statuimus: tamen affectu ingravescente, hæc uberius in caput delata fines suos latius explicat, adeo ut *particula spasmodica*, & in *reliquo cerebro*, & in *super in appendice nervosa*, tanquam *pulveris*, sive seminii explosivi strata, huc illuc longè latèque protensa jaciuntur; quo fit ut primò *avaidnoias* insultui, *convulsiones* modo in his, modo in illis partibus, & non raro in toto corpore excitatæ, superveniant.

Morbus
secunda-
riò pluri-
mas syste-
ma's ner-
vos par-
tes afficit.

C A P U T III.

Epilepsia differentia, & symptomatum quorundam rationes explicantur. Necnon ejus methodus therapeutica adumbratur.

HÆc de *Epilepsia essentia*, & *causis in genere*: jam proximè incumbit huius morbi *differentias*, necnon *accidentium* quorundam, & *symptomatum* ad eum pertinentium *rationes* explicare: quibus demum *observationes*, & *ægotantium historiarum* cum *medendi methodo* subjungentur.

Epilepsia maximè notabilis *differentia* peti solet à *subjecto*, nempe quod *cerebrum*, aut *pars ejus* in hoc morbo laborans, vel *primario*, ac *idiopathetice*, vel *secundariò* ac non nisi per *consensum* cum aliis partibus afficitur: de *priori specie* hætenus differuimus: quoad *alteram*, in qua scil. *caduci insultus* alicubi extra caput oriri visus, dein ipsum *secundariò* & velut afflatu aliunde immisso corripit: observare est, ejusmodi *affectum* (prout *Galenus* annotavit) vel à *partibus externis*, aut *internis* procedere: plura equidem *epilepticorum* exempla occurrunt, in quibus paroxysmo ingruente, primo *Spasmus* cum stupore in *manus*, aut *pedis digito*, aliove membro particulari sentitur, qui statim exinde, velut cum fornicationis sensu versus caput prorepit: quod cum attigerit, illico ægotans in terram prostratus aliisque pathognomonicis *caduci symptomatis* corripitur: nec minus usitatum est istius morbi procæmium, & primam quasi velitationem, è *stomacho*, *liene*, *utero*, *intestinis*, *genitalibus*, aut aliis *visceribus* incipere; imprimis nempe in istorum aliquo perturbatio quædam cietur; dein ab eo loco, *aura* velut *frigida* in caput ascensus percipitur; cui statim affectioni, *caduci accessio*, cum horrendo symptomatum apparatu succedit: hinc vulgò creditur *Epilepsia causam* in parte ita *primario* affici visa delitescere, atque noxam suam in *cerebrum*, ex se insons, propagare.

Epilepsia
qua per
cōsensum
excitari
dicitur
ratio.

Verum enimvero super his dicendum esse videtur, in *quavis Epilepsia* causam non modo *procatarteticam*, sed & *conjunctum* omnino in *cerebro* consistere; nempe *spiritus* hujus *incolas* ad *explodendum dispositos*, *ibidemque explosos*, *caducum* omnem inferre. Quoad *præliminaria* isthæc in quibusdam *epilepticis symptomata*, ea interdum *causæ evidentis*, nonnunquam verò tan-

Epilepsia
causa cō-
juncta
tantum in
cerebro
consistit.

tum signi rationem habent: siquando enim diathesi epileptica mala cujusdam visceris, puta *stomachi*, *lien*is, aut *uteri* dispositio accidat; quoties in viscere isto affecto perturbatio quæpiam cietur, facile contingit, ob fermenti illic transmissionem, aut *spasmi* in caput continuatorem, in cerebro prædisposito accessionem epilepticam excitari.

Attamen *caduci symptomata*, quæ exterius suscitata affectum cerebro propagare videntur, non raro ipsius *cerebri consensu* oriuntur, & *paroxysmi epileptici* ingruentis, sive spirituum in cerebro explodi incipientium tantum signa existunt: cum enim spiritus animales in *cerebri* & *cerebelli medullis*, simulque in *medulla oblongata*, juxta nervorum origines confiti, copula heterogenea ita saturantur, ut ad ipsam elidendam, proindeque morbi insultum acciendum parati sint, priusquam illi una omnes conglobatim exploduntur, spiritus aliqui exterius in privatis quibusdam nervis scatentes, si quidem assueto superiorum influxu distituuntur, inordinationes quasdam concipiunt, proindeque *spasmos* ineunt; qui *spasmi* (prout in ejusmodi affectibus sæpe mos est) à *nervorum extremitatibus* huic, vel isti membro aut visceri insertis incipiunt, unde sensim ad eorum principia prorrepunt; quò cum pervenitur, illico spiritus per totum *ἐγκέφαλον* prius in explosiones dispositi, ab eo spasmo commoti, proindeque tanquam fomite ignis correati, subito eliduntur; adeoque *Epilepsia paroxysmum* per se prius incipientem, velut *secundario*, & instinctu aliunde tradito excitare videntur: ad hunc modum aliquando *passiones hystericae*, cum ab imo ventre incipientes, cerebro communicantur, à visceribus istis oriri; & eorum culpa suscitari creduntur; cùm interim *causa morbifica* circa *nervorum origines* potissimum subsistit, sicut alibi innuimus, & infra, cum de *affectibus spasmodicis* particulatim agemus, fusius ostendetur.

*Epilepsia
differentia
alia.*

Restant plures aliæ *morbi comitiales differentia*; nempe quod sit vel *hereditaria*, vel *acquisita*, rursus utraque species varie distinguitur, ratione ætatis seu temporis quo primò ingruit, nempe cum *prima accessio* ante vel *circa pubertatem*, vel *post eam* contingit: porro quoad morbi efficaciam, in *fortem*, & *debilem*, quatenus paroxysmi cum vel sine *ἀνασθηνία*, & casu fiunt: quoad morem ejus *inordinatum*, cujus insultus sunt *vagi ac incerti*; quinetiam juxta *symptomata* his, aut illis ægrotantibus, propter quandam temperamenti indolem, aut *idiosyncrasiam* peculiaris, multifariam discriminari solet.

Cæterum ex præmissis, *symptomatum* plurimorum, quæ in hoc morbo occurrunt, causæ facile elucescunt, ut non opus sit istæc omnia particulatim hic considerare: de nonnullis verò quæ magis intricata videntur, non abs re fuerit hoc in loco differere.

*Cur Epi-
leptici
cum impe-
tu cadunt.*

Imprimis igitur hic lubet inquirere, cur hoc morbo laborantes non tam cadunt, prout *Apoplectici* aut *syncopen passi*, sed potius cum impetu prosteruntur, inque terram, aliave corpora fortuito objecta, tanquam à spiritu quodam malefico dejecti *alliduntur*; ita ut sæpissime aliqua *capitis*, aut *faciei* pars præ casu violento lædatur: affectique haud secus ac *Damoniacus* in *Evangelio* non raro in ignem, aut aquam præcipitentur. Huc referre oportet, *Epilepticos* ejusmodi malis obnoxios fieri, eo quod, urgente paroxysmo,

roxyfino iis notitia omnis, sive providentia adimitur; ac insuper *nervis* capiti vicinis valide contractis, tota corporis moles in *præceps corripitur*: Nimirum in *syncope*, & *Apoplexia* corporis affecti casus videtur tanquam ædificii ruina, quæ ob fulcimenta ejus subtracta contingit: at vero in caduco, non aliter res habet, quam si domus à pulvere pyrio exploso subverteretur, quæ ut plurimum extra locum in quo steterat dimovetur.

2. *Epilepsia* symptoma maximè pathognomonicum vulgò habetur, si affectis in terram prostratis, & convulsiones horrendas passis, *saliva spumosa ex ore effluat*; quæ quidem à cerebro constricto in palatum exprimi putatur: Verum enimverò ut concedatur hoc *spuma* effluvium sæpenumero *caduci* signum esse; tamen illud non ita huic morbo appropriatur, quin idem in *Apoplexia*, in *Caro*, in *affectibus hystericis*, aliisque *convulsivis* interdum accidat: porro ejusmodi *spuma* haudquaquam à cerebro descendit, nullus enim per quem transeat meatus patescit; verum à *pulmonibus* inflatis, ac usque ad *laryngem* elevatis, unde velut cum effervescentia quadam, & ebullitione saliva spumescit: urgente enim *caduci paroxysmo*, cum plerique *nervi* in toto corpore contrahuntur, etiam qui *pulmonum* & *diaphragmatis* motibus inserviunt, *spasmos immanes* passi, *præcordia* omnia sursum elevant, eaque in *systole* diuturna ferè *immobilia* continent; ita nimirum ut *pulsus* & *respiratio* vix, ac ne vix perficiantur: interea quia *sanguis* intra *cordis sinus* coërcitus ipsum distendit admodum, ac ferè opprimit, *pulmones* utcurque impediti, ne more solito & naturali moveantur, quod possunt tamen, festinata & spissa agitatione, quoquo modo *sanguinem* è corde exantlare satagunt; à quo ipsorum nisu, aer humiditatem viscosam crebra respiratione succutiens, ut agitatam ovi albumen in spumam attollit, mox sursum in oris cavitatem elevat, & illinc ulterius foras propellit: quare *saliva spumosa* etiam in aliis affectibus ubi *nervi pneumonici* aut contrahuntur, aut à functione sua obeunda inhihentur, non rarò succedit.

3. Porro ob eandem hanc rationem evenit, quod *epileptici* quidam in terram prostrati, *pectora sua* manibus gravissimè tundunt, & cohiberi se ægre tolerant: nam cum *præcordia spasmo* affecta & præpedita movere se solito more non possint, sanguisque in iis stagnans, non sine insigni cordis gravamine, vitæ suffocationem minetur; tunc fit ut laborantes, *cerebro licet inscio*, mero *natura instinctu*, thoracem percutiant; nimirum ut *præcordia* ita concussa, & velut exagitata, motus suos redintegrent, adeoque sanguis à stagnatione, & cor à gravi oppressione vindicentur: Non absimili ritu hic fieri videtur, ac cum *dormientes* aut *titillati*, aut pulicum morfu vellicati, illico locum affectum inscii *confricant*, aut *scalpunt*.

Quod spectat ad *morbi* hujus *prognosin*, eam difficillimæ curationis esse suprà innuimus, quæ quidem difficultas in eo consistit, quod cerebri medullium (in quo spirituum animalium prima scaturigo & fons est) non tantum à *causa morbifica*, sed insuper ab *effectis* ejus, nempe singulis paroxysmis plurimum *debilitatur*, ejusque *pore laxantur*, ut deinceps materiæ cujusque heterogeneæ incursum facillimè pateant; adeoque ipsa diathesis morbida repetitis paroxysmis confirmata, atque radices altius agens ægrius tollatur. Verumtamen observare est, *Epilepsiam* interdum *sua sponte terminari*,

Vnde spuma oris epilepticis contingit.

Quare nonnulli in caduco pectora contundunt.

Morbi prognos.

item aliquando *medicamentorum ope profligari*; quorum illud circa *pubertatem*, & tunc fere tantum contingit; adeo ut qui ista *periodo* elapsa, h. e. ante 25. ætatis annum minime curantur, vix unquam postea sanitatem recuperent. Nimirum circa *pubertatem* corpori humano *duplex alteratio*, atque propterea *morbi comitialis*, aut alterius cujusvis altius radicati non raro *solutio* contingit: Nam *primo*, hoc tempore *humor genitalis* in *vasis spermaticis* congeri incipit; unde sequitur *particulas spirituosas*, quæque ipsis accrescere solent, *nitrosulphureas*, & *morbificas*, non tantum in *cerebrum*, sed etiam in *testes* deponi: quare si heterogenea ista spirituum copula in novum hoc *promptuarium* uberius inferatur, exinde cerebrum immunis degens *diathesis epilepticam* aut alias *morbidam* non raro exuit. 2. Circa *pubertatem*, prout *sanguis* aliquid *cerebro* prius *destinatum* per *arterias spermaticas genitalibus* suffundit, sic etiam *fermentum* quoddam ab iisdem partibus per *venas* retributum accipit: scilicet *particulæ quædam seminali tinctura* imbutæ in *massam sanguineam* regeruntur, quæ ipsam vigorant, ac virtutem novam & vegetiorem inspirant; quare tunc temporis & *corporis*, & *animi* dotes se potissimum exerunt, *pili erumpunt*, *vox* magis *sonora* evadit, *foeminis catamenia fluunt*, aliaque *accidentia* superveniunt, quibus liquido constat & *sanguinem* & *succum nervosum* quædam recenti imprægnari: quare *fermenta*, sive *seminia morbifica* nisi ab hoc *novo fermento* naturali superantur, deinceps sæpe usque in mortem indomita persistunt.

At vero *Epilepsiam* aliquando *medicamentorum ope* sanari *experientia* testatur: de *medendi methodo*, & *remediorum* maxime *celebrium* rationibus mox disquiremus; interim quod ad morbi hujus prognosin ulterius spectat, si nec circa *pubertatem* desinit, neque *medicamentorum* usu profligari potest, diversimodum adhuc eventum in variis ægotantibus sortitur; nam vel *immediate in mortem* terminatur, vel in *alium morbum*, scilicet *paralysin*, *stupiditatem*, aut *melancholiam* plerumque incurabilem commutatur.

Epilepsia in alios morbos commutatur.

Quoad *prius*, cum *paroxysmi* crebro repetunt, & qualibet vice atrociores fiunt, *functio animalis* brevi debilitatur; atque hinc labe in *spiritus*, & *nervos præcordiis inservientes* sensim traducta, *functio vitalis* paulatim enervatur, donec tandem *languente* toto corpore, *pulsuque imminuto*, ac demum cessante, postremo *flamma vitalis* extinguitur.

Quod autem hic morbus non raro in *paralysin*, *melancholiam*, aut *maniam* desinit, ratio est, quia crebris spirituum animalium explosionibus *cerebri tonus*, & *conformatio* depravatur, ejusque naturalis status tandem ita pervertitur, ut *particulis morbificis* etiam alius generis intus *admissis* spiritus figantur, nec amplius in *explosiones* justo procliviores sint; quin potius vitio interdum contrario superinducto ipsorum virtus elastica nimium deficit, ita ut supra modum hebetes & torpidi evadant; non secus ac *intensiora febris incendia sanguinis intemperies* justo *frigidior* sæpe excipit: atque hæc quidem spirituum depressiones partim *propria ipsorum culpa* contingunt; quippe *particulis agilioribus* nimium explosis, *segniores* tantum supersunt, & deinceps suppeditantur; partim vero, uti dicimus, *cerebri vitio* accidunt: eo quod pori & meatus ejus à crebris *caduci paroxysmis* usque adeo dilatantur & aperiuntur, ut postea una cum *succo nervoso*,

nervoso, particulis quibuscumque heterogeneis, & diversimodè morbificis aditus pateat.

Hæc de *Epilepsia diagnosi*, & *prognosi*; quibus explicandis necesse erat *rationes abstrusas*, & à *communi pathologia* diversas inducere: nec minus in morbi hujus *Therapeia*, à *vulgari*, inque aliis affectibus trita *medendi methodo* recedere cogimur: Enimvero *dogmaticorum præscriptiones*, quibus fere tantum per cathartica *materiam morbificam educere*, ac penitus *eradicare* conantur, in *caduco* parum, aut nihil prosunt, imo frequenter *obesse solent*. Novi quosdam insignes *Præcticos*, omiſſa penitus *intentionum Therapeuticarum* serie, ad *remedia quadam empyrica*, absque ulla totius provisione se recepisse: hujusmodi *praxis*, licet interdum feliciter succedat, ea tamen multo certius propositam curationem assequeretur, si per alia itidem *pharmaca corpore ritè preparato*, impedimenta quævis summoventur.

Quare circa morbi comitialis *medelam*, *indicationes* (prout vulgò recensentur) erunt, vel *curatorie*, quæ paroxysmum respiciunt, eumque vel *ingruentem arcent*, vel *præsentem citius abigunt*: vel *prophylactica*, quæ morbi *causam* spectant, quam si tollant, in posterum accessiones ejus inhibentur.

Quantum ad priorem *intentionem*, *evacuantiæ generalia* vix locum habent; nec enim in *paroxysmo vomitus*, aut *purgatio*, atque raro admodum *venæ sectio* adhiberi debent; si *ἀναστροφή* diutius persistat, *enemata* interdum *usui esse solent*; id vero quod potissimum incumbit, est spiritus animales nimis *efferos & volatiles figere*, necnon eorum *explosiones inceptas* suppressere: in quos *fines duo remediorum* genera præcipuè conducunt: scil. primo quæ *spiritus animales efferrari & exsilire aptos reprimunt*, & velut suffitu quodam iis ingrato repellunt, inque ordines suos cogunt: quod equidem *medicamenta sale volatili*, & *armoniaco*, aut etiam *sulphure vitriolico* prædita efficiunt; cujusmodi sunt *sal*, & *oleum succini*, *sp. sanguinis*, *C. Cervi*, *fuliginis*, *tinctura Castorei*, & similia: hæc enim intus sumpta, aut naribus admota, sæpe levamen conferunt, quin & *malos hujus morbi spiritus* non secus ac apud *Tobiam fumus è felle piscis combusto demonem*, abigere creduntur. Secundo *spiritus* animales ab explosionibus ineundis avocantur, aut inhibentur, cum illi in opera quædam ipsis assueta alliciuntur, & occupati tenentur: quapropter urgente paroxysmo *frictiones per totum corpus adhibite*, & aliquandiu continuatæ sæpè juvant: quod autem nonnulli affectos erigunt, eorum brachia & crura à motu convulsivo penitus cohibent, vel in hoc, vel illo situ constringunt, porro quod sternutatoria naribus inflant, & cardiaca fortiora ori ingerunt, aut cucurbitulas, & scarificationes adhibent, aliisque administrationum modis caducos asperius tractant, & paroxysmi morem interturbant: hujusmodi, inquam, *praxis* sæpissimè *perperam* instituitur; quoniam hoc modo *duplex natura molestia*, alia nimirum à *morbo*, aliaque non levior ab astantibus & ministris intentatur; cum longè præstiterat paroxysmo juxta morem suum transire permisso, laborantes *unica tantum plaga absolvi*.

Profecto maxima *Medici cura & remediorum efficacia* circa morbi hujus *prophylaxin* versatur, ut causa ejus sublata, seu radice præcisa, fructus omnes emarcescant: *medicamenta* huic indicationi requisita *plures intentione*

respiciunt, quæ tamen ad duo hæc præcipua capita reduci possint : scil. primo ut morbi fomes immediatè à sanguine vitioso, aut succo nervoso, atque mediatus à visceribus, primisque viis suppeditatus præcidatur ; dein secundo ut mala cerebri & spirituum ejus incolarum diathesis, quæ nempe Epilepsia peculiaris est, tollatur.

Quoad prius indicatum, hic vomitoria, & purgantia, aliaque tum evacuantia, tum alterantia, quinimo phlebotomia & cauteria locum habent ; quatenus nimirum hisce modis ac viis & viscerum, & humorum impuritates subducuntur, ac dyscrasia emendantur : quamquam enim hujusmodi pharmaca, & administrationes medicæ per se raro aut nunquam Epilepsiam sanent, attamen hæc impedimenta tollunt, naturam erigunt, atque ad hostem suum aggrediendum incitant ; etiam vias præparant ut propterea remedia specifica certius & efficacius virtutes suas exerant ; quare solenne est dum morbi hujus cura per secreta & arcana peragitur, Vere, & Autumno, aliisque idoneis temporibus ejusmodi medicamentorum usus intercalare.

20. Quod spectat ad remedia specifica, quæ quidem sola, licet non semper, Epilepsia causam attingere, eamque expugnare perhibentur, cujusmodi sunt *Peonia mas.*, *viscus quercinus*, *Rota*, *Castoreum*, *ungula Alcis*, preparata è cranio humano, *succino*, *corallio*, cum multis aliis : quandoquidem hæc sine quavis sensibili evacuatione, aut etiam perturbatione in visceribus aut humoribus subsequente assumuntur, mirum est qua ratione formali, aut agendi virtute in hoc morbo uspiam juvare solent.

Specificorum in Epilepsia virtus in quibus consistit.

Super hac re intricata satis & obscura, si quis conjecturæ locus sit, cum Epilepsia procatarxin in copula heterogenea spiritibus cerebri incolis accrescente, eosque ad explosiones præternaturales incitante, consistere superius asseruimus ; sequetur ea quæ talem causam expugnant, aut tollunt, ejus naturæ esse, ut cerebrum corroborando, ejusque poros constringendo, copulam istam excludant, spiritusque intra cerebri meditullium scatentes eorum copulam exuendo ita figant, & quasi constipent, ut non amplius in explosiones irregulares apti & proclives fuerint ; simili forsan ritu ac cum pulvis *χρυσός* & cum sulphure tritus, aut spiritu vitrioli irroratus, virtutem suam fulminantem amittit. Et revera hujusmodi proprietates, nempe alteram, aut simul utramque in plerisque remediis antiepilepticis suspicari, imo aliquatenus detegere licebit : enimvero *peonia*, *viscus quercinus*, *ruta*, *lilium convallium*, cum multis aliis manifesta quadam astrictione pollent ; ut verisimile sit eorum particulas intus sumptas, adeoque sanguinis, aut succi nervosi vehiculo ad cerebrum delatas, poros ejus nimis laxos & apertos ita constringere & occludere, ut in posterum materiæ morbificæ aditui minime patefiant : porro quoniam hæc concreta *ἀναδυσίμων* quasi armoniacam, sive dissipativam spirant, ideo eadem spiritus animales depurare, & copula heterogenea exutos figere, & corroborare dicuntur : hæc virtus spirituum depurativa à sale armoniaco procedens in remediis quæ ex mineralium, & animalium familiis petuntur, qualia sunt *crani humani*, *sanguinis*, *succini*, & *corallii preparata*, magis elucescit ; sicut alia adstrictoria in vegetabilium partibus & præparatis potior existit.

Non erit hic opus Epilepsia curanda & completam medendi methodum cum exactis

exactis præscriptionum formulis proponere, quia apud Authores & generalia præcepta, & elegantissima remedia passim extant, prudensque Medicus tum indicationes, tum uberem istum rei pharmaceuticæ apparatus ad particulares ægrotantium casus facile accommodabit. Verum quia *morbi* hujus *theoriam* hoc in loco plane novam exhibemus, etiam *methodus Therapeutica* eidem adaptata, hic tradi debet: quam equidem mox plenius adumbrabimus, postquam casus aliquot, sive historias Epilepsia laborantium descripsimus.

Puella venusta parentibus mediocriter sanis orta, ipsaque ad *pubertatem* usque bene valens, sub id tempus de *capite* male affecto queri cœpit: Et primo per vices quasdam *vertiginem* juxta synciput, qua omnia circumagi videbantur, perpeffa est; simulque dum illud symptoma urgeret, mox delire loqui, & quicquid modo egerat oblivisci solebat: hujusmodi paroxysmi primo intra horæ quadrantem transire, & semel tantum aut bis in mense repetere, quorum intervallis satis rectè habuit: postea insultus ensim graviores facti, etiam sæpius redibant, atque intra sesquiannum, cerebro indies magis labefactato *vertiginosus* iste *affectus* plane in *Epilepsiam* mutabatur, ut ægrotans quovis paroxysmo in terram allisa, *convulsionibus* horrendis, ore etiam *spuma* diffuente, afficeretur. Observabant domestici eam semper in *idem* *latus* *præcipitari*, ita ut juxta focum sedens, si angulum *dextrum* occuparet, in medios ignes, sin vero *sinistrum*, in murum à tergo positum allideretur: semel cum sola in ædibus relicta supra carbones accensos corrueret, facies ei & synciput ita misere concremata sunt, ut cranio cute & carne denudato, eschara lata & profunda inureretur, & postea exterior tabula ejus ad palmæ magnitudinem decideret. Ægrotata interim quamdiu ulcera ab ustione contracta sanie manabant, paroxysmis caruit; postquam ea sanabantur, caducus rediit: *Morbus* hic *comitialis* circa pubertatem primo emicuit, nam puellæ statim ab initio ægritudinis catamenia fluere cœperunt, & postea statas periodos ordinate satis observabant, affectu licet indies in pejus evecto. Varia medicamentorum genera huic ægrotanti adhibita nihil profuere, quoniam ipsius & amicorum ejus mos & studium fuit cum medicum, tum medicinæ methodum, si quidem iis felix eventus non statim successit, subinde mutare, seque ad empiricos quosvis, & agyras circumforaneos ut plurimum recipere.

Quod in hoc casu *affectus vertiginosus* cum *brevi delirio Epilepsia* *prænunciatus* fuerat, plane arguit hujus morbi originem in *cerebri meditullio* consistam, à spirituum inordinatione quadam pendere; nimirum illi ibidem scærentes, ab initio copulam heterogeneam admittere cœperant; quæ plenius aggesta, aut sponte sua, aut occasionaliter commota, dum excuteretur, ob spiritus perturbatos, necdum vero valide explosos, priores istos affectus inducebat: postea cum ab eadem causa sensim in deterius evecta, *spirituum perturbationes* in ipsorum *manifestas explosiones* assurgerent, *vertigo*, & *delirium* in *Epilepsiam* migrabant.

Quod vero hæc puella circa pubertatem ægrotare cœperit, hinc plane sequitur uti *fermenta naturalia*, sic interdum *præternaturalia* eo tempore sese primo explicare; quare sicut *purgationes mēstruæ* tunc primo erupere, ita *morbi*

comitialis semina, sive innata, sive acquisititia tunc paululum germinare, & sensim in fructus maturari contingit: cum *fermentum praternaturale* prius emicuit, non raro *naturale succedens* ipsum delet; hinc *Epilepsia im-
puberis* non raro circa *pubertatem* terminatur; sin *fermentum* illud, sive *μιασμα νοσέον fluxu menstruo* posterius, aut cum eo simul in actum emer-
gens non statim succumbit, postea ut plurimum ex se indomitum, & re-
mediis quibusvis insuperabile durante vita perstat.

Ex observatione ista, quod huic ægrotanti *canteria* accidentaliter, & casu excitata à morbi insultibus immunitatem præstiterit, inferre liceat *fontanellas* in *Epilepsia* curatione utiliter adhiberi: ubicumque enim pro-
latice seroso, tum è sanguine, tum succo nervoso constanter educendo *emissarium* aperitur, illac plures particulæ heterogeneæ, ac morbificæ una
effluunt, propterea ut cerebrum immunius perstet.

2. *Observa-
tio.* Filia Cerivisiarii Oxoniensis à prima infantia *catharro* in *oculos decum-
benti* graviter obnoxia fuerat, alias satis sana & robusta, item duris labo-
ribus quotidie assueta degebat; circa decimumquartum ætatis annum *pa-
roxysmis epilepticis* tentari cœpit, quorum plures juxta majores lunæ *τεο-
ράς* præcipuè redeuntis perpessa est: ut curationem ejus moliar rogatus,
vomitorium ex *precipitato solari* exhibui, & idem *triduo* ante quævis *novi
& plenilunia* iterandum consului; insuper tit qualibet vice per quatrimum
à vomitorio assumpto bis in die caperet *pulv. rad. Paonia maris* 3. j. *cum
haustu aq. cerasor. nigr.* His remediis paroxysmi tamdiu intermittebant, ut
morbus sanari videretur. Posthæc cum iterum redibant, eorundem medica-
mentorum usu denuo recupellebantur; & dein fluxu menstruo erumpente,
& periodos suas ritè observante in posterū à morbo isto immunis perstirit.

Methodus Therapeutica.

In curatione *Epilepsia* à *Catharsi* incipiendum esse duco; & si æger vo-
mitionem facile toleraverit, *Emeticum* imprimis exhibeatur, & per plures
menses quatrimum ante plenilunium repetatur. Infantibus, & pueris *vinum
scilliticum*, oleo *amygdalarum dul. recenti* admixtum, aut etiam *sal vitrioli*
à ʒ. ss. ad ʒ. j. exhibeatur: Adultioribus & constitutione robusta præ-
ditis sequentes medicamentorum formulæ præscribantur.

Vomito-
ria.

℞. *Croci metallor. aut Mercurii vitæ* ʒ. iiij. ad vj. *Mercurii dulcis* ʒ. 16.
ad ʒ. j. simul terantur in marmore, misce cum pulpa pomi cocti, aut conserva *Bo-
raginis* 3. j. f. *Bolus*, vel exhibeatur infusio *croci metallorum*, aut *Mercurii vitæ*
in vino *Hispanico* facta ab ʒ. ss. ad ʒ. j. ss. vel ℞. *Tartari emetici Mynsicht.*
ʒ. iiij. ad vj. Qui tenerioris sunt constitutionis sumant *salis Vitrioli* ʒ. j. ad 3.
ss. & post horæ spatium superbibant plures libras lactis cerevisiati: dein, penna,
aut digito gutturi indito, vomitus provocetur, & aliquoties iteretur.

Die sequente vomitorium, nisi aliquid contra indicet, mittatur sanguis
è brachio, vel è venis hæmorrhoidalibus hirudinum suctu: dein postridie
sumatur medicamentum purgans, quod postea quatrimum ante novilunium
constanti vice repetatur.

Purga-
tiones.

℞. *Resin. Jalap.* ʒ. ss. *Mercurii dul.* ʒ. j. *Castorei* ʒ. iiij. *Conserva flor. Paonia*
3. j. f. *Bolus*. ℞. *Pilul. scetid. Majorum* ʒ. ij. *Resin. Jalap.* ʒ. v. *Ammoniacy solut.*
in

in aq. hysterica q. s. f. Pilul. v. ℞. Fibrar. Hellebor. nigr. in acet. macer. exsiccat. & pulv. 3. ℞. Zingiberis 3. ℞. salis Absynth. 3. ℞. xij. Olei succini gutt. ij. f. pulvis. Datur in pulpa pomi cocti. ℞. Pulveris hermodactylor. composit. 3. j. Cranii humani prepar. 3. vj. f. pulvis, detur in haustu decocti hyssop. aut salvia.

In diebus quibus à purgatione vacat, præsertim circa lunationum tempora, mane, & vesperi exhibeantur remedia specifica, quæ virtute quadam secreta & innata hunc morbum curare dicuntur : horum immensa extat sylva, eaque variis compositionum formulis præscribuntur.

Medicamenta simplicissima, quæque experientia valde efficacia fuisse compro- Specifica
bavit, sunt radix *Peonia maris*, & semina ejusdem. ℞. rad. *Peonia maris* siccatur. & pulv. 3. j. ad ij. vel iij. detur bis in die in tinctura seq. ℞. fol. visci qu. 3. ij. rad. *Peonia incis.* 3. ℞. *Castorei* 3. j. ponantur in vase clauso cum aq. *Betonica*, vel *Peonia simpl.* & vini albi an. ℞. j. salis visci quercini, vel communis 3. ij. digerantur in vase clauso calore arenæ per duos dies, capiat 3. iij. cum dosi pulv. præscr.

Pauperes sumant pulverem prædictum in decocto hyssopi, aut castorei in aq. fontana & vino albo facto.

Eodem tempore radix *pæoniæ* in taleolas discissa, & filo transfixa collo suspendatur. Etiam radices *fartagine* frixæ, aut ad teneritudinem coctæ, inter esculenta quotidie assumantur.

℞. Rad. & sem. *Peonia maris* an. 3. ij. Visci qu. ungula *Alcis*, an. 3. j. incis. & contus. in sindonem raram insuantur, f. sacculus, qui super ventriculi scrobem gestetur.

Inter specifica hic pulvis à multis Authoribus valde cõmendatur. ℞. *Castorei Pulveris*. *Opoponacis*, sanguinis *Draconis*, *Antimonii*, sem. *Peonia*, an. f. pulvis, sumatur 3. ℞. ad 3. j. omni mane cum vino, aut decocto appropriato, aut cum aq. ceras. nigror.

℞. *Cranii humani preparat.* 3. j. visci qu. *Cinnabaris factitii*, ungula *alcis*, an. 3. ℞. misce. Dosis 3. ℞. ad 3. j.

Si formula pulveris cuiquam ingrata sit, vel si diuturnior ejus usus tædio fuerit, *Electuaria*, pilulæ, trochisci, spiritus, & *Elixires*, quæ singula medicamentis specificis constant, præscribi solent.

℞. *Conserv. flor. Peonia maris*, *Lilior. convallis*, an. 3. iij. sem. & rad. *Peonia* *Electuaria* *maris pul.* an. 3. ij. *Corallii prepar.* 3. j. margar. pulv. *Cranii humani preparat.* *ria.* an. 3. ij. salis visci quercini 3. j. ℞. cum s. q. syr. e *Coralliis*, f. *Electuarium*; capiat mane & vesperi qu. *Nucis Moschat.*

℞. Rad. *Peonia maris pulv.* 3. j. seminum ejusdem 3. ℞. visci qu. ungula *Alcis*, *Cranii humani prepar.* an. 3. ij. rad. *Angelica*, *contrayerva*, *serpentaria virginiana*, an. 3. j. succini albissimi, *Corallii calcin.* an. 3. j. salis visci communis 3. ij. sacchari candi in s. q. aquæ antiepileptica *Langii solut.* 3. viij. f. confectio, capiat bis in die q. *Nucis Moschat.*

Pulveres isti addito sale succini, & C. *Cervi* cum s. q. *Balsami Capiv.* for- Pilulæ
mentur in massam pilularem, cujus sumantur 3. vel 4. pilulæ mane, & vesperi, superbibendo haustum liquoris appropriati.

Vel paretur hujusmodi *Elixire*, cujus gutt. 8. ad 10. sumantur bis in die in cochleari *Julepii* appropriat. superbibendo parum ejusdem.

℞. *Vitrioli Hungarici* ℞. vj. destillentur in retorta vitrea calore arenæ per ho- Elixires
ras 24. dein retorta eadem loricata cum recipiente amplo ponatur in furno rever-
berii.

berii, ut spiritus acidi igne fortissimo, quousque exhibunt, urgeantur. Liqueor totus exstillatus in retorta minori vitrea calore arena avocetur, & in matraccio superaffundantur rad. *Paonia maris* in taleolas sciss. & exsicc. ℥. iij. sem. ejusdem ℥. j. *Cranii humani* prepar. Vngul. *Alcis*, coral. rubr. an. ℥. ℞. visci qu. ℥. ij. digeratur leni calore per plures dies ad tincturae extractionem: liqueor decantatus avocetur in retorta vitrea ad tertiae partis remanentiam; exstillatus seorsim asseruetur: remanentia isti affunde sp. vini rectificatiss. & eorundem ingredientium infusione imprægnati parem qu. & digeratur per 6. dies in fimo equino. f. Elixir, cujus dosis ℞. ad ℥. j. Liqueor exstillatus detur à cochleari ℞. ad integrum, propter easdem intentiones.

Vel paretur oleum ex sale Veneris, juxta præscriptum apud Henricum ab Heers, & exhibeatur modo descripto.

Remedia
empyri-
ca.

Inter remedia specifica quæ (cum superiora non fuerint proficua) etiam tentari debent, habentur *ranarum hepata*, *vesica apri*, cum *urina exsicc.* Rad. *Bryonia pul.* pul. *cuculi*, *corvorum*, *coagulum*, & *pulmo leporis*, *hepar lupi*, *lapilli hirundinibus exempti*, *milvi jecur*, *ova corvorum* inter alimenta, & medicamenta quotidie assumenda, cum multis aliis, quorum catalogus insignis apud Henricum à Bra. medicum Zutphanensem extat, & è quibus præscripta pro pauperibus, utpote facile, & sine magno pretio parabilia desumi poterunt.

Dum hujusmodi remedia juxta methodum prædictam intus sumuntur, administrationes quædam exterius adhibitæ opem contribuunt, & in curationis partem merito asciscuntur; quare semper in hoc morbo *fontanella*, scilicet una aut altera in locis idoneis excitentur, etiam *vesicatoria* sæpius adhibeantur.

Amuleta.

Periapta collo suspensa, aut super ventriculi scrobem gestata, usui esse putantur: *radices paoniae recentes* in taleolas scissæ, & filo transfixæ in bracteolas formentur, quæ toti collo circumdantur; quamprimum exaruerint, substituantur novæ, illæque in pulverem intus sumendum redigantur. ℥. rad. & sem. *Paonia* an. ℥. ij. *ungulae Alcis*, *cranii humani pr.* an. ℥. j. visci qu. ℥. ℞. grosse pulv. in sericum rubrum insuantur, & f. *sacculus* collo suspendendus.

Amuletum ex frutice *sambuci* in *salice* inventi valde commendatur.

Empla-
stra.

Convenit nonnullis capiti itio derafo *Emplastrum* sincipiti applicari. ℥. rad. & sem. *paonia*, *Castorei*, visci *quercini*, *cran. i humani tenuissime pulv.* an. ℥. j. *emplastri de betonica* ℥. ij. *caranna*, *Tacamahacca*, an. ℥. ij. *Balsami Capiv.* q. s. f. *massa*, extendatur super *alutam*, f. *emplastrum* pro *suturis capitis*.

Tempora & nares sæpius inungantur oleo *succini* per se, vel cum oleo *Capiv.* admixto.

Sternuta-
toria.

Sternutatoria, & *Apophlegmatismi* horis matutinis quotidiano sint in usu. ℥. *Ellebori albi* ℥. j. *Castorei*, *Euphorbii*, an. ℥. ℞. *Majoranae odorat. folior.* *Rut.* an. ℥. ij. f. pulv. *Decoct. salvia vel hyssopi cum conf. Etione sinapeos* in eo solut. ore, & gutture obvolvatur.

Enemata juxta usus exigentiam quandoque injiciantur.

Aquæ
destilla-
te.

Quandoquidem medicamenta solidiora liquidis interdum dilui, aut hæc illis superbibi debent, in hanc rem præsto sint *aquæ destillata*, *Iulepia*, *decocta*, aut *tinctura*, quæ virtute quadam contra hunc morbum specifica prædita sunt.

℥. *Vitrioli*

℥. Vitrioli Hungarici ℥. iij. cranii humani recentis pulv. ℥. iij. rad. Paeonia incis. ℥. vj. simul contusis in mortario affunde vini Hispanici, vel albi tenuioris, vel vini & succo Cerasorum nigrorum in do'io fermentato ℥. ij. destillentur in retorta vitrea calore arena.

℥. rasura ligni Buxi, Vitrioli Hungarici, an. ℥. ij. folior. visci qu. vel communis M. iij. folior. Ruta M. ij. simul contusis affunde vini Hispanici ℥. iij. Destillentur in cucurbita vitrea calore arena.

℥. Vitriolicom. ℥. vj. rad. Paeonia maris ℥. vj. visci qu. ℥. j. Juglandum viridium Iulepia. ℥. viij. incis. & contus. destillentur in olla vitreata, alembico vitreo superimposito in calore arena. ℥. hujus liquoris ℥. j. aq. Cerasor. nigr. flor. Tilia, an. ℥. β. sacchari albissimi ℥. iij. misce, f. Iulepium: dosis ℥. ij. ad iij. bis vel ter in die.

Oxymel scilliticum, item hydromel cum hyssopo incocto ab antiquis plurimum laudantur. Vel hujusmodi Apozema paretur, cujus sumantur ℥. iij. ad vj. vel viij. bis in die.

℥. Rad. Paeonia maris, angelica, Imperatoria, Valeriana, an. ℥. vj. folior. Betonica, Apozema. Salvia, Lili convallis, pulegii, an. M. j. Sem. Rut. Nigella an. ℥. iij. Paeonia ℥. β. Passular. ℥. iij. Liquiritia ℥. β. incis. & contus. coquantur in aq. fontan. ℥. vj. ad tertiae partis consumptionem. Circa finem adde vini Cerasor. nigror. ℥. β. vel ℥. x. f. colatura, quae servetur in vasis occlusis. Dosis ℥. vj. ad viij. bis in die post remedia superius praescripta.

Vel praedicta ingredientia, exceptis liquiritia, & passulis, coquantur in hydromelitis ℥. vj. ad consumptionem tertiae partis: dosis ℥. iij. ad vj.

Quod si praedicta methodus, cathartico. & specificor. usu constans, aliquandiu tentata prorsus incassum cedit, ad aliud generis remedia, & praesertim ad ista quae magna dicuntur, devenire oportebit: In hoc censu diaphoretica, salivantia, Thermæ, & Acidulae ponuntur. Remedia magna.

Alphonfus Ferrius plurimos epilepticos, simplici Guajaci decocto bis in die ad ℥. vj. vel viij. praescripto, ejusque decocto secundario, vice potus ordinarii (prout in lue venerea assolet) assumpto, se curasse affirmat: si tali Decocto rad. Paeonia, aliaque specifica addantur, forsitan efficacior fuerit. Probabile videtur salivationem à Mercurio potenter excitatam, succedente postea diata sudorifera, hunc morbum certissime esse curaturam. Quid Thermæ aut acidulae possint, aut propria, aut aliorum experientia mihi nondum innotuit. Experiar forsitan aliquando quid acidulae nostrae artificiales, scilicet tum ferro, tum Antimonio impragnatae per plures dies in magna quantitate assumptae, circa Epilepsiae curationem valebunt.

CAPUT IV.

De ceteris Convulsionum speciebus, ac imprimis de motibus convulsivis puerorum.

Post Epilepsiam, velut principem Spasimum in principe loco, scilicet intra cerebri medullia excitatum, cæterae Convulsionum species ordine pertractandae occurrunt. Harum differentiae à duplici causarum genere &

variis utriusque modis, & accidentibus optime desumuntur. Supra ostendimus affectiones quascunque spasmodicas vel à mera spirituum *irritatione*, vel ab eorum, propter copulæ elasticæ adhæsionem, explosione, vel simul ab utroque conjunctim profluere: Quapropter multiplices spasmodorum ideæ distingui, ac in classes quasdam distribui possint, prout *hanc illamve*, aut *simul utramque causam* in variis τ *ἐγκεφάλου* vel appendicis nervosæ locis consistere contingit. Enimvero *materies spasmodica*, sive spirituum *copula explosiva* potissimum, ac sæpius per cerebrum, interdum vero & aliquatenus per *nervorum extremitates* aditum inveniens, aut circa *nervorum origines*, aut *medios processus*, aut *finis extimos* subsistit, vel in *totis eorum ductibus* scaturit, prout inferius speciatim declarabitur: porro *irritatio per se*, vel cum *procatarxi* prævia convulsiones ciens, licet ubivis in nervoso genere fiat: præcipue tamen, ac frequentius talem effectum circa *nervorum principia*, *medios processus*, & *plexus*, aut *finis* producit. Cæterum ejusdem generis causa, & effectus alio ritu in *infantibus*, ac *pueris*, alioque in *adolescentibus* & *adultioribus* habent. Cum itaque singulas convulsionum species particulatim considerare statutum fuerit, imprimis de *motibus Convulsivis infantum ac puerorum* differemus.

Infantes, & *pueros* affectibus spasmodicis tentari passim, & tam frequenter accidit, ut hæc præcipua, & fere unica convulsionum species statuatur; nam ejusmodi symptomata in adultis aliis insigniuntur nominibus, atque ad Epilepsiam, passiones hysterica, hypochondriacam, colicam, aut etiam ad scorbutum referri solent; in pueris vero quasi κατ' ἐξοχὴν motus convulsivi appellantur.

Super his observare est, circa duo potissimum tempora pueros convulsionibus maxime obnoxios reperiri, scilicet intra primum à *partu mensem*, & circa *dentium eruptiones*: Quanquam hujus morbi insultus etiam aliis temporibus, & quibusdam aliis de causis non raro eveniant.

Primo igitur sæpenumero accidit infantulos recens natos, aut saltem nondum bimestres, crebra vice spasmi in diversis partibus excitatis affici. Quippe oculorum inversiones, genarum, & labiorum distortionem, aut tremores, quinimo tendinum contractiones, membrorum, & non raro totius corporis subsultus, & concussiones subitæ eos infestant; eundemque affectum etiam præcordia nonnunquam afficere hinc sat plane liquet, quod dum spasmi artus, & membra exteriora occupant, etiam à sanguine in corde, & pulmonibus una contractis stagnante, facies modo pallorem, modo livorem contrahit. Cum itaque in pueris spasmi tres corporis regiones infestare soleant; nempe capitis & faciei partes, membra, & artus exteriores, atque præcordia & viscera; observamus modo has, modo illas, modo binas, aut simul omnes regiones à causa morbifica occupari, nempe prout eadem aut circa nervorum origines aut extremitates defigitur; & cum prius horum accidit, prout medullæ oblongatæ pars superior, media, aut infima spinalis, scilicet unica aut plures simul à causa morbifica impetuntur.

Quod vero spectat ad cæteras hujus affectus causas, nempe procatarticas, & evidentes; quæ prioris generis sunt, in his duobus præcipue consistunt.

stant; primò quod infantibus πάντα τὴ κεφαλή valde sint imbecillia, & viscosa humiditate scateant; nempe cerebrum minus firmum, atque nervorum tonus valde laxus, ne leviores quidem cujusvis materiæ impetus sustinere possint, quin spiritus eorum incolæ, etiam à proprio, quo istæ partes irrigantur, liquore, paululum modò immoderatio affluerit, aut saltem copiosior quam pro tantilli roboris modulo, facillè in motus irregulares, siue spasmos incitantur. Attamen secundo quoniam observatione constat, puerulos nec solos, nec omnes qui tenuioris sunt constitutionis in hunc morbum proclives reperiri; idcirco pro potiore procatarxeos morbidæ ratione haberi debet, quod infantibus quibusdam, propter mala ab utero contracta, & sanguis, & succus nervosus originaliter vitiosi existunt: quippe recens natis massa sanguinea per plures retro menses ventilatione carens impurior evadit; quapropter plerisque infantibus brevi à partu efflorescentiæ latæ, & rubicundæ morbillorum instar per totam cutem erumpunt; cujusmodi ἐξάνθησις si impeditur, aut reprimitur, sæpe numero aphthæ periculosæ circa oris partes succedunt. Hinc merito suspicamur tales sanguinis impuritates quandoque in cerebrum & nervosum genus, utpote debiliora suffundi, & propterea spasmodicas affectiones oriri; nempe dum sanguis ab utero vitiosus existens depurare se satagit, faculentias suas, efflorescentia in cutem facta exterminari solitas, in caput transfert: quare latex modo tenuis & serosus, modo crassior & viscidus, ac uterque salium & sulphurum præternaturalium particeps intra hos, aut illos cerebri, cerebelli, atque medullæ oblongatæ recessus, & cavitates deponuntur; cujusmodi recrementa cum nervi hujus aut illius, ac interdum una plurium origines, aut caudices obsident, spiritibus eorum incolis particulas heterogeneas, atque in explosiones spasmodicas aptas affigunt. Quamprimum enim nervi tales particulas altius imbiberunt, spiritus eorum copula onusti, aut sponte sua, aut à causis evidentibus incitati, eam elidere, & excutere satagunt: proindèque explosiones spasmodicas ineunt.

Causæ evidentes, quæ in puerulis prædispositis motus convulsivos inferunt, sunt bini generis, scil. primo quæcumque sanguinis effervescentias solito majores cient, uti sunt frigoris & caloris excessus, nutritio uberior, aut justo calidior; æris, ac auræ mutationes, ac imprimis lunationum periodi: etenim propter has, aliasque similes occasiones sanguis plus debito effervescens copulam heterogeneam spiritibus usque ad plenitudinem citius affigit; utque ab ipsis perturbatis è vestigio elidatur & explodatur, efficit. Secundò, irritatio ferè in qualibet systematis nervosi parte dispositionem spasmodicam non raro in actum deducit: quare non modo qualitatum tangibilium excessus exterius inflicti, verum & lac in ventriculo coagulatum, bilis, aliique humores acres, aut etiam vermes intestina vellicantes spasmos excitare solent: porro hujusmodi causæ evidentes, siquidem fortiores sint, aliquando per se, absque diathesi prævia, affectus spasmodicos inducunt; quippe lumbrici, forte & acres humores puerulis quibuscvis, saltem tenerioribus motus convulsivos inferunt.

Quo certius atque ad sensum pateret cujusmodi in motibus convulsivis

fit materies morbifica, plurium quos hic morbus oppressit, defunctorum cadavera aperui: causam intra coctionis viscera & primas vias semper frustra quæsi. Multorum capitibus latex serosus intra cavitatem cerebello subjectam congestus, & membranam, qua medulla oblongata investitur distendens, nervorum origines inundabat: in quibusdam nulla huius morbi vestigia apparebant; adeo quod spiritibus accrescens, eos ad explosiones irritat: interdum imperceptibili prorsus constat mole, & originem tam occultam habet, ut vel perspicacissimum visus scrutinium omnino lateat. Olim in hac urbe cujusdam mulieris nati plures ex hoc morbo interierunt; tandem foetus quarti intra mensem, uti priores, interempti caput dissecuimus; nulla hic serosa colluvies ventriculos inundabat, sed cerebri tantum, ejusque appendicis substantia erat justo humidior, & laxior: quod potissimum observatu dignum erat, in cavitate quæ cerebello subjicitur, supra medullæ oblongatæ caudicem, sanguinis grumosi, & velut concreti copiam insignem reperiēbamus: at vero incertum est utrum materies isthæc ibidem ab initio deposita spasmos primario intulerat; an potius sanguis iste à partium circumcirca confitarum contractione expressus, & extravasatus, convulsionum effectus, & productum, ac minimè istarum causa fuerit. Nam & in Apoplecticis ejusmodi Phænomenon passim occurrit: quod tamen morbi effectum potius quam causam esse posthæc ostendemus.

Profecto quod particulæ heterogeneæ, quæ sanguini ab utero innatæ, in plerisque pueris per *ἐξάνθησιν* in toto corpore cutaneam amandari solent; in aliis capiti suffusæ, affectionis spasmodicæ causa materialis existunt, præter rationes superius citatas, etiam à remediis maximè juvantibus inferre licet: quippe in puerulis hæreditario huic morbo obnoxiiis, insultus convulsivi optimè præcaventur, si mox à partu fontanella in nucha excitetur, & sanguis hirudinum suctu è venis jugularibus detrahatur; illæ namque succi nervosi corruptelæ subducuntur, atque hoc cruoris efflorescentiæ impuræ à capite avocantur: hisce administrationum modis, cum prius duo aut tres ejusdem parentis nati brevi post partum convulsivi interiiissent foetus, omnes alii ab eodem malo liberabantur.

2. Hæc de puerorum motibus convulsivis, qui mox à partu, propter labem ab utero contractam eos infestare solent. Quod si hac vice aut ipsum morbum, aut saltem mortiferas ejus plagas evaserint; nihilominus circa dentitionis tempora eidem periculo denuo obnoxii reperiuntur: quando enim dentes, præsertim majores, è gingivis erupturi sunt, sæpe febris excitatur, cui non raro motus convulsivi adjunguntur. Et licet hoc tempore, infantes viribus plus valeant, eoque morbi insultus melius quam recens nati tolerant; attamen affectiones spasmodicæ etiam nunc, nec graviore aliqua occasione excitatæ valde periculosæ, ac interdum lethales existunt.

Quandoquidem autem pueri qui circa dentitionem febricitant, non omnes motibus convulsivis tentantur; ideo sequitur huius morbi dispositionem quandam, sive innatam, sive acquisitam præcedere, atque dolorem à dentitione illatum tantum causæ evidentis fortioris rationem habere; scil. pueri, quibus aut cacochymicis, aut cerebri & nervosi generis con-

stitutione debiliore præditis, spiritus animales, vel adulterati, vel dissipabiles nimis existunt, in affectiones spasmodicas quandoque ineundas disponuntur: quare cum dolor admodum acutus una cum febre urget, dispositio ista latens in actum ducitur.

Si hic inquiratur, qua ratione febris, & dein qua motus convulsivi in prædispositis dentitioni superveniunt; dicendum erit quod uterque affectus ad dolorem velut causam immediatam referri debet: In nobis ipsis experimur quis sit cruciatus qui irritationem circa dentium radices sequitur; revera tantus & tam atrox, ut excitari vix possit atrocior; quippe nervorum quinti paris unâ aut altera insignis propago ad cujusque dentis radicem pertingit, quæ cum à sanguinis, aliorumve humorum particulis acerbis illic congestis vellicatur, corrugatione sua acerrimum molestiæ sensum, sive dolorem infert. Istiusmodi autem hujus nervi vellicatio in pueris dentientibus ideo contingit, quia dentibus jam in majorem molem crescentibus, & adhuc intra gingivas vixdum cavatas inclusis, membranæ & fibræ quaquaversus distenduntur: hinc sanguis in circuitu præpeditus tumorem infert, adeoque nervos comprimit, quin & acriores feri particulas iis suffundit, quibus illi insigniter vellicati corrugationibus, & spasmodicis dolorificis torquentur.

Cum itaque pueris dolores ita atroces à dentitione contingunt, nihil mirum est si febres, ac etiam motus convulsivi interdum succedant: prior horum accidit & quatenus sanguis circa partem dolentem, ne solito atque æquabili cursu circuletur impeditus, propterea in toto corpore inordinatius movetur; & insuper quia spasmodicis alicubi in nervoso genere excitatis, nervi corrugati & contracti arterias comprimunt & convellunt, proindeque in sanguine fluctuationes irregulares & febriles concitant. Cæterum motus convulsivi dentitioni aliquando superveniunt, tum quia sanguis effervescent, particulas heterogeneas regimini animali suffundit, adeoque spiritus in explosiones ciet; tum præterea cum dolor iste acutus, & velut lancinatio dentes erupturos sequuta sensum valde molestum ac irritativum à partibus affectis τὸ πρῶτον αἰσθητικῶν communicet, exinde statim per eosdem nervos, vel alios affines excandescentiæ motus (qui ob dispositionem præviam non raro convulsivus evadit) retorquetur.

Præter has binas (quæ in pueris præcipuæ, & crebriores esse solent) motuum convulsivorum occasiones, scilicet prima infantia, & dentitionis tempora; affectus iste etiam aliis temporibus, & propter alias causas sæpe numero excitatur: In quibus enim dispositionis spasmodicæ semina jaciuntur, illa interdum aut statim à partu se explicant, ac in morbosos fructus maturantur, sed aliquandiu latitantia dentitionem modo præveniunt, modo eam è longinquo sequuntur; & propter causas evidentes alias, scilicet vel internas, vel externas, cujusmodi sunt nutritrix invaletudinaria, aut prægnans, lac in ventriculo coagulatum, aut in putrilaginem acidam, aut amaram degenerans, intemperies febrilis, capitis, aliarumque partium ulcera, aut exanthemata subito evanescentia, aëris mutationes, solis, ac lunæ Σύζυζία aut aspectus oppositi, & similia, tandem incerto eventu in actum erumpunt. Super his non opus est ut particulatim differamus.

Cum viri cujusdam in hac vicinia degentis, nati omnes intra trimestre spatium convulsi interierint; tandem ad præcavendum in puerulo recens edito ejusmodi fatalem eventum, remedia expetuntur: Post aliquot à partu dies accersitus, consulo ut imprimis fontanella in nucha excitetur; dein postridie ut hirudine utriusque lateris venæ jugulari applicata, sanguis ad ℥.ij. extrahatur; insuper ut juxta singulas solis & lunæ (ὕλης, & aspectus oppositos, per tres dies mane, & vesperi pulveris sequentis circiter ḡ.v. exhiberentur è cochleari Julepii. ℥. Cranii humani præparat. rad. Pæoniæ maris, an. ℥. j. margar. pulv. ℥. β. sacchari albissimi ℥. j. misce, f. pulvis subtilissimus. ℥. Aq. Ceras nigror. ℥. iij. antiepilepticæ Langii ℥. j. syr. de floribus Pæoniæ maris ℥. vj. misce; item præcepi ut nutrix iisdem temporibus medicis sumeret haustum seri lactis, cui sem. & rad. Pæoniæ maris & fol. Lili convallis incocta sunt. Infans per quatuor circiter menses bene valebat, tunc vero affectibus convulsivis tentari cœpit: quo tempore iisdem remediis in dosi majori tum infanti, tum nutrici adhibitis, vesicatoria etiam pone aures applicabantur, & hirudinum suctu sanguis ex utraque vena jugulari fuit detractus: Intra duos, vel tres dies puer convaleuit: postea cum intra 4. vel 5. menses spasmi aliquoties redirent, eorundem usque remediorum usu sanabatur. Post sesquiannum affectiones convulsivæ penitus cessabant: attamen circa infimam spinæ dorsi partem tumor indolens succrevit, à quo vertebrarum distortio quædam, atque crurum imbecillitas, & demum paralytis inducebantur. Videtur in hoc casu, quod materies spasmodica primo cerebrum, & nervorum principia impetere solita, ultimo spinalem medullam subiens, inque extremitatem ejus detrusa nervorum appendicum capita omnino obstrueret, atque spiritibus transitum præcluserat: nimirum quia particulis explosivis aliæ narcoticæ & crassiores sese adjunxerant.

Methodus Therapeutica contra affectiones Convulsivas in pueris.

In pueris ac infantibus passiones spasmodicas, aut imminentes præcavere, aut jamjam exorsas curare incunbit.

*Infantum
spasmi
præserva-
tio.*

Nam si ejusdem parentis nati priores Convulsionibus obnoxii fuerunt, malum illud cæteris post natis tempestivo remediorum usu præveniri debet: in hunc finem solenne est fœtui recens edito, quamprimum spirare incipit, medicamentum aliquod ἀντισπασμωδὲς ori ingerere: hinc nonnulli guttas quasdam mellis purissimi, alii cochleare vini canarini saccharo imbuti, quin & alii oleum amygdalar. dul. recens extractum exhibere solent; à quibusdam olei succini gutta 1. aut aquæ epilepticæ semicochleare infunditur.

Præter hæc prima infantum libamina, quæ certè nullius non momenti esse videntur, alia quædam remedia, & administrationum modi in usum ascisci debent: scil. bis in die propinetur cochlear 1. liquoris huic affectui appropriati. e. g. ℥. aq. Cerasor. nigror. Ruta, an. ℥. j. β. Antiepileptica Langii ℥. j. syr. è Coralliis ℥. vj. Margar. præpar. ḡ. xv. misce in phiala. Die tertio aut quarto post partum excitetur fontanella in nucha, dein si vultus sit

fit floridi, parum sanguinis ad ℥. j. ℞. vel ij. è venis jugularibus hirudinum succtu extrahatur, cavendo ne inter dormiendum sanguis copiose nimis effluat; tempora, & cervix blande fricentur tali linimento. ℥. Olei Nucis Moschat. per expressionem ℥. ij. Capiivi ℥. iiij. succini ℥. j. Periapum ex radicibus, & seminibus Paonia maris, addito parum ungulae alci collo suspendatur.

Porro medicamenta antispasmodica nutrici quotidie exhibeantur: sumat ^{Methodus medendi nutricibus} mane, & vesperi haustum feri lactis, cui rad. & sem. Paonia maris & sem. fœnicul. dul. incocta sunt. ℥. Conserv. flor. Betonia, Paonia maris, Anthos, an. ℥. ij. adhiben- pulv. rad. & flor. Paonia maris an. ℥. ij. Corallii rubri preparat. succini albißimi, da. an. ℥. j. rad. Angelica, Zedoaria preparat. an. ℥. ℞. cum s. q. Syrupi de Paonia f. Electuarium: capiat q. Nucis Moschata mane & vesperi.

℥. Pulveris rad. Paonia maris ℥. ij. sem. ejusdem ℥. j. f. pulvis, sacchari albißimi solut. in aq. florum Tilia & ad tabulat. cocti ℥. iiij. Olei succini ℥. j. f. s. artem Tabula, singula pendant ℥. ℞. Comedat i. hora qualibet sexta. Illa etiam exacta v. etus ratione utatur.

Quod si infans quispiam Convulsionibus actu afficitur, quia fontanel- ^{Infantum Spasmi laborantium Cura ratio.} la minus, & tardius operatur, vesicatorium in nucha, aut pone utramque aurem applicari expedit, & nisi temperamentum frigidius obstat, sanguis hirudinum succtu venis jugularibus extrahatur: Linimenta circa tempora, nares, & cervicem, item plantis pedum emplastra admoveantur; enemata quæ alvum copiose subducunt quotidie injiciantur: porro sæpius in die, nempe sexta aut octava qualibet hora, remedia specifica intus sumantur.

℥. Olei Capiivi, castorei, an. ℥. ij. succini ℥. ℞. f. linimentum. ^{Linimentum}

℥. Emplastri Oxycrocci p. ij. Galbani solut. p. j. Olei succini ℥. j. f. Em- ^{ta.} plastrum pro plantis pedum. Pulvis de gutteta juxta descriptionem Riverii exhibeatur bis vel quater in die.

℥. Cranii humani prepar. sem. Paonia, ungula Alci, Margaritar. præ- ^{Pulveres} par. an. ℥. ℞. Ambra grisea ℥. vj. f. pulvis. Dosis ℥. vj. in cochleari liquoris infra scripti, ter aut quater in die.

Vel ℥. Cranii humani prepar. Margarit. an. ℥. ℞. salis succini ℥. j. sac- chari perlati ℥. j. Dosis ℥. ℞.

Vel ℥. Sp. C. Cervi gutt. iiij. detur sexta vel octava qualibet hora in co- chleari julepii infra præscript.

Pauperum natis exhibeatur pul. radicis Valeriana sylvestris ℥. ℞. ad ℥. j. detur bis in die in cochleari lactis, vel liquoris appropriati.

Vntzeaus valde commendat fel catelli lactantis, nempe ut totus succus cysti- fellea exemptus puerulo cum pauxillo aqua florum Tilia propinetur.

Nuper mihi retulit Medicus Eruditus se novisse plures hoc remedio cu- ratos: Porro solent empirici pueris majoribus, post fel epotum, etiam catelli hepar assatum comedendum tradere.

Julepia, aquæ destillata, alique liquores appropriati juxta præscripta se- ^{Liquores} quentia parari possunt.

℥. Aq. Cerasor. nigror. ℥. iiij. Antiepileptica Langii ℥. j. sacchari per- lati ℥. ij. misce.

℥. Rad. Paonia maris recent. in taleolas scissarum ℥. vj. Vitrioli Hungarici ℥. viij.

℥. viij. cranii humani ℥. ij. aq. Antiepileptica Langii ℥. ℞. Misce, & destillentur in retorta vitrea calore arena. Dosis cochlear j. ad ij.

℥. Rad. Paeoniae maris recent. incis. ℥. iij. contusis in mortario marmoreo affunde vini Hispanici ℥. j. f. expressio fortis, adde manus Christi perlata ℥. ℞. servetur in vitro occluso. Dosis cochlear j. vel ij. bis in die.

Spasmi ob
dentitionem
excitati.

Cum ob dentitionem difficilem motus convulsivi eveniunt, symptoma hoc quemadmodum secundarium & minus periculosum existit, ita in Therapeia non semper primam aut praecipuam exigit medendi operam, sed nonnunquam de dolore sedando, & intemperie febrili summovenda potius solliciti sumus; quare & patiens, & nutrix victu tenui & refrigerante uti debent: dentibus erupturis gingivarum aut frictione, aut sectione exitus patefiat; quin & partibus istis intumefactis & dolentibus anodyna applicentur: Enemata, & sanguinis detractio non raro hic locum habent: somnum conciliare, & sanguinis ferociam attemperare decet: interim remedia Antispasmodica usurpentur, verum temperatiora, & quae sanguinem, & humores minus exagitant: vesicatoria, quia serum in caput nimis suffundi aptum evacuant, saepe juvamen conferunt.

Spasmi
propter
alias oc-
casiones
excitati.

Quando pueri nec statim à partu, neque ob dentes erupturos, sed propter alias occasiones, & accidentia motibus Convulsivis tentantur; talis affectionis causa ut plurimum vel in capite, vel alicubi circa coctionis viscera subsistit. Quando prioris suspicio habetur, uti liquere solet à signis quae colluviem serosam intra ἐγκέφαλον nimis congestam arguunt, remedia superius citata in paulo majori dosi exhiberi debent; insuper in istis qui catharsin bene ferunt, interdum vomitus, & levis purgatio instituantur: *vinum & oxymel scilliticum*, item *Mercurius dulcis*, *Rhabarbarum*, & *resina Ialap.* egregii sunt usus.

Quoties affectionis spasmodicae causa in visceribus subesse videtur, aut *lumbrici*, aut *acres humores* ventris tormina cientes in vitio deprehenduntur.

Propter

lumbricos.

Contra Lumbricos purgatio ex *Rhabarbaro*, aut *Mercurio dulci*, addita *resina Ialappae* instituitur. Olim puero convulsionibus miserrime affecto, ut jamjam moribundus videretur, dosin *Mercurii dulcis* cum *resina Ialappae* exhibui; cum alvi dejectionibus, quas 4. habuit, lumbricos 12. excrevit, & derepente convaleuit.

℥. Rad. *Serpentaria virginiana* pul. ℥. j. corallii ad albedinem calcinati ℥. ℞. f. pulvis, dosis ℥. ℞. ad ℥. j. bis in die per tres dies continuos, superbibendo decoctum rad. graminis. ℥. Specier. *Hiera* ℥. j. ℞. *Theriaca Venet.* ℥. ij. f. emplastrum pro abdomine, vel *Emplastrum ex Galbano* applicetur umbilico.

Propter

acres hu-
mores.

Si motus convulsivos à ventriculi, & intestinorum irritatione per acres humores facta, procedere suspicamur, lenis catharsis, aut vomitus, aut secessu, aut successive utroque institui debet. In hunc finem blanda emetica ex vino scillitico, aut sale vitrioli propinentur; si quando scilicet laborantes vomendi nixu sponte tentantur: sin evacuatio potius κατὰ tentanda videbitur, *Rhabarbari infusio*, aut pulvis, syrûpus de *Cichorio* cum *Rhabarbaro*, aut *rosarum* cum *agarico* propinari debent: & non raro hisce remediis tempestive adhibitis, affectionem convulsivam in pueris sanatam vidi:

porro

porro in hoc casu enemata sint crebri usus : Cæterum non omittantur medicamenta externa , scilicet fots , linimenta , aut emplastra abdomini applicanda.

℥. Folior. Camomillæ minutim incis. M. ij. includantur duobus sacculis è lino tenui aut serico confectis , qui lacti calido intincti & expressi abdomini successive applicentur.

℥. Summitates , aut flor. malvæ pariter incis. incoquantur butyro recenti , vel sevo porcino , & sub forma linimenti aut cataplasmati ventri applicentur.

CAPUT V.

De morbis Convulsivis adultiorum, propter originem nervosam præcipuè affectam, oriundis.

Licet affectiones Convulsivæ quæ adultioribus accidunt, aliis nominibus insignitæ, etiam alius cujusdam prosapiæ vulgo reputentur, atque ad *passiones dictas histericas, hypochondriacas, aut colicas*, vel ad *scorbutum* referri soleant ; attamen si res paulo attentius consideretur, facile patebit symptomata quædam spasmodica tum viris , tum fœminis crebro evenire , quæ *Convulsionis* nomen sibi propriè ac jure vendicant : Hæc autem (uti supra innuimus) pro multiplici causæ morbificæ sede vario modo distingui possunt , potissimum vero in *hæ tres species* , scilicet in spasmos quosdam ob *nervorum originem* præcipuè affectam excitatos ; inque alios qui propter *nervorum extremitates* materia morbifica obsessas cientur ; ac demum in alios quorum materies morbifica à capite descendens, *nervorum* quorundam, vel simul omnium *ductus aut totos*, aut quoad maximam partem , occupat. De singulis hisce Convulsionum speciebus ordine dicemus.

Itaque imprimis ut *convulsiones à nervorum origine* affecta oriundas explicare pergamus ; hic imprimis notandum sit materiam morbificam nervorum principia obsidentem , quandoque in *priora nervorum paria*, quæ scilicet *oculorum & faciei* musculis prospiciunt, potissimum influere ; proindeque modo *nasi* , *genarum* , aut *labiorum* contractiones , & tremores , modo *oculorum* , aut *oris* distortiones sequuntur. Secundo aliquando *par vagum*, & *intercostale* particulas heterogeneas maximè imbibunt ; & tunc *abdominis*, & *hypochondriorum* inflationes, contractionesve , quin & *cordis palpitatio*, *tremor*, *respiratio difficilis ac interrupta*, *pulsus intermittens* , aliaque *medii* , aut *infimi ventris* symptomata plurimum infestant. Tertio , nonnunquam vero causa morbifica posterius consita , *spinalem medullam* præcipue afficit, & propterea *membra exteriora & artus subsultibus & contracturis* inordinatis obnoxia redduntur : porro in pluribus hujusmodi casibus, quia spiritus animales circa nervorum origines explosi , versus *γνέφαλον* inordinate resiliunt, idcirco quibusvis fere spasmis hoc ritu excitatis,

vertigo, item sæpe *Scotomia*, *aurium tinnitus*, & nonnunquam *anæsthesia* ad-
junguntur, aut succedunt.

2.
Juxta eo-
rundem
nervorum
varia loca
affecta.

Cæterum propterea ex variis affectionis convulsivæ typis conjicere licebit
videtur quod materies spasmodica hos aut illos nervos, aut simul eorum
plures adpellens, vel circa ipsorum *principia* ferè tantum hospitetur, ita
ut spiritibus ibidem crebro explosis, *vertigo frequens*, & valde molesta
oriatur; insuper circa *præcordia tremores*, ac *breve deliquium*, & *leipothymia*
metus, non raro in visceribus aut musculis *subsultus*, & *contracturae leves* sen-
tiantur. Vel secundo particulæ explosivæ ad nervorum origines delatæ,
eorum processus altius subeunt, & non raro in *plexus nerveos* ad *præcordia*
aut *viscera* imi ventris, aut etiam *membra exteriora* pertinentes delapsæ, il-
lic affectionum spasmodicarum alios quasi *nidos* consciscunt, ut quoties
spiritus circa originem nervosam in explosiones adiguntur, statim in ab-
domine, thorace, aut artubus *paroxysmi* velut *hysterici*, *asthmatici*, aut alias
convulsi oriantur: Horum exempla, & quibus fiunt modis, infra clarius
subduntur. Interim materies spasmodica nervorum ductus influens cum
usque ad processus, & plexus eorum remotos transfertur, quandoque ta-
men præcipuam mineram adhuc circa originem nervosam habet; adeo ut
post graves *viscerum aut membrorum spasmos*, magna *cerebri perturbatio*, cum
vertigine, *aurium tinnitu*, & non raro *anæsthesia* subsequatur: interdum ve-
ro materia morbifica, quoad maximam partem, ad longinquos nervo-
rum fines translata, deinceps circa eorundem principia immuniùs agitur:
Etenim plures observavi, qui dum principio *vertigine*, *crebro leipothymias*
metu, *cephalalgia*, & *occipitis gravitate* infestarentur, circa *præcordia*, aut
viscera leviores tantum inflationes, aut tremores pertulisse; postea tamen
circa has partes spasmos immaniores perpellos, de prioribus capitis affe-
ctibus minime conquestos fuisse.

Materies
spasmodi-
ca quo ritu
nervos in-
fluit.

Quod si de *materia spasmodica* amplius inquiratur, *undenam* illa sugge-
ritur, & quibus viis versus nervorum origines defertur, & cujusmodi ibi-
dem *situs*, & quasi *focos* obtinet; dicendum videtur, quod licet hujus du-
ctus manifestos, & vestigia detegere nequimus; quantum tamen ex ob-
servationibus quibusdam, & rerum analogia colligere datur, suppose-
re licebit *binos hosce distinctos transitus modos*, quibus particulæ spasmodi-
cæ primum è sanguine in Cerebrum, & Cerebellum suffusæ, exinde
versus nervorum principia convehuntur: scilicet primò interdum materies
ista à cerebro, ac cerebello imbibita, ac utriusque poros sensim pertran-
siens in medullæ oblongatæ caudicem delabitur, cujus item tractu quo-
dam superato, una cum succo nervoso versus nervorum origines prola-
bitur, ac prope illorum capita, vel intra ipsum caudicem medullarem,
vel intra prominentias annulares aggeritur, in quibus locis aut diu-
tius subsistens, crebras vertigines, ac in partibus remotis spasmos le-
viores, uti dictum est, ciet; vel exinde in nervorum ductus altius delap-
sa, convulsionum valde atrocium paroxysmos excitat: talem causæ
morbificæ progressum suspicamur, in quibus *vertigo*, *scotomia*, capi-
tis *gravedo*, ac mentis torpor insultus convulsivos præcedunt: cujus-
modi quidem affectus prævios, materies *potè* adhuc in cerebro, & ap-
pendice

pendice medullari scatens producit; quæ deinceps in nervos illapsa convulsiones infert.

2. Restat alter modus, quo liquidè patet materialem affectus spasmodici causam in principia nervorum transferri; nempe cum eadem à colluvie serosa intra cavitates, sive ventriculos τὴ ἐγκεφάλῳ deposita in vicinas nervorum radices insinuatur: Enimvero in morbis chronicis, cum ad insignem sanguinis, & humorum dyscrasiam *cerebri* quoque prava dispositio accedit, sæpe ingens feri acris, & nervoso generi infesti copia è plexuum choroeideῶν vasis exudans, in cerebri ejusque appendicis ventriculos dilabitur; serosus autem hic latex postea in *quartum ventriculum* cerebello substratum irrumpens, luxata ibidem pellicula, qua *medulla oblongata* obtegitur, unius aut plurium nervorum origines obsidet, eosque, vel irritando, vel particulis heterogeneis & explosivis imbuendo diathesin spasmodicam inducit. Atque hæc ferè causa est, quod post *febres diuturnas*, aut malè *judicatas*, etiam post *morbos cephalicos* graviores, ægrotantes demum *convulsi* intereunt, prout ex crebra cadaverum eo ritu defunctorum Anatome deprehendi. Quinetiam ex observatione Anatomica constat, cerebrum colluvie serosa quadam inundari absque dispositionis spasmodicæ affectu; porro & nonnullis ab *Epilepsia*, aliisque morbis convulsivis defunctis, nullum intra cerebri ventriculos feri diluvium adfuisse: Ex quo datur intelligere, *affectiones spasmodicas haud tantum ab aquosa τὴ ἐγκεφάλῳ illuvie profluere*; cæterum nec omnino à tali causa oriri, nisi *latex serosus cerebri ventriculos*, ac imprimis istum cerebello substratum *inundans, particulis heterogeneis & explosivis imbuatur*. Memini olim petiitum esse meum consilium pro adolescente egregio phthisi laborante, & tunc temporis planè desperato. Præter *tussim & dyspnæam*, ille per plures dies, immo hebdomadas graviter conquestus erat, non potuisse se in lecto supinum decumbere, aut dum in cathedra sederet, caput, vel minimum reclinare: quippe ab hoc, illoque corporis situ illico *cordis tremores, & spirituum deliquia*, quasi jamjam moribundus esset, pati solebat: quapropter necesse habuit, *caput semper pronum*, sive antrorsum inclinatum tenere. Post obitum, cadavere dissecto, pulmones ferè per totum scirrhusi, & in quibusdam locis ulcerosi apparebant: dein cranio aperto ingens feri flavi, & falsi copia intra omnes cerebri ventriculos fluctuabat: qui certè latex, dum capite reclinato in *quartum ventriculum* supra medullæ oblongatæ caudicem prolaberetur, in nervorum *pari vagi & intercostalis* capita irruens, circa præcordia convulsiones prædictas ciebat: quamdiu autem, capite antrorsum inclinato, ista feri colluvies in anteriores *cerebri ventriculos* refluebat, nervorum origines ab ista materia spasmodica immunes persistere.

Ostenso hæcenus *quot modis & quibus viis* materies morbifica versus nervorum origines delata, spasmos inferre videtur, facilè esset juxta has rationes multa symptomata convulsiva explicare: Nam præter *infantum, & puerorum motus convulsivos* ab ejusmodi causis sæpissimè excitatos, etiam huc referri debent partium nervosarum *contractiones, & subsultus*, quæ febribus superveniunt. Quin etiam *passiones* vulgò dictæ *hysterica*, item *hypochondriaca*, & quædam aliæ, non raro à causa morbifica nervorum principia

impetente procedunt. Hujusce igitur hypotheseos veritatem quibusdam aliis *agrotantium historiis*, & *exemplis* astruere nitimur; imprimis verò ejusmodi observationes proponemus, in quibus materies morbifica *nervorum principia* obsidens, necdum in illorum processus altius delapsa, *crebras vertigines*, & *leviores tantum viscerum & præcordiorum spasmos* inducit.

1. *Observatio.* *Fœmina perillustris* 30. circiter annos nata, constitutione tenera, & gracili corporis habitu prædita, quavis hyeme *catarrho in tracheam & pulmones* exudante, cum *tussi*, *raucedine*, & *sputatione copiosa* graviter affligi solebat: novissimo tamen anno, cura, & cautione diligenti usa istud malum evitavit: at vero post solstitium Brumale à frigore suscepto immani *capitis dolore*, *aurium tinnitu*, *vertigine*, cum *ingenti coryza* afficiebatur, ut facile constaret seri colluviem, antehac in pectus exudare solitam, tunc temporis intra caput & cerebrum omnino deponi: cujus insuper effectus erat, quod *passionibus quasi hystericis*, quibus nunquam prius obnoxia fuerat, quoties dormire inciperet valde infestaretur: Si quando enim somnum initura oculos clauderet, illico in abdomine molis ascensus, in gutture præfocatio, circa præcordia tremores, & subsultus excitabantur; quæ tamen affectiones, cum perfectè evigilaret, protinus cessabant, itaut ægotans necesse habuerit per plures dies & noctes somno ferè & in totum abstinere.

Ad hanc Dominam, postquam plures dies ægotans valde imbecillis evaserat, accersitus, medicamentis tantum blandis uti cogebar: Itaque *sanguinem* ex pede ad ℥. iiij. protinus detrahendum, & quolibet die *clysterem* è lacte saccharato injiciendum curavi, à quo ter, aut quater alvum deicere solebat: porro octava qualibet hora dosim *sp. C. Cervi* in cochleari sequentis *Julapii* exhibui. ℥. Aq. *Pul. gii, juglandum, Cerasorum nigror. an.* ℥. iiij. aq. *hystERICA* ℥. ij. syr. *Caryophyllor.* ℥. j. ℞. *Castorei nodulo ligat. & in vitro suspensi* ℥. ℞. *Margarita pulv.* ℥. j. misce. *Vesicatoria pone aures, & cataplasmata ex foliis Ruta & Aronis cum rad. Bryonia, sale marino, & sapone nigro plantis pedum cum fructu admovi.* Interdum vesperi in haustulo *Julapii* præscripti, *Diacodii* ℥. ℞. exhibui, cui somnus moderatus, absque solita spasmodorum consequentia succedebat; cujusmodi effectum ab opiatīs in tali casu exhibitis sæpius expertus sum. Pro siti restinguenda *ptisanam* cum *ingredientibus diureticis* incoctis propinavi: horum usu intra breve tempus plurimum alleviata fuit. Attamen, quod maximo emolumento cessit, *abscessus in aure sinistra sponte disruptus* primo saniem flavam, ac postea per multos dies ichoris tenuis copiam ingentem profudit, à qua evacuatione, viscerum & præcordiorum spasmis in totum cessantibus, morbus perfectè judicatus fuit.

Quod spectat ad prædictæ ægritudinis *Ætiologiam*, extra dubium videtur, affectus istos à *colluvie serosa* *αἷματι* & *ἐκ νέκρωσιν* deposita excitatos fuisse; nam & istius humoris in *caput translatio* morbum primo intulit, ejusque per *auris emunctorium* *ἐκκρίσις* symptomata quævis sustulit: porro cum materies morbifica spiritibus circa nervorum principia confitis *diathesin aliquatenus explosivam* intulisset, isti, licet tanquam æstro perciti ferè continuo agitentur, quamdiu tamen versus cerebrum resilientes spatium

in quo possent liberius expandi obtinerent, phantasiâ quidem illi solum vehementius exercebant, & absque ulterioris incommodo *vigilias* tantum induxere. At vero cum somno interdum obrepente spirituum irrequietorum excursus versus cerebrum cohiberetur (quod quidem necessario evenit quando obdormimus, liquore nervoso intra cerebri poros tunc temporis uberius admissio) *nervorum paris vagi & intercostalis* capita iidem tumultuariè irruentes, spirituum intra nervorum istorum ductus scatentium totas series perturbaverunt, adeoque prædictos circa *præcordia, viscera, & gula musculos spasmos* intulere. Plures hoc ritu tum viros, tum foeminas ægrotautes novi, qui cum *cephalalgia, occipitis gravitate, aut vertigine* laborarent, inter edormiscendum illico in *præcordiis, aut visceribus, aut simul in utrisque perturbationes quasi spasmodicas* sentire, quod quidem contingit à spirituum tumultuantium $\rho\epsilon\pi\eta$ à cerebro in nervorum origines reflexa: Quod autem huic ægrotae *opiatarum* usus somnum placidum, absque solita spasmodorum consequentia accersivit, ratio erat, quia spiritus animales, utut irrequieti & furentes, *particularum tamen narcoticarum* implexu, velut catenis injectis ligabantur, ut dein sine resistantia quavis somno obruerentur. Enimvero graves *convulsionum paroxysmos* tum *Asthmaticos*, tum quasi *hystericos opiatas* exhibitis, non raro feliciter curavi.

Mulier honesta M. G. 67. anno ætatis, vultu adhuc florido, & habitu corporis obeso; cum prius faciei intumescentiæ, & gravioribus cephalalgia paroxysmis dudum obnoxia degisset, intenso Brumæ frigore in vertiginem valde molestam, cum tremore cordis, spirituum deliquio, & cerebro vomendi nixu incidit: lecto imposita si oculos aperiret, aut è latere in latus converteretur, statim insigni *scotomia, leipothymias metu, & insuper vomitu inani* afficiebatur. Hanc invisens minimè dubitabam, quin ægritudinis causa foret *materies spasmodica ab exteriori capitis regione, ad intimos* $\tau\epsilon\gamma\kappa\epsilon\alpha\lambda\epsilon$ recessus translata; cujus afflatu, sive copula heterogenea spiritus animales tacti, dum inordinatè versus cerebrum exsiliunt, affectus vertiginosos; dumque isti in nervorum capita tumultuariè irruerent, *scotomiam, præcordiorum ἀταξίας, & vomendi nixum* excitabant. Hujus curationem *vesicatoria larga nuchæ, & pone aures applicata, enemata* quotidie injecta: item *frequens sp. C. Cervi, & Iulapii cephalici usus* intra paucos dies perfecerunt.

2.
Observatio.

Vir egregius 34. circiter annos natus, cum ex longo tempore tussi, cum sputo copioso, & crasso obnoxius egerat, insuper cutis poros valde apertos habens, continuo madere, & qualibet ferè nocte sudore multo perfundi solebat: sub initium veris evacuationes istas solennes parcius evenire persensit: interim conquestus est de manuum & pedum plenitudine, ac velut intumescencia quadam, ita ut *hydropem* ingruentem vereretur; cæterum & in capite *scotomia, & vertigine* crebra afficiebatur: Brevi postea hoc malo ingravescente, circa labia, aliasque oris ac faciei partes leves contracturæ, & subiti spasmi passim excitabantur; subinde etiam (materia morbifica, uti videtur, nervorum paris vagi & intercostalis origines influente) cordis tremorem & subsultus, cum crebris spirituum vitalium deliquiis, quasi *leipothymia* jamjam imminente, perpeffus est.

3.
Observatio.

Scio plurimos, pathemata hæc convulsiva, præcordia ita graviter instantia, *vaporibus à liene elevatis* ascribere : attamen ratio longè potior videtur, eadem à materia spasmodica intra cerebrum aggesta, & in nervorum principia irruente deducere ; quia scil. excrementi cujusdam à partibus aliis in caput metastasis præcessit, ipsumque adeo *ὡς τὸ ἰγνέεσθαι* deponi, affectus vertiginosus ferè continuus, istique partium oris ac faciei spasmi planè testantur : quare huic remedia juxta methodum inferius traditam præscribere visum est.

Possem hic plurimas hujusmodi observationes proponere, in quibus *materia morbifica prope nervorum origines* subsistens, cum *vertigine*, *leviores tantum viscerum*, aut *membrorum spasmos* ciet. Cæterum quia istius materiæ portio quædam à capite descendens nervorum ductus sæpe altius subit, adeoque circa medios, ultimosque eorum processus, & plexus, *seminii explosivi*, quasi *pulveris pyrii* fomitem struit ; ex re fore videtur hujusmodi casuum exempla quædam subjicere.

4. *Observatio.* Puella quædam E. L. procera, & venusta, parentibus sanis orta, ipsaque constitutionis (prout videbatur) originaliter sanæ ; postquam Hero longa invaletudine detento diu & ferè continuo ministrasset, atque hinc sæpius totas noctes evigilare, aliisque temporibus crebro expergisci cogeretur, ut nunquam somnus, nisi brevis & interruptus, capefferetur, tandem de *capitis hebetudine* cum *crebra vertigine* queri cœpit : intra brevem exinde temporis tractum, affectu indies ingravescente, *tremores* sensit in toto corpore, cum levi membrorum succussu, quibusdam vicibus, licet vagis & incertis, ingruentes : postea dein paroxysmos planè convulsivos, eosque horrendos & crebro instantes perpessa erat : paulo ante morbi insultum *Scotomia* brevi afficiebatur, mox *pectoris angustiam & oppressionem* magnam, qua præcordia simul omnia strictim contrahabantur, persensit ; tum illico stridorem ingentem, cum forti ejulatu edens, in terram concidere solebat : interim animo constabat ; at maxima cordis oppressionem laborans, donec ista pectoris constrictio relaxaretur, se nullo modo relevare potuit : postea cum paroxysmus pertransierat, insigni *cordis palpitatione*, *sensuum torpore*, & functionis animalis debilitate magna adhuc aliquandiu afficiebatur. Postquam hæc ægotans per quatuordecim circiter menses ejusmodi paroxysmis crebra vice repetentibus obnoxia degisset, demum *epileptica* evasit, ut quoties mali insultus rediret, in terram prostrata, *ἀναίσθητα* cum spuma oris, aliisque pathognomonicis *caduci* symptomatis corripere-
tur. Neque hîc affectus iste gradum sistebat, quin vix elapso anni spatio, in *maniam* degenerabat, ut denique ægotans, amisso rationis usu, modo cum *furore* insaniret, modo cum *stupore* planè desiperet.

Predicti casus Ætiologia. Ex morbi hujus *initio, progressu, & crebra metamorphosi* liquido patet eum primo in capite prope nervorum origines & *causam*, & *sedem* habuisse, & exinde fines suos & in *cerebrum* & in *systema nervosum* quotidie latius explicuisse : nam ab initio materies morbifica juxta nervorum principia consistens, *viscerum*, & *membrorum* leviores tantum spasmos, & succussiones cum *Vertigine* intulit ; postea ejus portio in *nervos pneumonicos*, eorumque *plexus* delapsa, gravissimas *præcordiorum, diaphragmatis &*

ventriculi convulsiones produxit; quin & ejusdem materiae portio altera cerebrum ejusque medulla invadens, *ἀναισθησία*, ac dein caduci paroxysmos inferebat; atque demum spirituum textura in totum vitiata, eorumque latice in liquorem acerrimum, ac velut stygium degeneri, *affectiones spasmodicae* in maniam transibant.

Quod itaque spectat ad particulares tum *morbi*, tum *symptomatum rationes*; videtur quod praedicta virgo ex vita sedentaria (omni corporis exercitatione & aurae liberioris usu penitus ademptis) praesertim vero ex vigiliis nocturnis, & somno frequenter interrupto, vitiosam sanguinis & humorum diathesin, simulque pravam & debilem cerebri, & nervosi generis constitutionem contraxerat: quibus accessit, quod illa hero suo gravissimis convulsionum affectibus laboranti perpetuo ministraret, atque ex eo forte contagium aliquod, sive miasmata spasmodica susceperat: Et primo quidem particulae heterogeneae una cum succo nervoso in cerebrum & cerebellum suffusae, ibidemque spiritibus accrescentes, praeliminari Scotomia, & vertiginoso affectu quasi velitabantur; dein materies spasmodica nervorum paris vagi & intercostalis, atque medulla spinalis principia obsidens, una cum vertigine viscerum & musculorum subsultus, & succussiones leviores intulit: postea cum eadem nervorum ductus altius subiens, in plexus cervicales, cardiacos, & forsan intercostales, aliosque deferretur, atque spiritus respirationis, & pulsus munia exequentes, copula explosiva imbueret; illi crebra vice ob plenitudinem, vel propter irritationem, una cum superioribus nervosae originis incolis in explosiones adacti, partium respectivarum spasmos horrendos excitabant: Enimvero urgente paroxysmo, à nervis pneumonicis constrictis, derepente thoracis systole inordinata ciebatur; deinde statim diaphragmate subito & vehementer retracto, ejulatus iste obstrepens succedebat: porro cum ob istam thoracis systolen diutius continuatam, sanguis ne moveri possit impeditus, omnino in praecordiis stagnaret, idcirco durante paroxysmo, cordis oppressio magna, cum *ἀσπνία* & *ἀναισθησία* laborantem urgebat: interim vero, cum adhuc cerebri regio à spirituum explosionibus libera ac immunis perstaret, aegrotans animo constabat; postea vero cum materies spasmodica indies adaucta, etiam in cerebri debilitati & praefracti medulla explicaretur, prioribus circa praecordia pathematis *ἀναισθησία*, dein *Epilepsia*, ac ultimo *mania*, propter rationes modo citatas supervenerunt. Huic aegrotanti medicamenta plurima, & varii generis, à multis tum medicis, tum empiricis, confuse tamen, methodoque incerta, & subinde mutata, praescripta ne hilum profuere.

Mulier quaedam venusta *ἡγεῖσθαι* & *ἡδονή*, à diutino mœrore in diathesin invaletudinariam incidit; circa meridiem, & horas vespertinas plerunque mediocriter habuit: mane autem cum somno satis, & saepe plus nimio indulserat, usque magis somnolenta, & torpida evasit: expergefata, statim queri solebat de gravitate, ac velut stupore in toto capite, cum vertigine ad quemvis motum, aut capitis circumactionem; paulo postea paroxysmum convulsivum, aut *ἀναισθησία* fere constanter expectabant, eamque modo hæc, modo iste infestare solebat: quippe post vertiginem, quasi velitatio

velitationem præviā, plerunque in *ventriculo*, & *latere sinistro* dolorem gravativum huc illuc transcurrentem sensit; hinc rugitus, vomendi nixus, flatuum eruptiones, necnon abdominis, & hypochondriorum distensiones miræ insequiebantur, & plurimis interdum horis hanc misere exercebant: interdum vero hæc symptomata abesse contigit, & tunc in *cerebro* affectio immanior successit: namque in crebras *ἀναισθησίας* incidens, aliquandiu immota, & clausis oculis, sine sensu, aut intellectu perstare solebat; cumque famulæ ejus *frictionibus*, & *nicotiana* fumigatione ipsam excitarent, mox animo constabat, at denuo statim revolvitur in similem *ἀναισθησίαν*, atque ita quatuor, aut quinque vices ejus subit, priusquam ad se perfecte, & sine recidiva mox expectanda rediit: Tandem peracta tragedia, etiamnum *capitis gravitate* & *torpore* aliquantulum afficiebatur: circa meridiem vero, nebulis omnino discussis, sudum, & serenum *πάντα* & *ἐνκεφάλῳ* obtinere solebant; donec proximo mane rursus eadem symptomata reverterentur.

Æthiologia.

Qui symptomata hæc rite perpendit, non habebit necesse vapores ab *utero*, aut *liene* elevatos supponere, atque in istis causam morbificam frustra quærere, nempe quam multo certius poterit in ipso capite collocare: Videtur enim quod huic ab initio, propter ingentem mœrorem (prout in fœminis crebro assolet) *cerebro* & *nervoso generi* magna *debilitas*, simulque *vitiosa labes* imprimerentur; ita quidem ut spiritus animales in Cerebrum & Cerebellum derivati, secum particulas heterogeneas mixti generis, scilicet partim *narcoticas*, & partim *explosivas* afferrent: cujusmodi copulam cum illi à somnis uberiores conciperent, mera plenitudine ad ipsam excutiendam ciebantur: quamprimum igitur expergesceret mulier, iidem spiritus commoti, vel *ῥοπὴ* *inferius* facta, in *nervorum origines* deprimebantur, ibidemque explosi viscerum spasmos excitabant, aut versus *cerebri medullium* resiliētes, ibidemque elisi, *crebras* & *terribiles ἀναισθησίας* intulere. Revera hæc affectio Epilepsiæ aliquantulum affinis erat, nisi quod materies morbifica nondum intra regale cerebri palatium, sive meditullium ejus ita commorabatur, ut spiritus illic intra primos ipsorum fontes inficeret; iisdem tamen inferius dissociatis, & juxta nervorum origines sese in varios, minoresque rivulos dividētibz, eadem copula heterogenea arctius adhærebat. Interea spiritus, quo istam materiam excuterent, crebrius explosi, cum *versus cerebri arcem* tumultuose raperentur, *stuporem* & *ἀναισθησίαν*; sin alio vergentes in *nervorum principia* irruerent, propterea istos *viscerum spasmos* intulere: Quod autem paroxysmi tantum *horis matutinis* post somnum pleniores ingruēbant, ratio erat, quia spirituum copula heterogenea iis cum succo nervoso adveniens, eo tempore ad plenitudinem explosionibus aptam congerebatur; quæ si quidem tunc integre discuteretur, reliquo die ægrotans ab affectu immunis perstitit, donec postridie, cum *somnus nocturnus* novum materiæ morbificæ supplementum capiti intulerat, mane similis paroxysmus redibat; qui forsā prout somnus brevior aut protractior fuerat, modo intra *cerebrum*, modo juxta *originem nervosam* peragebatur.

Observatio.

Nec tantum in *sexu fœmineo*, utpote debiliori & magis patibili, *spasmi* ab

ab *origine nervosa* principaliter affecta oriuntur; verum ejusmodi affectio-^{affectionis} nes aliquando in *viris*, à simili procatarxi excitatas observare licet. Ante ^{quasi hy-} aliquot annos festinanter accersitus ad hospitem quendam in hac urbe di-^{sterica in} versantem, ipsum primo intuitu revera *dæmoniacum* suspicabar, eique ^{viro.} *exorcismis* potius quam *pharmacis* opus fuisse rebar. Erat is quadragenarius, qui jam per tres annos statis quibusdam temporibus *motibus convulsivis* tentari solitus est; *hujusce* ægritudinis, dum hic paucos dies fortuito hospitaretur, occasione ingentis mœstitiæ insultum solito majorem perpeffus erat: morbi accessionem per duos aut tres dies præsentiscere solebat; nempe ex magna intra *sinciput commotione*, continua fere *vertigine*, & *crebra oculorum obfuscatione*; ingruente autem paroxysmo, primo oculi varie contorquebantur, invertebanturque, dein moles quædam instar vivi animalis, ab imo ventre sursum versus Cor & Thoracem, & exinde in caput obrepere videbatur: hujusmodi motum egomet manu ventrem ejus comprimens planè persensit, & quamdiu palmis totis viribus obtentis istius globi ascensum inhiberem, se mediocriter habuit; quamprimum vero intumescencia istæc sensim superius obrepens ad caput pertigerit, illico membra totius corporis immaniter convellebantur, ut tanquam *spiritu malo* obsessus se ad parietes, & postes illideret: à quatuor robustis viris vix summa vi detineri, & coërceri potuit, quin exsiliret, & brachia, & pedes, & caput motibus diversimodis huc illuc jactaret: quando ab exsultatione cessaret, membra fuerunt robustissimè extenta, & musculi rigidi, & velut *tetano* affecti: Talis paroxysmus circiter horæ quadrantem durabat; dein ad se rediens sobrie loquutus est, in cubiculo obambulavit, qualia passus erat conscivit, & veniam ab astantibus petiit; brevi postea oculos invertere, & ocissime volutare cœpit; dein statim affectus spasmodes repetens, similem uti prius excitabat tragœdiam: atque isto ritu intra tres horas quinque aut sex paroxysmos ejusmodi convulsivos sustinuit: in medio quodam paroxysmo, vena in brachio pertusa, facto-que orificio satis largo, sanguis lente effluebat & statim congelari visus est: ita quidem ut in pelvim exceptus, haud liquidorum more in superficiem planam & æquabilem difflueret; at instar sevi liquefacti, & in vas frigidum instillati, gutta super guttam accumulata in molem accresceret.

Si affectio hæc stupenda mulieri contigisset, obvium esset, eam *hy-* ^{Casus præ-} *stERICAM* dicere, ejusque causam in *uteri* vitium conjicere; eo magis, quia ^{dicti Etio-} *logia.* tanquam molis cujusdam ab imo ventre ascensus paroxysmum inchoavit: attamen cum vulgaris ista solutio, quæ sæpissime merum ignorantia subterfugium est, in hoc casu admitti nequit; rationi maxime congruum videtur, omnia istæc symptomata in malas *cerebri* & *nervosi generis* affectiones referre. Enimvero morbi causam in ipso capite latere, ex symptomatis paroxysmum præcedentibus, quæ spirituum intra *ἐγκέφαλον* scamentium agitationem insignem denotabant, plane colligitur: ista *cerebri inflatio*, graves *Scotomia*, quæque insultu jamjam ingruente constanter evenerunt, *oculorum contorsiones*, manifesto arguunt particulas heterogeneas, & explosivas spiritibus intra *ἐγκέφαλον* juxta nervorum principia degen-

tibus accrevisse. Adeo ut hic casus etiam ad *Epilepsia* naturam prope accederet, excepto tamen quod intra *cerebri medullium* spiritus nec copulam heterogeneam admitterent, nec alibi explosi, illic tumultuarie percurrerent; durante enim paroxysmo agrotans usque animo constabat: at vero materies morbifica in capite uberius congesta, cum illinc in nervorum tum interiorum, tum exteriorum ductus altius prolaberetur, in visceribus tum imi, tum medii ventris, etiam in membris exterioribus, seminii explosivi mineras valde diffusas posuerat; adeo ut cum spiritu animales juxta *nervorum origines* explodi inciperent, illico statim alii *plexus mesentericos*, & deinceps alii *alios plexus nerveos* à meta extrema usque ad caput interjectos incolentes, ordine explosi, spasmos à parte in partem usque continuabant, donec ad *ἐγκέφαλον* perveniretur: exinde vero explosione statim ad spiritus *spinalis medullæ*, & *nervorum appendicum* hospites translata, musculorum, & membrorum totius corporis convulsiones validissimæ insequuntur sunt: Quod autem ille velut *molis ascensus*, qui sæpe numero in imo ventre, circa convulsionum initia percipitur, à spiritibus intra *plexus mesentericos* in explosiones adactis procedat, inferius cum de *passionibus hystericis* dicemus, fuse declarabitur.

Quare
spasmi à
nervorum
extremi-
tatibus in-
cipiunt.

Interea si inquiritur ob quam rationem paroxysmo convulsivo *ἐν τῷ ἐγκέφαλῳ* juxta nervorum origines incipiente, illico spiritus extime degentes (quotquot in illud symptoma prædispositi sunt) explosiones ineunt, adeoque affectionem spasmodicam illic plenius exorsam sursum transferant, (nam ita plerumque habet, siue morbi accessio in *imo ventre*, siue circa *medium abdomen*, *hypochondria*, aut *præcordia* incipit: quippe spasmus ab istis locis sensim versus caput prorepere solet.) Dico propter hujus solutionem hæc duo imprimis consideranda offerri, scilicet primo advertimus quod, cum spirituum integra quædam series perturbatur, qui in extremo ambitu resident influxu originali primo destituuntur; quare isti ante alios tumultuari, & irregulariter habere incipiunt: hinc quando nervus *cubiti*, aut *femoris* ab incubatu constringitur, ut solita spirituum influentia impediatur, stupor cum pruritionis sensu in *manus*, aut *pedis* digitis primo sentitur; unde sensim superius versus loca affecta perreptat. Secundo subest altera, eaque potior istius affectus ratio, nempe quod spiritus in explosiones parati, cum intra ductus nervosos, unum aut plures, quasi totidem distinctos tubulos continentur, spatium satis amplum requirunt, in quo plurimum, & quidem successive rarefieri & expandi queant; quod siquidem intra nervorum truncos à principio versus finem haud facile conceditur, idcirco dum spiritus circa originem nervosam primo elisi, versus *ἐγκέφαλον* resiliunt, proindeque vertiginem cient; spirituum explosio apertior circa nervorum processus inferiores, aut extremitates, ubi nervi caudex aut in plexus ampliores dilatatur, aut in plures fibras late dispersas terminatur, plerumque incipit: dein spiritibus istis explosis, statim aliis ordine succedentibus, quo pariter explodi possint, locus conceditur: Hinc observare est, dum spiritus exteriores exploduntur, si ligatura, aut compressione strictius facta, aliorum in idem spatium successio, aut versus exteriora progressus intercipitur, spasmus

ne fursum ascendat, inhiberi solet : quare cum stupor (prout historiae medicae testantur) ab extremo manus aut pedis digito exorsus, cum formicationis sensu, aut instar auræ frigida ad superiora repit, ac demum cerebrum petens, convulsiones horrendas infert ; si mox ab initio insultus brachium, aut crus fortiter ligetur, spasmus locum istum ligatum superare non valens, à capite conscendendo impeditur : quinimo usitatum est *fœminis hysterics*, quamprimum ventris intumefactio, sive molis in abdomine ascensus primo sentitur, medium corporis truncum fasciis circumpositis valde constringere, adeoque sæpius præcavetur, ne præcordia, & capitis regio eodem paroxysmo convulsivo afficiantur.

Quod autem sanguis medio paroxysmo eductus cito congelabatur, ita quidem fieri in affectibus convulsivis, & apoplecticis passim assolet, prout *doctissimus Heighmorus* ex recensione *Heidochii* prius annotavit : attamen quod nonnulli hinc contendunt, convulsiones omnino à sanguinis crassitie, motu impedito, & stagnatione pendere, minimè concedendum erit : quippe sanguis ab iis qui spasmodis obnoxii sunt, paulò ante paroxysmum detractus, sero dilutus, atque satis fluidus existit. Quapropter opinari liceat, congelationem istam ab ipso paroxysmo induci ; quia scil. in motibus convulsivis, ab immodicis muscutorum & viscerum contractionibus, sanguis interfluus, spiritu & sero ejus exhalantibus, aliquantulum in mixtione solvitur, & propterea aliquatenus coagulatur, non aliter, quàm cum lac, propter nimiam agitationem & partium ab invicem separationem, in butyrum concrevit : Quare hujusmodi sanguinis coagulatio videtur convulsionum potius esse effectus, quàm causa.

Quare sanguis in affectibus convulsivis cito congelatur.

Methodus therapeutica.

Quod spectat ad curationem ejusmodi affectionum spasmodicarum, quæ in fœminis, aut viris à causa morbifica nervorum origines obsidente procedunt. Prima indicatio erit morbi fomitem subtrahere, scil. impedire, quo minus sanguis particulas heterogeneas, aut in se genitas, aut aliunde à visceribus acceptas capiti affigat. In hanc rem *evacuatio*, & per *catharsin*, & per *phlebotomiam*, nisi aliquid contraindicat, instituta, commode adhiberi solet.

Vomitio sæpissimè juvamen præstat, quare *emetica* ex *infusione croci metallorum*, vel ex *sale vitrioli*, aut *vino scillitico* ab initio propinentur. Dein propediem sanguinis detractio, aut *phlebotomia* in brachio, aut *hirudinum succu* è venis sedalibus celebretur ; dein postea *lenis purgatio*, aut *pilulis*, aut *apozemate solutivo* instituatur, & tempestivè repetatur.

℞. Pilul. è succino Cratonis, vel Tartarearum Bontii ℥.ij. resin. Ialap. ḡ. xvj. Castorei ʒ. j. Olei rorismarini, vel succini ʒ. ʒ. Gummi Ammoniacci solut. in aq. hysterica q. s. f. pilula 16. sumantur quatuor die quolibet sexto aut septimo.

Emetica.
Cathartica.

℞. Rad. Polypodii qu. Lopathi acut. preparat. Cherefolii, an. ʒ. vj. Paonia maris ʒ. iiij. folior. Betonice, chamedryos, chamepityos, verberna, veronica maris, an. M. j. sum. carthami, bardana, an. ʒ. iiij. Coquantur in aq. fontan. lb. iiij. ad medietatem, adde vini albi lb. j. coletur in matrarium, cui imponatur folior. senna opt. ʒ. j. Rhabarbari ʒ. vj. Turbith Gummosi ʒ. ʒ. Epihymi, santal. citrin.

an. 3. ij. salis Absinthii, cochlearia, an. 3. j. Flavedinis cortic. Aurantii 3. ij. Digerantur clausa in calore arene per horas 12. Colatura usui servetur: edulcoretur (si opus sit) cum s. q. Syrupi Augustani, vel è cichorio cum Rhabarbaro. Dosis 3. vj. semel aut bis in hebdomade.

Singulis diebus quibus à purgatione vacat, remedia cerebrum corroborantia, quin & spiritus animales à copula heterogenea suscipienda, aut ab explosionibus inuendis vindicantia exhibeantur. De quibus tamen juxta agrotantis temperamentum, corporis habitum, & constitutionem delectus quidam instituatur: nam gracili corporis habitu, & sanguine fervidiori præditis medicamenta minus calida, quæque sanguinem haud supra modum exagitent, propinari debent: è contra phlegmaticis, & obesis, quorum urina tenuis & aquosa est, atque sanguis hebetius circulatur, visceraque infarciuntur; remedia calidiora, & humores insigniter fermentare apta designentur. In priori casu ad hunc modum præscribantur.

Corroborantia & Specifica. ℞. Conservæ flor. Betonica, Tamarisci, peonia maris, an. 3. ij. spec. diamargar. frigid. 3. j. β. pulv. rad. peonia, & seminis ejusdem, an. 3. j. Corallii rubr. præpar. 3. ij. Vitrioli Martis 3. ij. salis Absinthii 3. ij. cum s. q. succi Aurantior. f. Elect. capiat bis vel ter in die, superbibendo haustulum Iulapii infra præscripti.

Pulveres. ℞. Corallii rubri cum succo Aurantiorum in marmore, aut mortario vitreo triti & exsiccati 3. β. pulv. visci qu. rad. peonia maris, an. 3. ij. sacchari perlat. 3. iiij. f. pulvis. Dosis 3. j. ad 3. β. bis vel ter in die.

℞. Specier. diamargar. frigid. 3. ij. salis Absynthii 3. iiij. rad. aronis pulv. 3. j. misce, f. pulvis, dividatur in viginti partes, sumatur dosis m. e. & hora quarta.

℞. Pul. rad. Petasitidos 3. j. dos. 3. β. ad 3. j. bis in die.

Aqua destillata & Iulapia. ℞. Fol. bardane, ari, an. M. vj. incisa, & simul mista destillentur. Dosis 3. ij. ad iiij. bis vel ter in die, post dosin Electuarii, aut pulveris.

℞. Hujus aqua destillata lb. ij. Chalybis nostri præpar. 3. ij. misce in phiola, sumantur eodem modo.

℞. Aq. Jugland. simplicis, Cerasorum nigror. an. lb. β. Limacum 3. iiij. syr. flor. Paonia maris 3. ij. Dosis 3. j. β. ad ij. eodem modo.

Apozema. ℞. Rasur. Eboris, C. Cervi, an. 3. iiij. rad. cherefolii, bardane, valeriana, an. 3. β. folior. betonica, chamæpitios, scolopendrii, summit. Tamarisci, an. M. j. corticum Tamarisci, solani lignosi, an. 3. β. coquantur in aq. fontana lb. iiij. ad tertia partis consumptionem, adde vini albi 3. viij. coletur in lagenam, cui imponatur folior. beccabunga, cardamines, an. M. j. f. infusio tepida, & clausa per horas quatuor, colatura servetur in vitris oclusis. Dosis 3. vj. bis in die, post dosin medicamenti solidi. Interdum tali Apozemati infundantur chalybis nostri 3. ij. & sumatur eodem modo.

Remedia in temperamento frigidiori. Tempore æstivo aquar. acidularum usus convenit, in earum defectu nostræ artificiales substituantur.

Quod si ob rationes supra citatas, medicamenta calidiora indicantur, juxta methodum sequentem procedere licebit.

Electuarium. ℞. Conservæ anthos, flavedinis Aurantii, Limonii, an. 3. ij. nucum Jugland. & Myrabolanor. condit. an. num. ij. ligni Aloës, santali citrini, serpentaria, contrayerva, angelica, ari, an 3. j. vitrioli Martis (vel chalybis præpar.) 3. iiij. salis absynthii, cochlearia, an. 3. j. cum s. q. conditura nucum Juglandum, f. Electuarium.

Etuarium, sumatur bis in die qu. nucis mosch. superbibendo dosin liquoris appropriati.

℞. Rad. *Peonia maris*, angelica, corallii rubr. prepar. an. ℥. ij. sacchari solut. Tabula in aq. limacum, & ad tabulatum cocti ℥. vj. Olei succini rectificatissimi ℥. ℞. s. a. f. Tabula, singula pendant circiter ℥. ℞. una, aut altera sumatur bis vel ter in die, superbibendo dosin liquoris appropriati.

℞. Rad. *serpentaria Virginiana*, contrayerva, *Valeriana*, an. ℥. ij. corallii pilula rubr. prepar. margarit. an. ℥. j. Cort. *Vvinteran* rad. dictamni Cretici, an. ℥. j. vitrioli Martis, salis Absinthii an. ℥. j. ℞. Extract. Centaurii ℥. ij. Ammoniacy solut. in aq. hysterica q. s. f. massa pilularis. Sumantur quatuor pilula mane & hora quarta. p. m.

℞. Sp. C. Cervi, aut fuliginis, vel sanguinis humani, vel salis Ammoniacy q. Spiritus s. sumantur gutt. 10. ad 12. mane, & vespere in cochleari Iulapii, superbibendo haustulum ejusdem.

℞. Folior. betonica, verbenae, salvia, cardamina, ari, bardana, an. M. ij. In- Aqua de gland. viridium num. 20. cortices 6. Aurantior. & quatuor Limonum, carda- fillata. mom. cubebae an. ℥. j. concisis, & contusis affunde seri lactis è pomaceo, aut vino albo facti ℔. vj. destillentur s. a. dosis ℥. ij. vel iiij. bis in die post dosin medicamenti solidi. Hujus ℔. ij. adde Chalybis nostri ℥. ij.

℞. Aq. Lumbric. limacum, an. ℥. vj. Ingland. simplicis ℥. iiij. Raphani compositi ℥. ij. sacchari albissimi ℥. ij. f. Iulaprium. Dosin cochlearia 4. vel 6. bis in die post dosin medicamenti solidi.

℞. Millepedum mundator. ℔. j. caryophyllor. concis. ℥. ℞. superaffunde vini albi ℔. ij. destillentur in cucurbita vitrea, dosis ℥. j. ad ℥. j. ℞. bis in die.

Pauperioribus per remedia facilius parabilia ad hunc modum consulatur.

℞. Conserva folior. ruta cum aq. p. sacchari facta ℥. vj. sumatur quantitas Nucis Moschat. bis in die superbibendo decoct. sem. & rad. bardana in sero lactis cum vino albo parat.

Vel paretur Conserva ex foliis Arboris vite cum equali parte sacchari, dosis ℥. ℞. ad ℥. j. bis in die.

℞. Pulveris Millepedum prepar. ℥. iiij. sem. ameos ℥. j. f. pulvis, dividatur in 10. partes, sumatur dosis bis in die: vel asellis 12. contusis cum vino albo affuso, exprimatur succus, f. haustus, sumatur bis in die.

Interea dum hæc remedia intus sumuntur, convenit interdum vesicatoriis in nucha, & pone aures applicatis ulcuscula excitare; ita namque serosi, & acres humores à capite plurimum emulgentur: porro sternutatoria, & apophlegmatismi non raro juvamen insigne præstant. Sanguinis detractio è venis sedalibus, aut è pede aliquoties iterari debet, quin & urgente affectu, emplastra, vel cataplasmata plantis pedum utiliter adhibentur, Juvat etiam circa suras, & femora epispastica admoveere.

CAPUT VI.

De motibus Convulsivis, quorum causa circa nervorum extremitates, aut intra plexus nerveos subsistit.

Affectiones spasmodicas interdum absque capitis vitio, à spirituum circa nervorum extremitates scatentium irritatione, explosioneque oriri, vel hinc constat, quia cum *pharmaca* ventriculi, aut intestinorum tunicas acrius vellicant, aut *lumbrici* eas corrodunt, non tantum in istis partibus succedunt spasmi, sed insuper motus convulsivi nonnunquam in membra, & artus exteriores retorquentur: enimvero, prout alibi ostendimus, cum partem aliquam gravioris molestiae sensus excruciat, & ab illa *primo sensu* communicatur; exinde spiritibus ibidem irritatis motus involuntarius & irregularis reflecti solet; idque non tantum per eosdem nervos, quibus doloris sensus afferebatur, sed interdum etiam per alios aut affines, aut prorsus extraneos spasmus recipiatur. Ita lapis *ureteri* infixus, fibrasque ejus nerveas plurimum irritans, motus convulsivos non tantum in vase affecto, sed in cunctis fere abdominis visceribus excitat: adeo ut urina suppressa, tormina huc illuc diffusa, & vomitiones horrendae ut plurimum succedant. Quapropter minimè ambigendum est, etiam morbos, & symptomata quaedam spasmodica, propter noxam externam *nervorum a scibus* inter *membranas, musculos, aut viscera* terminatis illatam saepenumero induci: quinimo in *passionibus hystericis, hypochondriacis* & quibusdam aliis, si quando motus convulsivi, capite illaeso, *uteri, lienis* aut alius visceris culpa excitantur; nã illi hac solum ratione, nempe reliquarum partium incommodis hac via per *nervos*, nullatenus autem per *vapores* ad cerebrum translatis, oriuntur, ac quoquoeversum in varias corporis regiones propagantur.

Spasmi à nervorum finibus incipiunt, propter irritationem. Hic autem adnotetur, quod licet *causa evidens* solitaria, siquidem ea fortis ac vehemens fuerit, convulsiones interdum per se, & absque dispositione prævía inducat; quatenus nimirum spiritus animales supra modum irritati, explosiones debito majores & plusquam ordinarias ineunt; prout in *hypercatharsi, ac paroxysmis colicis, & nephriticis* passim evenire solet; attamen in plerisque aliis affectibus spasmodicis, quorum accessiones sunt crebrae & habituales, præter *irritationem* circa nervorum extremitates factam, quæ ut plurimum causæ evidentis loco est, etiam *procatarxis* quaedam adest, cujus efficaciam morbi insultus præcipuè debetur; nempe cum motus convulsivi *lienis uteri, aut alius privatae partis* vitio excitari, ac crebra vice repetere solent, suspicari licet, quod *spiritus animales* fibrarum in parte affecta, & in vicinia ejus dispositarum incolæ, *copulam heterogeneam, & explosivam* prius contraxerant, qua ad plenitudinem saturi, levi occasione

Et propter copulam explosivam.

occasione in explosiones spasmodicas cientur : dein istæ circa *nervorum extremitates* primo inceptæ eorundem nervorum ductu sursum perreptant, & non raro ad ipsam *originem nervosam* ac interdum ulterius ad *cerebri medullam* traducuntur : à quo denuo in genus nervosum reflexæ, etiam membrorum, ac *artuum spasmos* secundario inferunt : postquam vero cerebrum, & superior systematis nervosi portio, spasmis infra excitatis sæpius compati & coaffici assueverunt, etiam spiritus istarum partium incolæ ipsi tandem adulterari, copulam heterogeneam, & explosivam admittere, adeoque in causæ procatarcticæ partem adscisci incipiunt ; hinc demum procatarxis spasmodica utrique caudicis cujusdam nervosi termino communis evadit, atque spiritus animales in nervi unius, aut plurium tum *capite*, tum *cauda* male dispositi, ab alterutro explosiones concipiunt, easque alteri statim tradunt, prout infra cùm de *passionibus hystericis*, aliisque speciatim dicemus, fusius declarabitur : Interim *historias* quasdam, & *observationes* spasmodorum à nervorum extremitatibus oriundorum subjiciemus.

Virgo lætissima circa 16. ætatis suæ annum ab equo decidens, & saxo I. protuberanti allisa, mammam sinistram graviter læsit, unde tumor cum Observa- dolore exortus est ; quæ tamen symptomata ab initio remediorum usu tio. mitigari, & deinceps ad longum tempus mediocriter habere visa sunt ; post triennium vero à frigore suscepto, ac pessima victus ratione adhibita, omnia exacerbari cœperunt : pars læsa in majorem molem intumescens dolore peracuto, & fere constanti afficiebatur, ut ægrotans præ insigni cruciatu dies & noctes plerasque insomnes degerit, mammaeque glandulas tumidiores tunc factas nec tangi, nec pertractari, imo ne strepitum quævis, aut concussionem in cubiculo factam sufferre potuerit.

Cum huic tumori versus cancerosum degeneri, foci & cataplasmata ex *cicuta*, & *mandragora*, aliisque stupefacientibus, & percussivis applicarentur, perillustri Domina affectiones quasdam spasmodicas crebra vice infestantes pati cœpit : imprimis quoties in mamma dolor atrocius urgeret, illic loci punctiones, necnon spasmos ac contracturas huc illuc excurrentes persensit : deinde statim ventriculus ac hypochondria, & non raro totum abdomen cum rugitu & vomendi nixu inflari, ac plurimum distendi solebant ; mox idem affectus sensim ad superiora translatus *αναισθησις* excitabat, cui brevi postea motus convulsivi in toto corpore adeo validi succedebant, ut ægrotans vix à tribus aut quatuor robustis viris contineri potuerit.

Hujusmodi paroxysmi primò erant vagi, & occasionaliter tantum excitati ; nempe succedebant quoties dolor pectoris à causa quadam evidenti intenderetur : postea convulsiones istæ crebrius infestabant : ac demum periodicæ, ac habituales factæ, bis in die, nempe totidem stasis horis à pastu constanter repetere solebant. Cumque ad hunc modum per sex menses ægrotans miserrime affligeretur, tandem *vertiginoso capitis affectu*, eam fere continuo exercente molestari cœpit ; cui malo cum foci ex herbis aromaticis & cephalicis capiti aliquandiu adhiberetur, quoad *vertiginem* melius habuit ; verum exinde novo & plane admirando sympto-

mate, *tussi* scilicet *inani* absque sputo dies & noctes, nisi cum somno obrueretur, perpetuo infestabatur: postquam clarissima hæc virgo diversimoda remedia à variis medicis præscripta absque multo commodo tentaverat, demum *thermis temperatis* apud *Bathoniam* usa juvabatur, deinde statim nupta, à *conceptu* ac *puerperio* sensim convaluit.

Ejus *Ætio-
logia.*

Si totius morbi ejusque accidentium rationes inquirentur, extra dubium est, affectionem convulsivam à *mammæ tumore*, sive loco dolente primo excitatam fuisse; cujus causa partim fuit acutissimus doloris sensus, à fibris ac nervis istius partis impressus, partim autem *copula heterogenea* spiritibus istarum fibrarum nervorumque incolis affixa; enimvero suspicari licet humorem accerrimum tumori impactum, qui forsan aliquatenus nervorum ductibus illuc confluerat, Topicorum usu percussus, fibras & filamenta nervea per totam viciniam disposita subiisse, proindeque copulam heterogeneam & explosivam spiritibus accrevisse; ad quam elidendam, quoties à dolore incitabantur, explosiones spasmodicas inibant, simulque spiritus alii intra nervos affines scatentes priorum consensu (uti crebro assolet) pari ritu explodebantur: dein affectio spasmodica nervorum extremitatibus ubi primo inceperat, per eorundem ductus usque ad *ἐν κέφαλον* continuata, *ἀνασθεντία*, & exinde in totum systema nervosum resiliens, artuum & membrorum omnium motus convulsivos inferre solebat: circa ægritudinis initium paroxysmi ad hunc modum à parte affecta propter dolorem excitati, ad cerebrum & appendicem ejus secundario traducebantur: postea vero cum spiritus horum incolæ per sympathiam crebro explosi, partium continentium poros ita laxarant & debilitaverant, ut intra eosdem, una cum succo nervoso, particulis quibuscumque heterogeneis aditus patefceret, *procatarxis spasmodica* etiam in *capite* succrescebat, atque spiritus *ἐν κέφαλον* incolentes, copula heterogenea infecti, paroxysmum spasmodicum ipsi inchoabant, aut saltem insultibus ejus primos instinctus præbuere, qui ut plurimum à pastu totidem statis horis redibant; quia scilicet materies morbifica unà cum succo nervoso æquali fere dimenso inferebatur: revera in ejusmodi casibus ubi convulsio generalis ferè omnes totius systematis nervosi partes successive occupat, suspicari licet spiritus animales in toto genere nervoso copulam heterogeneam & explosivam contraxisse, quæ cum statò tempore ad plenitudinem assurgat, ipsos spiritus pariter hora condita ad explosionem incitat: eademque explosio alicubi inchoata, fomitis ignarii ritu, in omnes ordine propagatur.

Quod spectat ad *tussim* istam *inane*, quæ capitis fomentationi succedens, ægrotantem istam per plures menses fere incessanter exercuit, videtur quod symptoma istud omnino ab *origine nervosa affecta*, & nequaquam à *pulmonum infarctu* penderet, nihil enim tussi excernebat, & si quando istum tussendi impetum violenter inhiberet, statim in gutture præfocationis sensu afficiebatur: adeo ut verisimilius sit materiem morificam prope originem nervosam depositam, à foris rarefactam, & commotam, nervorum pulmonibus dicatorum capita altius subiisse, atque in fibris, & filamentis eorum spasmos perpetuos irritasse: simili quodam ritu ac cum succus nervosus qui musculorum fibras & tendines irrigat, acris, ac degener

degener factus, partibus iis subsultus, ac contracturas continuas inducit. Hinc quando spasmus in aliquibus nervorum affectorum surculis sisteretur, ita ut tussire non liceret, statim motus convulsivus in surculos alios ejusdem, aut affinis nervi incurrens, præfocationem in gutture excitabat. Libet hic exemplum aliud spasmi à nervorum extremitatibus affectis oriundi proponere.

Clarissima Mairona quinquagenaria postquam ei menstrua per sesquiannum fluere desierant, primo de dolore pungitivo in mamma sinistra queri coepit; dein postea illo affectu cessante, circa ventriculum male habuit; illic nimirum tumor durus, & velut scirrhusus cum dolore gravativo subortus est: huic stomachi inflatio cum respiratione difficili, nausea, & vomitione crebra supervenit: dein morbo ingravescente, dolore magis acuto, & huc illuc quaquaversus excurrente, in affectiones ventriculi convulsivas incidit: nempe illic loci spasmis varie excurrentibus, haud secus ac si ventriculus multifariam distraheretur, fere continuo molestabatur: porro cum siti & vigiliis, constans animi perturbatio, & crebra spirituum deliquia, quasi jamjam moribunda esset, Dominam ægrotantem exercebant: quæ tamen omnia symptomata ex isto ventriculi tumore semper oriri, eadem plane persensit: Huic medicamina quævis vomitoria, cathartica, antiscorbutica, & hysterica, absque ullo levamine, molestiæ potius & nocumento fuisse videbantur: à sanguinis missione per hirudines, & lactis asinini usu nonnihil commodi recepit, & postea ab acidulis diu epotis plurimum alleviabatur.

Prædicta symptomata, quæ vulgo *passioni hysterica*, & *vaporibus uterinis* Eius ascriberentur, palam est à tumore circa ventriculi fundum excitato processisse: quippe sanguis Domine isti valde fervidus & atrabilarius existens, cum non amplius catameniorum fluxu purgaretur, recrementa sua & fæculentias adustas primo in mamma, & deinde novo incepto, in stomachi membranis deposuit: à tumore ibidem facto particulæ acres & heterogeneæ perpetim decedentes, fibras, & nervos circumcirca confitos subie-rant; quæ spiritibus earum partium insitis, influisque continuo accrescentes, ipsos ad crebras explosiones, adeoque affectiones spasmodicas in tota vicinia excitabant: quandoquidem vero motus convulsivi illic loci habiti leviores fuerint, hinc apparet totum nervosum genus, ipsumque ἐντέραν (prout in spasmis majoribus assolet) in eundem affectum nondum consensisse: attamen spirituum inordinatio circa partes affectas exorsa, & illinc minori undulatione ad caput traducta, ejusque adeo spiritus incolas leviter tantum afficiens, vigilias cum ingenti æstu, & phantasiæ perturbatione inducebat. Quæ hætenus de spasmis à causa morbifica alterutrum systematis nervosi finem obsidente differuimus, clarius elucescent, cum postea de præcipuis convulsionum speciebus, de *passionibus scilicet hystericis, hypochondriacis*, aliisque particulatim agemus: Interea huic, de spasmis propter nervorum extremitates affectas oriundis, hypothesei methodum therapeuticam non opus erit adjicere, quoniam medendirationes hujusmodi pathematis postea speciatim tradendis melius accommodari possunt: Inpræsentiarum vero procedere oportet ad explicandas

passiones spasmodicas, quarum causa, sive materies morbifica intra *plexus nerveos* subsistere videtur.

*Plexus
nerveos
materia
spasmodi-
ca sedem
esse.*

3.
*Obser-
vatio.*

De plexibus nerveis alibi satis fuse differuimus, atque ex illorum *descriptione & usu* verisimillimum esse ostendimus *motuum convulsivorum* paroxysmos graviores intra hasce partes sæpenumero incipientes, exinde quaquaversus in viciniam, & non raro in longinquum propagari: saltem multo probabilius videri, particulas heterogeneas & explosivas, postquam τὸ ἐγκέφαλον, ejusque appendis medullaris tractus superaverint, inque nervorum canales, eorumque ductus, una cum succo ipsos irritante altius prolapsas, intra *plexus nerveos*, velut *compita*, sive *diverticula*, copias explicare, ibidemque aliquandiu *stativa* habere, donec tandem uberius aggestæ, quasi collectis viribus, affectiones *spasmodicas* immaniores producant: hoc, inquam, longe probabilius apparet, quam (quod vulgo fit) ex *utero, liene, ventriculo, aliove viscere vapores elevatos* supponere, in quos omnis culpa ex facili conjiciatur: Nam intra *hosce plexus* promineris morbificis spatia satis idonea conceduntur, ut materies illic sensim *deponi* possit, & *manere*, donec ad plenitudinem congeratur: deinde vero, quia *spirituum copias ingentes*, supra quam in aliis quibuscunque cellulis, illic hospitari credimus, *copula heterogenea* iis accrescens in *explosiones graviores* quasi *fomitum* struit; adeo ut spiritus intra hæc corpora explosi ea non modo inflent, & dilatent, verum *desitu elevent*, & *attollant*; (velut cum ædificium à *pulvere pyrio* subvertitur) quare partes suprajacentes subito in tumorem efferuntur, atque appensæ huc illuc violenter contrahuntur. Ad hunc modum atrociores circa præcordia & viscera convulsionum paroxysmos sæpenumero excitari, præter argumenta ex ratione petita; non ita pridem αὐτοψία comprobatum habui: Cum enim foeminæ illustrissimæ paulo ante obitum *affectibus* (quos dicunt) *hystericis* gravissimè laborantis cadaver aperirem, uterum quidem prorsus inson-tem reperi: verum juxta *mesenterii plexus nerveos* (uti videbatur) in molem attolli, & elevari solitos, visceris istius *membranas ab invicem divulsas & solutas*, ut circumquaque *tumida & laxæ, quasi in bullulas, sive vesiculas inflata* apparerent.

Profecto plura sunt *rationum solidarum* momenta, quibus adducimur ut credamus *pathemata dicta hystERICA* sæpissime à materia spasmodica intra *plexus mesentericos* aggesta, & per vices explosa oriri: quod quidem ubi de morbis istis speciatim agemus, clarius patebit: sed neque minus probabile est, *dolores colicos* à materia acriori, & irritativa, *iisdem plexibus* contenta non raro procedere. Cæterum quoties *paroxysmi convulsivi* à *liene, aut ventriculo* incipere videntur, utpote quorum initia sunt partium istarum inflationes, & perturbationes insignes, verisimile est *materiæ spasmodicæ* nidum intra *plexus nerveos* ad *lienem*, aut *ventriculum* pertinentes reconditum fuisse: Quinetiam ejusmodi materies, intra *plexus cardiacos* gravissimos *cordis tremores & passiones*, intra *plexus pneumonicos*, aut *cervicales*, terribiles *asthmatis insultus* excitare videtur. In Neurologia nostra casum insignem perillustri foeminæ retulimus, cui materies serosa è *syn-
cipite per nares* sinistram exstillari solita, pone *aurem* decubuerat: ubi cum

dolor.

dolor atrocissimus infestaret, *spasmi* insuper & *contractiones* admiranda succedebant : quibus scil. modo *cerebri* & *totius ὑπεράλλε* compages deorsum, modo *guttur*, *præcordia*, & *viscera sursum* convelli viderentur : cujusmodi convulsiones partes ita oppositas, & longe dissitas per vices afficientes, cum ab una eademque morbi sede in medio consita procederent ; obvium erit concipere, locum dolentem, uti & affectionis utriusque spasmodicæ originem, fuisse *plexum ganglioformem*, juxta *parotidas* situm : in quem scilicet nervi tum *pari vagi* è *capite descendentes* ingrediuntur, & è quo *propagines* in *gutturis musculos*, atque *rami* in *præcordia* & *viscera* protenduntur. Porro ab eadem causa, scilicet materia *πασμώδεια* intra *plexus ganglioformes* aggesta & per vices explosa, istum in *gutturæ præfocationis sensum* in paroxysmis convulsivis tam crebro excitatum procedere (nec immerito) arbitramur. Verum super his quando morbos, & symptomata *πασμώδεια* particulatim tractabimus, erit opportunior dicendi locus. Quod restat de *convulsionum*, quarum supra mentionem fecimus, *specie ultima*, quæ nempe in *liquore nervoso per totam sui massam* particulis heterogeneis & explosivis infecto, proindeque *totos nervorum, corporumque nervorum processus* in *spasmos universales*, eosque aut *continuos*, aut *intermittentes* irritante dependet, modo disquirere incumbit.

CAPUT VII.

De motibus convulsivis, à liquore corpora nervosa irrigante, totosque eorum processus in spasmos irritante, oriundis.

Affectiones convulsivas aliquando per totum genus nervosum vagari, atque partes modo has, modo illas, modo plurimas simul infestare, adeo notum est, & experientiæ fere quotidianæ obvium, ut nihil magis : quippe advertere licet in his, musculorum tendines ubique subsilire, *spasmi* contrahi ; in aliis membra quævis exteriora, variis flexionibus contorsionibusque huc illuc multifariam flecti, aut extendi. Vidimus nonnullos spirituum effræni & indomita vi coactos, modo veluti *æstro* percitos currere, aut salire, modo pedibus, aut pugnis terram, vel objecta quævis validissimè contundere : quod ni facerent, illico in *lipothymias*, & horrenda spirituum deliquia incidere. Nimii esset tædii singulos *casus spasmodorum universalium*, & per totum genus nervosum oberrantium enumerare : istiusmodi autem symptomata, licet varia & multiplicia fuerint, ad *tria* tamen capita, præcipua quodammodo reduci possunt ; nimirum quatenus à *tribus causarum generibus* potissimum dependent : quandoquidem enim in *vagis* hisce *spasmi* supponere debemus totum *liquorem nervosum* vitiari, atque spiritus animales in eodem ubique scatentes adul-

*Spasmodi
universa-
lium tria
potissimè
causarum
genera.*

rari, proindeque fere perpetim explodi; Advertere licet ejusmodi labem, & succo nervoso, & spiritibus ubique influis, uno, aut altero ex tribus hisce modis, ut plurimum imprimi; scil. primò, vel à venenis, aut veneficiis. Secundò, vel à febre maligna, aut male judicata, in quibus scil. materies morbifica in cerebrum, aut nervosum genus suffunditur: vel tertio cum liquor nervosus longo temporis tractu, propter affectionem scorbuticam, aut alias vitiosam, à debita crasi in liquorem acrem, aut acidum, aut alio modo præternaturalem, & spasmodicum degenerat. Libet hic singulos prædictos casus considerare, & primò de spasmi insultibus qui à venenis aut veneficiis producuntur.

A venenis & veneficiis. Primò igitur, venena quædam in liquorem nervosum, potius quam in sanguinem agere, quæ illum depravantia, affectiones spasmodicas potissimum inducunt, alibi à nobis ostensum est; & liquido constat ex comestione cicutarie, apii risus, mandragora, solani furiosi, pastinaca sylvestris, aliarumque herbarum noxiarum, quam nempe brevi subsequi solent horrenda ventriculi contractiones delirium, atque in toto corpore tendinum spasmi, ac subsultus: porro ejusmodi affectiones convulsivæ succedunt in demorsis à cane rabido, aliisque feris venenatis; ubi miasma virulentum à succo nervoso susceptum, in eodem diu delitescens, se tandem exerit, atque totam liquoris quo involvitur, massam fermento suo inficit ac venenat: Id quod clarius adhuc & liquidius illustrent symptomata admiranda, spasmi nimirum dolorifici, & indefessa saltatio, quæ tarantula morsui succedere ab authoribus perhibentur; & possint quidem fabulosa videri, nisi quod rei veritas à pluribus bonæ fidei viris, tum antiquis, tum recentioribus asseritur: Nam præter Mathiolum, & Epiphanium Ferdinandum, Gassendus, & Kircherus addunt se affectus istius testes oculatos fuisse: quinimo fertur in Apulia notissimum esse, & usu fere quotidiano receptum; nempe in regione isthac phalangii, sive aranea genus quoddam extare, quod Tarantula, à Tarento antiqua Apulia urbe, appellatur. Animalculum hoc in æstate valde frequens, incolas incautos sæpe mordet, atque ictu venenato afficit, unde statim dolor in parte læsa, cum tumore, pruritu, mox in variis corporis partibus stupor, & tremor, necnon membrorum convulsiones & resolutiones, aliaque symptomata spasmodica, cum summa virium prostratione succedunt; uti ex Mathiolo, Ferdinando, aliisque stupendam hujus morbi pathologiam enarrantibus, colligere datur. At vero maxima admiratione dignum est, quod de Curatione hujus affectus isti Authores referunt, atque per totam regionem vulgò in praxi est: Namque icti à Tarantula, utut graviter laborant, auditis musicis instrumentis, statim à plangoribus cessant, atque in medium proficientes, tripudiare, ac saltare incipiunt; tamque diu rem persequuntur, ac si sani essent, ac nullo unquam teneantur dolore: quod si eveniat, ut Tibicines tantillum quiescant, non multo post tempore in terram concidunt, ac ad pristinos redeunt languores, nisi tamdiu sonitu indefinente saliunt, atque tripudiant, donec venenum penitus discutiatur. Ob id igitur Tibicines stipendio conducuntur, alternatimque mutantur, ut absque ulla sonitus intermissione, tamdiu tripudiant demorsi, quousque penitus curati conquiescunt. Ita Mathiolus: Quibus addit Ferdinandus, pauperes in Apulia omnem ferè substantiam suam in musicos & Tibicines

Tibicines erogare, qui per totam illam provinciam evagantur, & Tarantatis inserviando, multum lucri faciunt: & quidem tripudiant, ac saltant intra oppida, in publicis plateis, in agris, alii uno die, alii una hebdomada, alii pluribus. His Authoribus suffragantur viri Doctissimi Gassendus & Kircherus, quorum utrique ex propria observatione referunt, se taliter affectos novisse, asseruntque ipsos haud quavis musica indifferenter, at certis cantilenarum generibus affici, excitari, ac ad numeros quosdam, præ aliis tripudiare.

In prædictorum *accidentium rationes* ut, si quid conjectura assequi possimus, paululum modo inquiramus; imprimis extra dubium habetur, ab animalculi istius morfu miasmata quædam venenata corpori humano infigi, quæ tamen *sanguini, & spiritui vitali* minus infesta, quamprimum ex ipso in *liquorem nervosum* transierint, per totam ejus massam, fermenti instar, statim se explicant, atque spiritus animales ubivis in ea scatentes inficiunt; ita quidem ut ipsi ab invicem distracti, & huc illuc inordinatè agitati, affectiones spasmodicas inducant, quas partium continentium modo *contractura, modo languor, & resolutio* comitantur.

Cur autem, quæ à *Tarantula* morfu convulsiones dolorificæ suscitantur, statim à *musica* sedatæ, in *saltationem* commutari solent, non ita plane constat. Quod nonnulli asserunt, animalculum hoc (siquidem teste Aristotele *κορδατορ* fuerit) *musica* delectari, atque eapropter venenum ejus homini inditum, humores fermentando, parem *musica* amorem inducere: hæc, inquam, conjectura animo veritatis avido minus satisfacit, utpote quæ in *araneo* naturam *philomusicam*, eandemque postea cum homine, per *metastasin*, seu velut *μετεμψυχωσιν* quandam communicatam supponit; quæ quidem utraque & *gratis dicta* sunt, & minus arrident; quin potius dicendum videtur, venenum à morfu *Tarantula* liquori nervoso inflictum, mitius esse, quam ut spiritus animales penitus extinguere valeat, aut distractos prorsus dissipare, & in explosiones immaniores cogere; sed eos tantum in fugam conjicere, fugatosque hinc in spasmos leviores, ac fere tantum dolorificos incitare; at vero *musicam*, blanda mulcedine sua spiritus ita dissipatos facile una congregare, ac mutuo associare: quapropter cum iidem spiritus, ob miasmata virulenta ipsis adhærentia, usque in motus involuntarios, & convulsivos apti fuerint, *melodia* eos simul allectos, in tales spasmos disponit, ac dirigit, ut serie, ac ordine quodam, nervorum corpora subeuntes, certis velut in cancellis, ac orbitis ferantur, donec tandem veneni particulis penitus evaporatis, atque spirituum furore, ac impetu delassato, æstrum illud omnino excusserint. Enimvero *musica* homines sanos & sobrios, etiam invitos, aut aliud cogitantes, in actiones modulaminis auditi æmulas facile rapit; ut primo statim *Tibicinis* inflatu adstantes manus & pedes agitare incipiant, & vix, ac ne vix à saltando se contineant: ne quis ergo miretur, in hominibus à *Tarantula* demorsis, ubi spiritus animales, velut stimulis agitati, huc illuc sponte exsilire, & divagari coguntur, si ad citharæ impulsus in saltationes, & motus compositos excitentur; adeo ut in hisce affectibus *musica* spiritus debacchantes velut incantans, eorumque motus convulsivos quodammodo regens, atque commutans, *antidoti* loco habeatur: in quantum scil. spiritus animales ad

Symptomatum
Tarantula d. mor-
forum
Ætiologia.

In sedandis symptomatis
musica
ratio in-
quod con-
sistat.

hunc modum diu ac multum exerciti, *copulam elasticam à veneno* aut alias contractam, penitus excutiunt, ipsique plurimum defatigati, demum ab *æstro*, seu incitatione sua conquiescunt.

*Chorea
S. Viti de
scriptio.*

Huic affine est malum, quod *Chorea S. Viti* appellatur, de quo refert *Gregorius Horstius*, se cum mulieribus quibusdam locutum, quæ quotannis *Sacellum S. Viti*, quod est in finibus *Vlmensium*, visitant, ibidemque saltu cum perturbatione mentis, eoque sese nocte dieque exercent, donec ecstaticarum instar corruunt: qua ratione sibi restituta videntur, ut parum, vel nihil sentiant per annum integrum, usque ad *Maii* tempus subsequens, ubi membrorum inquietudine eoque sese torqueri referunt, ut vicissim circa festum *S. Viti* ad prædictum locum, saltationis gratia, sese conferre cogantur. *Horst. Epist. med. sect. 7. de admirandis convulsionibus.*

Eius Ætiologia.

Profecto usitatum est (prout sæpius observavi) tum viros, tum foeminas, interdum ea membrorum inquietudine, & velut *æstro* quodam urgeri, ut necesse habuerint usque ad lassitudinem ambulare, quin etiam saltare, huc illuc discurrere, ut hac ratione graviores molestias, & lipothymias alioquin invasuras evitare possint. Quorum ratio videtur esse, quod spiritus animales, quatenus in toto nervoso genere à copula heterogenea incitati, efferi prorsus ac effrænes evadunt: quos quidem ita exerceri, atterique opus est, tum ut ipsi perdomentur, tum ut copula explosiva excutiat.

*Spasmi
universa-
les à ve-
nificio.*

Affectiones convulsivas interdum à *veneficio* excitari, & vulgò creditur, & à multis fide dignis Authoribus passim asseritur: & quidem ut concedamus, admiranda in corpore humano pathemata à *diaboli prestigiis* sæpenumero produci; quatenus nimirum iste pro mira, qua pollet, agendi subtilitate, *anima sensitiva*, sive spirituum animalium systasi atomos, sive corpuscula heterogenea insinuat, adeoque functionibus ejus modò stimulos addit, modo vincula injicit, modo eas in perversum rapit: quinetiam aliquo modo ipse corpus humanum subit, & quasi altera anima potentior ei coextenditur; singulas partes, & membra actuat; vigore insolito inspirat, ac pro libitu suo regit, ac ad facinora immania & supernaturalia perpetranda incitat: attamen omnia spasmodorum genera, quæ præter communem istius morbi morem, prodigiosa apparent, non statim *sagarum incantamentis* inscribi debent, aut *Demon* *δαίμων* *μυχαῖν* semper in scenam vo-

*Qui vul-
go, sed
falso ha-
biti.*

*Eorum
Ætiolo-
gia.*

candus. Enimvero quoties è potentioribus cuipiam viro natus, aut affinis spasmodis fortè atrocioribus & insolitis corripitur, plerumque fit, ut *vetula* mox proxima *veneficii* accusetur, rea peragatur, laqueumque aut flammam vix, ac ne vix quidem misera evadat; cum interim morbus à causis merè naturalibus procedens, non alio *exorcismo*, quam remediis contra affectiones convulsivas præscribi solitis facile curetur: Revera spiritus animales copula explosiva immaniori præditi, & ab ea confertim elisi, tantum roboris, ac vigoris supra propriam ac solitam suam potestatem exerunt, quantum *flamma pulveris pyrii* supra flammæ communis deflagrationem; adeo ut qui morbo huic obnoxii extra paroxysmum levissimo unius viri ductu regi, attolli, & quo libitum erit agi potuerint, eodem urgente, quatuor ad minus robustorum hominum ultimos conatus, nixusque eludant: Sin vero in cujusquam laborantis casu *veneficii*,

aut

aut *fascinationis* suspicio exoritur, duo sunt imprimis motuum genera, *Qui veneficium arguunt.* quæ hanc creare, & fovere solent, scilicet primò si patiens ejusmodi membrorum, aut totius corporis contorsiones, aut gesticulationes perficiat, quas nemo sanus, ne quidem *mimus*, aut *gesticulator* quispiam, imitari solet. Dein secundo, si robur exerat, quod vim omnem humanam superat: quibus si rerum monstrosarum excretiones accedant, uti cum *acidularum fasciculi*, prout refert *Henricus ab Heers*, rejiciuntur vomitu, aut *viva anguilla*, prout refert *Cornelius Gemma*, per sedem dejicitur, extra dubium ponitur, in hac *tragædia* diabolum partes suas habere, & agere.

Obvium hic esset plurimas, & quidem admirandas hominum cujusque ætatis & sexus, more stupendo, & tanquam supernaturali, cum manifesta *veneficii* suspicione affectorum historias congerere: tales enim apud Authores tum *medicos*, tum *philosophos* passim extant; quin & morbos à *fascinatione* excitatos, in unaquaque fere regione sæpius evenire, vulgaris rumor perstre-pit: attamen quoniam ejusmodi casus, vel *impostura* sunt pleni, vel admirationis creandæ gratia, *fiçtitis narrantium commentis* semper aucti, eos (siquidem & rarius sub *Therapensi medica* cadunt) hic consulto prætermittam. Quod superest, proximam convulsionum universalium speciem, qualis nempe *febris malignis*, aliisve *anomalis*, aut *male judicatis* supervenit, explicare pergam.

CAPUT VIII.

De spasmodis universalibus, qui in febribus malignis, male judicatis, & quibusdam anomalis excitari solent.

Convulsiones febricitantibus interdum accidere, nullus è vulgo fere est, *Spasmi* quin passim advertat, & exinde *mortis*, aut *periculi* insigne *prognosticum* *universa-* desumat: Enimvero in *febris malignis*, item aliquando in ordinariis *male* *les febris* *judicatis*, prout *vertigo*, aut *delirium* à materia morbifica è sanguine in *cere-* *bus acci-* *dentes.* *brum* deposita oriuntur, sic ab eadem in *nervosum genus* delapsa, *musculorum*, ac *tendinum contractura* & *subsultus*, necnon membrorum, ac artuum subitæ *succussiones*, ac interdum in toto corpore *rigores horridi* succedunt: Cujus- *sympto-* *matum* *Ætiologia.* modi symptomatum ratio in eo consistere videtur, quod liquor partium *nervosarum* irriguus, particulis heterogeneis, ac spirituum irritativis ubique *scateat*: propterea namque *spiritus* tum *instui*, tum *insiti* ab æquabili suo *ef-* *fluxu* & emanatione perturbati, in crebras *explosiones*, & continuos quasi *crepitus* incitantur; non absimili ritu, ac cum *lampadis flamma*, oleo *fæcu-* *lento* & salito imbuta, cum *strepitu* & *scintillatione* ardescit. Cujusmodi ta- *men* affectus *πασμώδεις*, ut plurimum accidunt circa febrium *ἀκμῆς*, cum *materies morbifica*, primo in *sanguine* congesta, illinc in *cerebrum* transfertur, *eoque*

eoque vel protinus trajecto, vel simul infecto, in systema nervosum profertur; proindeque *pathemata convulsiva*, cum, vel sine *delirio* acciuntur.

At vero, præter hujusmodi affectiones *spasmodicæ* febribus *ἐπ. γινόμεναις* & *secundario* excitatas, observare est interdum, in maligna aëris constitutione, etiam à contagii pestilentis afflatu, *liquorem nervosum* sanguine prius, aut ab eo seorsim infici, & propterea delirium, ac convulsiones intemperiem febrilem prævertere. Porro sæpius observavi *febres* quasdam *anomalas* increbuisse, in quibus sanguine vix ebullire, aut supra modum effervesce viso, primum in humore nervoso *febris lenta*, ac valde periculosa initia jaciebantur; quæ sensim ad maturitatem evedta, affectus *spasmodicæ* cum *delirio*, aut *mania*, aliisque spirituum animalium deliquiis, aut exorbitantiis inducebant. Ægrotantes enim de calore aut siti minimè conquesti, cito debiles, & quasi enerves facti, crebræ vertigini, necnon artuum tremoribus, ac velut exsultationibus, insuper musculorum ac tendinum subsultibus, & contracturis, atque doloribus hinc inde vagis statim obnoxii fiebant. Hujusmodi ægrotudo à quibusdam medicis, siquidem in *solidis partibus*, potius quam in *sanguine* consistere videtur, *febris maligna hæctica* appellatur; cum revera eadem in humore nervoso potissimum defixa, *lues νδρῶδης convulsiva* melius dicitur.

Morbi convulsivi Hassiæ olim epidemici descriptio. Apud Gregorium Horstium mentio fit *morbi convulsivi & maligni*, qui olim *Hassiæ, Vvestphaliæ*, & in locis vicinis *epidemicus* fuerat: Illo correpti, sine febris æstu, aut immodica sanguinis effervescencia, dum circa negotia familiaria versarentur, sese vix modo ægrotare percipientes, circa manus, aut pedes, ac interdum in utrisque *formicationis sensum* cum *stupore* huc illuc transcurrentem, habere solebant: dein mox digiti, simulque brachia & crura, modo arcte contrahebantur, modo validissimè, ac si obriguissent, extendebantur. Hujusmodi contractiones & extensiones se alternatim excipiebant, & subinde loca mutabant; ut nunc in hac parte, dein statim in alia affectus resideret: sin (uti non raro contigit) morbus cerebrum una totum invaderet, *convulsiones universales*, & sæpè *insultus epileptici* ægrotos infestabant; insuper laborantes per vices quasdam *delirio, mania*, ac interdum *lethargo* obnoxii fuerunt: ægrotudo hæc sine *crisi*, aut integra solutione diu perseverabat, & vix insolidum ita curari potuit, quin *cerebri*, & *partium nervosarum* diatheses malæ ac morbidæ per totam postea vitam duraverint.

Symptomatum Ætiologia. Quoad *morbi hujus*, & *symptomatum rationes*, satis obvium est, eadem omnino à *succi nervosi* vitio, ac insigni depravatione pendere. Iste *formicationis sensus* ægrotudinem plerumque inchoans, propterea ciebatur, quoniam liquor iste à miasmate maligno venenari, ac in mixtione solvi incipiens, statim spiritus animales in ipso scatentes opprimebat, & ab expansione solita ac libera inhibebat; quare illi semiobrutī, ac velut inter vepres, ac retinacula obrepere coacti, quasi formicarum transcurrentium sensum excitabant: deinceps vero quoniam hoc morbo ingravescente, *liquor nervosus* in crasi sua adhuc magis pervertebatur, quæ in illo congebantur particulae heterogeneæ, spiritibus accrescentes, eos huc illuc exagitari, & inordinatè explodi fecerunt; propterea quidem ut in *membris*

bris contractiones, distensionesque horrendæ, ac in *capite tumultus* & inordinatæ maximæ cicerentur. Quod autem in hac febre *vdwōdei*, *solutio*, sive *crisis difficilis*, seu potius nulla contigit, ratio erat, quia *succus nervosus*, utpote lentus, & quasi mucilaginosus, proindeque in motu tardus, haud uti *sanguis*, effervescencia eccritica defæcatur, nec ejusmodi *fermentationem* facile concipit, qua purum ab impuro secernitur.

Profecto ægritudinem simili prorsus *typo* insignitam, non raro apud nostrates excitatam, & per totas familias, saltem in pueros & juniores grassatam fuisse novi. Ante aliquot annos *febris popularis cerebro, & nervoso generi* plurimum infesta in hac regione, imo fere per totam *Angliam*, plurimum increbuit: Cujus morbi historiam eo tempore quo sæviit, scilicet anno 1661. descriptam, hoc in loco *pathologia nostræ spasmodicæ* inserere hic operæpretium videtur: Hinc enim constet, quo ritu, & quibus de causis *symptomata convulsiva*, quæ febribus quibuscunque supervenerint, excitari solent.

Febris epidemica cerebro & nervoso generi potissimum infesta, anno 1661. increbrescentis descriptio.

In hac *ratione*, ante novissimam æstatem, scilicet anni 1660. morbo quo-
vis populari, nisi qui tantum in quibusdam locis sporadice grassabatur, su-
pra biennium immunes degeramus; tunc autem, ante solstitium æstivum,
morbilli (affectus hic raro epidemicus) variis in locis exorti, plurimum
sæviebant. Post æstatem illam, quæ intense calida & sicca fuerat, *autum-*
nus solito humidior insequutus est; quem postea *hyems* mitissima, & fri-
goris pene expers excepit: toto ejus spatio vix erat tellus nive oblecta,
aut unquam supra tres, aut quatuor dies continuos gelu constricta, adeo
ut intra paucas à *solstitio brumali* hebdomadas, arbores frondescere, plan-
tæ vernaes à terræ sinu erumpere & efflorescere, quin & aves nidificare
inceperint: tempestati huic miti, ac corpusculis nitrosis à *Borea* sufflari
solitis, haudquaquam eventilatæ, sub initium *veris*, imbrium fere con-
tinuo madentium squalor maximus successit. Post *æquinotium vernale*,
febris quædam *anomala* & inassueta nonnullos sparsim incescit; quæ tamen
intra mensem in tantum *epidemica* evasit, ut pluribus in locis *morbis no-*
vum appellari cœperit: in pueros adolescentes potissimum desæviens,
eos longa, & velut chronica ægrotatione affligere solebat: quinimo in-
terdum senes, & provectæ ætatis homines, licet rarius infestabat, at eos
citius, & quidem certius jugulabat. *Affectus* primo quempiam invadens,
ita tacite obrepebat, ut ægrotationis initia vix perciperentur; nam sine
calore immodico, aut siti acriori exoriens, statim in toto corpore debi-
litem magnam, cum spirituum languore, & functionis animalis torpe-
dine inducebat: *stomachus* esculenta quævis fastidire, & ab ingestis ag-
gravari, nec tamen facile in vomitum proclivis erat. Laborantes ad mo-
tum quemvis inepti, tantum lecto discumbere, & otio frui ambiebant:
Intra breve tempus, etiam aliquando ab ipso morbi insultu, de *vertigine*
gravi, *aurium tinnitu*, sæpe item de *cerebri quasi tumultu*, & *perturbatione*

Febris opi-
demica
anno

661. gras-
santi hi-
storia.

Ejus causa
procatar-
gica.

Symptoma-
tata.

magna querebantur. Cujusmodi *symptomata* sæpissime hujus morbi ingruentis *signum* quasi *pathognomonicum* habebantur : si in quibusdam hæc deesse, aut remissius habere contigit, vice *capitis* eo ritu affecti, morbus in *pectore*, cum *tussi excitata*, altiores radices egit, uti mox dicitur. Dum verò cerebro, ac appendice nervosa ad hunc modum affectis, spiritus animales mox ab ægritudinis principio obtorpescerent, *febris lenta* ac velut *hectica* in toto accendebatur : attamen cruoris *effervescentia*, quæ vix *continua*, sed *vaga & incerta* fuit, juxta ipsius sanguinis crasin, in aliis intensius ; inque aliis remissius habuit ; proindeque sitis, linguæ scabrities, aliaque symptomata, quæ ab intemperie febrili dependent, plus aut minus infestabant : sudor haud sponte successit, nec facile aut cum levamine ab arte produci potuit : quinimo nec hujus, nec alijsmodi evacuatio, velut *critica* unquam succedens, hunc morbum derepente solvebat ; verum iste per plures hebdomadas ac interdum menses persistens, in summam *atrophiam* ægrotantes redegit, & non raro eos *tabe* incurabili affecit.

Circa *morbi incrementum*, quod in plerisque intra *octiduum* contigit, si affectus (uti sæpius assolebat) *cerebrum*, ac *systema nervosum* præcipuè obfideret, in eorum regimine symptomata graviora, scilicet aperta *phrenesis*, aut altus *stupor*, sive *avandnoia* infestabant. Nam sæpius observavi, in plerisque *pueris*, atque non raro in *fæminis*, post septem aut octo à decubitu dies, *sensationem & loquelam* penitus defecisse, adeoque ægrotantes aliquandiu, immo interdum totius mensis spatio, sine adstantium notitia, cumque involuntario excrementorum profluvio decubuisse ; sin judicii & rationis usus aliquatenus perstaret, eos tamen crebro *delirio*, & constanter in somnis *fabulatione absurda & incongrua* laborasse. In *viris* autem, aliisque temperamenti calidioris, à materia morbifica, vice *criseos*, in *cerebrum* translata, *furor*, aut *phrenesis* periculosa, ac sæpe lethalis succedebat. Sin neque *stupor*, neque *distractio* immanior ingruerat, *scotomia*, *motus convulsivi*, cum membrorum *spasms*, ac tendinum subsultibus gravius infestabant. In quibusvis ferè ægrotantibus, *alvus* ut plurimum *soluta* erat, modo flava, modo tenuia & serosa cum insigni foetore copiose dejiciens : raro ! erat quod *vomitio* quempiam incesset : *urina* in toto morbi processu (nisi cum materies morbifica uberius in *cerebrum* correpta phrenitidem minaretur) fuit intense *rubicunda*, ita ut nonnulli propter saturatum lotii colorem, hanc *febrem* plane *scorbuticam* fuisse censerent : Quod tamen secus habuisse constitit, quoniam remedia *antiscorbutica* (quorum sane plurima, & cujuscunque ferè generis tentabantur) parum aut nihil profuere. Maxime admirandum erat, quàm cito ab hujus morbi insultu ægrotantium carnes contabescerent, ipsique in *sceleti marcorem* redigerentur, cum interea nec adfuit calor immanis, qui partes solidas sensim absumeret, nec evacuatio quævis violenta, quæ illas affatim detereret.

Præter hæc mala *capitis* regionem infestantia, affectio non minus periculosa sæpenumero *thoracem* incessit. Quippe in aliquibus, licet non omnibus, *tussis* valde molesta, cum *sputo* copioso, ac crasso excitabatur : hæc nonnullis circa *morbi declinationem* successit, nempe dum *cerebri* confinia serenum obtinerent, quasi nubibus illinc in *thoracem* dimissis, *catharrus*

ingens subito in pulmones depluebat. Verum in aliquibus, præsertim qui in *capite* morbi noxam minorem luebant, statim à *febris initio tussis* immanis, & fœda exspuitio, cum *diathesi* velut *tabida* ingruiebant, & ægrotantes subito ac improvise in *phthisin* præcipitabant; è qua tamen tempestiva remediorum ope sæpe insperato emergebant. Adverti in nonnullis, post diutinam facultatis sensitivæ eclipsem, & cerebri à materia morbifica oppressionem, quod demum in *glandulis* juxta cervicem *tumores* successerint, è quibus ægre maturatis & disruptis ichor tenuis & fœtidus longo tempore emanavit, & levamen contulit. Vidi etiam *pustulas aquosas* in aliis partibus corporis excitatas, quæ in *ulcera* cava, & ægre sanabilia transibant: interdum *macula* exiguæ, & *petechiales* sparsim apparuerunt: non audiavi tamen latiores aut lividas in hujusmodi ægrotis unquam conspicuas fuisse. Utcumque licet hæc *febris exanthematis* plurimum malignis rarius insigniebatur, haud tamen *contagio* vacabat. Quippe in eadem familia *pueros*, & *juniores* successive fere omnes invasit; etiam non raro provectionis ætatis homines, qui ægrotantibus ministrando, circa eorum cubilia & stragula familiariter versabantur, eadem lue inficiebantur: at vero haud tanta suspicionis causa erat, ut propterea ægrotantium amici ab eorum commercio aut visitatione omnino interdicerentur.

Quamquam hujus *morbi decursus* (nisi cum *cerebrum* intime obsideretur) tantummodo mitis apparebat, ac sine horrendo quovis symptomate peragebatur; tamen *curatio* ejus semper difficilis, non nisi longo tempore successit: Etenim laborantes raro intra *tres* aut *quatuor hebdomadas*, immo ut plurimum vix intra totidem *mensēs* convalescebant. Quod si in homines præfractæ ætatis, aut virium, hic morbus inciderit, præsertim qui affectibus cephalicis, uti *Lethargo*, *Apoplexia*, aut *spasmo* erant prius obnoxii, eos sæpenumero breviori spatio interfecit: sin vero convalescentiæ spes ulla suberat, ista tarde admodum promoveri potuit (remediis quibuscumque vix levamen sensibile conferentibus) ut ægrotantes non citius extra *febris* hujusce *sphæram* evaderent, quam intra *tabis* confinia sisterentur.

Si *prædictæ ægritudinis ratio formalis*, & *causa* inquirantur, facile hic constat, *liquorem cerebri* & *nervosi generis irriguum*, ferè simul atque *sanguinem* in culpa, & symptomatum præcipuè urgentium causam immediatam fuisse: nempe in quantum iste *latex* statim à primo morbi insultu solito *pauperior*, & quasi *effæctus* evaserat, propterea in toto corpore *languor* & *enervatio*, cum *lassitudine spontanea*, ac *impotentia ad motum*, cumque *subita corporis intabescencia* ægrotantibus accidebant. Porro quatenus *idem liquor* *particulis heterogeneis*, scil. partim *narcoticis*, partim *explosivis* referciretur, idcirco *stupor*, *formicationis sensus*, *tendinum* & *musculorum subsultus*, & *contractura*, necnon *vertigo*, *scotomia*, aliæque *affectiones cephalicæ* graviores suboriebantur: Porro aliquatenus ob *succi nervosi labem*, non cito aut facile emendandam *morbi solutio*, aut *sanatio* tam *ardua* ac *diuturna* extitit. At vero siquidem *laticis* hujusce vitium à *sanguinis dyscrasia*, etiam à *cerebri constitutione prava*, necessariò dependet; quales eorum *diatheses morbidæ* fuerint, & quo ritu *febris* modo descriptæ symptomatis ortum, vel fomitem præbuerint, jam proximè videamus.

Eorum
Æthiologia.

Quoad *prius*, videtur quod hac tempestate, propter anni constitutionem calidam, & humidam, ac à *Borea* (cujus nimirum corpuscula sanguinem, & succos corporis nostri *conditura* velut *nitrosa* imbuunt, eosque exagitando contra putredinem muniunt) minimè perflatam, sanguis in plerisque hominibus, ac præsertim in *pueris*, *adolescentibus* & *fæminis*, instar aquæ stagnantis, proindeque situm contrahentis, valde *impurus*, *particulis heterogeneis refertus*, atque ad *lentorem* & *aquositatem* vergens evaserat; in quo scil. *spiritu*, ac *sulphure* puriori aliquantum depressis, *particula aquosa*, cum *sale* & *sulphure impuro* simul evectis, nimis exaltarentur. Quamobrem *sanguis*, tum propter *crasin* ejus vitiatam, tum ob *particulas heterogeneas* in sinu ejus uberius congestas, effervescentiæ febrili aut sua sponte, aut occasionaliter, aut propter contagium suscipiendæ habilior factus est, proinde ut plurimi hoc tempore febricitarent. Attamen *sanguis* à miasinate febrili suscepto effervescens, non statim cum aperto incendio, sed tanquam ligna viridia foco imposita, cum *flamma* velut *suppressa*, ac *fumo* plurimum obvoluta exardescerebat. Quapropter materies morbifica intra massam ejus aggesta non (uti in *febre regulari*) deflagando absumi, ejusque reliquæ stato tempore per *crisin* exterminati solebant: sed tamen mox à febris initio, istius materiæ portio ingens in *caput*, vel *thoracem*, vel simul in *utrumque* suffusa, & postea iisdem partibus continuò suppeditata, aut prædictas *cerebri*, & *nervosi generis* affectiones, aut *tussim* cum dispositione tabida, vel simul *utrasque* inducebat: atque ob hanc rationem circa initia hujus morbi, cum *pulsus* debito celerior, & *urina* rubicunda, & contentis saturata, sanguinem ab intemperie febrili effervescere indicabant, ægrotautes de *calore*, aut *siti* minimè conquesti sunt; quia nimirum *sanguis* effervescens impuritates & recrementa sua illico in *liquoris nervosi* penum, aut in *pulmones* deponebat; quare intra *hæc receptacula* symptomata pejora statim acciebantur; postea tamen, morbo in statum evecto, calor non nihil acris, cum linguæ scabritie in aliquibus satis molestus esse solebat; quinimo in omnibus *febris lenta*, & *hæctica* perdurabat, quæ nec *sudore*, nec *transpiratione insensili* ita in totum amoveri potuit, quin illa quotidie, præsertim à pastu, licet tenuissimo, redintegraretur: quod equidem ita contigisse videtur, quia *succus nervosus* fæculentiis à *sanguine* depositis satur, eas postea haud in copia tam uberi excipiebat; quin recrementa isthæc unà cum *humore nutritio* (siquidem & hic particulis solidis alendis minimè absumeretur, intra massam sanguineam restantia, ipsam usque febriliter effervescere fecerunt.

2. Præter hanc *sanguinis* diathesin morbidam ab anni intemperie contractam, videtur & *cerebrum* ab eadem *peragente* in pathemata prædicta proclive factum. Cum enim longo temporis tractu *venti austrini*, cum humidiori aëris constitutione jugiter spirarent, proinde *cerebri* meatus & pori plurimum laxati & aperti, ejusque compages nimis dissoluta, humoribus serosis, & particulis quibuscvis heterogeneis aditum facilius præbebant: quare *sanguis* valde fæculentus & aquosus, quamprimum à febre effervesceret, recrementa serosa, & sordes suas statim intra *τὴν ἐγκεφαλικήν* fores nimis patentes ingerebat: enimvero quotusquisque est, qui non

humido

humido cælo, de capite nimis oppleto, & spirituum torpore queritur? quia scilicet excrementitii humores in cerebrum à tali occasione laxatum irruunt: contra hujus poris à frigore intenso, aut sicciori aëre constrictis, sensus & facultates omnes vegeti magis & expediti perstant.

His ita de *cerebri & humorum*, nempe *sanguinis & humoris nervosi* apparatu propter anni constitutionem morbo, præmissis; quo quidem plurimi tunc temporis in *febrem lentam, inaequalem, diuturnam, symptomatis cephalicis & convulsivis* stipatam, necnon *agere solubilem* inciderint: hinc etiam facile erit reliquorum *symptomatum & accidentium* in isto morbo præcipue notabilium rationes extricare.

Primo etenim, quod hæc *febris anomala*, in *pueros adolescentes, fœminas, & viros phlegmaticos* potissimum desæviebat, in causa erat, quoniam in istiusmodi corporibus, *sanguis* aquosior, & minus perspirabilis, proindeque colluviem serosam, & fæculentias heterogeneas congerere aptus est; quin & *cerebrum* humidius, debiliusque existens, sanguinis recrementa quævis facile suscipit. Quapropter observare licet, ejusmodi personas, in *convulsiones* propter alias *causas* oriundas, magis proclives reperiri.

Secundo, *insignis atrophia* tam cito huic feberi supervenit, quoniam ob *succi nervosi* depravationem, nutritus munia ab eo pendentia (quæ prout alibi ostendimus, sunt maximè activa) protinus defecerunt. Quamvis enim minimè concedimus, *humorem nervosum* solummodo nutritium esse, sed materiam partibus alendis destinatam, in massa sanguinea præparatam, per arterias dispensari; attamen arbitrari fas sit, liquorem cerebri, & nervosi generis irriguum, sua ratione *causæ efficientis* alimentationi plurimum conducere; hic enim spiritu animali turgescens, succum nutritium cuilibet parti à sanguine allatum actuat, & vigorat, eumque in corporis alendi meatus ac intimos recessus admittens, & velut intro manuducens, assimilât. Quare cum hic *liquor æconomus* adeo depravatur, ut spiritus animales circa nutritionis opus requisitos haud ritè suppeditet, membra quælibet ac partes, veluti stomachus in tono suo vitiat, nutrimentum quodvis oblatum, vel respuunt, vel proprium in usum recipere nequeunt: propterea quidem in hoc morbo, moles, sive habitus corporis utut plenior, aut obesus, plus ac citius deterebatur, quam in *febre causode*, ubi à calore intenso, aut sudoribus copiosis longe plus evaporat. Cujus ratio est, quoniam in *febre ardenti*, licet sanguis valde effervescentius copiosius exhalat, interea tamen aliquid nutrimenti jugiter apponit, quod singulæ partes, *liquoris nervosi* beneficio adjunctæ, facile excipiunt, & assimilant; verum in ista *lue*, quamquam materia nutritiva satis appareretur, tamen spirituum defectu nutritio prorsus inhibebatur.

3. Ob prædictas rationes, etiam *febris ista diutissime protracta*, vix unquam *critice* judicari, ac difficulter admodum medicamentorum ope curari solebat: materies enim febrilis statim à morbi initio in liquorem nervosum irrepens, ab ejus sinu ægre postea, & non nisi longo tempore exterminari potuit: quippe hic latex motu segni, inque vasis obstrictis lente seaturiens, non uti *sanguis* effervescentiam depurativam, sive fermenta-

Cur morbus hic pueros, fœminas & viros phlegmaticos potissimum invasit.

Atrophia huic febre supervenientis ratio.

Cur febris hæc agere solubilis.

tionem sponte concipit, neque medicamentorum vires ad eum facile ac illibatae pertingunt; sed aut aliis partibus prius impenduntur, aut siquidem heterogenea sunt, à cerebro incongruum quodvis respuente prorsus excluduntur. Equidem ob hanc rationem quævis cerebri, & nervorum affectiones, medicinæ velut opprobrium facientes, difficillimè sanantur. Itaque in hac febre, si quando labes cerebro & nervoso generi impressa tolleretur, vel *tussis* immanis cum sputo copioso, vel *tumores*, & *abscessus* in collo succedebant; scilicet materia morbifica à sanguine resorpta, & rursus deposita, vel in *thoracem*, vel in *glandulas*, & *emunctoria* juxta cervicem consita. Cæterum hic morbus contumacior extitit, quoniam & *sanguinis dyscrasia* non facile emendaretur: nam licet ab initio latex ejus recrementis usque in liquorem nervosum suffusus, minus ac inertius effervesceret; postea tamen receptaculis hisce oppletis, & *faculentia morbifica*, ac insuper *materies nutritia* partibus solidis minimè impensa, usque in cruore resides, ipsum aggravabant; eique propter molesti hujus non miscibilis exclusionem, *effervescentiam*, non secus ac in febre *hectica* assolet, aut ferè *continuum*, aut subinde repetere aptam inducebant. Enimvero sæpius observavi in hac febre, à jusculis avenaceis, decocto hordei, alioque victu tenuiori, non minus ebullitionis in sanguine concitari, quam à jure carniū consummato: nempe utrobique succus nutritius è chylo in sanguinem suppeditatus, siquidem in nutritionis opus non impendebatur, velut quoddam heterogeneum, & non ritè miscibile sanguini molestiam inferebat; atque ob hujus succi superflui particulas cum sero copiosè amandatas, *urina* valde *crassa*, *rubicunda*, & contentis plurimum saturata existebat: Etiam ob hanc rationem *alvus* plerumque *soluta* fuit, in quantum sanguis succo nutritio satur, minorem chyli portionem è visceribus exsugebat, atque istius, quod ipsi inferebatur, partem intestinis reinfundebat: intemperies insuper febrilis tamdiu cruori inhærebat, quia donec regimine animali restituto, nutritio ritè perageretur, materies ista superflua in massa sanguinea congerebatur.

Febris prædictæ typum, ejusque *Ætiologiam* ideo fusius tradimus, quoniam idem morbus apud nostrates etiam aliis temporibus *sporadice* increbuit: eo quippe nuper in hac urbe cujusdam familiæ juniores successivè omnes ægrotabant: quin & olim memini plures à tali febre laborasse. E variis, quæ prostant ab ea, quando *epidemica* fuit, ægrotantium historiis & exemplis, libet hic unum aut alterum proponere.

r.
Observatio.

Juvenis robustus & floridus sub initium veris Anni 1661. sine causa evidenti ægrotans, absque calore aut siti intensis, cito debilis & quasi enervis, cum appetitu dejecto, & spirituum languore evasit. Remedia *cathartica*, *antipyretica*, *digestiva*, quin & *antiscorbutica*, aliaque varii generis, ex Medicorum celebrium præscriptis adhibita, nequicquam profuere: attamen æger usque languidus, cum febre *lenta* & *vaga*, *pulsu celeri* & *debili*, *urina* intense *rubicunda*, per sesquimenssem decubuit: insuper ad summum marcorem redactus de *vertigine*, *aurium tinnitu*, & *sonitus in capite* velut *fluctuatione* conquestus est: Licet magno stupore afficeretur, tamen somni erant valde perturbati, ac interrupti, cum fabulatione delira.

Post

Post 40. dies, cum febris nondum declinabat, visum erat, sanguinis circiter 3. iiij. vel v. è venis sedalibus, hirudinum suctu detrahère; hinc statim febris plurimum exacerbari cœpit: nam calor magis intensus, cum siti, vigiliis, & corporis jactatione fere continua, etiam lingua exsicca & scabra evasit; dein brevi *tussis molesta*, cum sputo copioso & decolori successit: Huic *amygdalata & hordeata*, cum *bechicis* temperatis incoctis, *aqua è lacte*, cum *limacibus*, & *herbis thoradicis* destillata, *pulveres testacei*, *nitrum præparatum*, insuper *opiata cardiaca* sedulo exhibebantur; quibus tamen vix ullum juvamen conferentibus, æger usque debilior factus erat: Cumque hoc ritu supra bimestre spatium ægrotans, febrili intemperie, & tussi etiam indies in pejus euntibus, obitui approximari videretur, tandem diaphoresi sponte oborta, noctibus modo singulis, modo alternis sudore copioso perfundebatur, & exinde paulatim se melius habens, prædictis remediis deinceps usus, intra sex hebdomadas integre convaluit.

Morbum hunc, donec plures eodem ritu ægrotasse cernerem, omnino *febrem hæcticam*, cum *tabida pulmonum diathesi*, suspicatus fueram: attamen cum multi alii, tunc temporis, simili modo passim decumberent, hujusce *Ejus Aetio-*
febris Aetiology, qualis supra describitur, facile instituebam: nempe *logia*.
quod sanguis, propter anni intemperiem, & forsan errata in victu, procatarxin vitiosam contraxerat; dein iste febriliter effervescens, atque impuritates suas statim *cerebro* ingerens, ejusque adeo, & *nervosi generis* siccum irriguum depravans, *affectus vertiginosos* cum *stupore*, *spirituum languore*, & totius corporis *atrophia* inducebat: quamdiu autem sanguis recrementa sua è proprio sinu in *cerebrum*, ac *appendicem nervosam* transferencebat, effervescencia febrilis blandius ac mitius peragebatur: Postea tamen, quando hæmorrhoidum apertio materiæ morbificæ *portu* à cerebro avocarât, eadem primo intra massam sanguineam retenta *febrem* auxit; dein pulmonibus suffusa, *tussim immanem* cum sputo copioso excitavit: quatenus autem pulmonum caro usque à putredine immunis perstitit, quamprimum colluvies serosa per uberiores diaphoresin foras amandaretur, ægrotans tum à *febre*, tum à *phthisi* deplorata visa, incolumis evasit.

Interea dum iste decubuit, alium 12. circiter annos natum pari modo affectum invisi. Hic autem, cum primo accerferer, supra mensam ægro *Observa-*
tans in sceleti marcorem redigebatur; porro *vertigine*, cum *aurium tinnitu*, *tio*.
& *surditate*, ac insuper *tussi violenta*, cum *sputo flavo*, ac velut tabido afficiebatur: fuit pulsus celer, & debilis, urina rubicunda, & crassa, appetitus plurimum dejectus, spiritus ita languidi, ac vires prostratæ, ut lecto abstinere nequiret. Huic aquam è lacte cum limacibus & herbis temperatis destillatam sæpius in die propinavi: insuper decoctum aperitivum, quale in *rachitide* usitatum est, vice potus ordinarii quotidie assumendum præcepi. Cujusmodi remediorum ope intra mensis spatium sanitati restituebatur. Hoc tempore ad plures alios cujusque *etatis*, & *sexus* homines, eodem *morbo* tunc plane *epidemico* affectos vocabar: nam iste per totas familias grassatus, non tantum in hac urbe, ejusque vicinia, sed in *regioni*

regionibus longe diffitis, prout à medicis aliorum locorum incolis audiui, increbuit. Plerique ab hac febre laborantes, modo alioqui essent sani, idoneo circa *medicinam & dietam* regimine usi, convalescebant: Illis sæpenu-mero male cessit, qui aut *senio* fracti, aut invaletudinaria *cerebri & nervosi generis* constitutione præditi fuerunt; cæterum non raro agrotantium casus aleæ periculosa subiciebantur: quia Medici non statim à morbi initio, quinimo vix antequam hujus radices altiores jaciebantur, ipsaque medendi occasio præterierat, accersiri solebant.

3. *Observatio.* Propterea namque hæc febris in viri cujusdam prænobilis familia, inter natos ejus affectionibus cephalicis originaliter obnoxios admodum funesta evasit. Circa *æquinotium vernale*, puer in ætate circiter undecim annorum agrotare cœpit: imprimis absque calore, aut siti intensis, *appetitibus dei & virium languor* accesserant: Insuper, *vertigo* fere continua molestabat, cum crebro *lipothymias* metu, ut sæpius *animi deliquium* instare putaverit. Huic ex mulieris cujusdam ministrantis consilio clysteres quotidie injiciebantur: dein cum ex linguæ, orisque spurcitie febris signa manifesta apparerent, *Empirica* ista die quinto *vomitivum ex infusione croci metallorum* propinabat, atque die septimo *pulvere cardiaco* exhibito, agrotum stragulis coopertum ad sudandum incitabat: vix cutis madefieri cœperat, quin statim hic delire loquutus, de pileo suo in aquas delapso conquestus, mox *αποῶν* factus, intra quatuor horas, dummodo egomet accerserer, ante adventum exspirabat.

4. *Observatio.* Brevi posthæc, sororem ejus ætate minorem idem morbus incescit; cujus tamen ægritudo, quoniam tussi crebra, & humida stipata fuerat, primo tantum *frigoris susceptio* putabatur; verum intra paucos dies ista *tassis* plane *convulsiva* evasit: adeo ut inter tussendum, diaphragmate sursum elato, & cum systole repetita, ita aliquandiu retento, stridor ingens, & velut suffocativus ederetur: dein puellula hæc apertius febricitans, ac de siti & calore conquesta, noctes insomnes, cum insigni corporis agitatione ducebat, atque propediem delire loquuta, uti prius frater ejus, de veste sua in aquas delapsa querebatur; cumque omnia in pejus ruerint, motibus convulsivis, primo in artubus, mox in facie, & subinde in toto corpore tentari cœpit: paroxysmi crebra vice, nempe bis, aut ter intra horam repentes, gravissimè urgebant, adeo ut misella hæc, intra nycthemeri spatium, à quo affectiones spasmodicæ graviores exortæ fuerint, spirituum animalium tenore penitus labefactato, fatum obierit. Dum paroxysmi convulsivi urgerent, pulsus erat plurimum inordinatus, ac sæpe intermittens; etiam vomitione crebra afficiebatur. Ad hanc invisendam, etiam fero nimis, scilicet paulo ante obitum, accersitus, cum nihil vitæ prorogandæ contribuere potuissem, quantum licebat ex morte ejus, in prædicti morbi *diagnosin* inquirere satagebam, proinde cadaveris dissecandi venia impetrata, symptomatum in hac febre præcipue urgentium rationes & vestigia clarius patebant.

Morbida Itaque ventrem inferiorem primo aperiens, viscera omnia in eo con-
gnosis tenta satis sana & facta recta inveni: Ventriculus, licet inani vomitione
dissectio crebro laceratus, nihil præter liquorem nuper ore ingestum continebat:
etenim

etenim neque in ipso, nec in appendice ejus *lumbrici*, aut *acres humores cadavere* (qui sæpe ejusmodi convulsionum causæ perhiberi solent) reperiebantur: intestina tenuia pluribus in locis mutuo involvebantur; nempe ^{ta.} partis unius superficies convexa, in alterius concavam, tanquam in vaginam fuit intrusa, & alte recondita: quod quidem à viscerum istorum motibus convulsivis omnino contigisse arbitror: dum enim ob spasmus vehementem ab origine nervosa excitatum, fibræ oppositæ simul convulsæ idem intestinum una in motus contrarios agerent, facile eveniat ut intestini ilei pars una sursum lata, alterius deorsum raptæ cavitatem incurreret.

Thorace aperto, pulmonum caro valde rubicunda, & velut cruore suffusa, immo in quibusdam locis quasi livida, & fere nigra apparebat ex eadem ubivis discissa ichor tenuis & spumosus exudabat. Certe hoc indicio constitit, materiem febrilem, sive serosæ sanguinis effervescentis impuritates illico *pulmonibus* impactas, eorum poros & meatus adeo infercivisse, ut ipse sanguis, solito, & liberiori ejus circuitu præcluso, ibidem stagnans, & extravasatus inflammationem quandam excitavit.

Nec minus clara morbi hujus adeo funesti vestigia in capite deteximus: nam calvariæ olla amota, statim vasa meningas perreptantia sanguine plurimum turgescere conspiciebantur; quasi fere tota cruoris massa in capite aggereretur: venis enim circa viscera imi ac medii ventris sectis, aut disruptis, parum sanguinis effluxit: porro membranæ istæ, ubi cerebellum investiunt, atque altius instratæ ipsum à cerebro dirimunt, sanguine pluribus in locis extravasato suffusæ, colore atro-purpureo insigniebantur; ut minime dubitandum esset, quin *phlogosis*, sive *inflammatio* illic circumcirca excitata, *convulsionum* adeo atrociter infestantium causa fuerit. Integumentis hisce ablatis, cerebri substantia prorsus madida, & humore aquoso supra modum irrigata videbatur: quinimo ejus cortice exempto ventriculi omnes aqua limpida erant repleti; cujusmodi pellucidi liquoris plusquam libræ semissem eximere licuit.

Ex his *phenomenis* prædictæ febris *pathologia* facile colligitur: Nempe *Prædicta febris pathologia.* in hac ægrotante, sicut etiam in plerisque aliis, sanguis febriliter effervescebat, statim recrementa sua tum in *pulmones*, tum in *cerebrum* deponebat; quare serosa colluvies utriusque compagem illico inundabat: dein propterea sanguis, & *hic* & *illic* à debita *circulatione* præpeditus, circa partium affectarum confinia plurimum coacervari, demum stagnare, & quasi *phlogosin* inferre cœpit: hinc ob serum in *pulmonibus* copiose aggestum, & calore assatum, tussis molesta, cum sputo crasso & decolori plerumque isti morbo supervenit; atque ob similem affectionem intra *ἡμέρας* excitatam, *vertigo*, *scotomia*, *stupor*, aliæve pathemata cephalica laborantes fere constanter incessabant: Cujusmodi affectus in hac puellula ac in fratre ejus, propter cerebri constitutionem in utroque prius invaletudinariam, graviores facti in *apoplexiam* terminabantur. In promptu hic esset plures alias ab hac febre tunc temporis ægrotantium historias proponere; verum ex his modo citatis morbi prædicti typus satis innotescat. Quoniam vero *eadem febris* quosdam prædispositos fere quotannis in-

cessit, & propter malam anni constitutionem forsan aliquando posthæc epidemica evadet, ex re fore videtur circa *curationem* ejus *methodum* quandam adumbrare.

*Methodus
therapen-
tica.*

De qua imprimis annotetur, in hac febre *dies criticos*, prout in *synocha vulgari*, nequaquam observandos esse: etenim sanguis, quamprimum effervesce incipit, materiæ morbificæ partem adhuc crudam, ac minime subactam, è complexu suo statim *capiti*, aut *thoraci* suffundit: Quapropter incassum esset expectare, ut sanguis particulas heterogeneas in massa sua ad plenitudinem congeri sinat; dein ut *efflorescentia* statis temporum intervallis oborta, easdem subtiliatas foras excernat. Quinimo iste effervescens, haud magno, & aperto incendio gliscit; verum instar ignis cespitibus cooperti, fumum sive halitum madidum, potius quam flammam emittit: ita tamen ut exinde propter *succum nervosum* statim in crasi depravatum, & non raro ob *pulmones* materia tabifica infarctos, symptomata aut *convulsiva*, aut *phthisica* in toto morbi decursu præcipue urgerent.

*Initio mor-
bi sanguis
mittendus.*

Intentiones curativas juxta varia morbi tempora, & *symptomatum* præcipue urgentium diversitates designare oportebit. Circa febris hujus initium *sanguinis missio* fere omnibus convenire videbatur: Hoc remedii genus sæpe in parvulis cum fructu expertus sum: Quippe hoc modo, cruoris massæ tacite ac cooperte effervescenti, fuliginesque suas in partes nobiliores obtrudenti, *spiraculum* quasi aliud aperitur, proindeque efflorescentiæ ejus impuræ à *cerebro* & *pulmonibus* avocantur: quanquam igitur hæc febris *mali moris* aliquatenus *maligna* audiat, attamen in quantum sanguis haud statim *coagulari*, sed *fundi* nimis, & seorsitates suas in partes nobiliores, nempe *cerebrum*, & *pulmones* suggerere aptus fuerit, idcirco *plebotomia*, modo in principio morbi celebretur, fere nulli non convenit.

*Emetica
& cathar-
tica exhi-
benda.*

Propter eandem juvaminis rationem, *medicamenta cathartica*, ac imprimis *vomitiva*, statim à morbi principio adhibentur; hæc enim non modo coctionis viscera evacuant, adeoque morbi fomitem primum, & quasi originalem subducunt, verum insuper à sanguine serositates emulgent, adeoque purgamenta ejus potius in *stomachum* & *intestina*, quam in *caput* aut *pulmones* suggeri faciunt. Porro ab *emeticiis*, in quantum glandulæ lymphæ ductuum exceptrices, cum succussione magna vellicantur, succi nervosi superfluitates, ne *cerebrum*, ejusque appendicem male afficiunt, in viscera inferiora exprimuntur: etiam in hunc finem *cerebro enematum* usu alvus continuo soluta teneatur. Interea tamen dum sanguis hujus morbi labe inquinatus, *cerebro*, aut *præcordiis* malum minatur, haud tutum erit, aut *diaphoreticis*, aut *diureticis*, aut etiam *catharticis* fortioribus quidpiam moliri: hujusmodi enim *pharmaca*, quatenus sanguinem valde fundunt, & serositates ejus in exitus apertiores adigunt, recrementa quævis à cruoris massa abscedere apta, *cerebro*, aut *pulmonibus*, si quando debilioris sint constitutionis, facile obtrudunt: Ita in juvene supra citato, sudore intempestive ex citato *æcuvia* supervenit. Novi etiam in morbida pulmonum diathesi *sudorifica*, non secus ac *chalybeata*, tabem intulisse.

Itaque phlebotomia, & si opus fuerit, *vomitio*, aut *catharsis*, scilicet altera,

altera, aut utraque mox ab initio morbi celebratis; cæteræ intentiones erunt, sanguinis serositates morbificas in *caput* & *thoracem* exundare aptas avocare, perque alias evacuationum vias leniter derivare, & foras excernere. In hunc finem *vesicatoria* circa *nucham*, aut *parotidas*, juxta *alas*, aut *Vesicatoria* *inguina*, circa *femora*, aut *suras*, scilicet modo in hac parte, modo in ista applicari debent; nimirum ut ulcuscula hic illic excitata, & continuo manantia, serum particulis heterogeneis & morbidis imbutum copiosè profundant.

Cæterum remedia serum in *renes* & vias *urinarias* blande ducentia, sæ- *Diureti-* pissimè cum fructu adhibentur: in hanc rem *Apozemata*, & *Iulapia diu-* *retica*, juxta formulas sequentes instituantur.

℞. *Radicum scorzonera*, *chærefolii*, *graminis*, *eryngii* condit. an. ʒ. vj. po- *Apozema*
mum j. incisum, *folior. pimpinella*, *Vimaria*, an. M. j. *passul.* ʒ. j. *β. C. Cervi* *diureticū.*
usti ʒ. ij. incis. & contus. coquantur igne claro in aq. fontana lb. iiij. ad tertia
partis consumptionem: colatura clara lb. ij. adde *syrupi acetositis citri*, aut
violar. ʒ. ij. *salis prunella.* ʒ. j. *β. f. Apozema.* Dosis. ʒ. iiij. ad vj. ter in die.
Vel colatura ista superaffundatur *amygdalar. dulcium excorticatar.* num. 15. *Emul'sio.*
& 4. sem. frigid. an. ʒ. j. contusis, s. a. fiat *Emulsio.*

℞. *Aq. Dracontii*, *cerasor. nigror.* an. ʒ. iiij. *scordii compositi* ʒ. ij. *The-* *Iulapium.*
riacalis ʒ. j. *β. syr. Caryophyllor.* ʒ. ij. *sp. vitrioli gutt.* xij. f. *Iulapium.*

Sal Prunella sæpius in die ad ʒ. β. vel ʒ. ij. propinetur in *cerevisia tenui*, *Pulvis.*
vel *sero lactis.*

Porro in hac febre *medicamenta blande diaphoretica*, ejusmodi imprimis, quæ *Blande*
spiritus animales restaurant, eosque copula quavis *heterogenea* vindicant, egregii *diaphore-*
sunt usus: quare aut *margaritarum pulvis*, aut *spiritus C. Cervi*, vel *sanguinis* *tica.*
in modica dosi bis in die, scilicet mane & vespere, exhibeantur.

Enemata quolibet ferè die injiciantur, & si opportunum videatur, *pharmacia* *Enemata.*
leniter solutiva, semel aut bis in septimana repetatur.

Victus non nisi tenuis, qualis nimirum in aliis febribus assolet, institua- *Victus.*
tur: carne, aut brodio ejus penitus interdictis, solum *jusculis avenaceis*,
aut *hordaceis* æger vescatur: potus sit *cerevisiæ tenuis*, aut *seri lactis.*

Quod si non obstante *persuulæ* quavis medica, materies morbifica ce-
rebrum, aut *pulmones*, vel simul utrumque occuparit, ita ut *functionis anima-*
lis deliquium & *inordinatio*, aut etiam *tussis violenta* ingruerint, considerare
oportebit, quid in utrolibet morbi statu, in conditionem malam ad hunc
modum evecto agendum fuerit; tunc autem *indicationes curativæ* respicere
debent *stuporem*, aut *insaniam*, aut *tussim*: atque demum, si morbo in decli-
natione posito, hæc symptomata remittent, contra *Atrophiam*, velut *ulti-*
imum hujus febris propugnaculum, remedia appropriata adhibeantur.

1. Itaque si *materia morbifica*, uti crebro assolet, *cerebro* illata, *stuporem*, *Methodus*
aut *affectus soporosos* intulerit, remedia ipsam aliò deducantia, & quoquo- *therapeu-*
modo à capite derivantia, insuper quæ *spiritus animales* exuscitant, & co- *tica in*
pulam impuram exuunt, sedulo administrari debent. Quare in hoc casu *stupore &*
exterius *Epispasticorum* usus plurimum augeatur, *spiritus C. Cervi* ferè *insania.*
sexta qualibet hora in dosi paulo majori exhibeatur, sanguis adhuc am-
plius è *venis jugularibus*, *salvatella*, aut etiam ex *venis sedalibus* *hirudinum*

suctu detrahatur. Si affectus minimè remittit, *capillitio derafo*, *fotus emolientes* capiti sæpius applicentur: porro *cucurbitæ*, *emplastra*, & *cataplasmata* plantis pedum admovenda, aliique administrationum modi, quales pro *stupore* curando vulgò indicantur, adhiberi debent: pariter, si malæ, aut nulli hujus febris *crisi*, *phrenesis*, aut *mania* supervenit, remedia in istis affectibus appropriata usurpentur.

2. Sin vero, cum vel sine hujusmodi plaga *capiti* illata, etiam *pulmones* morbi noxam luunt, ita ut ægrotantes, necdum febre immunes, cum *tussi molesta*, *sputo copioso* & *crasso*, non raro item *discolori*, in *tabem*, sive *phthisin* incidisse videantur, medicamenta in hujusmodi affectibus communiter indicata satis conveniunt, quare *decocta pectoralia*, *Ecclegmata*, *syrupi*, *aqua lactis*, & *limacum destillata*, aliaque hujus farinae remedia diligenter usurpari debent, quorum formulæ in casibus supra descriptis reperiuntur.

Hactenus *febrem continuam*, maxima ex parte *convulsivam*, atque ex *succi nervosi* non minus quàm *sanguinis* vitio oriundam descripsimus. Insuper hic subest *morbi*, febris intermittens typum referentis, atque in *succo nervoso* potissimum radicati exemplum proponere; cujusmodi affectus, siquidem oppido rari, atque ad pathologiam spasmodicam ritè pertinentis, natura ex sequenti historia elucescet.

Observa-
tio oppido
rara.

Mulier lectissima, tenera admodum, atque *cerebri* & *nervosi* generis constitutione imbecilliori prædita, proindeque affectibus *spasmodicis* valde obnoxia, postquam *utero* conceperat, circa quartum gravidationis mensem, à frigore suscepto *paroxysmis asthmaticis*, insuper *crebris spirituum deliquiis* gravissimè affligebatur: Verum ab hujusmodi pathematis remediorum *sale volatili* prædicatorum usu intra binas septimanas convaluit, attamen deinceps post sesquimenssem *affectio insolita*, & planè *admiranda* hanc dominam incessit.

Quodam mane, post *somnum* ea nocte minus tranquillum evigilans, in toto corpore levem *rigorem*, tanquam urgente febris tertianæ paroxysmo patitur: succedunt *crebra oscitationes* & *pandiculationes*, cum *frequenti vomendi nixu*: dein *urina*, quæ modo fuit *citrina* cum *hypostasi* laudabili, *pallida* & *aquosa* evadit, & *crebra vice*, scil. ferè quovis horæ *minuto* excernitur: porro circa *lumbos*, & *hypochondria*, aliisque in *locis dolores* cum *spasmis* levioribus huc illuc transcurrentes excitantur: Cujusmodi *symptomata* planè *spasmodica*, cum *crebro urina limpida mictu* à mane ferè ad *vesperam* persistunt; quo temporis spatio *lotii quantitas ingens*, nempe triplex ad minus supra liquorem assumptum redditur; interim nec calor intenditur, nec sitis urget, neque pulsus augetur: *vesperi* affectus prædicti cessant, atque *urina* rursus *citrina*, ac *modica* evadit; tota insuper nocte somno moderato fruitur; dein mane sequenti juxta *eandem horam* redit *paroxysmus*, simili prorsus *symptomatum* apparatu stipatus, & quotidie eandem omnino tragœdiam peragit.

Eius ætiologia.

Hanc Dominam postquam per *duodecim dies* hoc ritu ægrotat, invisens, prædicti casus hujusmodi *Ætiologiam* instituo: Nempe quod *morbus* iste in *nervoso genere* potissimum radicans, ab *humoris partes nerveas* irrigantis

effervesc

effervescencia & fluore dependeat : Enimvero suspicari licet, hunc *laticem* à sanguine, propter *catamenia* suppressa, degeneri facto, in *cerebrum*, & *nervosum genus* diffusum, plus debito *acrem* ac *serosum*, proindeque partibus continentibus *incongruum* evadere : quare à *somno* nocturno ad plenitudinem aggestus, eas propter sui *expulsionem* ubique in *corrugationes*, *contractiones*que irritat : hinc in toto corpore *rigores*, *pandiculationes*, *oscitatio* crebra, & *dolores* vagi excitati : porro à partibus solidis hoc modo *contractis* & *concussis* non tantum *liquor nervosus*, sed etiam *nutritius* partibus solidis ubique appositus, necdum verò assimilatus excutiuntur : ac dein uterque *latex receptaculis suis* exterminatus, & per *lymphaductus* aut *venas* exceptus, *massæ sanguineæ* redditur : è cuius sinu priusquam ab eo *tincturam lixiviale* acquirat, per *renes* denuo secretus *urinam limpidam* & *copiosam* constituit : quod autem affectus isti *periodos* adeo *exactas* observant, ratio est, quia *latex nervosus* inæquali dimenso suppeditatus, *stato* quotidie tempore ad *turgescentiæ plenitudinem* assurgit : propterea item *urina* ante & post *paroxysmum concocta* & *citrina* apparet, quia tunc materia ejus tantum è *sanguinis sero* constat : postea durante *accessione spasmodica* humor limpidus à *partibus nerveis* & *solidis* excussus, & sanguinem cito trajiciens, *lotii quantitatem* & *calorem* alterat. Huic gravidæ *phlebotomiam* ac insuper pulverem è *corallio*, *margaritis*, *ebore*, aliisque *cardiacis* compositum in liquore appropriato ter in die sumendum præscripti ; mane & vesperi cœpit *tinctura antimonii* (cujus effectum in *nimio urinae profluvio* singularem aliquoties expertus sum) *gutt. 12*. Horum usu intra breve tempus symptomata omnia remittebant.

C A P U T IX.

De spasmodis universalibus, qui propter succi nervosi diathesin scorbuticam excitari solent.

H Actenus de *spasmodis universalibus* per totum *genus nervosum* diffusis, qui *Spasmi universales* febribus superveniunt : ac speciatim de *convulsionibus*, quæ in febre *propter succi nervosi diathesin scorbuticam* *maligna hectica* vulgò dicta, excitari solent. Restat adhuc (quod tertio erat propositum) ostendere, quo ritu, & quibus de causis *spasmi universales*, absque *veneno*, aut *miasmate febrili*, propter *succi nervosi dyscrasiam scorbuticam*, aut *alias vitiosam* inducuntur. Enimvero liquor, tum *nervos*, tum partes nerveas irrigans, interdum à crasi naturali ac idonea desciscens *Horum duas species, scilicet discretas & connexas* particulis heterogeneis & explosivis in tantum refertur, ut spiritus animales copulam incongruam, sibi met ubivis accrescentem admittentes, in continuos velut *crepitus*, sive *explosiones convulsivas* irritentur : cujusmodi spirituum affectiones, aut sunt *divise*, sive *discrete*, inter quas nulla communicatio, aut dependentia intercedit, scilicet quando multæ partes corporis simul totidem *spasmodis* sibi propriis afficiuntur, qui se invicem

Successivè non excipiunt, sed in eodem musculo aut membro ubi incipiunt, terminantur : quo ritu novi quosdam ægrotantes, quibus musculi & tendines simul omnes in toto corpore totidem distinctis convulsionibus perpetuo subsilirent. Vel secundo *affectiones convulsivæ* quæ in toto genere nervoso simul excitantur, sunt *continuae*, sive *connexæ*, quæ perpetua quadam vicissitudine inter se continuatæ invicem succedunt ; in quantum membrorum fere omnium motus inordinati sese mutuo excipientes, ab una parte exorsi, mox in alias transeunt. Ita nimirum *Horstius* refert puellam *motibus convulsivis* obnoxiam, cujus non tantum membra, & artus in diversimodas flexiones, ac distorsiones urgebantur, verum insuper illa, tanquam malo spiritu agitata, eodem loco stare impotens, in hypocausto hinc inde discurrere, & saltare usque necesse habuit ; neque ulla vi, aut increpatione detineri potuit, quo minus hinc inde cursitaret, se modo impedes conjiceret, modo alias se impetuosè jactitaret ; nam si vel paululum tantum subsistere conaretur, statim præcordia gravissimè affligebantur. Quare præsentis instituti res est in *utroque affectionis convulsivæ*, nempe tum *illius* quæ per *tendinum & musculorum* unà *plurium subsultus* ; tum *hujus*, quæ per *membrorum*, aut *totius corporis æstra & inquietudines* peragitur, *naturam*, & *causas* paulo exactius inquirere : exinde ut constet qualis *medendi methodus* in utroque casu adhiberi debeat.

*Affectio-
nis con-
vulsivæ
intercisa
natura.*

1. Quod itaque spectat ad *speciem priorem*, facilè occurrit ejusmodi affectus non simplices, sed *complicatos* esse, nimirum ex *spasmo & paralyti*. Nam licet musculi, & tendines motibus convulsivis perpetuo urgentur, tamen ægrotantes enerves facti, membra quævis, aut totum corpus strenuè movere nequeunt : quinimo his pathematis *dolores* per singulos artus æquè diffusi adjunguntur. Hinc inferre liceat, spiritus animales *copula multiplici*, scil. *particulis*, tum *explosivis*, tum *narcoticis*, tum etiam aliquatenus *irritativis* imbui : adeo ut quamvis semper onusti, *explosiones* ineunt, tamen nec plures simul, ob particulas alias alius generis interjectas, nec quidem ulli expedite ac vegete exploduntur ; quare impetus motivus haud longè pergit, sed brevis usque & interruptus existit : Res ferè simili modo habet, ac cum *pulvis nitratus* humore limoso subactus ignitur : quippe non tota simul massa cum fragore eliditur, nec unus acervus illico alium accendit, sed pauca tantum grana, eaque successive, scil. alia aliquandiu post alia, cum exiguis crepitibus exploduntur : pariter & *liquor nervosus*, *particulis spasmodicis* quæ spiritibus usque accrescunt, per totum refertur ; in quantum vero quædam *narcotica*, aliæque *dolorifica* illis admiscentur, priorum *vis elastica*, utut perennis, & valde diffusa, tamen multum refringitur, ac ubique interciditur.

*Observa-
tio.*

Pro illustranda hujusmodi *affectione ætateque intercisa*, libet hic *generosi* cujusdam in hac vicinia nuper degentis, casum maximè notabilem describere ; cui quidem plane stupendo vix Medicorum scripta, aut observationes ullæ parem suggerunt. *Vir Illustrissimus* quem refero, parentibus, proavisque aut cerebri, aut nervorum dispositioni alias morbidæ obnoxiiis oriundus, circa ætatis suæ *ædipulæ* seminii istius *rore* fructus luere cœpit : primo enim artuum debilitate, stupore, & spasmis levioribus

tentari

tentari solebat, cujusmodi affectibus cum diu laborasset, demum curationis gratia *Bathoniam* adiens, *thermis* calidioribus nimis crebro usus, vice remedii tantam morbi exacerbationem retulit, ut ab isto tempore prædicta symptomata non amplius per vices, sed fere constanter urgerent; nimirum singulos artus, imo quamvis partem corporis motus convulsivi, & tensiones dolorificæ incessanter exercebant, ita ut musculi simul omnes subsultibus repetitis perpetuo convellerentur, idque non sine insigni cruciatu; cujus unica sedandi ratio in hoc sita erat, ut corpus modo totum, modo aliqua ejus *membra* motu locali perpetim exercebantur: quamdiu enim evigilabat, in lecto vel sedili agitari, aut in curru vehi, aut membra comprimi vel fricari necesse habuit; in quem finem illi parabantur cathedræ & lecti cum basi arcuata, uti sunt puerorum incunabula, in quibus cum decumberet, vel erectus sederet, huc illuc, motu versatili, continuo agitaretur; quod ni fieret, immani dolore, & musculorum tensionibus atrocioribus infestabatur: Hujusmodi *diurnam* affectionis spasmodicæ molestiam tempore *nocturno*, & statim à *somno* symptomata longe graviora exceperet: nam recens expergefacto, illico totum corpus horrescere, musculi tensionibus dolorificis plurimum exerceri, singuli artus, velut instanti mortis agone, sudore squalido perfundi solebant; qui in tantum corrosivus erat, ut instar *aquæ fortis*, linthea, ni statim abluerentur, cito exederet, & corrumperet. Ager durante hoc conflictu sudores inter & horrores per plures horas torquebatur, donec penitus defatigato somnus obrepens levamen aliquod afferret; quod si paroxysmo ingruente protinus è lecto excitaretur, melius habuit, adeoque solitam affectus ferociam præcavebat: idcirco quamprimum à somno expergisceretur, licet hoc intra horæ semissem contingeret, illico ut torturam evaderet, domesticis ascitis, statim lecto eximebatur: quantum ad appetitum satis valens, absque nausea comedebat, neque à comestis stomachus turbabatur; sæpe tamen de *cardialgia* querebatur, ac interdum *sputatio molesta*, cum *fæore oris*, velut ab assumpto *mercurio*, per plures dies eum exercebat. Calidiora quævis, tum alimenta, tum pharmaca constitutioni ejus minime congruebant; vinum, aut cerevisiam generosiores ne pitissare audebat. Primis ægrotationis suæ annis ad conspectum ignis horrescebat, postea imbecillior factus, licet urgente bruma, prope focum sedere renuebat. Urina semper fuit citrini coloris, quæ si in vase fictili supra prunas evaporaretur, fæculentiæ salinæ, supra dimidium liquoris, in fundo residabant; alvus continuo astricta, nisi à pharmaco, aut enemate irritata, sarcinam nunquam deposuit. Quinimo præter motus convulsivos *paralysis spuria* totius corporis membra quævis occupabat; nec enim manus attollere, aut pedes gressui accingere potuit: lingua vacillans verba non nisi imperfecta protulit, interdum vero cum ex occasione gaudio repentino gestiret animus, spiritibus, & robore mire exsuscitatis, è cathedra subito surgere, & sine alterius ope recta incedere, & salire valebat; quod tamen intervallum vix horæ minutum durabat, quin membra denuo vacillarent, & solito languore & tremore afficerentur. Cum supra duodecim annos Dominus insignis ad hunc modum ægrotabat, Medicorum in

tota Anglia maxime celebrium consilia adhibuit, & remedia quamplurima, ac fere nullius non generis tentavit, scilicet *antiparalytica, antiscorbutica, dietas exsiccantes, sudoriferas, purgantia, cantheria, balnea, linimenta, quin & salivationem* bis expertus est: verum nulla ejusmodi medendi methodo sanari potuit, quare dimissa penitus curationis spe, per septem posteriores vitæ suæ annos tantum remedia quædam symptomata præcipua respicientia usurpavit; scilicet ter in septimana medicamentum solutivum, ex *senna & rhabarbaro*, cum correctivis, in forma modo *syrupi*, modo *extracti* cepit; *opiata* ex conservis & speciebus temperatis dosim qualibet nocte sumere solebat: porro *Iulapium* pro data occasione, cum spiritus fatiscerent, sumendum præsto habuit, insuper *cerevisiam avenaceam*, herbis temperatis & diureticis alteratam continuo bibebat. Horum usu septem ut minus annos, sine magna in pejus alteratione transegit; tandem ingravescente *senio*, simul ac *morbo*, spasmodorum paroxysmi atrociores, non uti prius, somno peracto, sed quamprimum lecto incalesceret, ipsum invaserunt, ut necesse habuerit lecto suo omnino abstinere, atque vestimenta raro, nisi ut lintea mutarentur, exuere: hinc transpiratione impedita, recrementa serosa, aliaque evaporari solita, in *pulmones* defigebantur, quæ primo *respirationem crebram*, postea *affectionem asthmaticam*, ac denique *tabem lethalem* intulere.

Symptomatum præcipue urgentium rationes.

Si prædictorum *affectionum rationes* inquirantur, obvium erit, universa hæc mala à *prava cerebri, & nervosi generis constitutione*, ac immediatius *succi* istas partes irrigantis *dyscrasia*, ac vitio deducere. Nam cum liquor iste, in quo spiritus animales scaturiunt, quoad *temperiem* summe acris, & instar *aquæ stygia* corrosivus esset, & quoad *mixturem* particulis tum *narcoticis*, tum *explosivis* referebatur: haud mirum est, propterea *spiritus* plurimum onustos, proindeque à debita expansione cohibitos, ubique in minutas *explosiones*, seu velut *crepitu* urgeri, & *corpora continentia* à debita tensitate, & robore exsoluta, etiam in corrugationes dolorificas continuo irritari.

Exacerbatio mox à somno processit.

Affectiones istæ *spasmodica* mox à somno acrius infestabant, quoniam calor lecti heterogeneas *succi nervosi* particulas exsuscitat, easque rarefaciens velut in *explosiones* adigit; tum etiam quia *partes nervosæ* in somno *succum suum*, ac cum eo simul allatæ materiæ morbificæ penum uberiores imbibunt; quibus ad plenitudinem saturæ, primo evigilationis instanti, protinus quod molestum est excutere nituntur. Propter hanc rationem observare est *scorbuticorum* dolores, & *asthmaticorum* paroxysmos à lecti calore, atque à somno plurimum ingravescere; ideo statim lecto eximi, ut his, ita

Cur motu sedatur.

agroto nostro levamen conferre solebat. Quod autem molestia à continuis musculorum subsultibus, & tensionibus dolorificis excitata, corporis, aut membrorum motu locali aliquatenus sedaretur, ratio est quia spiritus animales, dummodo in actiones diversas ab extra coguntur, inordinationes quasvis ab intra suscitatas remittunt: etenim ut in *dolore & pruritu*, qui leviores sunt spasmi, partem affectam comprimere, fricare, aut scalpere juvat; ita musculorum, ac tendinum motus convulsivi, à totius corporis, aut membrorum agitatione inordinata aliquatenus placantur.

Quod

Quod spectat ad *ptyalismum*, sive copiosam *oris sputationem*, cum foetore *Ptyalismus* anhelitus, quæ incertis intervallis redire solita est; suspicari est, eam for- *ratio.* te à *mercurio* clanculum aliquando exhibito processisse; quanquam & multos viderim affectibus tum convulsivis, tum scorbuticis laborantes, quibus hujusmodi perpetua sputi ex ore defluxio, citra omnem Mercurii suspicionem molesta fuit; nonnullos etiam (uti mox infra dicitur) quibus salivatio superveniens (materia explosiva ad hunc modum critice evacuata) morbum solvit: porro verisimile est, hunc affectum à meris succi nervosi recrementis productum fuisse; *ductusque salivales*, cum plures & satis patentes fuerint, superfluitates à *nervis*, æque ac *arterius* in glandulis copiose depositas excipere, & foras convehere.

Quoad *lucida intervalla* quibus æger inducias quasdam, licet breves, mi- *Cur æger* tigata quasi morbi ferocia, obtinere solebat; ut quem modo ægritudo ca- *hic indu-* thedræ alligabat, derepente exsilire, & circumcirca deambulare potuerit; *cias quas-* insperato tamen atque evanido hoc robore, mox iterum in pristinum lan- *dams obti-* guorem desinente: Dico ejusmodi motus naturæ laborantis, & sub *nuit.* gravi onere prostratæ, fortiores quosdam nixus, & ultimos conatus esse, quibus scilicet ad momentum temporis se recolligit, & quasi morbi jugum excutere tentat; verum quia huic certamini diu sustinendo impar sit, denuo statim relabitur, & pristina succumbit sarcinæ. Profecto mirum est quantum supra naturæ vires, *ira ac timor*, aliæque animi passionες quædam nervosum genus intendunt, atque impetus plane stupendos edere cogant: sunt vero exiguæ tantum durationis hæc *conatum prodigia.*

Designata ad hunc modum morbi prædicti *causa conjuncta*, & *symptomatum* præcipue urgentium *rationibus* ostensis; adhuc inquirendum restat, circa causam *ægy ptyalismu*, nempe ob quas *ægy ptyalismu* succus nervosus ita degener factus, primo *paralysin*, ac deinde *musculorum* omnium *subsaltus*, sive *spasmos* intestinos intulerit: porro explicare oportet, quamobrem morbi hujus fructus paulatim accrescentes, *thermarum* usu tam cito ad maturitatem pervenerint: item quare *ægritudo* ista nullis remediis cedens, *incurabilis* extiterat.

Quoad *prims*, dicendum esse videtur, quod ægrotans parentibus, qui *Prædicti* morbis cephalicis graviter obnoxii fuerunt, oriundus, malam *cerebri* & *affectus* *nervosi generis* constitutionem originaliter contraxerat, adeo ut intra sex- *causa* tum ætatis suæ lustrum *paralysi spuria* laborare inceperit; dein cum *ægy pty-* *alismi.* *catarxi* huic *hereditaria causa* evidentes sanguini, & humoribus majorem indies labem affigentes accederent (erant enim varii casus atque infortunia quæ viro eximio mœstitiam & melancholiam continuo intulere) propterea quidem *liquor nervosus sale fixo*, & *scorbutico* supra modum imbutus, instar *aquæ fortis*, aut *stagnatis vitriolici*, summe *acris*, & *irritativus* evasit; proindeque spiritus, & corpora eos continentia, non secus ac prædicti liquores lumbricis suffusi, in corrugationes, & contracturas spasmodicas continuo incitaverit.

Quod autem hic *morbis*, primo sensim accrescens, *thermarum calidiorum* *Cur affe-* usu in statum longe deteriorem cito evehebatur, ratio facile patet: expe- *ctus hic* *therma-* rientia

rum usu
ingraves-
cebat.

rientia enim constat *balnea calida*, & *sulphurea* in corpore humano *salinas*, aliasque *morbidas*, quæ intra viscera, aut humores scatent, *particulas* plurimum exaltare, & cito ad ἀνρότνας perducere; eas scilicet exagitando efferatiores reddere, è primis viis in sanguinem, & exinde in cerebrum & nervosum genus urgere, quinimo prius secretas & otiosas conjungere, ac in ζύωσιν quandam incitare: quare qui aut *arthritis*, aut *calculo* hæreditario obnoxii, istorum affectuum paroxysmos nondum perpeffi fuerunt, à *thermarum* usu sæpissime alterutrius morbi fructus in se statim maturari sentiunt. Cum itaque in hoc ægrotante & sanguis, & liquor cerebrum nervosum irrigans particulis tum *narcoticis*, tum *spasmodicis* imbuerentur: quin & à crassi dulci, & *balsamica* iste versus *salsum*, atque hic in *acetosum*, & *stagnatis vitriolici* æmulum degenerarent, tantum abfuit *aquarum calidarum mineralium* usus ab auxilio ferendo contra hæc mala, ut propterea statim omnia plurimum exacerbarentur: atque *morbis* ab humoribus, quoad *temperiem* & *mixturam* ita depravatis procedens, nullis uspiam remediis curari potuerit; nihilo facilius scilicet quam *acetum* in *vinum* reducat.

Cum *Illustrissimi* hujus viri à *phthisi* demum extincti *cadaver* aperuissim, pauca admodum ejusmodi gravissimorum pathematum *vestigia* detegere licebat. Hinc ut constet, *paralysin* & *spasnum* non tam à crassa & copiosa materia, alicubi in *mineriis* congesta, quam à mala spirituum animalium, qui subtilissimi ac invisibiles sunt, affectione pendere. Quæ circa hujus *anatomem* notatu digna occurrebant, paucis exponam.

In dissectione
cadaveris
notatu digna.

Abdomine aperto omentum (prout in plerisque à *tabe*, aliisque morbis chronicis interemptis assolet) putridum erat, & fere consumptum. Interim *ventriculus*, *intestina*, *pancreas*, & *mesenterium* satis recte habuerunt; scilicet *membrana* erant firmæ, bene coloratæ, & abscessu quovis aut *tumore scirrhuso* liberæ: *intestinis* majoribus *excrementis* quædam *carneæ*, instar *auricularum muris*, adnascebantur; hujusmodi cum plurimæ fuerint, ex utroque *intestinum coli*, & *recti* latere, ad certa quasi stadia, instar ramorum arboris, gemellæ prodibant: Simile quiddam in *tabido* olim reperi: Hujus ratio videtur esse, quod in *phthysicis nutritio* (licet circa partes solidiores & exteriores deficiat, aliquando tamen) interior prope succi nutritii fontes plus debito perficitur, proinde ut *epiphyses non naturales*, & superflue excrescant.

Lien, qui semper pessime audierat, & à plerisque medicis, velut *scorbuti*, & cæterorum omnium affectuum *causa principalis* damnatus fuerat, prorsus insons, & quavis culpa immunis apparebat: nam prout in maxime sanis observamus, fuit *subatri coloris*, *mollis*, & *superficie æqualis*, *obstructione*, aut *scirrhuso* quovis liber, *fibris*, & *vasis* satis *distinctis*, & *firmis* præditus: è compage ejus dissecta sanguis nigricans effluxit.

Hepar (quod equidem mirari subest) mediocriter se habuit, nec à tam gravi & diuturna ægrotatione solito durius, aut *scirrhusum*, aut *tuberculis* oblitum evaserat: erat tantum grandius, & coloris nonnihil obfusci.

Renes, licet *calculo* ac *ulcere* quovis immunes, tamen culpa non vacabant: nam in medio dextri renis *cavitas* ingens à *pelvi* distincta, eoque multo amplior, aqua limpida impleta conspiciebatur: talem in *hydropicis* sæpe numero

numero comperi : atque hæc quidem fortasse ex sero in renem istum de-
posito, quod haud facile per meatus, & poros ejus percolaretur, orta est;
quippe serum inibi subsistens, ab initio specum sibi exiguum procuderat,
quæ sensim postea dilatabatur : cumque ob hanc rationem seri secretio,
& per ureterem exitus aliquatenus præpedirentur, latex ejus in sanguinem
restagnans capiti noxam graviores intulit, quod quidem eo magis suspi-
cari fas erat, quia *ren* etiam *sinister*, valde extenuatus, & absumptus, plu-
res *hydatidas*, & cavitates aqua limpida repletas continebat.

Pulmones sterno, & costis, & diaphragmati undequaque adnati, sine ulla
ferè distinctione lorum, unà tantum compages carnis spongiosæ, putri-
dæ, & materia ichorosa per totum infarctæ videbantur. Proculdubio *agro-*
tans hoc malum non ita pridem contraxerat, scilicet cum nullo corporis
exercitio defungi, nec intra lectum, ut liberius perspiraret, commorari po-
tuerit, sanguinis fæculentiæ, & recrementa, quæ per cutim evaporare so-
lita sunt, in *pulmones* deposita, in causa erant quod hi & inter se, & cum
aliis partibus concreverent, eorumque *tonum & conformationem* prorsus
vitiant, itaut *phthisis* demum exorta cæterorum affectuum, quibus diu
ac misere affligebatur, *effectus, & productum*, ac minimè *causa* fuerit.

In *utroque cordis ventriculo* sanguis in substantiam solidam, albidam, &
carnis coctæ æmulam concreverat, quæ juxta *cordis, & vasorum* cavitates,
& processus effigiata, *serpentis*, cum *cauda multiplici & divisa*, figuram
nonnihil referebat; quo quidem in multis post longam invaletudinem
defunctis, nihil usitatus occurrit : Cujus ratio est, quod sanguis à longa
ægritatione effectus, atque hinc circa præcordia pigre circulatus, in corde
& vasis appensis *stagnare* incipit, proindeque in *concreta* ejusmodi *carnea*
sensim congelatur.

Dum *cranio aperto* præcipuam morbi causam inter contenta ejus per-
quirimus : primo occurrebat, *cerebri molem* justo minorem, & *gyris paucio-*
ribus instructam fuisse, unde spiritus animales non satis copiosè productos
suspicati fuimus : porro universa *τε ἐγκεφάλου* compages justo humidior,
latice aquoso madida & prorsus immersa videbatur; ut integumenta ejus,
scilicet *meninges integra* divellerentur, atque *anfractus & ventriculi* omnes
aqua limpida inundarentur. Probabile est hoc *cerebri diluvium* nuper acci-
disse, nempe quatenus ob *σπινωλὴν impeditam*, & *lotii secretionem* parcius
habitam, *serositates* in massa sanguinea aggestæ capiti traderentur : ideo-
que *cerebri* substantia, & imprimis *corpora striata* uliginosa prorsus & tam
madida erant, ut discissa eorum substantia vix compacta maneret, quin, li-
quidorum inspissatorum, more aliquatenus diffunderet : intra *sinus cerebro*
ejusque *appendici superstratos ac insertos*, atque *vasa* ex iis prodeuntia,
sanguis in *glomeres* duriusculos, ac velut carneos, non secus ac intra *cordis*
ventriculos, & *vasa* iis appensa concreverat; quod etiam nuperrime cum
sanguis pigre circularetur, propter eandem rationem, qua sanguis intra
præcordia coagulabatur, accidisse putamus.

Spinalis medullæ truncus aquæ limpide immersus valde extenuabatur,
ut vix dimidium ossæ cavitatis impleverit : quod equidem à *seri salis*, cui
velut incoquebatur, colluvie effectum censemus.

Aff. Affectio-
nis con-
vulsiva
continua
natura,
& fieri
modus.

Hæc de *spasmodis universalibus*, qui *affectioni paralytica* ut plurimum conjuncti, simul in pluribus locis *diversim* excitantur: restant alii quos *continuos* appellavimus, quia scilicet à *partibus aliis* in *alias* subito translati, se mutuo excipiunt, atque membra modo *hæc*, modo *istâ*, & non raro totum corpus involuntariè moveri, & diversimode flecti aut agitari cogunt. In hujusmodi casibus *spiritus animales* non tantum *insiti* in *privatis quasi focus*, & *mineris* copulam explosivam sibi met asciscunt, & eam quatenus, vel *saturati*, vel *irritati* per vices quasdam elidunt; sed cum tota *liquoris nervosi* massa *particulis elasticis* abunde scateat, hæc quidem spiritibus tum *influis*, tum *insuis* ubique accrescunt, quos propterea in spasmos ferè continuos cient: in quantum vero spiritus non simul omnes, utcumque prædispositi, explodi queant (quia scilicet tantis illorum agitationibus intra ductus nervos spatium satis amplum non conceditur) idcirco *impetus explosivus* in *his* aut *illis* partibus exorsus, inde mox in *alias*, & subinde in *alias* transfertur, adeoque instar *pyroboli*, aut *ignis missilis* è pulvere tormentario conflati, sese huc illuc ocysimè proripientis, ex artubus *his* in *illos*, & dein statim ex omnibus, in *præcordia*, aut *viscera*, ac vice versa vage transcurrit. Quo hujusmodi *affectio* *typi* innotescant, libet hic *agrotantium*, quibus olim sanandis operam navavi, *casus* quosdam rariores proponere.

I.
Observatio.

Virgo lectissima & piissima, procera & gracilis, patre valetudinario, scilicet gravissimis nervosi generis affectibus obnoxio genita, circa vicesimum ætatis suæ annum *cephalalgia* valde atroci, & periodica per plures dies affligebatur; instante demum *solstitio brumali* 1656. *dolor capitis* remisit, sed in vicem ejus ingens *catarrhus*, cum sputo tenui & copioso, necnon ulcerosa narium, oris, & gulæ affectione successit; cum hujus molestiam aliquandiu pertulisset, tandem ex mulieris cujusdam præscripto, *sumum succini* per tubulum ore excipiens, derepente sanata est; *catarrhus* nempe subito sistebatur, subinde vero conquesta erat de *vertigine* insigni cum *capitis dolore* & *aurium tinnitu*; die tertio, cervicis tendines convellebantur, ut caput modo antrorsum, modo retrorsum, modo ad latus deflecteretur, modo rigidum & immotum perstaret; brevi posthæc totius corporis membra exteriora, & artus ejusmodi *affectio spasmodica* invasit: brachia & manus mire contorquebantur, ut eorum flexiones & convolutiones haud quispiam *agyrta* aut *gesticulator* imitari potuerit; crura & pedes huc illuc divaricare, mutuo concutere, & alternatim transponere necesse habuit: ad hunc modum aut in cathedra sedens, aut lecto commissa, nisi à somno obrueretur, motibus convulsivis perpetuo afficiebatur: cumque summo musculorum nixu membra paululum cohiberet, statim respiratione difficili & anhelosa, cum præfocationis sensu corripiebatur; interim vero oculi, fauces, os, & viscera interiora spasmo quovis immunia perstabant; nec vomitu, rugitu, neque ventris hypochondriorum inflatione tentabatur: porro animo usque constitit, memoriæ, intellectus, & phantasie munia ritè obivit, nihil delire aut insipienter loquuta est, aut egit; quin inter stupenda hæc mala verbis usque piis, & probis fortitudinis & patientiæ Christianæ specimen admirandum exhibuit appetitus cito dejiciebatur, ut cibos, & ali-

menta

menta quævis valde averfaretur; fitis autem continuo urgebat: vires admodum debiles fuerunt, ut nec stare, nedum pedibus incedere potuerit: urina erat coloris citrini, falfedine plurimum saturata, in cujus superficie pellicula tartarea concrefcebatur.

Cum *sexto* ægrotationis die ad hanc *Dominam* accerfcerer, admirandi istius affectus hujusmodi *Ætiologiam* instituebam: Etenim ne cum multis aliis statim omnia ad *fagarum præstigias* referrem, patris ejus consideratio effecerat, qui in eadem domo passionibus spasmodicis tunc temporis gravissimè laborabat: quapropter ut symptomatum istorum causas naturales investigarem, imprimis obvium erat, suspicari *dominam* illam *hereditaria* affectionum convulsivarum seminia contraxisse, quæ tandem circa ætatis suæ *anulw* in ejusmodi fructus eruperunt: cum enim sanguis particulis heterogeneis & explosivis plurimum imbueretur, istæ demum (prout in tali diathesi assolet) in caput suffundi, ibidemque affigi cœperunt; primo igitur in *meningas* depositæ *cephalalgiam* immanem & periodicam induxerunt; dein postea eadem materies, metastasi accidentaliter facta, in *gula* ac *oris* emunctoria decumbens, *cephalalgiam* in *catarrhum* commutavit; cum denique intempestivo remedii adhibiti usu *defluxio* fisteretur, materies morbifica in *cerebrum* regurgitans, *vertiginem* intulit, & exinde in *nervosum* genus detrusa, prædictas affectiones *παραώδεις* excitavit.

Quod vero spectat ad *rationem formalem*, seu generationis modum, quo materies spasmodica in nervosum genus decumbens symptomata isthac Prædictæ
casus Æ-
tiologia. admiranda produxisse videatur: opinari fas sit, quod eadem ab *ἐγκεφάλῳ*, utpote firmioris, confinio in *medullam spinalem* ejusque appendicem detrusa, ac instar fermenti maligni habens, imprimis succi has partes irrogantis massam integram particulis heterogeneis & summè explosivis infecerat; quæ spiritibus per totas eorum series ubique dispositis accrescentes, ipsosque velut æstro quodam agitantes in explosiones continuas irritabant: revera cum *succus nervosus*, uti dictum est, à materiæ spasmodicæ influxu ita fermentatur, qui partes continentes alioqui blando allapsu irritaret, atque spiritus animales cum expansione æquabili per easdem trajiceret, nunc idem fibras nerveas in varias contractiones, & corrugationes torquebat, atque spiritus tum influos, copula nimirum heterogenea onustos, à debita irradiatione inhibebat; tum partis cujusque *insitos* variè exagitans, *afflatu* velut *diabólico* incitabat, adeo ut appetitus imperio minimè obsequentes, motus inordinatos iniverint, eosque huc illuc rapide translatos, reciprocatione perpetua iterarint.

Quamvis autem particulæ heterogeneæ è sanguine in cerebrum suffusæ, indèque in *genus nervosum* protrusæ, haud ex æquo nervorum omnium origines, sed *spinalem medullam*, ejusque propagines nerveas præcipuè, ac ferè tantum subiere; ita ut *viscera* interna, insuper *oculi*, *oris*, & *faciei* partes spasmò quovis immunes perstarent; iste tamen impetus explosivus, quo minus à membris exterioribus obiretur, vi quadam inhibitus, illico velut *ignis missilis*, qua data via, in *præcordia*, ac imi ventris *viscera* incurrere solebat: quia scil. *spiritus influi* æstro quodam perciti, & spatium

amplius in quo baccharentur exigentes, ab uno loco exclusi, mox alium alicubi patentem subeunt, quapropter *æstrum* illud, si tum à membris, tum à visceribus fuisset repulsum, non dubito quin in *cerebrum* regurgitasset, *furorem* ibi aut *ἀναισθησίαν* quasi *epilepticam* illaturum. Quæ quidem symptomata abesse contigit, eo quod Dominæ hujus ingeniosissimæ cerebrum constitutione firmiore præditum, è liquore nervoso recens instillato quicquid congruum & spirituosum fuerat, in penum propriam arripiebat, eoque fruebatur: interim particulas quasque morbificas in *spinalem medullam* deprimebat, à quibus membrorum motus involuntarii, eo quo dictum est modo excitabantur.

Methodus
therapeu-
tica in
hoc casu
observa-
ta.

Præclaræ hujus virginis *curationem* moliri rogatus, facta imprimis levi corporis præparatione, *portionem solutivam* ex infusione *sennæ & rhabarbari*, adjectis *santalo citrino*, & *sale absynthii*, propinabam, qua duodecies cum magno levamine purgata fuit; die sequenti è brachio sinistro sanguinem ad ℥. viij. detraxi, quovis vesperi opiatam ex aqua & syrupo *florum verbasculi* cum *pulvere margaritarum* exhibui: insuper semel intra sex horas dosim *spiritus C. Cervi*, cum haustulo *Iulapii* sequentis sumendam præscripsi. ℞. *Aq. cerasorum nigrorum*, *juglandum*, *florum pæonia*, an. ℥. iij. *antiepilept. Langii* ℥. ij. *syrupi è floribus pæonia maris* ℥. ij. *margarit. pul.* ℥. j. *misc. f. iulapium*: quia *purgationem* multam ferre nequibat, *enemata* ex lacte *saccharato* erant crebro in usu: præter *linimenta antispasmodica cervici & spinæ* applicata, *frictiones* membrorum affectorum cum pannis laneis oleo appropriato madefactis, & excalefactis frequentes institui.

Horum usu intra sex dies *agrotans* plurimum alleviari visa fuerat; nam motus convulsivi ferè in totum cessabant, membra in debito situ, & quiete continere potuit, solummodo *caput* contractione leviori interdum huc illuc leniter deflectere cogeatur; porro cathedra exurgere, & parum incedere valuit; sed dum gressum faceret, non recta, sed *in latus* oblique procedebat: Hoc tempore discedens, eam multo melius habere visam in manifesto convalescentiæ statu reliqui: post alteram vero septimanam, cum *Boreas* inclementior nocturno tempore exortus, fenestra haud firmiter occlusa *agrotanti* lecto commissæ vehementius afflaret; illa statim à frigore suscepto ejusmodi *recidivam* passa fuit, ut non modo *pathematis spasmodicis*, verum & *paralysi universali periodica* obnoxia evaserit: nam deinceps à mane usque ad *vesperam* capiti & membris (uti prius) huc illuc vicissim flexis atque jactatis, *artus* successivè omnes circumagere, deflectere, ac variè detorquere coacta est; donec sub *noctem*, motibus ejusmodi prorsus sedatis, *membrorum resolutio*, sive *paralysis* succederet, ita ut nec manus, aut pedes, neque ullam præterea partem movere, aut corporis nixum quemvis motivum exercere potuerit, intra lectum instar saxi ferè *immobilis* jacens; at aliquanto somno relecta, circa mane prout *facultatis motiva regularis* virtutem quandam, scilicet brachiis & cruribus huc illuc, imbecillius licet, deflectendis parem recuperavit, sic etiam *motus convulsivi & involuntarii*, per totum exinde diem perdurantes constanter redibant, qui *vesperi* rursus in *artuum resolutiones* commutabantur.

Ex his liquido constet, *Dominā agrotantem*, & duplici morbo, scil. *paralysi*

ac *spasmo* laborasse, & utriusque *causam materialem* aliquatenus *distinetam* fuisse: videtur enim, quod *spiritus animales* ubique scatentes, à particulis *narcoticis* onusti fere continuo ligarentur: præterquam quod inter dormiendum, unà cum succo nervoso, *particula spasmodica* ubertim influentes, etiam spiritibus accrescerent, quarum *explosionibus* spiritus incitati motus involuntarios produxerunt; quin & *copula narcotica* eo tempore aliquatenus excussa, etiam voluntarios, seu regulares quadantenus perficere valuerunt. Præter remedia modo citata, alia quamplurima cujusque fere generis, scilicet *antisorbentia, antiparalytica, decocta, sudorifica, aqua destillata, spiritus, elixires, tinctura, balnea, linimenta* cum multis aliis sedulo adhibebantur; quorum usu symptomata nonnihil remittebant; haud tamen morbus integre sanabatur: *paralysis universalis* brevi cessabat, ita ut omni tempore artus movere, & huc illuc deflectere potuerit; quin & membrorum *motus involuntarii* eam rarius molestabant; usque tamen *languida & imbellis* perstitit. Cumque illa constitutionis tenerioris ac in tabem proclivis, & nunc quidem nulli exercitio habilis esset, ob transpirationem impeditam sanguinis recrementa in *pulmones* deposita *tussim* inferebant, quâ indies ingravescente, demum *phthisica* interibat.

Ante plures annos accersebar ad *virginem nobilem*, simili ferè ritu & aliquanto gravius ægotantem: Hæc enim *capitis & membrorum motus involuntarios*, nempe aut *succussiones*, aut huc illuc *deflexiones*, vel *circumactiones* fere perpetua vice redeuntis perpessa fuerat: insuper *diaphragmatis, & musculorum respiratori* inservientium *spasmo* admodum molesto, & plane stupendo afficiebatur: Etenim quovis horæ minuto, & sæpius, *spina dorsalis* circa medietatem ejus subito incurvabatur, simulque *pectore* antrorsum exsiliante, & *hypochondriis* introrsum contractis, *singultus* valde sonorus, idemque *duplicatus*, modo *triplicatus*, minus tamen, & usque minus stridulus edebatur: per plures horas hujusmodi *motus, & stridoris reciprocationes* obire solebat, ut per totas ædes exaudiretur: si quando breve hujus interstitium contigit, illico *brachia & manus*, modo *crura & pedes* valde concutere, aut contorquere, quin etiam *caput* modo rapidissime conjectare, mox cervicem quasi rigidam, & immobilem tenere cogebatur: quandoque inter loquendum *lingua* eo ritu corripiebatur, ut idem verbum sæpius immo aliquando vices utminimū repeteret: Cum in membris exterioribus motus convulsivi fortius urgerent, ab affectu isto *stridulo, & singultuoso* aliquantulum vacabat, atque hoc spatium intermissionis, & levaminis sui tempus dicebat, licet interea caput ac membra motibus violentis huc illuc proriperentur: si quando in latus sinistrum decumberet, statim dextri hypochondrii introrsum contractio, cum singultu ciebatur; Intra paucos dies hujusmodi pathematum assiduitate viribus plurimum dejectis, tantam in *lumbis & crurum artibus* imbecillitatem contraxit, ut nec stare, nedum pedibus incedere potuerit: *ventriculus* sive languore, sive *spasmo* affectus, quidvis ingestum vomitu reddebat.

In hoc casu, sicuti in priori plane constat, *spiritus animales*, non modo huic aut isti parti vel regioni *insitos* copulam heterogeneam per vices quasdam elidendam contraxisse, sed & *spiritus nervorum* quorundam *in istos* parti

2.

Observatio.

Casus descripti naturæ & causæ.

particulis explosivis imbutos, motus convulsivos perpetuos & vagos intulisse. Cumque ab initio contigit *spiritus* ita affectos, non omnes simul *neros*, nec quosvis indifferenter, verum *spinalis medulla* appendices, atque ad *diaphragma* pertinentes, fere tantum subiisse, ita ut intra horum spatia, spirituum continuo explosorum debacchatio limitaretur, propterea quidem accidit, *affectiones spasmodicas*, in una qualibet istarum parte cohibitas, in alia statim ferocius erupisse; cumque ex proprio instinctu, illorum impetus motivus in una regione intenderetur, in altera idem interea remitti solebat. Porro in hac ægrotante *materies morbifica*, particulis tum *narcoticis*, tum *spasmodicis* constans, affectionem una *paralyticam* ac *convulsivam* inferebat.

Die quarto adveniens pharmacum *emeticum* propinabam, à quo septies evomuit pituitam viscidam, cum bile flava copiosa, sine quovis tamen levamine: die postero *sanguinem* è brachio detrahebam ad $\frac{3}{4}$. vj. exinde statim sanguine versus caput impetuosius raptò, de *cephalalgia*, & *vertigine* plurimum conquesta erat: intra triduum vero *phlebotomia* in pede celebrata, semelius habuit: sumpsit postea remedia nervorum affectibus dicata, scilicet *spiritum C. Cervi*, & *sanguinis*, *pulveres testaceos*, & *bezoarticos*, *julapia*, & *electuaria antispasmodica*: Horum usu symptomata nonnihil remittere visa, usque tamen aliquatenus, juxta typos modo descriptos, perdurabant: Post duas septimanas, ex præscripto mulieris cujusdam rusticæ, cepit sanguinis ex *aure asini* detracti cochlearia sex in haustu cerevisiæ, à quo derepente sanari videbatur: nam motus convulsivi illico omnes cessabant, iisque per 24. horas immunis degebat; attamen morbus cum solita ferocia propediem revertens, neutiquam isti remedio, nec quidem facile aliis quibusvis cedebat: Itaque in posterum cepit *medicamenta methodice* præscripta: semel intra sex dies blande purgabatur; præterea sumebat *pulverem* ex *bezoar*, *margaritis*, & *coralliis* cum *rad. & sem. paonia* compositum; item *electuarium* ab *Horstio ad convulsiones* hujusmodi *admirandas præscriptum*; insuper *julapia*, & *decocta in affectibus spasmodicis appropriata*: *Enemata* erant crebro in usu, *frictiones*, *vesicatoria*, & *linimenta* cum fructu adhibebantur: Intra alteram hebdomadam *affectio singultuosa* prorsus cessabat, quin & reliqui motus convulsivi, sensim mitiores facti plurimum remittebant: ab istis verò *pathematis* convalescens, *catarrho* in fauces decumbente, in tantum molestabatur, ut *salivam acrem*, & velut corrosivam fere continuo exspueret, ac si ab assumpto *Mercurio salivatio* induceretur: quod equidem remedii genus in hoc casu peridoneum fuisse eventus comprobavit: ab eo tamen adhibendo, quia cum ægrotantis, & amicorum ejus venia minime licebat, prorsus abstinebam.

Postquam *sputatio* isthæc copiosa, & valde molesta per plures dies perstitisset, morbus fere in totum sanari videbatur: adeo ut *domina illustris* moribus convulsivis libera, foras incederet, & viribus, & stomacho valeret: solummodo querebatur quòd aliquoties in die, subito totius corporis *horrore* circiter horæ minutum afficeretur; qualis etiam affectus quandoque noctu superveniens somnum abrumpebat. Intra mensis spatium, hoc etiam *symptoma*, ac insuper *catarrhus* prorsus cessabant: deinceps vero illa

illa interdum *summo acore in ventriculo & œsophagi ductu*, quandoque etiam in faucibus & *Palato* affligebatur, ut vereretur ne partes istæ cute interiori detrita, diathesin ulcerosam contraherent; porro sæpius in somnis, aliquando etiam evigilans *incubo* tentari solebat. Huic, *vere & autumno* blandam *catharsin* cum remediorum *antiscorbuticorum*, & nonnunquam *chalybeatorum* usu adhibendam præscripsi: Cujusmodi methodum tanto suo commodo observavit, ut per plures annos satis recte valuerit, & etiamnum valeat.

Inter multa remedia, quæ contra istum *palati & œsophagi acorem*, & diathesin quasi ulcerosam sumebantur, præscripsi ut quolibet mane *propriam urinam* recens excretam ebiberet; hæc ut plurimum valde *salsuginea*, levamen ingens conferre solebat: quibusdam vero temporibus *urina* tenuis & copiosa, quæ tamen minime *salsa*, verum instar *aceri* plane *acida* effluxit, à cuius potu parum aut nihil commodi recepit.

Casus modo descripti *Ætiologia*, priori non multum absimilis videtur, nisi quod in hac ægrotante *particulæ explosivæ*, plurimum nervorum ductus, scilicet præter istos *medullæ spinalis* appendices, quosdam insuper *respirationis* muneri, ac per vices quasdam *linguæ* motui dicatos subierint, atque spiritus in ipsis scatentes *æstro* fere perpetuo affecerint.

Quod autem *morbi hujus solutio* per *humoris acerrimi* in *oris & gula emunctoria decubitus* contigerit, hinc colligere licet, hujus *causam materialis* fuisse *particulas heterogeneas*, & quasi *nitrosas* in sanguine progenitas; quæ cum exinde, *cerebro trajecto*, in *nervosum genus* deferrentur, *pathemata prædicta* intulerant: quamprimum verò remediorum ope uberius istius materiæ proventus inhiaberetur, atque *particulæ morbificæ* jamjam productæ, tum à *sanguine*, tum à *cerebro & succo nervoso* in ista *capitis emunctoria* derivarentur affectio convulsiva statim remisit, atque intra breve tempus, tali *incuria* usque perdurante, *morbi solutio* perfecta sequebatur.

Quandoquidem *urina*, ex se plurimum *salsa & quasi lixivialis*, per vices quasdam *acetosa* evasit, quæ contra *gula acorem*, non uti prior, juvamen præstitit: hinc colligere datur, *sanguinis & humorum* particulas salinas per urinam decedentem *duplicem statum*, nempe *fixitatis*, & *fluoris*, subiisse; quare *serum* iis imbutum, modo *hujus*, modo *istius indolis* extitit: videtur enim quod *particulæ salinæ* intra *massam sanguineam* degeneres, *fixiores* manent, & *urinam* plerunque *lixiviale* reddunt: quæ tamen extra sanguinem in *succo nervoso* scatent, aut circa *partes solidas* *deponuntur*, in *fluorem*, sive *acetositatem* degenerant. Itaque ab his in *oris emunctoria* derivatis, insignis iste *oris & œsophagi acor* procedebat: porro cum ejusmodi *particulæ* in *succo nervoso* ac *partibus solidis* ad plenitudinem aggestæ *turgescerent*, ac *fluxione oborta* in *sanguinem* ebullierint: hæ statim exinde confertim per *renes* amandatæ, *urinam* quantitate auctam *acetosam* reddebant. In quantum vero *particulæ salinæ*, diversi status, ac minime quæ sunt ejusdem, invicem commixtæ, in se mutuo agunt, & vires suas refringunt, idcirco *urina salsa* ac neutiquam *acetosa gula acorem* sanabat. Experimento satis vulgari constat *spiritum vitrioli acerrimum*, *salis tartari* aut *cujusvis alius lixivialis mixtura plurimum mitescere*: quinimo & *humorem acidum*

in Dominae hujus oris & gulæ partes exudatum, prope ad *aceti calcantiani* indolem accessisse inde constat, quia *nicotiana fumus* ægrotantis ore acceptus mire *dulcescebat*, prout nimirum in quibusvis à *vitriolo prægustato* affolet.

Quoniam hic de *convulsionibus admirandis*, quæ non passim eveniunt, & quarum *natura & causæ* in abstruso latent, agimus; pro meliori ejusmodi affectuum illustratione, libet hic *casum* adhuc *unum & alterum*, & prioribus haud minus stupendos proponere.

Decem abhinc annis, *nobilis* cujusdam *filiam* ad motus *convulsivos* eoritu incitatam, ut nonnulli eam à spiritu malo obsessam putaverint, invisebam, *Virgo* hæc 16. circiter annos nata, pulchra & *decasto*, patre tamen paralytico progenita, sine causa evidenti, circa *brumæ solstitium* male habere cœpit: primo per aliquot dies *cephalalgia & vertigine*, haud gravi tamen modo afficiebatur; deinde in brachio uno, & mox in altero *tremorem*, & subitam *contractionem* persensit; cujusmodi spasmi isto die sæpius repetentes, vix punctum temporis durabant; postridie juxta sororem suam in cathedra sedens, subito exsiliens, saltum unum & alterum, multosque alios successive ad distantiam plurimum pedum mira agilitate perficiebat; dein cum cameræ extremum limitem attingit, aliquandiu in eodem loco, & qualibet vice ad miram altitudinem saliens præstabat; cum saltationi ulteriori crura deficerent, in terram concidit ac statim caput cum mira violentia huc illuc conjecit, quasi illud collo excuteret: quamprimum ab hoc motu præ lassitudine cessaret, statim manus, & pedes idem furor invasit, ut necesse haberet membra hæc parietes, aut postes percutiendo, vel pavementum contundendo validissime exercere: Quando ob pudorem, aut verecundiam amicis aut astantibus debitam, se magna vi ab his motionibus cohiberet, (usque enim animo constabat, & sobrie loquuta erat) statim affectu interius transmissio, insigni cordis oppressione, cum gemitu, & singultu valde stridulo plurimum infestabatur; dein cum se relaxaret, statim cæstro ad artuum exteriorum musculos transmissio, aut saltare, aut caput, vel brachia immaniter huc illuc conjicere, aut etiam in camera rapidissime cursitare, vel humum pedibus contundere cogeatur; quippe hujusmodi vehementes *artuum, aut viscerum commotiones*, affectus *tragædia* velut in orbem revertente, se mutuo excipiebant.

Methodus
therapeu-
tica.

Die quinto à quo hæc *domina* primo ægrotaverat adveniens, *vomitum* ex *infusione croci metallor. vino* scilicito, & *sale vitrioli* propinabam, à quo septies evomuit bilem æruginosam in magna copia, cum admixture humoris acerrimi, & quasi vitriolici: postridie *sanguis* è vena saphœna ad 3. x. detrahebatur; præterea sumebat bis in die *antidota* ex *pulveribus lapidum pretiosorum, cranii humani, & rad. pœoniæ maris*. Horum usum intra septimanam sanari visa, per plures exinde dies affectionibus prædictis immunis degebat: Attamen post binas hebdomadas, instanti plenilunio, ejusdem morbi recidivam solito atrociorē patiebatur; nam præter saltus admirandos, *capitis & membrorum contorsiones, convolutionesque* vehementes, insuper intra cubilis spatia *cursum huc illuc rapidissimum* iterare coge-
cogeba-

cogebatur. Cepit hoc tempore, ex aliorum præscriptis, *remedia antihysterica*, & statis quibusdam intervallis *purgantia*, sine quovis tamen juvamine: Denuo accersitus, siquidem robusto corporis habitu, & spirituum effractione insigni prædita videbatur, *emeticum fortius* propinabam, à quo decies evomuit bilem instar æruginis viridescentem, cum pituita instar aquæ stygiæ acerrima, & subito alleviabatur: Exhibui posthæc quovis mane, *haustum vini albi cum aqua cerasorum nigrorum* dilutum, *asellis contusis* superaffusum, & fortiter expressum: Horum usu statim curari visa, per mensem & amplius integrè valebat: Cumque postea affectus redituri quævis præludia unquam persensit, mox *vomitorii* & ejusdem *millepedum expressionis* usu morbi insultum avertebat: Intra tres menses sanitatem pristinam ita recuperabat, ut plures nunc annos affectionibus ejusmodi spasmodicis immunis degeret: attamen à quo tempore pathemata convulsiva prorsus cessarunt, quandoque circa *oris* & *gula* partes *humoris acidissimis* ac instar *stigmati virriolici* defluxione afficiebatur: Insuper interdum *malacia* & *pica*, aliquando etiam *tussi*, cum *sputo decolori pchisin* minante obnoxia fuit, quæ tamen remediis in ejusmodi casibus usitatis facilè sanabatur.

Quod spectat ad prædicti casus *Ætiologiam*, non est cur vereamur hujus morbi, & symptomatum causas, ad *particulas explosivas è sanguine* (*cerebro usque impune trajecto*) in *genus nervosum* continuo suppeditatas referre: quæ siquidem copia ingenti suffusæ, intra privatas mineras tantum per vices elidendæ, minimè coërcerentur, *spiritibus* ubique tum *inflatis*, tum *insitis* accrescentes eos, velut œstro afflato perpetim explodi, & per manipulos huc illuc inordinatè efferri cogebant: ita nimirum ut intra partes continentes paulatim regulari nequirent; quia eos impetuosè tumultuantes, & hic illic, turbinis instar, corripere aptos, exercitio valido, ac admodum violento subigi, & perdomari opus fuit: Revera in hac ægrotante non aliter res se habuit, quam in *organis musicis*, quæ si vento nimis insufflato supra modum impleantur, ni statim plures fistularum aperturæ recludantur, brevi totius machinæ compages concutitur, ac in partes dissilire periclitatur: pariter in hac domina cum spiritus animales nervorum quorundam ductus, & fibras appendices actuanter, ultra debitum tenorem exagitarentur, necesse erat eorum impetus, dum corpora nervosa supra modum inflarent, in motus locales una plures & vehementiores impendi: quapropter cum eorum rabies ab una parte cohiberetur, mox uti ventus oclusus alio se proripiens, in quâdam alia parte violentius erupit.

In hac ægrotante *vomitorii* usus semel, atque iterum juvamen præstitit, eo quod *cysti fellea*, quin & *glandulis* & *emuntoriis*, quæ circa coctionis viscera confita sunt, hoc modo inanitis, *sanguinis* & *succi nervosi* purgamenta in eadem copiosius allicerentur: propterea quidem, ut spiritus animales intra ductus nerveos affectos scatentes, ab iis minus inficerentur: Hac ratione etiam *succus asellorum* profuit, quatenus materiam morbigenicam è *nervoso genere* ad *vias urinarias* derivavit: Præter hæc remedia materiæ morbigenæ *radicem* & *ramos* magna ex parte amputantia, cum & alia velut *antidota*, ejus *vegetationem* ubique impredientia sedulo adhiberentur,

quicquid ejus reliquum fuit, natura demum superior facta (solita in his casibus ἐκκρίσθαι) ad oris & gula emunctoria ablegabat.

4.
Obser-
vatio.

Dum hæc scriberem, virginem illustrem invisebam, quæ alijsmodi motibus convulsivis, iisque universalibus, & non minus admirandis afficiebatur: Hæc circiter annum ætatis 18. εὐχροῖς, venusta, & antehac sana, cum grassante in hac vicinia pestilentia ejus contagii periculum incautè subiret, in terrorem panicum, cum crebra *leipothymia* incidit: sequenti nocte, tanta spirituum deliquia, & ἀταξίας passa erat, ut planè moribunda videretur: isto tamen malo ægrè eluctata, deinceps quolibet die *paroxysmos convulsivos*, horis tamen primo incertis, & sub specie multiformi redeuntibus habuit: verum intra breve tempus morbi accessiones regulares factæ, bis in die, scilicet hora undecima ante, & quinta post meridiem, constanter repetebant, ut nulla febris intermittens periodos suas exactius servaverit; quin & singula *paroxysmi* accidentia simili ritu quotidie obtingebant.

Cum per tres septimanas hoc modo laborasset, quodam die accersor ut symptomata quævis ac integrum morbi typum advertere possem: Hora decima matutina lecto excitata rectè valuit; vultu, incessu, colloquio optimè se gessit, ut nullus eam quoquo modo ægrotare suspicaretur: hora undecima de ἐγχερᾶς plenitudine & spirituum torpore, cum levi scotomia queri cœpit; mox in *hypochondrio sinistro pulsationem* insignem, & quasi vivi animalis exsultationem persensit: hunc motum lateri manum meam admovens plane percepi; dein *pandiculatio* & *rugitus* succedebant; quo facto, illico ad lectum ducebatur, & ancillæ super pulvinar sedenti tenenda tradita est: Hæc ægrotantem in gremio suo, brachiis circa medium corpus ejus complicatis, durante paroxysmo arctissimè constringit: insuper præsto sunt ministræ, affinesque adstantes, quæ modo ejus brachia & manus cohibent; modo ventrem & hypochondria in molem ingentem elevata, & sursum nitentia comprimunt. Præcipua morbi symptomata, quæ vicissim excitata, ferè totum paroxysmum dividebant, erant hæc duo, scilicet modo *immanes viscerum spasmi* infestabant, itaut abdomen in molem ingentem assurgens obtentis astantium manibus contraniteretur, ut vix, ac ne vix comprimi potuerit; simulque præcordiis sursum contractis, cordis & sanguinis motus pene sisterentur: quo temporis spatio virgo hæc caput reclinans, cum pulsu diminuto, & ferè nullo ἀσπνῶ, & ferè insensibilis jacet; post duo aut tria horæ minuta hi spasmi cessant; & dein ægrotans sese erigens, alacriter circumspicit, & aliquandiu morbi impetum in colloquia & cantilenas convertit, quorum utraque lepidissima, & supra propriam indolem elegantissima indefinenter effundit: ejusmodi effatis, & dictariis adstantes quosvis prosequitur, ut nihil uspiam in comædia facetius occurrat; dein *harmonia modulos* suavissimos, & jucundiores quam aut alius quispiam potest, aut ipsamet alio tempore profert: postquam ita jactando, canendoque circiter sex aut septem horæ minuta transegit, denuo viscerum & præcordiorum spasmos, & ἀσπνίαν, uti prius incurrit: atque his brevi remittentibus, spirituum ὅσων à nervis inferioribus in cerebrum resiliens, denuo loquela cantusque facetiis impenditur; quoties cum adstantibus

stantibus colloquitur, si quid ab his acerbius aut ignominiosum reponitur, illa viscerum spasmos graviores & diuturniores subit: Ad hunc modum, scilicet alterna *viscerum* & *cerebri* affectione circiter horæ unius spatium molestari solet; dein paroxysmo versus finem vergente, viscerum spasmi leviores facti ter aut quater cum minima intermissione repetunt: dein his in totum cessantibus, morbi impetus, in membra exteriora erumpit, unde statim penitus evanescit; nam brachia & crura per horæ minutum contracturas, subsultusque patiuntur: illico dein ægrotans excitata, è lecto descendit, omni spasmo, usquedum novus redit paroxysmus, immunis, quin & viribus mediocriter valens, circa ædes obambulat, & durante affectus interstitio consueta vitæ munia alacriter obit, excepto tamen quod stomachus languescens toto die alimenta fastidit, vesperi post secundum morbi paroxysmum modicè cœnat.

Hic præfens *morbi status est*; in cujus paroxysmis quarundam facultatum *usus illustrior*, aliarum *anomalias* quadantentis compensare videtur: Verum circa ægrotationis initia paulo secus habuit; quippe viscerum spasmi longe graviores fuerunt, iisque *ἀναστροφή* adjuungebatur: illorum insuper interstitia, *fabulatio absurda*, *cantus inconcinni*, quin & *risus*, aut *fletus*, ratione haud conscia erumpentes, excipere solebant: nunc autem spiritus animales in explosiones diuturnas coacti, eas tam regulariter modo hac, modo illac, qua data via commodior, peragunt, ut quodam modo *rationis* & *voluntatis* imperio fieri videantur.

Itaque ut juxta nostram *hypothesin* hujusce affectionis *Ætiologiam* instituiamus, videtur imprimis quod *timor vehemens*, spiritus *cerebri* & *præcordiorum* incolas in magnas *ἀταξίας* adegerit; ita ut istis extra ordines suos perturbatis, & amentia quædam, & leipothymia crebra succederent. Porro suspicari licet ab eadem impressione *cerebro* ipsi noxam illatam fuisse, ita ut conformatione ejus nonnihil vitiata, particula heterogenea & morbifica, unâ cum succo nervoso admitterentur: dein licet spiritus ab initio confusi atque perturbati, post breves inordinationes sese denuo recuperarent & functionis tum animalis, tum vitalis solita munia exequerentur: attamen ob labem *cerebro* impressam particula heterogenea constanter admissæ spiritibus accrescentes, *δυναμεις* explosivas inducebant; quamprimum enim spiritus copula extranea ad plenitudinem saturantur, ad ipsam excutiendam, sive elidendam irritati, explosiones *σπασμώδεις* inibant.

Circa *morbi principia*, cum & *cerebri*, & *spirituum* incolarum diathesis à noxa recens suscepta magis perversa & vitiosa esset, copula heterogenea plenitudo citius contigit, proindeque explosio ejus crebrius & inordinatius succedens, cum majori tumultu peragebatur; postea vero cum regiminis animalis noxa remittente, istius *copula*, non secus ac *liquoris nervosi* supplementa æquali dimenso quotidie ingerebantur, spirituum explosiones regulares mitioresque factæ, iustas observabant periodos.

Quod ingruente paroxysmo in *capite plenitudinem*, ac velut *inflationem*, cum spirituum *torpore* & *scotomia* ægrotans persensit: ratio est, quoniam hoc tempore spiritus *cerebri* incolæ, jamjam in explosiones parati,

primo exagitari, & velut turgescere solent; dein pulsatio ista in sinistro hypochondrio successit, in quantum spiritus *plexus fibrasque nerveas* circa *lienem* densissimè confitas incolentes explodi incipiunt: postea cum spiritus intra *plexus* tum *mesentericos*, tum *cardiacos* scatentes, una exploduntur, istæ *abdominis & thoracis* elevationes, & quasi *subsultus* inducuntur: cumque in hac affectione *cordis & sanguinis* motus ferè in totum sistuntur, ideo *pulsus diminutus & ferè nullus*, cum *æquiva* & aliquali *ἀναστροφή* evadit.

Remittente *viscerum & præcordiorum spasmo*, garrulitas & cantus succedunt, quia spirituum adhuc explosorum *potè* è *nervoso genere* in *cerebrum* facta, *spasmos* in *phantasia exaltationem*, & promptiora phantasmatum exercitia commutat. Quamdiu spiritus intra *cerebri medullium* regulariter ac ordinatè exploduntur, facultatum & habituum actus tantum nobiliores, & quasi suprà naturæ vires & tenorem eduntur, prout in hac ægrotante: è contra autem, cum in ista regione spirituum explosiones inordinatæ contingunt, ut plurimum *amentia*, aut saltem potentiarum istarum exercitia incongrua, ac absurda peraguntur.

Viscerum spasmi & actiones phantastica sese mutuo & alternatim excipiunt; quia scilicet spirituum copiarum ad explodendum dispositæ, velut undulatione *directa & reflexa*, tendentiam suam modo in hanc partem, modo in istam vicissim faciunt: dein ultimo, cum ferè omnes exploduntur, *viscerum spasmi* crebriores excitantur; cumque explodendorum manipulus tantum exiguus superest, iste denuo tum à *capite*, tum à *visceribus* exclusus, in *spinalem medullam* excurrit, ultimosque morbi impetus in *brachiorum & crurum* convulsiones impendit.

In hoc casu difficultas adhuc insignis restat, quare morbi hujus *paroxysmi*, cum statis semper horis exacte repetant, *periodos* tamen adeo *inaequales* habent; nimirum ut *accessio prima* tantum sex horas antecedit secundam, & dein secundæ reditus ad primam non nisi 18. horarum spatio contingat. Propter hujus solutionem supponendum erit paroxysmos istos pendere à *liquore nervoso* particulis heterogeneis ad plenitudinem referto; quæ particulæ huic è *massa sanguinea* omnino convehuntur, atque *sanguis* eadem è *succo nutritio* à visceribus suppeditato imbibit. His ita suppositis, considerare oportebit quo temporis spatio *massa sanguinea* particulis istis morbificis saturatur, & dein quali dimenso eas in *liquorem nervosum* suffundit. Super his, in ægrotantis hujusce casu, ut melius constet quo ritu habet, sciendum est, eam in toto nycthemero unica tantum vice victum plenum assumere: nempe paroxysmo secundo finito circa horam septimam mediocriter cœnat, reliquo die appetitu carens, vix quidquam alimenti ingerit; itaque probabile est *materiem morbificam*, una cum *penu nutritia*, potissimum tempore nocturno in *massam sanguineam* suffundi; idque uberius quam ut totum exinde statim in *liquorem nervosum* derivari possit: particulæ heterogeneæ, quæ primo è *sanguine* recens saturato in *liquorem nervosum* convehuntur, ad plenitudinem aggestæ paroxysmum primum excitant; cujus accessio ideo diutius protelatur, quoniam & spatium unum requiritur, quo *sanguis*, & dein aliud quo *cerebrum & nervi* impleantur.

impleantur: post exactum hunc paroxysmum, quia sanguis adhuc satur, plures alias ejusmodi particulas in se continens, eas succo nervoso è vestigio suffundit, idcirco paroxysmus alter sub triplo istius spatii quo prior, inducitur: hoc autem finito, quia tum *massa sanguinea*, tum *succus nervosus* sarcina sua profus liberantur, ægrotans melius quam alio quovis tempore se habens, alimenta satis avide capebat; deinceps vero, cum ad paroxysmum proxime sequentem primo *massa sanguinea*, & tunc *succus nervosus* materia morbifica saturari debent; ideo *gemino huic penso hora octodecim* requiruntur; siquidem vero ad secundum paroxysmum tantum opus est particulas alias è *massa sanguinea* adhuc plena, in *liquorem nervosum* derivari, ideo huic effectui spatium longe minus, sex scilicet horarum sufficiat.

Postquam *hanc Dominam* per plures septimanas ejusmodi paroxysmis periodicis laborantem, denuo inviseram, præcepi ut tres horas ante secundum paroxysmum, *sanguis è vena pedis ad ℥. x.* detraheretur, quo facto accessio vesperi expectata, prorsus eam deseruit, neque unquam postea repetebat; alter vero paroxysmus pristinam vicem observans quotidie redibat, donec phlebotomia paulo ante accessum ejus celebrata, patiens isto die morbo immunis perstitit, qui tamen postridie rediens, juxta eundem typum eam per plures menses exercuit: interim illa, quia brumæ frigus gravissime urgebat, remediorum usum aliquandiu distulit: at tamen ineunte vere, *Illustissima Domina Oxonium* adducta sequenti methodo sanabatur.

*Methodus
therapeu-
tica.*

Imprimis hoc *catharticum* exhibui, atque sexta aut septima qualibet die idem repetendum curavi. ℞. *Sulphuris Antimonii* ℥. vj. *Mercurii dul.* ℥. j. *resin. jalap.* ℥. iiij. *Zinziberis* ℥. vj. *simul terantur in marmore, dein addendo conservæ violar.* ℥. j. *f. bolus: bis aut ter vomitum, atque tres aut quatuor sedes provocare solebat. Catameniorum fluxus* ei statim temporibus in magna copia constanter eveniebat: quare cum sanguis valde copiosus, & calidus videretur, medio inter periodos menstruas tempore *phlebotomiam* bis aut ter instituebam: porro singulis, quibus à *purgatione* vacabat, diebus cœpit bis in die quatuor *pilulas* *massæ* sequentis, superbibendo haustulum *julapii* infra præscripti. ℞. *Radicum paonia maris* ℥. ℔. *serpentaria virginiana, contrayerva, dictamnii cretici, an.* ℥. ij. *cranii humani prepar.* ℥. j. *℔. ungulæ alcis* ℥. j. *corallii rubr. prepar. Margarit. pul. an.* ℥. j. *salis absynthii* ℥. ij. *salis corallii* ℥. j. *cum s. q. syrupi de floribus paonia maris, f. massa.*

℞. *Aq. florum paonia maris, cerasorum nigrorum, juglandum, an.* ℥. iiij. *aq. antiopileptica Langii* ℥. ij. *syrupi de floribus paonia* ℥. j. *℔. castorei nodulo ligati & in vitro suspensi* ℥. j. *misc. f. iulapium.*

Quando *pilulas* fastidire cœpit, iis omissis sumpsit bis in die, scilicet primo mane, & sero vesperi circiter ℥. j. *pulveris* sequentis in cochleari *julapii*, superbibendo 4. aut 5. cochlearia ejusdem. ℞. *Lapidis Bezoar, utriusque succini albi, margaritarum prepar. corallii rubr. an.* ℥. j. *cranii humani* ℥. ij. *rad. serpentaria virginiana, sem. ruta, an.* ℥. ℔. *misc. f. pulvis, capiat* ℥. j. *mane & vesperi cum dosi julapii supra præscripti.*

Dein cum & hoc medicamentum tadio esse cœpisset, *pilular.* aut etiam *elixiris*

elixiris proprietatis, quandoque etiam per plures dies *sp. C. C.* usus succedebat. Postea demum ab *isto pulvere* aliquanto spatio quotidie assumpto juvari coepit.

Interea dum hæc *medendi methodus* instituitur, *capillitio derafo*, caput tenui solum amictu cooperiebatur. *Emplastrum hystericum*, cum *Galbano admixto* super abdomen gestavit; pro potu ordinario *bochicum ex sarsa & china, rad. paonia maris*, aliisque appropriatis in aq. fontana infusis, & decoctis bibebat. Intra mensem paroxysmi aliquantulum remittebantur, dein mitiores sensim minoresque facti tandem fere in totum cessabant: nisi quod instante *catameniorum fluxu* ejusdem morbi insultu uno aut altero affici solebat; porro *vertigine* fere constanti & *anorexia* laborabat. *Media æstate* bibit *acidulas Astropenses* per sesqui mensem, & perfecte convaluit.

Quod vero spectat ad *Therapias* rationem in genere pro convulsionibus ejusmodi admirandis adhibendam, non facile erit aut *remedia morbo huic Herculeis* paria, aut *curationis methodum* certam & crebris experimentis comprobata assignare: præterquam enim quod casus isti similes raro occurrunt, insuper observare est, quod eadem medicamenta, quæ huic ægrotanti hoc tempore profuerunt, alteri, aut eidem alio tempore adhibita, ne hilum juvarent: cujus ratio videtur esse, quod morbi causa in *succi nutritii dyscrasia* consistat, qui liquor non uno semper eodemque modo pervertitur; verum à multiplici *salium* ac *sulphurum* combinatione indolem varii moris, ac generis morbidam adipiscitur, eamque subinde commutat: quapropter in gravissimis ejusmodi affectibus, *medicamenta* haud *vulgaria* & ex *pharmacopeia* deprompta, sed *magistralia*, & pro re nata, juxta symptomatum admirandorum apparentias præscribantur. *Vomitio lenis*, *purgatio*, & *phlebotomia* in primis celebrari, ac aliquoties prout opportunum videbitur, iterari debent. Quoad *medicamenta* autem *specificæ* ac in casibus istis appropriata, cum præcipua indicatio fuerit, *succi nervosi* crasin emendare, plurima tentare, & ab effectu eorum virtutes rimari liceat: itaque experiri fas sit, quid *remedia sale volatili* aut *armoniaco* prædita efficiant. In hanc rem *sp. & sales C. Cervi*, *sanguinis*, *fuliginis*, *flores* & *spiritus salis armoniaci* assumantur: His nihil juvantibus ad *chalybeata* deveniendum est, *tinctura* & *solutiones corallii*, ac *antimonii* præbeantur; cujusmodi medicamenta in tali dosi & forma, & tam crebra vice exhibeantur, ut ex iis *alteratio* quædam toti *sanguini* & *succo nervoso* inducatur: porro si talibus deerit successus, ad *alexipharmaca*, quæ contra *venena* & *malignitatem* humoribus impressam juvant, procedere oportebit; scilicet ex his *vegetabilium decocta*, *destillata*, *pulveres*, *conservas*, *aliaque preparata* instituere, & alia cum aliis varie componere, & diversimode administrare. Verisimile est, quod ejusmodi medicamina, quæ *demorsis à vipera*, aut *cane rabido*, etiam quæ contra *aconita* & *toxica* ore assumpta prodesse solent, etiam in *convulsionibus* supradictis ex usu esse possunt. Licebit hic, juxta exemplum *Gregor. Horstii* in tractatibus suis *de morbo convulsivo maligno*, item *de convulsionibus admirandis*, *remedia magistralia* sub forma *electuarii purgantis*, item *pulveris* & *antidoti convulsivi* præscribere, eademque ex *simplicibus* partim *alexipharmacis*, partimque *antiepileticis* varie componere.

CAPUT X.

De passionibus quæ vulgo dicuntur hysterica.

Passio hysterica inter morbos muliebres, pessimæ adeo famæ existit, ut semidamnati instar, plurium aliorum affectuum culpas gerat: si quando enim ægrotudo inusitati moris, aut occultioris originis in corpore fœmineo occurrat, ita ut causa ejus lateat, & indicatio therapeutica sit prorsus incerta, statim uteri (qui plerunque insons est) malam influentiam accusamus, & in symptomate quovis inusitato aliquid hystericum subesse pronunciamus; proindeque ad hunc scopum, qui sæpe tantum ignorantia subterfugium est, intentiones ac remediorum usus diriguntur.

Pathemata, quæ ad hunc censum referri solent, varia & multiplicia reperiuntur, quæ raro in diversis fœminis conveniunt; aut eundem prorsus modum contingunt: communissima, & quæ vulgo affectioni hysterica rationem formalem constituere dicuntur, sunt hæc; scilicet motus in imo ventre, ibidemque velut globi cujusdam ascensus, dein rugitus, aut vomendi nixus, hypochondriorum distensio & murmur cum flatuum eructatione, respiratio inaequalis; ac ut plurimum impedita, præfocatio in gutture, vertigo, oculorum inversio aut rotatio, sæpe risus, aut fletus, fabulatio absurda, quandoque ἀπωρία & ἀκνυσία, cum pulsu obscuro aut nullo, & aspectu cadaveroso: interdum motus convulsivi in facie, ac artubus, & nonnunquam in toto corpore excitati: verum spasmi universales rarius contingunt, & non nisi morbo hoc in statum pessimum evecto: quippe ut plurimum sine membrorum contractione tantum in ventre inferiori, thorace & capite, scilicet in eorum aliquo, aut successive in omnibus paroxysmi tragædia peragitur. Hujusmodi affectionibus obnoxia sunt fœmina cujusque ætatis & conditionis, scilicet divites & pauperes, virgines, uxores & viduæ: observavi symptomata isthæc in puellis ante pubertatem, etiam in vetustis post catameniorum defectum; quinimo ejusmodi passiones interdum viros infestant, uti plane constat exemplo superius allato.

Quod spectat ad symptomatum istorum causas, eas Medici plerique veteres & quidam neoterici solummodo in uteri ascensum & vapores ab eodem elevatos retulere: Prior opinio, licet antiquum obtinet, minus verisimilis videtur, quippe in virginibus & viduis uteri corpus adeo exigua constat mole, & partibus circumquaque vicinis ita strictim alligatur, ut nec ipse loco moveri, & ascendere, nec motus ejus, si quis fuerit, persentiri poterit: quoad ἀπολογία istam vulgarem à vaporibus desumptam, eam uti prorsus vanam, & futilem alibi justis de causis sæpe rejicimus: passiones autem modo descriptas neque semper, neque omnino ab uteri ascensu aut vaporibus procedere judicamus: idque prius quidam alii celebriores medici statuerunt. Quippe olim Carolus Piso, & nuper Doctissimus Highmorus uterum ab omni culpa vindicarunt, atque pathemata, quæ vulgo dicuntur, hysterica, hic à sanguine in pulmones impetuosius irruente, atque iste à colluvie serosa, juxta

nervorum origines congesta, oriri excogitarunt : Posterior hæc opinio quantum probabilis videatur, è sequentibus patebit. Quoad doctrinam vero super hac re à D. D. *Highmore* traditam, quanquam à more nostro absit cuiusquam placita convellere, & mihi pene religio sit à *Clarissimo* hoc viro dissentire : quia tamen *pathologia* nostra basi contrariæ innitens (scilicet affectus hysterici causa ad *genus nervosum* immediatius quam ad *sanguinem* imputata) gratis asserta videbitur, nisi rationes quæ *contra istam hypothesein* & *pro nostra* militant, proferam; idcirco venia hic detur, utramque sententiam velut in balance positam exactius trutinare.

D. Highmore
ri opinio
examina-
tur.

In *paroxysmo* igitur vulgo dicto *hysterico* supponit *vir egregius*, *sanguinem*, utpote tenuiorem & flatulentum, cum effervescentia quadam in *vasa pneumonica* & *cordis* nimis confertim irruere, & in iis impetuose ebullire, adeoque *pulmones* infercire, & plurimum aggravare, ut nec illi motum ineant, neque sanguis è cordis sinubus lacunari possit : hinc à sanguine in præcordiis stagnante, *magna oppressio*, *respiratio difficilis* & sæpe nulla cum spirituum vitalium deliquio inferri solent : dein *septum transversum*, ut *pulmonibus* magis magisque distentis locum cedat, & respirationem aliquo saltem modo perficiat, cum *diastole* immani, & diutius continuata deorsum fertur, adeoque intestina deprimendo, abdomen & hypochondria attollat, & motum velut *globi ascendentis* simulet : postea vero *functione vitali* ad hunc modum laborante, *facultas animalis* in suppetias ejus insurgit; quapropter urgente motuum in variis partibus necessitate, spiritus animales in principia nervorum impetuose propulsi convulsiones diversimodas, hinc inde vagas edunt. Hanc opinionem à magno *juvamine* in hoc affectu per *sanguinis missionem*, necnon ab *insigni lesione* propter *excretionis* cujusque *sanguineæ retentionem*, tum à *juvantibus*, tum *nocentibus* in hac passione, *Auctor* confirmare satagit.

Verum licet *doctrinam* hanc de *suffocatione uterina*, prout valde ingeniosam, & affabre excogitatam, non possim non laudare; tamen quo minus huic per omnia consentiam, rationes quædam magni momenti plane evincunt. Equidem fateor me non intelligere, quomodo in quibusdam hystericiis, quæ scilicet temperamenti frigidioris sunt, sæpe etiam *pica* & *malacia* afficiuntur, sanguis ita in *pulmones* immodice ebulliat, sine quibusvis effervescentiæ suæ notis alibi conspicuis : Novi *puellas* ob *χλωρόσιν* quasi *exsanguēs*, quarum nempe cruor, utpote effectus, à quovis exercitio in corde stagnaret, & exinde difficulter admodum in *pulmones* exantlaretur, quæ tamen *passionibus* dictis *hystericis* erant graviter obnoxia : certe haud probabile est quod harum sanguis immodice effervescens in *vasa pneumonica* impetuose irruat, eorumque poros & meatus confitissime infarciat; cum interea tales anhelosæ sunt propter sanguinis à *pulmonibus* absentiam, aut admissionem difficilem : præterea quo pacto evenit, ut violentus iste sanguinis in *pulmones* incursus, qui circa *paroxysmum* fieri supponitur, haud *inflammationem* in iis pariat? quippe sanguis parti cuiuspiam rapide & nimis confertim impactus, facile extravasatur, & *φλόγωσιν* ægre discutiendam excitare solet : unde igitur in *affectu hysterico* cruor *pulmones* violenter subiens & distendens *peripneumoniæ* minime

minimè inferat? aut quare non *peripneumonia*, alias inductæ, affectus quasi *hysterici* superveniunt? Quamobrem improbable videtur, quod sanguis proprio orgasmo turgescens, in *pulmones* irruat, eosque infarctione nimia immobiles reddens *diaphragmatis*, aliarumque partium convulsiones *secundariò & consequenter* inducat; quin potius videtur quod ob *diaphragma*, aliaque respirationis organa sprius spasmò affecta, sanguis in præcordiis stagnare cogatur: Insuper observare licet, quod *pulmones* haud semper ante alias partes afficiuntur; sæpe enim *symptomata spasmodica* alibi incipiunt, & non raro *pectoris* regionem omnino intactam demittunt. Quippe in aliquibus *vertigo*, & *oculorum coruscationes* paroxysmum inchoant, quibus *fletus*, aut *risus*, aut *artuum motus convulsivi* sine *thoracis angustia*, aut *cordis oppressione* succedunt: in aliis antequam respiratio quovis modo laborat, *infimi ventris intumescencia* cum vomitu, aut *rugitu* paroxysmum ordiuntur, & non raro finiunt; utcumque *respirationis difficultas* symptomata ista sæpe longo intervallo sequitur, eamque *fasciarum in hypochondriis* arcta *constrictio* præcavere solet: porro videtur quod iste, velut *globi* cuiusdam ab *hypogastrio ascensus*, à septi depressione neutiquam procedat: quoniam scilicet in *paroxysmo hysterico* hæc pars haud semper versus inferiora deprimitur, at sæpenumero ad superiora contracta, *pulmones* sursum propellit, adeoque spiritu ferè præcluso, *suffocationis* periculum minatur. His aliisque rationibus persuasi in ea demum sententia sumus, quod *affectio dicta uterina*, præcipuè, ac primario sit *convulsiva*, atque à *cerebro & nervoso genere* affectis potissimum dependeat, & quicquid inordinationis, aut anomalie exinde circa *sanguinis* motum contingit, tantum *secundario*, & *dependenter à viscerum spasms* fiat.

Enimvero *passio* quæ vulgò perhibetur *hysterica*, sicut alii motus convulsivi, omnino à *spirituum animalium explosionibus* producitur: discriminis ratio, qua tum *morbi* hujus *species* ab invicem, tum ab aliis affectibus spasmodicis differunt, à varia *causæ morbificæ origine & extensione* potissimum desumitur: nam origo hujus, sicut plurium alijsmodi spasmodorum, utroque prorsus insorte, sæpenumero in capite consistit: quandoque tamen hic affectus ab *uteri culpa*, & nonnunquam ab *aliarum partium vitio* dependet. Quoad *morbi extensionem*, à quacumque origine procedit, ut plurimum *nervos interiores*, nempe ad *viscera & præcordia* spectantes, eorumque appendices præcipuè afficit, spiritusque in iis scatentes potissimum exercet; interdum vero, licet rarius, etiam *spiritus* qui *nervis exterioribus*, item qui *cerebro & cerebello* præsident, eodem affectu involvuntur. Primo dicemus de *morbi hujus origine*.

Hanc autem sæpissimè *δὲ τὸ ἐγκέφαλον* consistere, & symptomatum quæ in *vivis* accidunt comparatio, & *defunctorum observationes anatomica* apertè indicant: quippe observare licet hunc affectum à subito terrore, ingenti tristitia, aut indignatione, aliave passione violenta, in qua spiritus cerebri incolæ potissimum afficiuntur, crebro exortum ducere; porro nonnullis mala victus ratio, & varia accidentia quibus humores vitiosi intra caput uberius congeruntur; hoc malum primo intulerunt: quin & *paroxysmorum ritus* idem manifesto evincit, in quantum scilicet *capitis plenitudo*,

vertigo, oculorum coruscatio, aurium tinnitus in multis paroxysmum hysteri- cum ordiuntur, eumque non raro concludunt: præterea mulieres quasdam ab aliis morbis defunctas, *passionibus interim hystericis* dum ægrotarent valde obnoxias aperui, in quibus *utero* satis rectè habente, in *occipue* ner- vorum principia fero acri madida, ac prorsus immersa deprehendi, prout infra fufius declarabimus.

Causa Has aliasque rationes perpendentes, non dubitemus asserere *passiones morbi se-* vulgò dictas *hystericas*, creberrimè oriri, eo quod spiritus animales ner-
pissimè *vorum principia* intra *ἐνέφανον* occupantes, labe quadam afficiuntur; illi
circa ner- nimirum aut in confusionem acti, aut humoribus vitiosis perfunsi, *copulam*
vorum *heterogeneam & explosivam* sibimet asciscunt, quam unà secum in canales
Principia *nerveos* longè deducunt: cumque iidem spiritus per totas eorum series,
incipit. sive ordines *copula ista* ad plenitudinem saturantur, aut *spon- te sua*, aut *occa-*
sionaliter commoti explosiones ineunt, adeoque motus convulsivos cient: quod vero *talis copula* spiritibus adhærens unà cum iis in *nervos interiores* potissimum derivatur, ratio est, quoniam in hoc versus *præcordia & viscera* commeatu, spiritus animales, propter *animi affectus* plurimum perturban- tur; quare noxas quasvis aliunde illatas facilius admittunt, & anomalias promptius concipiunt. Spiritus enim animales ob hanc præcipuè occasio- nem *diathesin spasmodicam* contrahunt; quatenus nimirum illi ab impres- sione violenta, extra orbitas suas, ac solitum influentiæ, & actus modum pervertuntur; hinc inordinationes suas non modo postea repetunt, quin & particulas heterogeneas in amplexus suos suscipiunt, cumque iis faci- lius combinantur: quapropter in quantum spiritus animales *nervos paris-*
vagi, & intercostalis permeantes, *appetitus* tum *concupiscibilis*, tum *irasci-*
bilis perturbationibus quibusvis continuo implicantur, nihil mirum est, si illi præ cæteris *dispositionem convulsivam* acquirant.

Eadem Supposito igitur (quod revera supponi debet) spiritus animales juxta
causa po- *origines nervosas copulam heterogeneam & explosivam* contraxisse, eamque in
stea per *nervos interiores* una secum vexisse, & per totos eorum ductus explicasse,
totos ner- non difficile erit *paroxysmi hystericis*, omniumque ejus *symptomatum rationes*
vorum assignare. Imprimis enim *morbo ingruente*, sæpenumero *vertigo, oculorum ro-*
ductus *tatio & cerebri* velut *inflatio* quædam, quasi velitationes præviæ excitantur,
disponi- quia *tota spirituum cohorte* in explosiones parata, *leves eorum copia* versus
tur. *cerebrum* resiliens primo eliduntur; deinde statim in *imo ventre*, aut *hypo-*
chondriis perturbatio succedit, in quantum *spiritus* intra *plexus hic* aut *illic*
consitos proximè afficiuntur: nam alibi ostendimus, si quando spiritus ani- males in tota quadam serie exploduntur, qui in extremis partibus resi- dent, affectionem istam primo inire: quare *morbi* hujus *initia* in *capite &*
visceribus plerumque habentur; quod autem convulsiones modo in *imo*
ventre, ac modo in *hypochochondriis* primo sentiuntur, ratio est, quia materies morbifica interdum nervi intercostalis ductu in *plexus ultimos mesentericos* provehitur; quandoque tamen eadem non ultra *paris vagi fines* delapsa, multo citius, nempe circa *plexus lienares* aut *stomachicos* subsistit.

Symptoma Cum itaque spiritus animales, (prout ostensum est) intra nervos *paris-*
hystericis, *vagi & intercostalis* ab eorum origine, usque ad fines ultimos *copula hete-*
rogeneam

rogenea & explosiva imbuuntur: illi tandem, vel mera plenitudine, vel ab irritatione alicubi facta in explosiones cientur; in qua affectione si qui spiritus versus cerebri medullium exsiliant, vertiginem, capitis inflationem, aliaque accidentia prævia inducunt: attamen spiritus, nervosi caudicis extremitatem alteram, scil. *plexus mesentericos* incolentes, præcipuè explodi incipiunt; qui statim elisione sua, jam hypogastrii partes attolli, & sursum contrahi cogunt, adeoque *molis cujusdam*, quasi *uteri ascensum* inducunt: dein cum *plexus mesenterii* superiores eodem affectu sensim implicantur, idcirco in quantum tota *mesenterii* compages, visceraque eidem annexa elevantur, & versus superiora impetuosè corripuntur, abdominis intumescencia violenta, velut cum exsultatione quadam succedit: porro *ventriculus* non tantum situ ejus mutato elevatur; quin *fibris* ejus omnibus, scil. *obliquis, rectis & transversis*, unà spasmo affectis, sæpè tanquam vesica inflata distenditur: hinc non raro *vomitibus*, aut saltem *rugitus & hypochondriorum murmura* excitantur: quamprimum vero spiritibus serie quadam explosis ad *thoracis* regionem pervenitur, *diaphragma* modo *diastole* immani convulsus deprimitur, adeoque viscerum ascensionem occurrens, inflationem, & summam intumescenciam cum ingenti lucta infert; itaut in affectis illico ligamenta vestium solvi debent, secus illæ in *leipothymiam* incidere periclitabuntur: interim septo ita depresso, ejusque *diastole* continuata, sanguis ferè immotus in præcordiis subsistit; adeoque stagnatione sua magnam oppressionem ac non raro functionis vitalis deliquium ciet: porro *sepsi convulsio* modo versus superiora contingit; adeoque illud *pulmones* sursum impellens, *thoracis systolen* violentam, & diutius quam par sit protractam inducit; cumque hac ratione sanguis in *vasa pneumonica* propellitur, nec denuo à cordis sinu excipitur, ibidem ac in toto præterea corpore stagnat, unde *cordis oppressio*, & sæpè *leipothymia*, immo interdum *ἀσπυζία*, modo cum *livore faciei*, modo cum *aspectu cadaveroso* insequuntur: postquam hæc in *ima mediaque* regione peraguntur, demum affectio ad *caput* nervorum, quasi *fornicis ignarii* ductu, pertingit, atque spiritus ibidem *explosi*, modo versus cerebri medullium resilientes, *scotomiam*, & non raro symptomata *epilepsie* æmula producunt; modo spiritus illic explosi in nervorum aliorum principia irruunt, ibidemque pares explosiones cient: quapropter *hysterica* circa finem paroxysmi sæpè rident aut plorant, aut delire fabulantur: nonnunquam *faciei* ac *oris* partes, quinimo interdum *brachia*, aliaque *membra* motibus convulsivis afficiuntur; cumque adeo demum spiritus omnes, qui copulam heterogeneam contraxerant, exploduntur, paroxysmus finitur, verum exinde statim alterius paroxysmi materies congeri incipit.

Quandoque accidit dispositionem *spasmodicam* non ita longe latèque protensam esse; præterquam enim, quod sæpè *nervi tantum paris vagi & intercostales* eadem plectuntur, ut neque *cerebrum*, nec *membra exteriora* quicquam afficiantur; quinimo interdum nec ipsi *nervi interiores* per totos eorum processus causa morbifica occupantur: nam diathesis convulsiva (prout modo innuimus) sæpè non ultra *plexus lienares*, aut *stomachicos* pertingit, & tunc paroxysmus à *ventriculi*, aut *hypochondrii sinistri* inflatione incipiens,

non uteri, sed *lien*is vitio oriri creditur : cujusmodi affectio mox ad *thoracem* traducta, ibidemque *septum*, & *pulmones* spasmo involvens, *respirationem*, & *cordis motum* sistit, aut quodammodo pervertit : subinde vero paroxysmus iste modo *cum*, modo *sine* capitis perturbatione insigni pertransit. Hæc quidem vario modo contingunt, juxta quod materiem morbificam, sive *copulam explosivam* à capite descendentem, velut pulveris pyrii acervos, modo in hac, modo in illa parte plus aut minus congeri accidit : de qua *tamen materia*, quo ritu eadem in capite producta nervorum origines primo afficit, adeoque *passionis* dictæ *hysterica causam procatarticam* constituit, jam proximè inquirendum restat.

Morbi
causa
procatar-
tica, vel
juxta ner-
vorum
origines
subsistit.

Quod itaque spectat ad *materiam morbificam*, sive *copulam explosivam*, quæ spiritibus intra *ἐγκεφάλῳ* scatentibus accrescens, cumque iis in processu nerveos derivata, non raro affectuum, qui vulgò perhibentur *uterini*, causa existit : dicimus hanc, sicut in aliis convulsionum speciebus, esse particulas heterogeneas è sanguine suffusas, quæ tamen ob duas potissimum *αἰτιατικὰς* spiritibus in nervorum principia influxuris affigi solent ; nempe aut *spirituum ipsorum culpa*, aut ipsius *materie præpollentia* : utriusque generis instantiæ passim occurrunt. Interdum accidit *spiritus animales* intra cerebrum, inque comœatu ab ipso ad præcordia ducente confitos, à *subita passione*, puta *timoris*, *ira*, *tristitia*, plurimum perturbari, ac in *ἁταξίας* cogi ; proindeque illos extra ordines propulso, particulas heterogeneas quascumque obvias sibi met asciscere, cumque ipsis combinari ; ut propterea mox diathesin explosivam acquirant, eamque aliquandiu postea retineant, prout suprà declaravimus. Insuper secundo *ipsa materies morbifica* interdum magis effera & potentior facta, invitis œconomiae animalis præsidiiis, è massa sanguinea in cerebrum, ejusque appendicem suffunditur, quæ spiritibus adhærescens eos statim in explosiones disponit : hoc passim cernitur in malis *febrilium crisis*, necnon in affectibus quibusvis malignis, etiam scorbuticis, aliisque chronicis perperam judicatis. Has causas plurimum fovet, suscitaturque *mala aut debilis cerebri & nervosi generis constitutio*, sive eadem hæreditaria, sive ob malam victus rationem acquisita fuerit : namque in corporibus ita dispositis, & spiritus animales à levi quavis occasione in confusionem aguntur, atque cerebri, & systematis nervosi meatus *materiæ heterogeneæ*, & *explosivæ* incursum facilius patefcunt. Revera propter hanc rationem *fœmina præ viris*, illarumque aliæ aliis, affectibus convulsivis obnoxia magis fiunt, prout infra fusiùs ostendetur.

Vel juxta
uterum,
aut alia
viscera.

Quamquam autem hujusmodi mulierum *passiones* dictæ *hysterica* sæpius-
mè à capitis vitio, sive à causa morbifica intra *ἐγκεφάλῳ* oriunda procedunt ; attamen aliquando tales affectus propter causam alibi incipientem, scil. modo in *utero*, modo in *aliis visceribus* suscitantur ; atque hujus *pathologiae spasmodicæ* duo sunt præcipuè capita, scil.

Posterius
hoc dupli-
ci modo
contingit.

1. Interdum accidit *tumorem*, aut *ulcus*, aut *humorum acrimie congestio-
nes*, in partibus membranosis circa *uterum*, aut *alia viscera* confitis ex-
citari, atque partes ita affectas, ob *solutionem continui* in spasmos dolorifi-
cos crebro irritari : deinde in quantum spiritus animales circumcirca dis-
positi

posui, in *fluque* in crebras *atazias* adiguntur, illi demum particulas heterogeneas aut à parte affecta, aut aliunde dimissas sibi met asciscentes, ad impetus explosivos disponuntur: cumque inprimis motus convulsivi tantum in loci affecti vicinia contingunt, nempe ut *moles* in *hypogastrio ascendens*, aut *ventris intumescencia* solummodo percipiantur; postea corporum nerveorum ductu, & consensu spasmi ibidem incepti sensim in alia ventris imi viscera, dein ad præcordia, ultimoque in ipsum caput propagantur; atque affectu ita paulatim ad spiritus cerebri incolas delato, illi insuper in propria officina copulam heterogeneam nacti, eam in viscera retorquent, adeoque *causa morbifica reciproca* facta, ab utraque caudicis *nervosi extremitate* inchoatur. Vidi olim *virginem prænobitem*, in qua *tumor* exiguus subter *os pubis* cum dolore atrocissimo exortus, convulsiones immanes primo in *ventre infimo*, ac postea ad *præcordia & caput* ascendentes, ac demum in *membra exteriora* protensas ciebat: nam semel aut bis in die, postquam in parte affecta cruciatus insignes urgerent, *abdomen*, & mox *hypochondria* attolli solebant: dein *respirationis difficultas* & *anæsthesia* succedebant, atque statim affectu exterius translato, *membrorum & artuum contractiones, convulsionesque* horrendas sequutæ sunt. Nonnunquam etiam accidit *puerperis*, ob noxam *utero* illatam, symptomata spasmodica induci: Refert *Hirvæus* ab *injectione uterina* acriori convulsiones mirandas excitasse: ita interdum, licet rarius accidit, spiritibus circa nervorum extremitates, & prope uterum degentibus, materiam morbificam sive *copulam explosivam* immediatè à loco ibidem affecto, & absque cerebri culpa affigi.

2. Restat adhuc alter *casus*, sive *afficiendi modus*, quo dispositio spasmodica partium longe à cerebro dissitarum vitio producitur: (licet interim labes, quæ istius affectionis causa existit, non raro ipsi cerebro mediate communicetur) nimirum, si quando *succus nervosus* alicubi in motu suo, sive circulatione impeditur, exinde in partes nervosas restagnans, easque aggravans, sæpe diathesin spasmodicam infert: Ita cum evacuatio quædam solennis, qua liquoris nervosi superfluitates excerni solebant, cohibetur, uti à *fontanellis subito occlusis*, aut *ulceribus vetustis* sine catharsi exsiccatis, plures in affectiones convulsivas inciderunt: quinimo aliquatenus hic locum obtinet, quod vulgo in *virginibus & viduis* pro causa passionum hystericarum assignari solet, nempe *humoris seminalis*, quem *de à deposita* impendi oportuit, intempestiva cohibitio; saltem si quando istæ à conjugali vitæ statu juvamen recipiunt, ideo accidit quoniam *humoris nervosi* restagnationes, quæ cerebro & nervoso generi sæpe labem affigunt, hac ratione præcaventur: Porro *succus nervosus* versus principium suum regurgitat, quia transitus ejus alicubi à *tumore* aut *scirrhuso*, aut *cancroso* præcluditur: Nuper in hac urbe istiusmodi affectus insignis instantia contigit, scilicet *puella* quædam 12. annos nata *herniam* contraxerat; hinc ex præscripto matris suæ fasciam male adaptatam, cum fibula duriuscula glandulas inguinales valde comprimente, non sine magno dolore & cruciatu per binas septimanas gestabat: intra hoc spatium (cum prius integre valebat) de *vertigine* & gravi *capitis torpore* queri cœpit: ac paulo

Vel ob solutionem consensui.

2.
Vel ob succum nervosum obstructum.

paulo postea *affectiones convulsivas*, & quasi *hystericas* crebro ingruentes; simulque *scrophula* ingentes pone *aures* ac in *cervice* ejusdem lateris subnascebantur, quibus antehac in tota vita haudquam obnoxia fuerat. In hoc casu minime est quod dubitem, quin à *glandulis* istis, quæ sunt liquoris nervosi emunctoria, nimis *compressis*, humoris *istius* superfluitates inde per vasa lymphatica amandari solitæ, in *caput* restagnantes mala ista pepererint: quippe symptomatum prædictorum à subligaculi istius inguinalis gestatione ortus, ita subito & manifesto successit, ut in hanc occasionem vel mater ejus morbi causam retulerit. Insuper etiam in aliis observavi *humoris nervosi*, alicubi in decursu suo obstructi, recrementa versus caput restagnantia, non modo *symptomata spasmodica*, aut deinde *affectus strumosos* intulisse.

Objeccio. Hæc de *affectionis* dictæ *hystericæ ratione formali*, diversimoda *origine*, *nes contra* necnon de *symptomatum* ejus *causis genuinis*: è quibus liquido constare *vi-*
prædictam detur, *passiones* istas non semper ab *utero*, quin longe crebrius à *cerebri*,
hypothesin aliarumque *generis nervosi* partium vitio pendere: At vero contra hæc mul-
solvantur. ta objiciuntur, quæ juxta veterum opinionem culpam omnem in *uterum* rejiciunt: Nimirum ita fieri videtur, quoniam hujus *morbi insulium* fere tantum *fœminas* invadit; quin & *mulieres* circa *uterum* male habentes, scilicet *puerperæ*, aut quibus *catamenia* sistuntur, ei potissimum sunt obnoxia: porro ex juvantibus hoc arguere licet; quia scilicet *emplastra* super abdomen gestata, item arcta ventris & hypochondriorum constrictio, quibus scilicet *uteri ascensus* inhibetur, paroxysmum ingruentem non raro arcent; hoc etiam indicat, quod *suaveolentia* naribus admota paroxysmum inducunt, atque *fœtida* eundem abigunt, è contra accidere perhibetur, si eadem *ventri* aut *puerperæ* imponuntur.

Ut has *objectiones* diluamus, dicimus imprimis symptomata quæ videntur *hystericæ*, haud tantum *mulieres* incessere: nam historia superius allata ostendimus *virum* quendam ejusmodi paroxysmis, cum *molis* in imo ventre *ascensu* obnoxium fuisse: quod autem *fœmina* multo crebrius quam *viri* affectibus istis convulsivis tentantur, duæ rationes proferri possunt: scilicet primo quod illarum constitutio animalis sit longe debilior; nempe *cerebrum* & *nervos* molliores, & minus firmæ texturæ obtinent, ut nihil fortiter sufferre, nec injuriæ cuius resistere queant: & in illis *spiritus* animales magis in fugam & distractionem proclives, copulam heterogeneam & explosivam facilius admittunt: hinc fœminæ à subito terrore, aut ingenti tristitia maximas spirituum inordinationes subeunt, cum viri à tali occasione vix omnino perturbantur. Secundo *fœmina* diathesin spasmodicam promptius suscipiunt, quia materiæ morbificæ copiam uberiores congerunt: quippe cum vitam sedentariam plerumque degunt, sanguis ob ventilationis defectum impurior evadit: insuper in hoc sexu iste particulis heterogeneis, & fermentativis originaliter scatet; quapropter eum *catameniorum fluxu* sæpius expurgari expedit, quo tamen haud semper, quod extraneum & incongruum est, à massa sanguinea in totum eliminatur, quin superstes sit, quod pro data occasione in cerebrum & appendicem ejus suffusum, affectionum convulsivarum

sivarum causa existat : porro cum *fluxu menstruali* cohibito diathesis spasmodica accersitur ; haud igitur putandum est, tales affectus ab utero suscitari, verum quod massa sanguinea particulis heterogeneis plus solito imbuta eas una cum succo nervoso capiti ingerat ; quinimo potissimum ob hanc rationem, etiam *puerpera passionibus* quasi *hystericis* obnoxia reperiuntur ; præterquam enim quod læsis *uteri* membranis, spasmus illic ob sensationem molestam inceptus sursum perreptat, ac denuo cerebro communicatur ; sæpissime accidit, sanguinem à *lochis retentis* infectum febrili incendio effervesce, ac dein *criseos* loco, miasmata maligna cerebro ingerere ; unde affectus *convulsivi*, & non raro *soporosi* excitantur.

Quod vero arguitur, *morbum* hunc videri *hystericum*, quia remedia circa abdomen applicata non raro levamen conferunt, facile erit referre, causam morificam in *mesenterio* sæpius quam in utero consistam, interdum hac ratione aut tolli, aut ab influentia sua cohiberi : præterea ejusmodi circa *hypogastrium* applicationes nihilominus prodesse, licet affectus origo ab ipso capite derivetur ; nam supra ostendimus, quod cum materies heterogenea & explosiva ab *ἐκπεράλῳ* descendens, spiritibus intra totos nervorum interiorum processus dispositis diathesin spasmodicam intulit, motus convulsivi propterea excitati à nervorum extremitatibus incipiunt, & exinde sursum versus illorum initia perreptant ; adeo ut imprimis viscera *imi ventris*, dein *præcordia*, ac ultimo *cerebrum* ipsum afficiantur ; si vero spiritus *extimi*, scilicet in *mesenterii plexibus* degentes, ab explosionibus ineundis cohibentur, cæteri omnes in reliquo ductu nervoso intra ordines suos permanent : hoc autem *emplastra* supra *umbilicum* gestata non raro efficiunt : namque *odore* suo spiritus ab exsultatione reprimunt, ac in ordine cogunt ; quinetiam *copulam* illis accrescentem non raro excutunt, abiguntque : quare cum explosiones illic ineundæ inhibentur, paroxysmus convulsivus omnino præcavetur : quod adhuc amplius constat, in quantum si spasmus in imo ventre inceptus, indeque instar *globi ascendens*, statim suppressitur, ac istarum partium constrictione valida impeditur, ne superius perreptet, sæpenumero passio convulsiva, *præcordiis*, & *cerebro* intactis abruptitur : quapropter vulgo in more est, mulieres laborantes *fasciis*, aut *brachiis* circa *epigastrium* complicatis arcte constringere, adeoque symptomatum versus superiora progressum sistere : Cum enim spiritus animales velut fomite igniario spasmos successive ineunt, ubicunque fomes abscinditur, aut intercipitur, affectio isthæc prorsus inhibetur.

Quod spectat ad varios *odoratorum* effectus, nempe quod *suavia* paroxysmum accersunt, *fætida* vero eundem abigunt, dicendum esse videtur, priora spiritus animales demulcendo resolvere, ac à solitis influentiæ pensis nimis relaxare, adeoque ipsos ad explodendum paratos in tales inordinationes provocare, quinimo velut flammula admota aliquatenus accendere ; contra autem *graveolentia* spiritus reprimunt, ab excursibus & exorbitantiis retro cogunt, inque ordines compellunt, quin velut *sulphur* auro *fulminanti* admixtum, virtutem explosivam iis adimunt.

Quæ hæcenus de *passionibus* vulgo dictis uterinis fuscè differuimus, adhuc clarius elucescent, si in confirmationem hypotheseos nostræ argumenta ab *anatomicis observationibus* desumpta adjiciantur: Itaque libet hic *casum insignem*, quo affectionum convulsivarum *ratio formalis*, & *causa* plurimum illustrantur, in medium proferre.

Observa-
tio.

Domina perillustis, forma elegantissima, optimaque animi & morum indole prædita, nuper in hac vicinia degebat, quæ per multos annos *affectibus spasmodicis* obnoxia, siquidem valetudinariam hanc diathesin *originaliter*, sive *hereditario* contraxerat, atque hos morbidi semini fructus fere quovis ætatis suæ lustro experta fuit, potissimum vero quoties utero conceperat (crebros enim conceptus & abortus passa) *pathematis convulsivis*, quasi *hystericis*, supra modum tentari solebat: quippe statim à mensibus cohibitis particulæ heterogeneæ ad *cerebrum* & *nervosum* genus translata, atrocissimi affectus paroxysmos intulere.

Postquam novissime conceperat, primis mensibus, juxta pristinum morem, *affectibus convulsivis* subinde molestabatur: circa nonam gravidationis hebdomadam, à frigore suscepto, in *febrem* periculosam incidit, in qua *dolores* valde acuti, per plures dies in *lumbis*, & juxta *hypogastrium* gravissimè urgentes *abortum* minari videbantur: attamen *dolores* isti, prout ab eventu constitit, potius *colici censeudi*, ab humore acri per nervorum ductus à *cerebro* in istas partes decumbente procedebant; nam circa *febris declinationem*, materia istac alibi translata, *diarrhœa*, *pedum dolores*, & dispositio velut ulcerosa successerunt.

Quamprimum hæc *Domina* à *febre* & *doloribus* istis convaluit, *affectus convulsi* redibant; nam quolibet mane è somno evigilans, circa *oris* & *faciei* partes, necnon in *brachiis* & *cruribus* *spasmos* & *contracturas* immanes pati solebat; quæ symptomata proculdubio à *serosa colluvie* in capite circa *nervorum origines* aggesta, ab iisque unà cum succo irriguo in somnis altius inhibita oriebantur; & cum postea eadem materies *nervorum interiorum* ductu, iterum in *mesenterii plexus*, ac *lumbos* ferebatur, istarum partium dolores atrocissimi, ac insuper *paroxysmi* quasi *hysteric* eam graviter infestabant.

Enimvero isti *faciei* & *membrorum* motus convulsi brevi tempore cessabant; usque tamen imbecilla, ac enervis, cum vultu pallido, gressu infirmo ac tremulo, atque alimenti tantum incongrui, & liquorum calidiorum appetens perstabat: sub finem *tertii mensis*, quo tempore constanter *abortire* solebat, *menstrua* eruperunt, quibus per duos aut tres dies una cum membranarum laceratarum frustulis descendentibus, *abortum* expectabat: attamen fluxu isto cessante, dolores velut parturientis, in *abdomine* & *lumbis*, uti prius exorti sunt, eamque hebdomadæ spatio *die* & *nocte* miserrime torquebant: tandem balneo herbarum emollientium usa, & exinde lecto ad sudandum commissa, *uteri* sarcinam deposuit: *conceptus* ita cum ingenti cruciату decedens, *galti Indici ovum* & magnitudine & figura æquabat: hujus tunica exterior fuit lacera & disrupta; interior integra manens, *aqua limpida* circiter lb. β. & nihil præterea continebat; nulla quidem *fœtus* aut *formati*, aut uspiam *futuri* rudimenta apparebant: postea

postea per quatuor aut quinque dies *lochia* cum aliquibus membranarum frustis effluebant; interim dolores cum solita atrocità urgebant; cumque elapso hebdomadæ spatio haud sponte desierint, demum iis sedandis remedia expetuntur.

Propter hunc finem, imprimis *linimenta, fatus, balnea, & clysteres* crebro adhibentur; etiam medicamina *uteri* sordes expurgantia, in quas totius mali causa rejicitur, intus sumuntur: *priorum* usum, *torminum* breves intermissiones sequutæ sunt: subinde vero affectus cum insigni molestia redibat; quinimo intra tres hebdomadas morbus plurimum ingravescens, multa alia horrenda symptomata ascivit: nam præter dolores in *abdomine, & lumbis*, qui in dies atrociores fiebant, insuper in *dorso, cervice, scapulis*, necnon in *brachiis & cruribus* magno cruciatu mox afficiebatur, idque acerbius quoties lecto incalescebat; cæterum crebra *vertigine, vomitu & nausea*, atque sæpius in die *paroxysmis convulsivis* gravissimis affligebatur; scilicet primo *moles in hypogastrio* ascendere visa, illico totum ventrem cum impetu attollebat, mox *respiratione cohibita anæsthesia* cum *vultu cadaveroso* successit: postquam ita velut demortua, per tria aut quatuor horæ minuta jacuerat, subito exsilire solebat, ut ab astantibus vix comprimi, aut contineri posset; dein *contractiones immanes & distorsiones* in cunctis oris & faciei partibus, necnon in omnibus corporis membris sequutæ sunt: symptomata hæc revera hysterica judicabantur, quoniam Domina illustris ita nuper abortierat.

Attamen hæc singula perpendens, in ea demum sententia fui, *utriusque paroxysmi*, scilicet tum *ἀλγυματώδης*, tum *σπασμώδης causam* omnino à mala *cerebri & nervosi generis* affectione, etiam absque *uteri* culpa pendere; nempe quod humor acris intra *ἐγκέφαλον* congestus, exinde per *nervorum ductus* in partes longe distitas descenderet, qui *membranis & fibris* insidens, cumque *humore* à massa sanguinea *influo* fermentescens, eas plurimum irritaret, adeoque dolores atroces cieret: postea dein cum *particula heterogenea & explosiva* cum *humore* isto intra *ἐγκέφαλον* admixta, atque ductus nerveos subeuntes, spiritibus accrescerent, propterea *diathesis spasmodica* subinde in graves paroxysmos erumpens inducebatur, prout mox fusius patebit.

Juxta hujusmodi *Æthiologiam* intentiones curativas instituens, Domina agrotanti, quo tempore gravissimè laborabat, *sanguinem è vena saphæna* mitti, intra biduum lene *catharticum* exhiberi, idque semel, aut bis in hebdomada iterandum præcepi: insuper aliis diebus, vesperi & mane sp. C. Cervi, aliisque horis bis aut ter in die *pulverem è margaritis & oculis cancrorum* cum dosi sequentis julapii propinabam. ℞. Aq. limacum, lumbricor. magistralis, an. ℥. ii. saxifragiæ, cerasor. nigror. an. ℥. iii. hysterica ℥. ij. syr. è coralliis ℥. j. β. tincturæ castorei ℥. j. misce: Balneo herbarum dulcium frequenter usa fuit, cum necessitas urgeret; opiata semper bono successu assumpsit; *vesicatoria* internæ parti utriusque femoris, etiam *cervici* applicabantur; porro *fatus, linimenta, clysteres, cucurbita, sternutatoria*, cum multis aliis administrationum modis, juxta symptomatum exigentias præscribebantur.

Ab hac *medendi methodo* per 14. circiter dies adhibita, *Domina illustrissima* plurimum alleviata, *paroxysmis convulsivis* omnino caruit. Quinimo *viscerum & membrorum tormina*, aliaque symptomata valde mitigata, citæ convalescentiæ spem optimam fovebant: Post hæc vero, partim ob malam victus rationem, cui ægrotans, vel paululum refecta semper indulgit, præcipue tamen propter subitam terroris, vel tristiciæ passionem, quam funestum accidens, intra proprias ædes contingens, excitarat, *recidivam* passa, mox morbus in multo deteriore statum evehctus est; nam & *spasmi*, *dolores* atrocius infestabant: quin & ventriculus *vomitu* ferè continuo laceratus, nec *alimenta*, nec *medicamina* admittebat. *Lac asininum* per aliquot dies cum fructu quodam sumebat; quod tamen, siquidem in ventriculo bilescens ei molestiam pareret, brevi omittebatur: tandem invitis omnibus remediis, juxta plurium Medicorum consilia diligentissimè præscriptis, nobilissima patiens magis indies, magisque elanguescebat, atque sensim morti appropinquabat: biduo ante obitum *ventris & lumborum* tormina plurimum remittebant, ipsaque solito alacrior facta convalescentiæ spem quandam concepit; interea tamen conquesta erat de *capitis dolore & gravitate* insigni; cumque circa initium noctis alte dormiverat, expergefacta in *paroxysmum convulsivum* valde horrendum incidit, qui statim in *apoplexiam* cito lethalem transiit; namque *insensilis & æquæ* facta, intra 12. horas hac vita emigravit.

Morbi
Ætiologia
ex obser-
vatis
anatom-
is de-
sumpta. Cum circa *ægritudinis*, ex qua *illustrissima* Domina obierat, causam varia judicia ferebantur, plerisque nimirum mala omnia in *affectiones uterinas*; aliis in *abscessum* aut *apostema*, quod alicubi circa abdominis viscera latitans suspicati sunt, referentibus; placuit amicis ut cadaver, ob funus diu prolatum, aperiendum sedulo inspiceretur; adeoque genuinæ morbi & mortis causæ investigarentur: quod pensum curæ meæ delegatum summa quia poteram diligentia executus sum.

Itaque primo circa *habitu corporis* observatu dignum erat, quod membra, & partes inferiores *juxta ac ultra* dolorum sedes consitæ, plurimum contabuerant, ut *crura* prorsus emaciata, instar sceleti apparuerint: interim *facies, cervix, & brachia* satis plena & torosa manebant, unde constat *liquorem nervosum* operi nutritio non minus quam facultatum animalium exercitio conferre: quare cum liquor iste in *lumbis & abdomine* à transitu multum impeditus, & spasms continuis absumptus, haud debito influxu ad partes inferiores descenderet, istæ propterea statim tum enerves, tum emarcidæ evaserunt. Hujusmodi *atrophia* in hoc differt ab altera *hectica*, quæ *sanguinis* vitio contingit, quoniam in hac *facies Hippocratica* præcipuum morbi signum est, in illa vultus aspectusque parum aut nihil mali produnt.

Domina illustrissima cadaver, ut valde emaciatum, & viscera omnia inanita fuerint, tamen illud citissimè computruerat; nam intra 40. horas cutis per totum discolor, in hac parte livida, in ista viridis, inque alia subnigra apparebat; & corpus tam subito putrescens odorem summe retrum expirabat: cujus ratio proculdubio erat, quod propter musculos spasms perpetuis exercitos, *mixtionis principia* in tantum laxarentur, ut illa

in dissolutionem prompta, post obitum mox ab invicem decederent; pariter rite, uti observamus de carne ferarum, quæ aut cursu diuturno fatigata, aut fustibus contusæ occiduntur; hæc enim multo citius putrescit, quàm illarum, quæ in statu tranquillo & sedato macerantur.

Abdomine aperto, *intestina* & *ventriculus*, satis sana scilicet, integra enim & bene colorata apparebant; erant tamen inanita, & quasi inflata, utpote quæ in perpetuas ferè evacuationes, scilicet suprâ, aut infrâ habitas, sollicitata fuerint: in tota hac cavitate nulla *abscessus*, aut *apostematis* vestigia cernebantur. Dum morbi causam perquirentes, viscera huc illuc devolvimus, in *mesenterio* aliquid notatu dignum occurrebat: nempe circa medium ejus, ubi dorso affigitur, atque majores nervorum plexus continet, substantia laxior, & pluribus quasi vesiculis inflata manus latitudinem exæquans videbatur, eo scilicet ritu, ac quando in armo vitulino interstitia musculorum à laniis insufflantur, ut pars ea plenior & velut pinguior facta extumescat: Hoc *mesenterii* loco, quia tumidior & tactu mollior fuit, humorem aliquem doloris causam hospitari putaveram; aperiens veroprehendi tantum membranas fuisse ab invicem solutas, & interstitiis suis nihil præter flatum inclusisse: qualis membranarum separatio, & ab invicem divulsio, proculdubio inducta fuerat à crebris spasmodis, sive spirituum explosionibus, quæ intra plexus, & fibras nerveas illic densissimè confitas ferè continuo ciebantur; atque spasmi isti, ob particulas heterogeneas & explosivas illuc nervorum ductu à capite derivatas contingebant.

Enimvero quod spectat ad ista *ventris tormina*, & in affectibus convulsivis velut *molis ascensum*, & *abdominis inflationem*, non dubitandum est quin causæ morbificæ sedes in illa *mesenterii* parte delituit: attamen quoniam *uteri* principaliter affecti tanta suspicio ferebatur, quantum hoc viscus meruerat, proximè inquirebam: itaque pelvim intra ossa pubis confirmatam diligenter scrutatus, *uterum* in debito situ & quoad omnia sanum, & factum tectum reperi: corpus ejus ad justam molem, licet quinque tantum septimanæ abortum præterierant, contrahebatur, scilicet *pyrum minorem* & magnitudine & figura referebat; *glandula* ex utroque fundi latere, quæ *testes* dicuntur, perexiguæ & flaccidæ, sine quovis humore superfluo, aut virulento in iis contento apparebant: *uteri* corpus ubilibet dissectum, crassitudine sua pollicem latum æquabat; ejusque interior cavitas haud major fuerat quam ut fabam contineret: intra hanc specum, sicuti in aliorum viscerum cavernis assolet, mucosum quiddam in perexigua quantitate includebatur: revera circa *uterum*, aut appendicem ejus nihil extabat, cui tanquam causæ morbificæ symptomata modo descripta imputari poterint: quapropter hinc quod prius opinatus sum, *ut dicitur* concludere liceat, *passiones* dictas *uterinas* sæpissimè ab alia causa, quàm *uteri* vitio excitari.

Intestinis amotis etiam *renes* satis sanos reperimus: alter tamen eorum inusitata erat figuræ, scilicet in plures lobos instar *renes vitulini* findebatur.

Lien, *pancreas*, & *omentum* sine culpa; *ventriculus* valde inflatus erat, ejusque

ejusque tunica interior, absque plicis, aut rugis plana evaserat: quod certè acciderat propter crebros vomitus, viscere hoc spasmodis ferè continuis affecto: porro ob hanc rationem, scil. *stomachi* tono præfracto, alimenta nec bene appetere, nec concoquere solebat.

Hepar à sana constitutione plurimum desciverat, fuit namque tumidum & subdum, pallidi coloris, atque instar ligni putridi, exsanguis prorsus & exsiccum: hoc proculdubio effecerat liquorum cardiacorum, & impensè calidorum crebrior usus.

Pulmones erant lividi coloris, & per totum obstructi, utpote ichore spumoso, & foetido infarcti: Certè *hoc viscus* & *hepar* à longo tempore vitiosa extiterant, propterea ut *sanguis* diutius à recta crasi degener & valde depravatus, ægritudinis prima seminia, ejusque deinceps fomitem constantem suggererit.

At vero præcipuam, & quasi originalem morbi causam in capite, idque haud frustra quæsimus: itaque *calvaria* exempta, vasa *meningas* & *cerebrum* perreptantia sanguine plena, & distenta apparebant, cum in reliquo corpore inter disseccandum vix quidquam sanguinis effluxerat: *meninge* crassiori amota, per alteram tenuem, & pellucidam aqua limpida cerebri plicas & anfractus implens, ejusque totam compagem quasi inundans cernebatur: revera omnes *cerebri* cavitates & recessus colluvies serosa impleverat: *plexus choroeides* aqua diu immersus, & velut elixus, discolor & semicorruptus evaserat: Juxta *nervorum splanchnicorum* origines, aqua se plurimum insinuans, *piam matrem* à *medulla oblongata caudice*, per duos digitos latos separaverat; proculdubio horum nervorum ductu materies morbifica à capite in *mesenterii plexus* descendens, & *dolorum*, & *spasmodorum* causa extiterat: porro eadem materies etiam aliorum nervorum capita afficiens, eorumque ductus pervadens, postea in aliis partibus, scilicet quibusvis ferè totius corporis, atrocissimas hasce affectiones produxit.

Medendi methodus contra affectiones hystericas. Quod spectat ad *therapeiam*, sive *medendi rationem*, in *passionibus* vulgò dictis *hystericis* usurpandam: quandoquidem plurima hujus morbi *symptomata* sunt *convulsiva*, inde constat *remedia antispasmodica*, qualia superius describuntur, potissimum indicari; attamen cum affectiones hæ *sexui foemineo* sæpius contingunt, in quo nempe *fluxus menstruus*, aliaque *uteri* accidentia plerumque in causæ morbificæ partem asciscuntur; idcirco *medicamenta* varias *uteri* dispositiones respicientia prioribus superaddi, iisque multifariam complicari debent: *Indicationes therapeuticae* sunt vel *curatoriae* in *paroxysmo* adhibendæ, vel *præservatoriae*, quæ extra *paroxysmum* institutæ morbi causam tollunt, ejusque accessiones præcavent.

Curatoria.

1. Quoad prius, si *paroxysmus* levior esse solet, absque ulteriori spirituum perturbatione, sua sponte pertransire permittatur; sin eo gravius urgente, naturæ valde oppressæ suppetias afferre opus sit, unum illud agatur, ut spiritus *copula heterogenea* amplexibus immunes facti, inordinationes suas, explosionesque remittant: in hunc scopum usu receptissimum est imprimis *foetida* & *graveolentia* naribus admove-
quorum

quorum scilicet effluvia spiritus nimis efferos, & exsilire paratos reprimunt, ac in ordine cogunt, quin & copulam heterogeneam iis excutiant, & non raro penitus profligant: *assa foetida*, *castoreum*, *galbanum*, *sindone* rara inclusa, & naribus admota conveniunt; item *pluma perdicum*, & *vetera coria combusta*, aut *sulphur accensum*: Porro spiritus, ac oleum fuliginis, aut cornu cervi non raro juvant: Novi tamen hujusmodi suffumigia quibusdam foeminis plurimum infesta paroxysmum aggravasse; probabile est eadem interdum spiritus nimium irritare, ac in majores *ataxias* adigere: sicut *foetida* naribus admota, ita similia ori infusa non raro levamen conferunt; quare *histericis tincturam castorei*, *solutiones assae foetidae*, & *galbani*, etiam *spiritus C. cervi*, ac *fuliginis*, cum aquis appropriatis saepius bono cum successu propinamus. ℞. Sp. C. cervi gutt. 12. ad 15. vel 20. sumantur in haustulo julapii sequentis. ℞. Aq. pulegii, artemisiae, an. ℥. iiij. aq. bryoniae compositae ℥. ij. castorei nedulo ligati & in vitro suspensi ℥. ℞. sacchari albissimi ℥. j. misce. ℞. Tincturae castorei ℥. j. ad ℥. ℞. sumatur in haustulo cervisiae tenuis. ℞. Assae foetidae, vel galbani ℥. ij. dissolvantur in spiritu vini ad tincturae rubicundae extractionem. Dosis ℥. j. in aq. matricariae cochlear. ij. vel iiij. Riverius valde praedicat illud Solenandri. ℞. Moschi, sanguinis draconis, an. ℥. j. plus minus sumatur in aq. Naphae ℥. iiij. ad iiij. Johannes Anglicus commendat sem. *pastinacae* vel *aquilegiae* in vino, aut aq. appropriata, prout remedia certissima. Si paroxysmus diutius persistens *αἰσχυρά* aut *ἀσχυρία* intulerit, enemata acriora, ut rad. bryonia cum carminativis aq. incoctis injiciantur: frictiones crurum ac pedum instituantur, ac si ad fortiora procedendum erit, cucurbitula abdomini, aut inguini applicentur, quin & sternutatio crebro provocetur: nonnullis convenit in medio paroxysmo, aq. frigida haustum, aut simplicem, aut in qua camphora deflagavit, propinare.

2. Indicatio praeservatoria has tres praecipuas intentiones complectitur, Praeservatoria scilicet primo sanguinis impuritates cerebro ac nervoso generi suffundi aptas tollere, aut alio derivare. Secundo cerebrum munire, spiritusque incolas ita corroborare, ut illi copulam heterogeneam vel non omnino suscipiant, vel facile excutiant. Tertio quicquid enorme uterus habet, ac dispositioni spasmodicae contribuit, emendare.

1. Prima intentio catharsi & phlebotomia, aliisque communioribus sanguinem, & humores depurandi expurgandique viis perficitur. Si emetico locus fuerit, ab eo semper ordiendum esse duco, praesertim in *cacochymicis*, atque *pica*, aut *malacia* affectis, in quibus ingens *phlegmati*, *viscosi* saburra, ventriculi plicis ac tunicis infarcta, aliorum medicaminum virtutes inhibet: propediem a vomitorio nisi aliquid contraindicat, sanguis detrahatur; in foeminis temperamenti calidioris, statim è brachio, & postea, si opus sit, ex pede, aut hirudinum suctu è venis sedalibus; in corporibus vero obstructionibus molestatis, & minus calidis sanguis mittatur parcius & rarius, ac tantum in locis infra uterum confitis: post has evacuationes (si modò indicantur) rite celebratas, semel intra sex septemve dies purgatio instituaturs juxta formulas sequentes. ℞. Pilul. foetid. major. ℥. j. ℞. resina jalap. ℥. xij. Tartari vitriolat. castorei, an. ℥. j. ammoniaci solut.

in aq. hysterica q. s. f. pilula 12. pro tribus dosibus. Vel ℥. Resina jalap. ḡ. xvij. Calomelanos ʒ. j. castorei ʒ. j. f. pulvis, dividatur in tres partes pro tribus dosibus, detur in pulpa pomi cocti, vel in conserva borraginis : temperamento calidiori præditis, extracti, aut syrupi nostri solutivi dosi convenienter exhibeatur : ad materiæ morbificæ à capite revulsionem fontanella sura, aut femori inusta, atque interdum vesicatoria, ligatura, & frictions dolorificæ adhiberi solent. Nec tantum sanguinis purgatio, ejusque recrementorum à capite revulsio, sed liquoris eius alteratio, inque crasin debitam reductio hic locum habent : quare in quibusdam hystericis chalybeata juvant, in aliis acidula, aut serum lactis, in nonnullis thermarum usus insigniter prodesse solent.

Secunda intentio, nempe cerebri, & spirituum animalium rectificatio, medicamentis cephalicis, ac proprie antispasmodicis perficitur, quæ quidem fere singulis diebus, quoties à catharsi, aut phlebotomia vacat, sedulo exhibeantur : talium remediorum cum variæ sunt species & administrationum modi, libet hic selectiores quasdam formulas subjicere.

℥. Fecula bryonia, assæ foetida, castorei, an. ʒ. j. salis corallii succini, Iovis, an. ʒ. ʒ. galbani solut. in aq. hysterica q. s. f. massa. Dosis ʒ. ʒ. ad ʒ. j. mane & vespere superbibendo dosi liquoris appropriati.

Vel ℥. sem. pastinacæ sylvestris, urtica, an. ʒ. ij. vitrioli martis ʒ. j. extracti gentianæ, matricariæ, an. ʒ. j. ʒ. cum s. q. syrupi de artemisia, f. massa : sumatur ad ʒ. ʒ. eodem modo.

Si forma pulveris magis arridet, ℥. Rad. serpentariæ, virginianæ, contrayervæ, an. ʒ. j. ʒ. corallii prepar. margarit. succini albissi mi, an. ʒ. j. misce, f. pulvis. Dosis ʒ. j. ad ʒ. ʒ. mane, & vespere cum liquore appropriato.

Opiatæ ad hunc modum componantur. ℥. Conserv. flor. lilii convallii, pæoniæ maris, betonica, an. ʒ. ij. sem. pæoniæ, corallii rubr. prepar. an. ʒ. ij. pulv. dictamni cretici ʒ. j. ʒ. salis absynthii ʒ. ij. cum s. q. syr. è corticibus citri, f. electuarium. Dosis mane & vespere q. N. Moschat. Eodem modo pauperibus exhibeatur conserv. foliorum arboris vitæ, vel foliorum rutæ, bis in die.

Liquores contra affectiones hystericas appropriati, & medicamentis prædictis superbibendi, sunt vel aqua destillata, quæ per se, vel cum aliis in forma julepi sumantur, vel decocta, vel tinctura, ac infusiones.

℥. Aq. artemisiæ, pulegii, an. ℔. ʒ. hysterica ʒ. iiiij. tinctura castorei ʒ. ʒ. syr. è coralliis ʒ. j. ʒ. misce. Dosis ʒ. j. ad ʒ. j. ʒ. cum medicamento quolibet è supradictis.

℥. Folior. pulegii, matricariæ, abrotani utriusque, calamintha, nepetæ, marrubii utriusque, an. M. j. rad. bryoniæ ʒ. iiiij. sem. pastinacæ ʒ. ij. incisis, & contusis affunde vini albi, vel pomacei ℔. vj. destillentur s. a.

℥. Rad. pæoniæ maris, angelicæ, valerianæ, an. ʒ. ʒ. folior. artemisiæ, chamæpyteos, calamintha, pulegii, visci qu. an. M. j. sem. utriusque pastinacæ sylvestris, an. ʒ. ij. passular. M. j. coquantur in aq. fontana ℔. iiiij. ad medietatem, adde vini albi ℔. j. ʒ. f. colatura, servetur in vasis occlusis. Dosis ʒ. iiij. vel iiiij. bis in die.

℞. Sem. pastinaca sylvestris contus. ℥. ij. castorei ℥. j. ponantur in vitro cum vini albi lb. ij. Dosis ℥. ij. bis in die.

3. Quoad *tertiam intentionem*, quæ *uteri* inordinationes inhibens *passionis* dictæ *hysterica* sanationem promovet; dico imprimis, quod olim credebatur circa *morbi causam*, & curationis scopum, nempe *uterum ascendere*, ideoque debere in *debitum locum reduci*, omnino commentitium esse, prout alibi ostendimus: *uteri descensus*, sive exitus sæpenumero accidit; attamen raro aut nunquam affectus hystericos producit: porro *uteri dislocatio puerperis* mox à partu interdum contingit, scilicet cum *uteri corpus* capacius factum, & recens inanitem, non recto in loco, intra pelvim subsidet, verum superius ad latus illi modo dextrum, modo sinistrum declinat, ibidemque instar marsupii constricti, in molem ingentem complicatur: cujusmodi moles juxta inguinis latus diu permanens, foetus alterius, aut secundinæ relictæ, aut etiam tumoris scirrhusi illic accrescentis suspicionem inferre solet; postea tamen, cum *lochiis* copiose fluentibus, *uterus* ad debitam magnitudinem redigitur, tumor iste sensim evanescit: atqui dum illic persistit, nisi forsan *lochia* propterea sistuntur, *passiones hystericas* minime producit. Huic parti in debitam positionem citius reducendæ, *fotus*, *linimenta*, & *emplastra* bene conducunt. Sæpiissime tamen symptoma illud sine ulteriori noxa sponte pertransit. Quibus præterea affectibus *uterus* à puerperio obnoxius fuerit, & qua medicinæ methodo iis occurrendum sit, alibi ex professo ostendimus. Quoad cætera illius partis vitia, quæ fœminis aliis, scilicet minimè puerperis obtinunt, advertimus, ea potissimum esse vel *uteri morbum ex solutione continui factum*, qui scilicet aut *tumor*, aut *ulcus* est; vel excretionis cujusdam assuetæ inhibitionem, nempe aut *sanguinis menstrui*, aut *fluoris albi*, aut *humoris seminalis* suppressionem: Propter *menstrua retenta* particulæ heterogenæ non raro in caput suffusæ, pathemata spasmodica inducunt: pariter cum fluor albus sistitur, materia excrementitia à sanguine resorpta, *cerebro & nervoso generi* traditur. Quinimo cum seminis evacuatio solita inhibetur, humoris nervosi superfluitates in cerebrum regurgitant, ejusque spiritus incolas tinctura morbifica & explosiva inficiunt. Super his particularibus *uteri affectibus* non opus erit speciatim ac fuse differere, sed *medicamenta & administrationes iatricas morbis muliebribus* appropriatas, cum *remediis antispasmodicis* complicare.

C A P U T XI.

De affectibus vulgo dictis hypochondriacis, quos ostenditur, maxima ex parte esse convulsivos: obiter item de medicamentis chalybeatis.

IN superioribus plane evicimus, *passiones* dictas *hystericas* non semper ab *utero*, imo sæpius à *capite affecto* procedere; inquirendum proximè de *affectibus hypochondriacis*, cujusmodi originis & naturæ illi fuerint, & à

quarum partium vitio potissimum dependent. Vulgaris invaluit opinio, symptomata huic morbo accenseri solita, omnino à *liene* produci; quare ut plurimum *vaporibus* ab hoc viscere elevatis, & huc illuc varie discurrentibus ascribuntur; cum revera ægrotudines istæ plerumque sint *partium nervosarum spasmi & contractiones*: ut vero constet quibus de causis excitari solent, ipsa symptomata in primis perpendere, eorumque censum quendam instituere oportebit.

*Affectus
hypochondriaci
descriptio.*

Quoad *affectus* igitur, qui vulgo *hypochondriaci* perhibentur, observare licet eos hominibus temperamenti atrabiliarii, cum aspectu lurido, & graciliori corporis habitu potissimum accidere; raro est quod morbus iste *doctores* vultu florido, aut etiam nimis phlegmatico præditos molestat: circa ætatis *æta* signis manifestis se prodit; huic *viri*, frequentius quam *femina*, obnoxii reperiuntur; in utrisque habitualis factus ægre admodum aut vix omnino curatur; in *mulieribus* ob debiliorem constitutionem affectibus spasmodicis longe pluribus stipatur; quare vulgo dicitur in hoc sexu, *passioni hypochondriacæ hystericam* ascribi.

Symptomata, quæ huic morbo accensentur, vulgo valde multiplicia, & diversimodæ indolis existunt, neque in omnibus parem originem, aut eandem à se mutuo dependentiam observant: quippe in his *ventris inferioris viscera*, in illis *præcordia*, in aliis *cerebri confinia* plurimum affici videntur: in plerisque, veruntamen haud omnibus, *ventriculus* multum laborat; circa appetitum sæpe nimius, atqui ab ingestis statim aggravatur: cumque alimenta ob *σπασμὸν* diutius in eo morantur, eorum *particula salina in fluorem* evectæ, totam chyli massam in *pultem* modo *acidam*, aut *austera*, modo in *salsam*, aut *acrem* pervertunt; hinc *cardialgia*, *flatuum ingens proventus*, *rugitus*, ac *crebra vomitio* succedunt; & quoniam ob *σπασμὸν* defectum chymus haud in totum volatilifatur, ac foras provehitur, quin materiæ viscosæ saburra ventriculi tunicis adhærescens pone relinquitur, *sputatio* fere continua eos infestat; in sinistro *hypochondrio distensio*, & non raro ibidem, ac subtus *ventriculum pulsatio immanis* sentitur, etiam illic *dolores* passim oriuntur, qui hinc inde vagi transcurrunt, & cum lancinatione quadam per plures horas misere excruciant: interim à membranarum contracturis, & flatuum exinde concitatorum fluctuatione, *borborygmi*, & *murmura* producuntur: in *thorace* autem sæpenumero adest *magna constrictio & angustia*, ut *respiratio difficilis*, & ad morum quemvis laboriosa evadat; etiam in nonnullis *paroxysmi asthmatici* gravissimi ingruunt: insuper de *cordis tremore & palpitatione*, cum insigni ejusdem oppressione laborantes queri solent; item crebra *spirituum deliquia*, & *leptothymia metus* superveniunt, ut ægroti mortem sibi semper imminentem putarint: in hac regione circa membranas, ac præcipuè *mediastinum*, *dolor acutus*, qui modo in una parte circumscribitur, modo ad scapulam extenditur, hujus morbi symptoma familiare est. At vero in *capite* malorum ilias hypochondriacos plerumque perturbat; nempe *dolores atrocissimi* periodice revertentes emergunt; item *scotomia*, *crebra vertigines*, *vigiliae pertinaces*, *cogitationum æstus*, & *fluctuatio* molestissima, *animi incertitudo*, *phantasia perturbata*, rei cujusque *formido & suspicio*, morborum.

morborum quibus immunes sunt, possessio imaginaria, pleræque etiam aliæ spirituum distractiones, imo interdum *melancholia*, & *mania* hanc ægritudinem comitantur: præter interiores hæc corporis regiones ab hoc morbo obsessas insuper *partes* ferè qualvis *externas dolores vagi*, necnon *spasmi* & *stupores* cum fornicationis sensu invadunt; *sudores nocturni*, *sanguinis* in facie & volis manuum *suffusiones*, *febres erratica*, & pleraque alia *Affectus hypochondriaci ad genus nervosum spectant.* incertæ originis symptomata passim oriuntur; de quibus siquidem in promptu non fuerit causas genuinas & fiendi modos assignare, statim in *lienem* culpa omnis rejicitur, illumque, velut affectus cujusvis anomali primum authorem, Medici accusant; verum quo jure, mox inquiretur: interim observare est, quod præcipua hujusce ægritudinis *symptomata* sint *spasmodica*, atque immediatè à spirituum animalium, & succi nervosi anomaliis, potius quam à viscerum coctioni inservientium dyscrasiis dependent. Veruntamen unde morbi hujus complicatissimi prima origo procedit, & qua ratione in pluribus ita locis affectiones diversimodas pariat, non ita facile erit designare.

Quid medici veteres atque moderni de *passione hypochondriaca* ejusque *essentia*, & causis crediderunt, tædio hic esset particulatim referre; annotamus solum, quod plerique valetudinariam hanc diathesin unci *lienis* vitio adscripserint; interim nonnulli tota hujus visceris confinia in culpæ *inquiri-* partem asciscentes, sanguinem in vasis *splenicis*, & *epigastricis* ubivis *scatur-* tentem, utpote intemperiei calidæ & siccæ reum, adeoque adustioni, & nimiae fermentationi obnoxium, multiformi huic malo originem præbere contendunt: At vero *insignissimus Highmorus*, *lieni*, æquè ac *utero*, vindicias afferens, præcipuam hujus morbi causam omnino in vitiosam *ventriculi* constitutionem retulit; atque hinc symptomatum prædictorum rationes originaliter petendas esse voluit. Enimvero ut hypothesein pro solvendis hujus ægritudinis phænomenis idoneam contexeret, supponit imprimis *stomachi tonum* nimis laxum & debilem evasisse, ut propterea alimenta difficile admodum & imperfectè coquat: ita nimirum ut chyli portio tenuis & spirituosior, debito citius illinc sanguini commissa, ejus *crasin* versus acrem & calidam pervertat; dein alimenti residuum diutius intra ventriculum mora in phlegma viscidum, & ponderosum degeneret; quod etiam stagnatione sua (pariter ac in eduliis diutius asservatis observare est) valde acidum aut austerum evadit: hinc autem arguit *vir doctissimus*, quod à sanguine nimis seroso, & tenuiori facto, ejus effervescentiæ cito transeuntes inducantur, atque à *stomacho* materiæ viscosæ saburra aggravato, ventriculi & *hypochondriorum* flatus ac distensiones, necnon ructus & sputatio molestissima oriantur: quo vero *lienem* hac culpa penitus eximat, eum neque sanguinis facem atrabiliariam secernere, nec alii cuivis circa *αἱματωρ* muneri inservire contendit; attamen usum ejus ferè tantum in eo consistere, ut *viscus* hoc sanguine præfervido turgescens, *ventriculo* adjacenti calorem suppeditet, ipsumque blando tepore foveat.

Circa hanc opinionem, licet egregio huic Authori eatenus consensum, ut *ventriculum* in hoc affectu sæpe graviter laborare concedam, *Highmorus*

*hypothesis
ventila-
tur.*

cujus siquidem tonus sit laxus, & robur præfractum, propter alimenti indigestionem, pituitæ viscosæ saburra usque in sinu ejus progignitur; cui ob particulas salinas diutina mora in fluorem evectas sæpe acor insignis aut austeritas accedunt; dein quia vitium in prima coctione haud emendatur, in secunda *ἀπεψία* istam sanguinis dyscrasie & inordinationes excipiunt. Verumtamen in illam opinionem haud adducar, *ventriculum* semper esse primum in culpa, aut cætera morbi hypochondriaci symptomata tantum à vitiosa illius constitutione pendere. Novi enim plures ægritudine ista immaniter afflictos, qui *stomacho* satis valebant: etenim de *pulsatione* in *sinistro hypochondrio*, de *pectoris angustia*, & *dolore vago* in eo excitato, necnon de *cordis tremore* & *oppressione*, cum metu continuo & *imaginatione* perturbata plurimum questi sunt; interim cibos copiosè appetere, ac ingesta quævis sine ventriculi molestia, aut gravamine, etiam absque sputatione aut ructu acido digerere solebant. Quinimo observavi alios bibaces, & mala victus ratione utentes, *stomachi* flacciditatem cum *dyspepsia*, *flatulentia*, & *crebra vomitione* contraxisse, qui circa *præcordia* & facultates animales satis sani pro *hypochondriacis* haud omnino haberentur: præterea in hoc affectu sæpe *ventriculus*, potius aliarum partium aut sanguinis vitio, quam propria culpa laborat; quippe usitatum est, hujusmodi ægrotos, quamdiu in lecto compositi multum perspirant, circa *stomachum* rectè habere; cum vero excitantur, poris occlusis, & massæ sanguineæ sæculentia intus restagnante, statim *cardialgia*, *flatuum aggestione*, & *crebro vomendi nixu* affici.

Propter hæc, aliaque rationum momenta, *affectionis hypochondriacæ* originem ab alio fonte, quam à *ventriculi* imbecillitate derivandam esse existimo: quatenus autem inter partes hic primario affici suspectas, maximæ quærelæ contra *lienem* suscitantur, erit operæ pretium inquirere, quali officio hoc viscus defungatur; dein quoties ab eo desciscit, utrum huic morbo contribuat.

*In lienis
usum in-
quiritur.*

Ut concedam igitur, cum D. Highmoro, *lienem* calore suo *ventriculum* fovere, adeoque forsan aliquatenus coctionem juvare: attamen haud eo potissimum fine, sed ob usus quosdam nobiliores hanc partem conditam esse concludo: quippe *stomacha*, propter alimenti digestionem, haud tam *calore*, quam *fermento* activo opus esse videtur: etenim *pisces* actu frigidi, esculenta sua integra devorant, ac sine caloris subsidio eadem velut à menstruo quodam resoluta facile coquunt: præterea de *liene* observare est, quod licet in homine tota ejus compages ventriculo adjaceat, in cæteris plerisque animalibus figura oblonga præditis, quoad maximam ejus portionem procul à ventriculo amoveatur: porro si *lien* sit tantum focus in quo sanguis ventriculum calefaciens contineatur, quæ ratio est ut iste potius, quam hepar, aut pulmones, lividi coloris evadat, & cruore nigricante, ideoque minus præfervido inferciatur.

*Vide Dia-
trib. de
ferment.
cap. 5.*

Dum hæc perpendo, quod olim de lienis usu annotaveram, longe probabilius videtur, quod nimirum à *sanguine* per *arterias* advecto, portio quædam sæculentior, scilicet materia terrestri & sale fixo constans, in

hocc

hoc viscere deponatur, quæ illic velut digestionem exaltata, & in fermenti naturam evedta, denuo *sanguini* per *venas* refluxo committatur, quæ ipsum *ζυμώσεαι* quadam inspiret, atque circa *πυλμάτωσιν* ejus idem præstet quod *fermentum* nostrum vulgare (*levain*-dictum) massæ farinaceæ commissum; nam sicuti panis incocti portio quædam ad austeritatem servata istum indolem assequitur, ut panes alios fermentet, eorumque particulas aliàs segnes in motum vindicet, ita videtur quod *sanguis* in *liene* reconditus, ibidemque velut stagnatione acescens, fermenti naturam induat, quo quidem reliqua cruoris massa, aliique forsan humores, tanquam spiritualisati, in motum vividiorum actuentur. Quod spectant quæ à nupero *Authore*, scilicet *Doctissimo Velthufio*, de *lienis usu* ingeniosè proferuntur: enimvero ille in hoc viscere *fermentum*, quo sanguinis particulae segniores ad activitatis statum perducuntur, contineri, uti summe probabile constituit: quippe animadvertens quod in *pueris*, aliisque temperamento sanguineo, & habitu corporis obesiori præditis, uti mores, & animi indoles ad otium, mollitiem, & hebetudinem inclinarent, ita *lien* semper *coloris rubicundi*, & sanguine, uti *hepar*, florido repletus fuerit; hinc concludit, in his *lienem*, uti partes genitales ante pubertatem, aut in elumbis, minus officio suo fungi; è contra vero, quando quidem in *viris* circa mediam ætatem, præcipuè in istis qui sunt vultus severi & corporis gracilioris, uti solertiæ, sagacitatis, constantiæ ac fortitudinis indicia se produnt; ita *lien coloris lividi*, & sanguine velut cœnoso imbutus reperiatur: hinc insuper arguit, *sanguinem* in *liene*, velut conditorio, diutius asservatum, planè in fermentum abire, quo reliqua ejus massa subinde inspirata subtilisetur magis, ac spiritus acutiores in *regimine* tum *vitali*, tum *animali* progignat: supponit enim corpora nostra naturaliter humiditate nimia scaturire, qua quidem partium & viscerum plerorumque functiones plurimum hebetantur: at vero *lienem* massæ sanguinis communicare partes solidas, constantes, firmas, nec facile dissipabiles, atque has detergere illam humiditatem, simulque aliquatenus à sanguine & spiritibus illam mollitiem auferre, quæ in tenella ætate præpollet: eo firmè modo quo *Boreas*, aut *ventus orientalis*, siccitate & robore suarum partium aërem ventilans & intimè penetrans, aëri & corporibus nostris robur aspirat.

Sed quæ olim circa lienem meditatatus fuerim, cum alibi prostant, non opus erit in hoc loco repetere: attamen amplius annotare libet, quod in corporibus animalium ex *elementorum quinario* conflatis, uti *spiritus cæteris* præpollere debent: ita quidem isti viscosa *sulphuris* & *aquæ* humiditate irretiti, præpediuntur adeo, ut sæpè vires suas vegete satis exerere nequeant; hinc particulae *salinae*, utpote plurimum fermentiscibiles, ad hoc requiruntur, ut *corpuscula spirituosæ* aliorum complexu semiobruta, ac sopita exuscitentur, ac in motus libertatem vindicentur. Unde in nobis ipsis experimur, cum à sanguine nimis halituoso *spiritus* hebescent, à liquoribus acetosis, uti primario *vinis tenuibus* & pomaceo, insigni juvamen præstari: hujusmodi enim remedia *spiritus* exacuunt, at torporem quemvis excutiunt. Talem omnino *ζυμώσεως* virtutem à *liene* rectè

se habente, erga sanguinem & liquorem nervosum jugiter exerceri, facile credimus.

Cum enim hoc viscus triplici vasorum genere instruat, scilicet *arteriis* & *venis*, ac insuper magnis *nervorum plexibus*, fibrarumque nervearum textura confitissima, singulorum usus ad hunc modum dirimi censem: nempe per *arterias* sanguis *lieni* infertur, hinc faculentias suas è sale fixo & materia terrestri conflatas, in meatus & porositates ejus deponit, atque istæ ibidem reconditæ, velut digestionem quadam in saccum valde fermentativum evehuntur, cujus item portio *sanguini* per *venas* reducendo continuo permiscetur: adeoque tota ejus massa hujusmodi particulis fermentativis à *liene* inspiratur; à quibus eidem velut *austeritas* quædam, & *acumen*, cum motus vigore conciliatur, ita ut propterea ipse sanguis vegetior in vasis feratur; etiam exinde *succus nervosus* è sanguine procreatus, magis activus regimini animali suppeditetur: at vero haud tantum hoc ritu mediate, & cruoris interventu, *lienis virtus* fermentativa cerebrum & genus nervosum inspirat: verumtamen opinari licet, quod hoc aliquatenus immediato *nervorum* in *liene* disperforum comineatu fiat: nam siquidem in hac parte, *nervorum*, & *plexuum nerveorum*, *fibrarumque* ab iis ortarum ingens satellitium anatomia detexit, merito ambigitur quali usui inserviunt. Super hoc imprimis annotetur *ventriculum* & *lienem* cum *cerebro* intima commercia habere; in tantum ut *Helmontius* in visceribus istis *animæ sedem* posuerit: hoc autem nulla, quàm per *nervos prædictos*, commodiori via fieri possibile est. Quapropter hic merito suspicamur, non tantum *spiritus animales* à meta alterutra ad alteram internuncios esse; quin etiam & *liquorem nervosum*, qui spirituum istorum tum *pabulo*, tum *vehiculo* est, modo à *cerebro* versus hæc viscera descendere, modo à *visceribus* hisce per *nervos* susceptum, versus *ἐγκέφαλον* perreptare. Cujusmodi *succus lienaris* ad *cerebrum* delatus, *spiritus animales* exacuit, eosdem segnes erigit, ac in motus pernicies irritat: unde à *liene mentis acumen* & *sagacitatem* proficisci vulgò fertur, & *lienosi pro ingeniosis habentur*. Cæterum probabile est, quod *passionum ὁρμαὶ* impetusque, à spiritibus *cerebri* incolis incepti, *nervorum* comineatu in *lienem* feruntur; adeoque spiritus inibi degentes patheticè afficiunt, & sanguinem illuc confluum in perturbationum fluctus exagitant: hinc enim aliquatenus procedit, quod in ira, tristitia, aliisque animi affectibus, juxta quod *lienis* fermentum plus aut minus commotum sanguini inspiratur, hujus liquor diversimodè ebullit: porro ob hanc rationem accidit *lienosis* à passione quavis violenta *sinistri hypochondrii* inflationes & commotiones magnas cieri.

Symptomatum
hypochondriacorum
rationes
explicantur.

Circa *lienis usum* his ita prælibatis, in promptu erit, juxta hanc nostram *hypothesin*, symptomata pleraque ad affectionem hypochondriacam pertinentia explicare, & singulorum rationes assignare: Si quando enim *lien* in officio suo deficit, h. e. cum sanguinis recrementa atrabiliaria non secernit, nec in materiam fermentativam coquit, sicuti in pueris, aliisque temperamenti sanguinei, aut nimis phlegmatici crebro evenire modo observavimus; animi indoles fit hebetior, corpus otio pinguescit; quin &

& sanguis debito segnior, intra vasa stagnare, aut saltem minus vegetè circulari aptus est: è contra vero, cum *lien*is vis fermentativa nimis exaltatur, aut pervertitur *sanguis* proinde debito acrior, aut austerior factus, huc illuc rapide transcurrit, atque motuum anomalias concipit: quin & *succus nervosus* à recta crassi desciscens, spiritus animales copula heterogenea & explosiva imbuat, eosque adeo, velut stimulis afficiens, in crebros spasmos irritat: ut non prorsus immerito *lieni* perperam habenti plurima morborum genera impurentur; sunt autem *afficiendirationes*, quibus *lien* male dispositus passionis hypochondriacæ symptomata producit, aut saltem eorum ortui contribuit, potissimum hæ sequentes:

Scilicet *primo* interdum accidit spongiosam *lien*is substantiam à sanguinis fæce poris ejus nimis impacta, ibidemque stagnante plurimum inferciri ac obstrui, ut deinceps massæ sanguineæ recrementa haud satis excipiat; quin eadem illuc delata, sed minime suscepta, in *arteria cœliaca* ramos propinquos regurgitent, unde statim in *ventriculi* membranas, *omentum*, *mesenterium*, aliasque partes vicinas deferuntur, iisdemque affigi solent; hinc viscerum istorum tonus in tantum labefactatur, ut circa chyli coctionem debita munia haud rite exequantur, & membranæ circumquaque confitæ, particulis heterogeneis, & irritativis plurimum imbutæ, siquidem fere continuo vellicantur, à *spasmodis* hic illic suscitatis, *doloribus vagis*, *contracturis*, *distensionibus*, & *flatuum proventui* graviter obnoxie fiant: propter hujusmodi sanguinis à liene obstructo regurgitationem, verisimile est pulsationem, quæ in hypochondriacis subtus ventriculum sentitur, excitari.

2. Cum sanguinis fæculentiæ, *liene obstructo* excluduntur, partibus ejus vicinis, uti dictum est, affixæ, sinistri hypochondrii affectionem valetudinariam pariunt: at vero licet viscus illud *succum atrabiliarium* è cruore per arterias advectum satis excipiat, sæpe tamen eundem haud rite coquit, verum sale plurimum exaltato, in humorem nimis acidum, aut austerrum, vel alius generis vitiosum pervertit; quo, cum tota massa sanguinea, atque succi alibilis in sinu ejus contenti penus inficiuntur, semini hypochondriaci fructus in toto corpore repullulant; sanguis indebitè effervescens, in quibusdam partibus impetuosius agitatur, simulque in aliis stagnare aptus est: hinc *lienosis* familiare est, statim à pastu faciem rubescere, manuum volas incallescere, hypochondria æstuarè, cordis oppressiones, atque pulsus variationes succedere: Cæterum particulis istis fermentativis è sanguine in partes solidas ubique translatis, dolores vagi hinc inde transcurrentes, & punctiõnum sensus in plerisque corporis membris accientur: porro ab hoc cruoris inquinamento, siquidem massa ejus à temperie benigna & balsamica in falsam & tartaream mutatur, corporis habitus macilentus cum vultu larido & obfusco inducitur.

3. E sanguine ita *lien*is culpa depravato, etiam regimini animali labes sæpenumero infertur; nam particulæ heterogeneæ & spasmodicæ non raro in *cerebrum*, indeque in *nervosum genus* suffunduntur; ita ut spiritus animales

animales in utraque provincia degentes varias anomalias concipiant: propter noxam τ ἐγκεφάλῳ impressam, hypochondriaci variis phantasmatis, & cogitationum mole, fluctuationibusque tentari solent: insuper iis crebræ vertigines, scotomiæ, cephalalgia, & non raro affectus paralytici contingunt: dein quatenus materies morbifica è capite in nervosum genus prolabitur, affectiones spasmodicæ in plerisque corporis partibus, potissimum verò circa *præcordia*, ac imi *ventris viscera* excitantur: cum enim spiritus intra *nervos*, qui partes istas respiciunt, scatentes, propter animi affectum valde perturbantur, particulæ spasmodicæ istos ductus promptius subeunt, illisque spiritibus diathesin convulsivam facilius imprimunt: Itaque partim ob labem mediante *cerebro* transmissam, partimque ob noxam à *liene* (uti ostensum est) immediate communicatam *cordis palpitatio*, *tremor*, & *frequens deliquium*, *pectoris constrictiones*, *respirationis impedimenta*, *stomachi dolor*, *rugitus*, *vomit*, & multa alia in istis visceribus accidentia *hypochondriacis* contingunt.

4. Præter hujusmodi inordinationes, quæ *sanguinis trajectu* à *liene* in *humores* & *partes solidas*, ipsumque *cerebrum*, & *nervosum genus* derivari solent, sunt & alia præterea mala, quæ ab hoc *viscere*, etiam *nervorum commeatu*, exoriri videntur: quippe cum eorum propagines extremæ, ipsæque fibræ nerveæ visceribus intertextæ, extimis suis osculis humorem quendam imbibere, ipsumque nonnunquam sursum convehere ostendimus; summe probabile est, *fibras nerveas lieni* dispersitas (quarum, prout modo innuitur, ingens satellitium est) succum ejus acerrimum suscipere, qui ductus nerveos altius perreptans, motuum convulsivorum causa existat: Revera quod inter *cerebrum*, & *lienem* tam intima commercia habentur, nimirum longe citius, quam quæ per *sanguinis ambages* fieri possint, opinari liceat, *nervos paris vagi* & *intercostalis* proximam commeatu viam esse, qua hæ partes invicem communicant, ac sese mutuo afficiunt. Videtur enim quod cum *atra bilis in liene*, aut sponte turgescit, vel à causa quadam evidenti commovetur, particulæ ejus fibræ nerveas eidem densissime distributas, subeunt, quæ spiritus animales in iis scatentes perturbant, inque explosiones, aut saltem *ἀταξίας* quasdam adigunt; dein spiritus ita perturbati, proximos, illique alios afficiunt; donec continuata ipsorum serie, passio intra *lienem* incœpta, usque ad *cerebrum* propagetur, ibidemque phantasmata inordinata, qualia *hypochondriacis* accidunt, producit: etiam vice versa, cum gravis animi affectus intra cerebrum occasionaliter excitatus, spiritus ejus incolas molestat; impressio phantasia oblata, spirituum intra *nervos paris vagi* & *intercostalis* consistorum serie, & affectione successiva usque ad *lienem* perducitur: hinc fermentum ejus magis commotum, tum in viscere isto, tum in tota vicinia, fibrarum, & membranarum spasmos ciet; & insuper sanguinem in fluxus & refluxus, variasque æstuationes cogit; quin & spirituum perturbationes in cerebrum reflectit. Ab hujusmodi reciproca *cerebri*, & *lien* affectione accidit, quod *hypochondriaci* adeo sunt irrequieti, instabiles & proposito quovis fluctuantes, quasi, juxta Poëtam, *decem animi in iis unâ certarent*.

Vir quidam *illustris*, temperamenti melancholici, & semper pro *lienosa* habitus

habitus, de dolore & inflatione hypochondrii sinistri, crebro rugitu, ructu acido, necnon de tremore cordis, assidua vertigine, nimis vigiliis, & phantasia perturbata plurimum conquestus erat: circa trigessimum quintum ætatis suæ annum, morbo ingravescente, somnum ægre, ac raro admodum capessere noctu, & interdiu cogitationum æstu, & fluctuatione molestari, res omnes, ac personas suspectas habere, & objecta quævis valde pertimescere cœpit: præcordia plurimum constringi, & coarctari, atque in imum subsidere videbantur, quasi cor ipsum usque in ventrem deprimeretur, quo symptomate urgente, valde mœstus, & animo dejectus evasit: postea tamen, remittentibus istis animi affectibus, una cor paululum elevari, simulque præcordia relaxari, & dilatari persentiebat: porro dolores, & contractiones circa viscerum ac membrorum musculos varie excitatos, & huc illuc discurrentes creberrime sustinebat.

Quoad morbi naturam, facile constat, affectionem hanc ejusmodi esse, quæ vulgo *hypochondriaca* appellatur; quod vero spectat ad symptomatum admirandorum causas, supponere licet, sanguinis massam degenerem, & faculentiis atrabiliaris refertam recrementa sua adusta capiti continuo suggerere; unde liquor cerebrum, & nervos irrigans, acris, & spiritibus improporionatus factus, corpora continentia in corrugationes dolorificas, & contracturas irritabat: porro cum à capite in nervos paris vagi & intercostalis hæc labes præcipue derivatur, cerebrum & præcordia noxam inde suscitatum quammaximè luunt. Quod autem sanguis eo ritu depravatur, lienis vitio imputandum videtur, in quantum hoc viscus perperam habens, faculentias atrabiliaris à sanguine non rectè secernit, quinimo & recrementa quæcunque ab illo suscipit, amplius pervertit, eademque in fermentum noxium exaltata cruori remandat, proindeque massam ejus plurimum inquinat, & dyscrasia acetosa & plane vitriolica imbuat.

Obvium est intelligere, symptomata istæ caput molestantia, scilicet vigiliis nimias, vertiginem, phantasia perturbatam, cum multis aliis, à particulis heterogeneis, è sanguine in cerebrum suffusis procedere: Quoad istam pectoris angustiam, & cordis subsidentiam, cum insigni metu & tristitia, opinari licet fibras nerveas cordi, ac imprimis pericardio insertas, in spasmos & corrugationes actas, partes istas constringere & deorsum convellere; quapropter in toto pectore velut constrictio quædam sentitur, & cor ipsum deprimi videtur: porro in quantum præcordiis ita constrictis & depressis, sanguis intra cordis sinus sistitur, ac velut stagnare cogitur, anima tum vitalis, tum sensitiva à sola expansione, & irradiatione plurimum inhibetur, proindeque à systasi ejus diminuta, & decurtata, immanes isti metus & tristitia affectus oriuntur; cum vero, spasmis remittentibus, ista cordis & appendicis ejus constrictio relaxatur, etiam anima, velut flamma amplius expansa, passionum istarum catenas paululum excutere nititur. Pro curatione istius affectionis quum plurima remedia & administrationes medicas à longo tempore usurparat, sine magno tamen fructu, demum aquarum acidularum usu aliquantulum sublevatus, & exinde sensim melius habens, à gravioribus

istis symptomatis immunis evasit, usque tamen affectui hypochondriaco obnoxius degit.

Juvenis quidam Academicus, temperamenti originaliter sanguinei, eumque, vultus floridi, indolis benignæ, ac mitis, propter studia immodica & intempestiva, interim exercitio & victus ratione prorsus neglectis, *lienis obstructionem*, aliamve istius visceris affectionem morbidam contraxerat: quippe aderat sinistri hypochondrii inflatio & tumor, cum dolore gravativo ferè continuò ipsum infestante; cætera satis sanus habebatur. Postquam hujusmodi affectu sesquiannum circiter laborasset, de crebra vertigine, oculorum obfuscatione, mentis inquietudine, & de somno perturbato queri cœpit; quæ symptomata tunc obvium fuit vaporibus à liene elevatis imputare: deinceps vero tremor cordis, cum frequenti spirituum deliquio, hypochondrii pulsatio, ac tandem dolores & contractiones in membris exterioribus, cum crebro stupore, & fornicationis sensu huc illuc excurrentibus succedebant; denique ut malorum iliade correptus, contra genium suum, nativamque indolem valde hypochondriacus evaserit.

Ut casus hujusce pathologiam verbo expediam, satis hic constare videtur, *lienem* in vitio primum fuisse; cujus culpâ cum massa sanguinea depravaretur, exinde labes in humorem cerebrum & nervosum genus irrigantem serpens, eumque inquinans, symptomata prædicta spasmodica inducebat.

Medendi
methodus
contra af-
fectiones
hypochon-
driacas.

Methodus therapeutica contra affectiones hypochondriacas adhibenda, indicationes potissimum has quatuor generales appetit, scilicet *In primis* ut curationis impedimenta tollantur, cujusmodi intentio primarum viarum purgationem & custodiam præcipue respicit. *Secundo* innitendum erit, ut *lienis obstructiones*, aliæve inordinationes corrigantur. *Tertiò*, ut *massæ sanguineæ* tum *recrementa expurgentur*, tum *debita crasis restituatur*. *Quartò* denique, ut *cerebri & nervosi generis*, necnon *humoris irrigui*, ac *spirituum incolarum enormitates*, sanguinis, ac *lienis culpa contractæ emendantur, aboleanturve*. Cum simul in plures, aut omnes hosce scopos collimandum fuerit, tempora idonea eligantur, quibus singulis propositis, absque cæterorum incommodo aut neglectu satisfiat.

1. Quoad primam indicationem, cum ingens materiæ crudæ, aut adustæ saburra in primis viis congeri, cumque ventriculi tonus labefactari, ejusque fermentum varie perverti soleat, contra hæc cujusque generis mala cum idoneis remediis tempestive occurratur; itaque blandæ, & lenes evacuationes, & per vomitum, si facilè succedat, & per secessum adhiberi debent: quibus stomachus contenta sua facile fursum ejicit, suadeo ut, semel intra mensem, assumpto liquore scillitico, aut sale vitrioli, atque cerevisia lacteata, aut aqua tepida copiose epota, vomitus crebra vice provocetur; intermedio tempore purgatio lenis, & tantum *ἐκκρωστικὴ* sæpius instituat: in hunc finem pilula Tartaræ Bontii, aut stomach. cum gum. vel extractum nostrum solutivum ex usu esse poterunt: ℞. Senna opt. ℥. j. rhabbarbari ℥. vj. ep. hyemi ℥. iij. santali curini ℥. ij. salis absinthii ℥. ij. spica celtica ℥. j. incisa & contusa digerantur in vini albi & aq. fumarie an. ℥. x. per horas 48. colatura clara evaporetur leni balnei calore ad consistentiam extracti, addendo

dendo circa finem pulv. sennæ, rhabarbari & cremoris tartari, an. 3.ij. terantur simul in mortario viureo, redigendo in consistentiam pilularum. Dosis 3.ß. ad ʒ.ij. vel 3. j. Remedia ventriculi tonum, ac fermentum spectantia, cum multiplicia, ac diversimoda fuerint, ex iis cujusque ventriculi crasi maxime accommodata seligantur; namque huic amara, illi salsa, alteri acida, aut forsan acria melius competunt. Ex hujusmodi medicamentorum (quæ vulgò digestiva appellantur) censu, sunt elixir proprietatis, tinctura sacra, pulvis Ari compositus, sal absinthii, cremor tartari, tartarus vitriolatus, vitriolum martis, cum multis aliis. Præter hæc remedia interna, etiam externæ applicationes non raro juvamen conferunt: quippe stomacho male affecto, fons ex vino albo cum absinthio, centauro, aliisque plantis amaris incoctis, etiam linimenta, aut emplastra sæpe opem præstant: de quibus non opus erit particulatim differere, ipsorumque medicamentorum formulas præscribere.

2. Indicatio lienis vitia emendare instituens (sive nimirum eadem obstructio, sive tumor, aut dolor, vel simplex dyscrasia fuerint) per remedia tum interna, tum externa perfici, aut saltem tentari solet: Quæ prioris generis sunt, cum istis tertio in loco indicatis (quibus scilicet sanguinis depuratio intenditur,) coincidunt; quippe cum præcipuum, aut ferè totum illud, quod lieni importatur, aut effertur, sanguinis commeatu fiat, tum laticis hujus, tum visceris istius anomalix, opere sociali, conjunctis medicamentorum viribus sanari debent; quo ritu, mox ostendetur: interim applicationes quædam externæ sub forma emplastri, aut linimenti, aut fons lienis corpus proprius & immediatius respiciunt, & non raro juvamen insigne conferunt, quatenus nimirum tumores discutiunt, fæculentias atrabiliarias inibi stagnantes circulationi reddunt, quin & fibrarum corrugationes, & affectiones spasmodicas sedant, ac compescunt. Hujusmodi medicamentorum exteriorum copia ingens passim apud Authores prostat, quorum delectus cum juxta varia lienis pathemata, tum diversas patientis constitutiones institui debet, non opus erit particulares eorum formulas hoc in loco tradere.

3. Remedia tertio in loco indicata, quæ nempe sanguinis dyscrasias lienis vitio contractas deponunt, simulque primariam lienis culpam eluunt, multiplicia, ac diversi generis, & moris existunt; quorum delectus juxta variam hujus ac illius labem adhiberi debet. Ex his alia sunt compositiora, juxta medici præscriptum paranda, prout electuaria, pulveres, apozemata, tinctura, infusiones, & similia; alia sunt simpliciora, prout serum lactis, lac asininum, aqua acidula & thermæles.

Duo sunt præcipui ægotantium casus, quibus remedia magistralia, secundum eorum vires & qualitates accommodari debent: nempe aut sanguis est crassus, subfrigidus, & terrestris cum liene obstructo, qui medicamenta calidiora, fermentantia, ac imprimis chalybeata requirit; vel sanguis plane adustus, ac fervidus supra modum fermentescit, simulque hypochondria valde æstuant, in iisque sanguis & vapores ebulliunt; in quo statu remedia solum temperata, humorum & æon immodicamque & & & sedantia indicantur, ubi chalybeata omnino fugienda sunt.

Cum itaque frigido ventriculo, sanguinis ac lienis dyscrasia etiam frigida accesserunt, juxta formulas sequentes præscribere soleo.

℞. Trochisc. de rhabarbaro, pulv. rad. Ari, cort. Vvinterani, an. ʒ.ij. rad. serpentaria virginiana, contrayerva, diatrion santalon, oculor. cancri, an. ʒ. j. extracti gentiana, centaurii, an. ʒ. j. ʒ. ammoniaci solut. in aq. lumbricorum q. s. f. massa pilularis, capiat quatuor pilulas mane, & hora quarta p. m. superbibendo haustulum vini absynthitis, vel chalybeati, cum exercitio moderato.

Vel ℞. Conserv. flavedinis aurantii, limonii, an. ʒ. iiij. myrobalanor. condit. num.ij. spec. aromatici rosat. cort. Vvinterani, an. ʒ.ij. salis absinthii ʒ.ij. virioli martis ʒ. j. (vel chalybis preparat. ʒ.iiij.) cum s. q. syr. è corticibus citri, f. electuarium, capiat bis in die superbibendo haustum vini absynthitis, vel infusionis corticis vel flor. tamarisci.

Quibus medicamenta non nisi in forma eleganti, & mole perexigua placent, tincturas antimonii, è coralliis, etiam è chalybe cum spiritu vini (corpore prius per propria menstrua soluto, & ad calcem redacto) paratas exhibere convenit: quin & spiritus fuliginis, item sanguinis, aut C. Cervi ad gutt. 12. plus minus bis in die cum liquore appropriato sumendos, commodo insigni, supra quodvis aliud medicamentum cessisse novi: porro potus assiduus Coffee dictus, etiam alter ex infusione foliorum Thee paratus, nonnullis emolumento fuerunt.

Quod si affectioni hypochondriacæ sanguinis fervor, & nimia ζύμωσις, cum lienis astu, & mentis inquietudine conjungitur.

℞. Conserva fructus cynosbati ʒ. vj. (vel flor. tamarisci, & foliorum lujula, an. ʒ. iiij.) spec. diarrhodon abbatis, confectiois alchermes, an. ʒ. j. eboris pulv. ʒ. j. ʒ. margar. ʒ. ʒ. salis tamarisci, absynthii, an. ʒ. j. c. s. q. syr. acetositis citri, vel caryophyllor. f. opiata, capiat bis in die qu. nucis moschat.

℞. Eboris pulv. ʒ. ij. margar. pulv. ʒ. j. spec. diarrhod. abbatis, diamargar. frigid. an. ʒ. j. ʒ. f. pulvis subtilis, adde sacchari albiissimi solut. in aq. Melisse, & ad tabul. coct. ʒ. vj. s. a. f. tabula, sumat ʒ. j. ʒ. ad ʒ. ij. bis in die. His, aliisve hujus farinæ medicamentis adjungatur usus aquarum acidul. quæ quidem in altero, immo in quibusvis melancholia hypochondriacæ casibus, ferè semper cum fructu sumuntur. Defectu illarum aq. nostræ acidula artificiales bene substituantur; quin & serum lactis, & si atrophia notabilis adfuerit, lac asininum quotidie sumatur.

Præter hæc remedia interna, aliasque applicationes externas supra citatas, phlebotomia, aut sanguinis è venis sedalibus hirudinum suctu detractio in crebro sit usu: quin & venam salvatellam, juxta veterum præscripta nunquam secare convenit: Porro cauteria, aut fontanella, quæ sanguinis adusti recrementa foras continuo derivent, & paulatim excernant, fere nulli non commodo esse solent.

4. Quarta indicatio, cerebri, ac nervosi generis affectiones, sive symptomata spasmodica prioribus επιγνώριζα respiciens, raro per se, ac seorsim ab aliis in usu venit, quin remedia huic scopo destinata cum supradictis complicantur. Liquores sale volatili, aut armoniaco præditi, prout sp. C. Cervi, fuliginis, huic intentioni, simulque non raro cæteris modo citatis apprimè conveniunt; quapropter talia remedia, nisi quiddam contra indicat,

opportuna hora quotidie exhibeantur. Porro cum *aq. acidula* bibuntur, *tabula*, aut *pilula*, quales supra ad affectiones spasmodicas præscribuntur, saltem bis in die capiantur. In *crebra vertigine* & *scotomia*, necnon in *cordis passionibus*, *spirituum deliquiis*, cum *timore*, & *mortis* quasi jamjam imminenti metu, à *medicamentorum chalybeatorum* usu insigne juvamen sæpius collatum novi.

Quandoquidem hic mentio incidit de *medicamentis chalybeatis*, operæ *Medicamentorum chalybeatorum præparatio- nes & effectus explican- tur.* pretium videtur inquirere in varias eorum præparationes, & propterea in diversimodos, quos in corpore humano producere solent effectus, hinc ut constet, qua ratione, & ob quos respectus hæc aut illa *ferri* præparata nonnullis *hypochondriacis* insigniter profint, atque aliis plurimum obfint.

Medicamentorum chalybeatorum virtus, & operatio à concreti particulis vario modo resolutis, explicatis, & in actum exertis dependet: Enimvero *chalybis*, sive *ferrum* potissimum constat ex *sale*, *sulphure* & *terra*; *spiritu*, & *aqua* tenuiter admodum dotatur: priorum vero elementorum particulae, præsertim *sulphurea*, ac *salina* in mixto una cum *terra* combinatae, fixae prorsus ac inertes manent; verum *soluta*, ac ab invicem *divulsa* *essentias* valde efficacis existunt.

Prædictæ particulae *duplici modo* dissolvuntur, & in actus libertatem vindicantur, scil. vel ab *arte*, dum medicamenta parantur; vel à *natura* postquam intus assumuntur; corpus enim metallicum à ventriculi fermento, non secus ac à menstruo chymico corrodi, ac solvi solet: singulas utriusque species, & fiendi modos perpendamus, ut constet qualis alteratio *medicamento ferrato* inter præparandum imprimitur, & quales effectus quodlibet ejus præparatum *corpori humano* imprimit.

Simplicissimus *ferri* parandi modus, est corporis ejus in *partes* exiguas *integrales* per *limaturam* divisio, quæ totius mixti naturam referunt, continentque corpuscula tum *sulphurea*, tum *salina* inter se, cumque aliis *terrestribus* combinata. *Limatura ferri* intus sumpta à ventriculi fermento, tanquam à menstruo acido dissolvitur; cujus indicia sunt tum ructus *sulphureus*, & *nidorosus*, velut à comestis ovis ad duritiem coctis; tum excrementi *stercoracei* nigredo: à *chalybe* intra coctionis viscera dissoluto, particulae activæ tum *sulphurea* tum *salina*, copiosè exsiliunt, atque succo nutritio involutæ in sanguinem evehuntur; quæ cum diversa pollent virtute, non raro utraque velut junctis viribus, in ægroti commodum conspirant. Corpuscula *sulphurea* sanguini illata, ipsi novam ac uberiores *sulphuris* penum addunt: propterea ut massa ejus, si antea pauperior & effecta fuerit, intra vasa vegetius fermentescat, & ulterius in corde accensa calorem magis intensum, quin & colorem saturatiorem acquirat. Ita namque observare est de plerisque *leucophlegmatia*, *pica*, & *malacia* affectis; vultus pallefcit, sanguis frigidus, & aquosus existit; à *chalybis* autem usu brevi vultus floridior fit, *cruor* tincturæ, & calore intensioribus imbitur: porro à *limatura ferri* in ventriculo soluta, etiam *particula salina* offeruntur, & non raro tum in partes solidas, tum in humores uberem fructum erogant; nam istæ siquidem *natura* sunt *vitriolica* & *stiptica*, visce-

rum fibra nimis laxas, & debilitatas adstringunt & corroborant, adeoque tonum præfractum restituunt: cæterum *particula ista salina* sanguinis impetum inhibent, ab æstu nimio, spumeaque turgescencia reprimunt, & in æquabili circulatione retinent: Insuper (quæ maxima illarum virtus est) *arteriarum oscula* nimis laxa, aperta, & dehiscencia contrahunt & angustant; proinde ut nec *serum*, nec *latex sanguineus* exudet, aut circuitus filum abrumpat: Quapropter in *hydrope* & *hemorrhagiis*, remedia salinis ferri particulis imbuta celeberrimi sunt usus, & efficaciam; plures enim morbi ab hac causa procedunt, in quantum arteriarum osculis nimis patentibus, & vasorum interstitiis supra modum laxatis, serum aut latex sanguineus erumpit. Cujusmodi affectibus *particulæ chalybis vitriolica*, & vasa sanguifera, & fibras nerveas constringendo & corroborando sæpe numero medentur.

Ad hunc modum *limatura chalybis* intus assumpta *sanguini* & *calcaria*, & *fræna* simul adjicere videtur. In quantum vero ab istiusmodi medicamento *incitatio* longè potentius exeritur quam *restrictio*; idcirco illis tantum, quorum sanguis valde crassus & frigidus est, uti rusticis & valde robustis, exhiberi debet: in sanguine præfervido & spirituosissimo, ac visceribus calidis minimè convenit; porro in delicatulis, & tenerioris constitutionis hominibus periculum est, ne *chalybis* portiuncula, cum satis dissolvi nequeant, tanquam *vitriamenta*, viscerum membranis impingantur; iisque pertinaciter adhærentes, ulcera, & tormina lethalia producant, quod revera interdum accidisse novi.

2. Post *limaturam ferri* proximus ejus parandi modus sit, *calcinando cum sulphure*, nempe *chalybis lamina* intensissimè ignitæ magdaleon *sulphuris* admoveatur, ut metallum in globulos liquecat, qui denuo ad consumptionem *sulphuris* calcinati, ac mortario triti, in pulverem subtilem, qui eximii usus est, rediguntur. In hoc ferri præparato *particulæ* quædam *sulphurea* exhalant; cujus indicium est, quod *pulvis* hic à liquore acido affuso longè minus ebullit, aut incalescit, quam *ferri limatura*: attamen ab eodem ore assumpto nidor sulphureus excitatur. Interim in præparato isto *particula salina* nonnihil augeri videntur, novis à *sulphure flagrante* metallo accrescentibus; adeo ut utriusque generis *particulæ activæ*, nempe *sulphurea* ac *salina*, ferè ad æquilibrium accedant: cumque hac ratione medicamentum hoc, laxata metalli compage, minutissimè pulverisari possit, longe præstantioris usus, quàm *limatura ferri* evadit: in plerisque casibus ubi *chalybis* in substantia exhiberi debet, prout in *cachexia*, *pica virginum*, & similibus, hoc medicamento uti convenit.

3. Tertio in loco succedit, *chalybis præparatio cum aceto*; nempe *limatura chalybis* toties irroratur cum aceto & exsiccatur, donec in pulverem impalpabilem reduci queat: in hac præparatione *particula sulphurea* adhuc longè plures, immo quoad maximam partem evaporant, paucioribus tantum relictis; interim *salina*, propter alias ab aceto accrescentes, plurimum augentur, quæ cum *particulis terrenis* commiscentur: *pulvis* hic *chalybeatus* à liquore acido asperso parum, aut vix omnino spumat, aut ebullit: etiam ore assumptus *nidorem sulphureum* vix ullum inducit; quare in

expediendis viscerum obstructionibus, aut restituendo sanguinis fermento minus conducit: nihilominus in calidiori constitutione, in hæmorrhagiis, & affectione hypochondriaca majori successu quam superiora præparata exhiberi solet.

4. Succedit *ferri rubigo*, quæ corporis metallici extractum, sive quinta essentia esse videtur: quippe in excrescentia ista particulæ quædam cujusque generis, nempe *sulphurea*, *salina*, & *terrena*, à totius compage solutæ, inter se combinantur, & novum quasi mixtum magis subtile, & defæcatum constituunt. Quoniam in hoc concreto pauciores resident *sulphuris* particulæ, idcirco non adeo potenter sanguinem fermentat, aut viscerum obstructiones referat, uti *chalybs* cum *sulphure præparatus*: attamen in calidioribus partium aut humorum dyscrasiis intentiones à medicamento *chalybeato* requisitas egregiè perficit.

Huic classi nostra præparatio *chalybis* jure accensetur; in qua scilicet metalli particulæ omnes à mixtionis vinculo laxatæ una continentur: quæ tamen (concreto prius in pulverem redacto) in quovis latice, aut menstruo immediate dissolvuntur. Hic pulvis intus sumptus, pari virtute ac *chalybs* cum *sulphure calcinatus* pollet; at menstruo, sive liquori, in quo dissolvitur, particulas *salinas*, seu *vitriolicas* potissimum, ac fere tantum impertit, *sulphureis* avolantibus *terrenis* in fundo subsidentibus. Aquam communem hujus dissolutione imprægnatam, vice *acidularum naturalium* in magna quantitate exhibere soleo, & non raro cum optimo successu: porro vinum, cerevisiam, pomaceum, serum lactis, aliosque liquores ab hoc pulvere dissoluto medicatos efficio, & propter varias intentiones iatricas sumendos præcipio. Hæc de *ferri præparatis*, in quibus particulæ elementares cujusque generis, in varia licet proportionem, comprehenduntur: restant alia in quibus particulæ fere tantum unius generis, nempe *salina*, aut *terrestres*, cæteris, quoad maximam partem, propulsis, relinquuntur: cujusmodi imprimis sunt *vitriolum martis*, sive *sal chalybis*, & *crocus martis*.

5. Pro conficiendo *vitriolo martis*, imprimis metallum à liquore valde acido & corrosivo exedi, & in partes elementares dissolvi solet: inter dissolvendum particula *salina* menstrui aliis *ferri salinis* impinguntur, iisque intime combinantur, reliquis interim *sulphureis*, ac *terrenis* sepositis, & à consortio exclusis; dein aqua communi solutioni isti affusa, sales utriusque generis combinati à liquore imbibuntur, eoque demum filtrato, & evaporato, in crystallos rediguntur. Hujusmodi salificatio succedit, sive cum spiritu vitrioli, oleo sulphuris, aqua stygia, aliisque stigmatibus mineralium stillitatis proceditur: Quinimo sal armoniacus tantum deliquio solutus ferrum eodem ritu dissolvit, & ad crystallisandum disponit.

Sal martis ita præparatus, saporem subdulcem cum aspera quadam stipticitate refert, & naturæ vitriolicæ in tantum participat, ut à *cuprosa viridi* haud multum differre videatur: Intus pro medicina sumptus, humores aliquatenus fermentat, atque fibras nervosas potentius constringit: in *cachexiis frigidis* & *phlegmaticis*, quoniam nullæ exeruntur *sulphuris* particulæ, hoc medicamen minus convenit: in calidioribus viscerum dyscrasiis, cum *sulphuris* adusti prædominio; necnon in sanguinis, & succi

succi nervosi effervescentiis vagis, scorbuticis, & inæqualibus, illud per se, aut cum aliis remediis stimuli vice admixtum non raro cum fructu adhibetur: attamen in constitutionibus tenerioribus periculum est ne ab acrimonia ejus, & constrictione nimia, ventriculi tonus & fibræ lædantur.

6. Ultimo in loco succedit *crocus martis astringens*, per diuturnam ab igne calcinationem paratus: scilicet *ferri limatura*, *scoria*, aut *lamina* in fornacis reverberio ita collocentur, ut à flamma intensa continuo lambantur: *Limatura* hoc modo igni nudo exposita, primum aliquatenus rubescet, ac in glomeres duriusculos concresecet; post tres autem vel quatuor dies subito in acervum altiorem intumescens, summe levis, impalpabilis, & coloris purpurei elegantissimi evadet: In hoc *preparato particula sulphurea* & *salina*, dum vi ignis à concreto abigi incipiunt, se mutuo apprehendunt, adeoque invicem combinatæ in *glomeres* accrescunt; postea tamen particulis, tum *salinis* tum *sulphureis* penitus profligatis, *igneisque* in earum loco succedentibus, tota massa mole intumescens, & velut spongiosa facta, levissima evadit.

Medicamentum ita *paratum* in quibusdam casibus usus egregii, & nulli è *cha'ybeatis* secundi existit; nimirum in omni *seria* ac *sanguinis extravasatione*, aut *eruptione nimia*, prout in *hemorrhagiis* externis, internisve; in *diarrhœa*, *diabete*; in *catarrho* vehementi, etiam in *ascite*, aut *hydrope* incipiente nihil hoc remedio præstantius novi: hoc etiam nuper à celeberrimo, & exercitatissimo apud nostrates Medico summe comprobatum audiui: De quo tamen medicamine, siquidem illud *particulis* tum *salinis*, tum *sulphureis* prorsus destitutum, fere solummodo *terrenis igneisque* inclusis constat, valde ambigitur, qua facultate operatur, & effectum ita laudabilem in corpore humano producit: videretur enim nihil huic plusquam ac in *vitrioli*, *aliorumque mineralium* igne intensissimo destillatorum *capite mortuo*, aut *terra damnata* superesse. Circa hæc ut conjectari liceret, videtur imprimis, quod huic *preparato* activitas quædam, qua sese exerit, & virtutes suas, sive obstructions referandi, sive vasa fibrasque viscerum nerveas constringendi explicat, à *particulis igneis terræ fixissimæ* inclusis, ab iisque intra corpus erumpentibus debeatur: attamen potissima juvandi ratio in eo consistat, quod *particulæ terrestres salinis* (quibus arctissime tenebantur) prorsus orbatae, iisdem, aut similibus reuniri avidissime expetunt: quapropter iste *crocus martis* corporibus nostris immersus, *sales* quoscunque obvios sibi arripit ac intime devincit, adeoque dum particulas salinas quamplurimas velut spongia absorbet, multas enormitates à *salium fluore* potissimum obortas tollit. Sub hac ratione *C. cervi* ustum, *spodium*, & *antimonium diaphoreticum*, si quando juvamen præstant, virtutes suas exerunt.

CAPUT XII.

De tussi, ac asthmate convulsivis.

Tussim aliquando, sine magno pulmonum vitio, propter materiam mor-
bificam nervis pneumonicis illapsam excitari, hystoria superius allata
clare indicat, ubi nimirum refertur, in casu nobilis puella paroxysmis con-
vulsivis, ac insuper vertigine gravi & continua laborantis, quod cum ex
Medici præscripto, fons ex decocto cephalico capiti adhiberetur, illico
scotomia cessarat, inque vicem ejus, tussis inanis, sine ullo sputo, sed dies &
noctes fere perpetuo molesta succederet: quod procul dubio contigit ob
materiem spasmodicam à cerebro in nervorum origines depulsam: Hujusmo-
di exempla tussis mere convulsivæ in adultioribus rarius occurrunt, ut affe-
ctum huic similem haud sæpius viderim: attamen usitatum est, in pueris
(quandoque etiam novi in viris) tussim à colluvie serosa pulmones inun-
dante exoriri; quæ cum primo simplex, & moderata fuerat, postea vehemens,
& convulsiva evadet; ita nimirum ut inter tussendum, diaphragmate sur-
sum contracto, ac in systole longiori, aut creberrime repetita detento, pul-
mones valde coarctati in motu suo plurimum inhibeantur; interim ob res-
pirationem impeditam, & sanguinem intra præcordia cohibitum, proin-
deque in aliis locis stagnantem, laborantes suffocari periclitentur, & non
raro vultum lividum, aut cadaverosum acquirant. Cæterum in hoc casu,
præter spasmos cum tussendi impetu circa præcordia excitatos, non raro
etiam ventriculus in consensum adductus, quicquid sinu suo continetur,
vomitu rejicit: quin & novi, in quibusdam tenellulis hoc ritu affectis,
morbum subinde in alias partes grassatum, motus convulsivos in facie, oculis,
ac artubus excitasse, ac demum lethalem evasisse. Hujusmodi tussis convul-
siva, inter pueros valde frequens est; & quibusdam annis ita plurimos
corripit, ut plane epidemica videatur: ubi radices egit, difficulter ad-
modum remediis sanatur, quin sæpius diu protracta, vix aliter nisi ab im-
mutato anni statu curari solet.

Tussis me-
re convulsi-
va exem-
plum.

Hic affe-
ctus in
pueris satis
frequens.

Si prædicti affectus causa inquirantur, obvium erit procatarxin ejus ad
serosi humoris in massa sanguinea, & aliquatenus in toto corpore redun-
dantiam referre; cujus materiæ portio quædam arteriarum osculis in pul-
mones exudans, tussim ordinariam creat; postea cum serosa colluvies ad-
huc in sanguine exuberans, & particulis spasmodicis referta, etiam in-
tra caput aggereretur, eadem nervos pneumonicos subiens, tussim simplicem
in convulsivam adauget: cum enim hi nervi circa extremitates suas
prius irritati, supra modum exerceantur, illi propterea materiam spas-
modicam juxta principia sua depositam facilius imbibunt: cumque adeo
demum binis in locis, scilicet capite, & cauda, atque ob duas distinctas cau-
sas, scilicet à spirituum tum irritatione, tum explosione in motus irregulares
adigerentur, nihil mirum est si tussis primo communis, postea in malum

morem evecta, adeo immanis & spasmodica evadat: porro cum interdum accidit, eandem materiam in capite aggestam, nervos quosdam alios subire; propterea *tussi convulsiva* aliufmodi *pathemata spasmodica* non raro superveniunt.

Asthma convulsivum.

Quandoque à pulmonibus una ac nervis affectis dependet.

Ostenso ad hunc modum, quod *tussis* neque solummodo, neque semper *pulmonum vitio*, sed interdum à causa spasmodica solitaria, sæpius tamen ab hac affectioni pneumonica superinducta oriatur; etiam de *pathemate* quodam alio *thoracico*, scilicet *asthmate*, fere idem pronunciare non dubitamus: nam sive hic *morbis continuus*; sive *periodicus* fuerit, in utroque casu symptoma præcipue urgens est *respiratio difficilis*; quæ quidem propterea excitari videtur, quia pulmones nimis inflati, & distenti thoracis cavitatem valde implent, nec uti par est, per vices subsident; hinc spiritus intus manens haud libere satis emitte, neque revera aer recens, ob spatium prius oppletum, facile introduci potest: dum *pulmones in diastole* continua, aut parum remissa ita diutius detinentur, sæpenumero *diapragma*, contra morem suum, in *systolen* violentam urgetur, atque sursum contractum, *pulmones* magis, magisque elevare, eorumque subsidentia contraniti solet: quo fit ut *respiratio* adhuc difficilior & plus laboriosa existat.

Hujusmodi *dyspnœa* affectionem, quandoque *pulmonum* vitio accidere, facile credimus; quoniam *anatomia* plane detexit: nam si *colluvies serosa* ingens, in *thorace* deposita, *pulmones* plurimum infercit, illorumque per os omnes & meatus in tantum obstruit, ut sanguis in circuitu impeditus vasa pneumonica haud libere pertranscat, propterea quidem taliter affecti nullo non tempore *anhelosi* fiunt: deinde quoties sanguis ab exercitio aut calore lecti plus incalescens, & rarefactus, pro circulatione sua intra pulmones spatium amplius requirit; tunc statim à tali occasione *respiratio creberrima*, sive *paroxysmus asthmaticus* cietur: si præter hanc morbidam pectoris diathesin, etiam massa sanguinea latice seroso abundans, subitis fluxionibus, & seri effervescentiis apta fuerit; hinc etiam, ob violentum seri effervescentis in pulmones prius obstructos, & valde oppletos incursum, non raro istius morbi insultus graviores, & pene suffocativi eveniunt. Porro interdum præter *asthmatis* radices, uti dictum est, circa præcordia defixas, ejusdem morbi germina quædam ab *extractione* pullulantia, prioribus occurrunt, cumque iis complicata, immaniores *dyspnœa* fructus producant: Nam siquidem *pulmonibus* sero oppletis, ejusdem amplius in sanguine redundantis quantitas alia particulis spasmodicis imbuta *capiti* suffundatur, eadem *nervos pneumonicos* promptius quam alios subiens, *asthma thoracicum* prius simplex, & moderatum, *periodice vehemens*, & *convulsivum* efficit.

Hujusmodi affectuum, scilicet *dyspnœa*, *pulmonum vitio singulari* ac socio excitatæ, *instantia* & *exempla* quamplurima observationi nostræ constituerunt, ac etiamnum fere quotidie eveniunt. Nihil enim usitatus, quam *tussi inveterata*, aliave mala pulmonum diathesi laborantes, demum *hydrope*, aut *scorbuto* accedente, *asthmaticos* fieri: nempe cum sanguis, longe impurius factus, sæculentias serosas etiam in capite deponit, hæc *nervos pneumonicos*, utpote

utpote debiliores, & juxta extremitates suas crebro irritatos, promptius, & quidem facilius quam alios subeunt, inque iis *dyspnœa spasmodica* materiem congerunt.

Porro interdum observavi, *graves asthmatis paroxysmos* sine quavis notabili *pulmonem* labe accidisse; revera ut putaverim, hunc *morbum* aliquando *interdum* esse *mere convulsivum*, ejusque insultus solummodo excitari, quoniam *se-* *mere con-* *vulsivum* *rosa colluvies*, particulis explosivis referta, *nervos* pulmonum diastolen per- *à nervis* *solummodo* *affectis* *procedit.* *plenitudinem*, vel *irritationem* confertim, & aliquandiu *elisis*, *pulmones* velut rigidi & inflati detinentur, ut neque *ἐμπνοή*, neque *ἐκπνοή* munia exequi possint: *paroxysmo* autem finito, quin etiam priusquam incipitur, *respiratio libera* & æqualis satis rectè ducitur, nullaque tussis, aut valetudinariæ pulmonum dispositionis signa apparent. Cum hujusmodi *dyspnœa* merè *spasmodica* casum in pluribus notavi, libet hic unam aut alteram *historiam* proponere.

Generosus quidam robustus & obesus, victu pleniori & inordinato, sine quovis exercitio, aliquandiu usus, sub initium hyemis male habere cœpit: *1. Observa-* *tio.* primo *capitis gravitate* & dolore, cum *insigni vertigine*, & *leipothymias metu*, se jamjam moriturum subinde credens afficiebatur, alioqui satis sanus; intra paucos dies hæc symptomata in apertum *stuporem*, seu potius *lethargum* transibant: *phlebotomia* in brachio celebrata, *cucurbitulas*, *vesicatoria*, *enemata acria*, cum multis aliis remediis sedulo adhibenda curavi: *nycthe-* *meri* spatio ad se rediens animo constitit, & torporem omnem excussit. Verum cerebro licet inclarescente, debilitate magna & stupore in membris corripiebatur: qui tamen affectus remediis *antiparalyticis* & *antiscorbuticis* brevi sanabantur: post duas autem septimanas iterum de *capitis gravitate*, & *vertigine* conquestus est; dein postridie in *asthma horrendum* incidit: ut pulmonibus subito inflatis, & sursum nitentibus, spiritum, qui creberrimus, laboriosus & valde præpeditus fuit, vix ac ne vix ducere valens, quovis horæ minuto suffocari periclitaretur. *Paroxysmus* hic, utut immanis, intra duodecim horas sine tussi, sputo, aut vomitu pertransiit, & deinde supra hebdomadæ spatium thoracis vitio quovis carebat; tunc autem similis *dyspnœa paroxysmus* rediens, eum paulo mitius exercuit: atque postea, juxta magnas aëris mutationes, præsertim frigore intenso, ac nive imminentibus, tali *asthmatis insultu* tentari solebat.

Novi alium *virum generosum scorbuto* inveterato laborantem, qui tussi *2. Observa-* *tio.* omni carens, modo *cephalalgia*, cum *insigni vertigine* per plures dies laborat; dein alio tempore, ab iis pathematis immunis, *asthmatis paroxysmo* valde atroci corripitur, atque *affectus* modo *hujus*, modo *istius* crebros insultus, præsertim circa insignes aëris alterationes, & majores anni tropas, patitur.

In prædictis casibus minimè dubitandum est, quin isti *dyspnœa paroxys-* *Ætiologia.* *mi* omnino penderent à materia *spasmodica*, in nervos pulmonum distensionem, vel irritationem elisa, sive explosa, præcordia sursum attolli, ac velut inflari, proindeque à motu suo reciproco inhiberi fecit.

Asthma Porro hujusmodi *dyspnœam convulsivam* interdum excitari putamus, *interdum* propter *tracheæ bronchia coarctata* nimis, & non raro penitus *constricta*: in *propter* *neurologia nostra* advertimus plurimas *nervorum fibrarumque nervearum* *bronchia* *spasmodi-* *pages asperæ arteria* ramificationes omnes ubique amplecti, & circumli-
ce affecta gare; quos equidem *nervos*, si forsan accidat, à materia morbifica obsessos,
excitatur in crebros spasmos irritari, propterea sequitur, canales, sive ductus, quos ambiunt, valde constringi, & in quibusdam locis prorsus occludi.

3. *Virgo lectissima*, constitutionis teneræ ac gracilis, atque vultus floridi, *Observa-* vix secundum ætatis suæ lustrum prætergressa, *tio.* *paroxysmis asthmaticis* graviter tentari cœpit; iisque priusquam curæ meæ delegatur, quatuor ut minus annos obnoxia degit. Interdum morbi hujus insultu quovis per duos aut tres menses immunis perstat: sæpenumero tamen, propter errata in victu, vel propter magnas anni, aut aëris mutationes, in atrociores *dyspnœæ paroxysmos* incidit: Ita nimirum ut pulmonibus inflatis, & sursum versus guttur elatis, ibidemque in diastole ferè continua detentis, ægrotans vix ac ne vix respirare possit; interim respirationis quoquomodo peragendæ gratia *diaphragma & musculi pectoris* motuum nixibus creberrimè repetitis laboriosissimè exercentur. Hujusmodi accessio, intra 7. vel 8. horas sensim remittens, paululum desinit; subinde vero per unam aut alteram hebdomadam, aut sponte sua, aut de levi qualibet occasione repetere solita: postquam morbi impetus, materia ejus in plures ejusmodi paroxysmos impensa, pertransiit, *virgo illustris* deinceps per plures septimanas, immo interdum menses, satis rectè valet, atque thoracis vitio quovis expers liberè respirat. Huic *vere & autumno medendi methodum* sequentem institui, jamque suprâ biennium prædictæ affectionis quovis insultu caruit.

℞. Sulphuris antimonii nostri ḡ.vj. cremoris tartari ḡ.vj. misce. Detur in pulpa pomi cocti: ab hoc medicamine assumpto, quater, aut quinquies evomere solet: post quatrimum sumit hoc catharticum, quod item interjecto 6. aut 7. diebus bis repetere solet. ℞. Calomelanos ḡ.xij. resin. jalap. ḡ.v. castorei ḡ.iiij. c. s. q. ammoniaci solut. f. pilul. iiij. Quolibet præterea die capit mane & vespere tinctura antimonii ḡ.xij. in cochleari julapii sequentis, superbibendo ejusdem cochlearia 6. vel 7. ℞. Aq. limacum ℥.vj. lumbric. ℥. iiij. aq. pulegii, ruta, an. ℥.iiij. hystericæ ℥.iiij. castorei nodulo ligati, & in vitro suspensi ℥. s. sacchari altissimi ℥.j. misce in vitro, f. julapium.

4. *Circa autumnum* prioris anni, puella quædam alia nobilis, simili ritu, *Observa-* scil. *asthmate periodico* laborans, mihi sananda adducitur; quæ prædictis *tio.* remediis, paulo in minori dosi usa, eademque *vere novissimo* repetens, insigne levamen percepit.

In his etiam casibus nihil apertius constare videtur, quàm morbi causam absque phlegmate, aut humore viscoso pulmonibus, uti vulgò creditur, impacto, intra nervosum genus subsistere; atque dyspnœam hujusmodi merè convulsivam, propter nervos pneumonicos affectione spasmodica occupatos excitari. Hujus veritas, *observatione anatomica* mihi nuper à *Mexico Doctissimo D. Gualt. Needham* communicata, adhuc planius evincitur. Retulit mihi *vir insignissimus*, se novisse *Lanum Vallsalliensis*

Observa-
tio.
Anato-
mica.

in agro Staffordiensi, qui cum diu laboraverat *asthmate periodico*, intra 14. vel 20. dies, ut plurimum, recurrente, tandem in ipso paroxysmo extinctus est. Cadaver apertum exhibuit viscera omnia sana, praesertim pulmones, neque aut excrementi in bronchiis collecti, aut sanguinis in venis restagantis ulla indicia prodita sunt. Hoc tantum praeter naturam accidit, quod vesica fellea calculos complures in se continuit. Cetera (subdit ille) vel generi nervoso affecto tribuenda erant, vel causa nobis ignota, certè oculis non conspicua.

Olim pro puerulo nobili consului, qui 12. circiter menses natus, paroxys- Observa-
tio alia.
Anato-
mica.
mis convulsivis, & quasi epilepticis, à quibus brevi fatum obiit, gravissimè affligebatur. Sæpius observabam, quod dum spasmi partium exteriorum intermitterent, tussi immani & singultuosa corripereetur: unde suspicio fuit materiem morbificam haud minus in pectore quam in cerebro defigi. Post obitum vero, cadavere aperto, pulmones facti recti & vitio quovis immunes apparebant; ut manifesto liqueret, tussim illam mere convulsivam, propter nervosi generis affectionem excitatam fuisse.


Quod spectat ad remedia, & therapeias rationes, quæ in prædictis casibus usurpari debent, si quando tussi, vel dyspnæa pulmonum vitio primo exorta, insuper ob labem cerebro communicatam, symptomata convulsiva superveniunt; id sedulo agatur, ut medicamenta antispasmodica thoracis, intentiones quascumque respicientia, aptè complicantur. Quinimo interdum, ut modo his, modo illis seorsim exhibitis, medendi tempora intercalentur. Non opus erit medicamenta bechica, aut pneumonica, eorumque formulas, quarum sylva immensa apud authores medicos passim extat, huc transferre: in propositum nostrum satius erit, medicina methodum, item selectiora quædam remedia in tussi, ac asthmate mere convulsivis convenientia subijcere.

Quoad priorem affectum, qui pueris potissimum familiaris, curationis difficilis, & nonnisi longioris ut plurimum existit, præcipuæ indicationes Tussis convulsiva
curatio.
erunt, tum humores serosos & acres è sanguine & visceribus expurgare, ut illorum potè ac decubitus in cerebro, ac aliquando forsan intra pectus præcaveatur: tum has partes, ne feri æstuantis superfluitates facilius admittant, corroborare. In hos fines vomitoria, & cathartica leniora ferè semper conducunt, & aliquatenus iterari debent: Vesicatoria sæpè proficua sunt; quinimo si morbus sit contumacior, fontanella in nucha, aut brachio, vel circa axillas excitentur. Potus, & alimenta liquida in quantitate solito minori sumantur; istius vice, Bochetum ex sarsa, China, santalis, rasur. Eboris, C. cervi, cum ingredientibus diureticis & antispasmodicis usurpetur: In hoc casu remedia quædam, velut specialia valde commendantur, cujusmodi sunt muscus pyxidatus in pulvere exhibitus, vel lacte incoctus, adeoque crebra dosi quotidie exhibitus: decoctum, vel syrupus, ex castoreo & croco; decocta rad. peonia, visci quercini, item hyssopi multos juvarunt. aq. ceras. nigrorum, saxifragia; aqua limacum, cum sero lactis ac ingredientibus appropriatis destillata, sæpe cum fructu adhibentur.

2. Qua methodo, & quibus remediis asthma periodicum in nonnullis junioribus sanavi, superius annotatur. Cæterum in plerisque hoc morbo affectis, vomitoria imprimis conducere, insignissimus Riverius observavit, licet Asthmatis
convulsivi
curatio.

rationem minus rectè assignarit, quæ quidem in eo consistere videtur, quod nempe *pharmacum* istud emunctoria circa primas vias consita valde succutiens & irritans, ex iisdem sanguinis & succi nervosi recrementa in *cerebrum* & *nervosum genus* urgeri, aut restagnare apta valide exprimunt & foras deducunt. *Zacutus Lusitanus*, non sine ratione, *cauteria* modo in *bregmate*, modo in *nucha*, aut circa *axillas* inusta valde prædicat: *Millepedum* præparata, scil. in forma pulveris sicci, aut liquoris destillati raro successu carent; talia nempe seri superfluitates à *capite*, ac *genere nervoso* avocant, ac ad vias urinarias deducunt: propter eandem rationem, *cathartica* blanda, & per *epicrasin* evacuantia in crebro sint usu; in hunc finem *decoctum galli veteris*, cum *pharmacis alterantibus*, & leniter *purgantibus* ventri ejus insutis à multis laudatur. Præter remedia hæcenus citata, quædam alia *asthmatis appropriata*, & velut *specificæ* perhibentur, cujusmodi sunt *balsamum sulphuris terebinthin.* item *sp. C. Cervi*, vel *fuliginis*, eodem imprægnatus, *syrupus de peto*, ex *ammoniaco*, *diasulphur noster*, *lohoch de allio*, *pilul. de rad. enula campan.* *lacte sulphuris*, *floribus benzoin*, cum *pice liquida*, aut *liquidambra* confectæ, cum multis aliis, quæ singula enumerare hîc tædio esset.

Et jam præcipuis *convulsionum* speciebus & modis, unâ cum *symptomatum causis*, & *medendi rationibus* satis fusè explicatis, tempus videtur *pathologia* hujus periodum affigere: Attamen, siquidem aliud morbi genus restat, nempe *scorbutus*, qui pathemata mixtæ naturæ, scil. partim *spasmodica*, partim à *sanguinis & viscerum dyscrasiis* immediatè oriunda continet; operæ pretium existimo *hujus theoriæ*, unâ cum *Ætiologia*, & *Therapeias methodo* adjectis, succincte tradere. Ambo etenim hi affectus, scil. convulsivi & scorbutici, juxta positi se mutuo illustrabunt, ac utrique alterutris faciem non levem præferent.



TRACTATUS DE SCORBUTO.

CAPUT PRIMUM.

Scorbuti descriptio; ejus causa interna & proxima, potissimum in sanguine, dein aliquatenus in liquore nervoso radicata.



IN veteri medicina, morbi quem *scorbutum* appellamus, tam rara fit mentio, & tam parca descriptio, ut nonnulli dubitarint, utrum talis ægrotudo nunc multis in locis *endemia*, & ubique fere *sporadica*, qua scilicet fere nunc omnes laborant, aut se laborare putant, priscis temporibus omnino extiterit; quin natales suos, sicut *lues venerea*, & *rachitis* longe posterius duxerit: attamen affectionem hanc, licet aliis nominibus insignitam, ab antiquis observatam, ejusque curam, rudiori licet Minerva, traditam fuisse, *Hippocratis*, *Aretæi*, *Plinii*, aliorumque testimonia satis evincunt.

Circa varias hujus morbi appellationes parum solliciti, ac naturam ejus eruendam, explicandamque recta procedimus: quæ tamen cum adeo diffusa fuerit, atque ad tam varia & multiplicia symptomata extendatur, ut nec unica definitione, aut vix singulari *descriptione* comprehendi possit, ex re fore videtur imprimis cuncta hujus morbi *phenomena* congerere, sive accidentium præcipuè notabilium historiam pertexere; dein *apparentiis* istis rite solvendis *hypothesin* quandam accommodare.

Quoad prius, maxima symptomatum farrago, affectus multiplices, *Præcipuo-* & diversi generis, quique interdum naturæ sunt oppositæ, aut contrariæ *rum scor-* *scorbuto*, accensentur: immo si accidens quoddam inusitatum, nec prius *buti sym-* auditum in corpore humano eveniat, cum ad aliud certum morbi genus *promatum* referri nequit, sine dubio statim illud *scorbuticum* pronunciamus: adeo hic *recensio* morbus, quasi mali nominis, & damnati instar, pathemata aliena luit:

Interim

Interim huic à proprio lare plurima extant symptomata, in singulis fere partibus humani corporis excitari solita; quorum recensio cum partium corporis distributione optime perficitur. Itaque ut *scorbuti* vestigia à capite ad calcem pertractemus, 1. Inprimis ab illius *ὀψέω* incipiamus: huc spectant *cephalalgia* immanes, & habituales, illæque aut *vagæ*, aut *periodicæ*; modo *spirituum torpor* & *somnolentia*, modo *vigilia* pertinaces, crebrae *vertigines*, ac *scotomia*, *convulsiones*, *paralysis*, *sputatio copiosa*, *gingivarum ulcera*, *dentium vacillatio*, *oris faetor*. 2. Interim circa pectoris regionem dolores variis membranarum partibus, ac præsertim in sterno, & hi sæpe acuti & lancinantes, laborantes per plures dies & noctes miserrime torquent; *frequens asthma*, *respiratio difficilis* & *inequalis*, *pectoris constrictio* & *angustia*, *tussis inanis*, *pulsus inordinatus*, *cordis tremor*, *crebra spirituum deliquia*, *frequens lipothymia*, ejusque metus fere continuus. 3. In ventre inferiori hic morbus quasi principem sedem figens, malorum iliada producit: sæpe nimirum adsunt *nausea*, *vomitus*, *rugitus*, *cardialgia*, *hypochondriorum inflationes*, & *murmura*, *colica frequens*, & dolores molestissimi huc illuc discurrentes, *diarrhæa* fere constans, interdum *dysenteria*, aut *teneismus*, *atrophia*, ac interdum *ascitis*.

Urina sæpissime *rubicunda* & *lixivialis*, cum crusta innatante, aut vitri parietibus affixa; interdum vero per vices quasdam eadem pallida, & aquosa copiose excernitur. 4. Præter hujusmodi ventrium affectus, in externis membris, immo in toto habitu corporis, dolores vagi, & non raro summe atroces, & noctu potissimum ingravescentes sentiuntur; *lassitudo spontanea*, *carnium intabescencia*, *lumbago*, *aliorumque artuum debilitas* & *enervatio*: in cute *macula varii coloris*, *tumores*, *tubercula*, & non raro *ulcera caecothæa* erumpunt: circa musculos, *stupor*, *formicatio*, ac velut *frigida aura* *ascensus*; item *contractura*, ac *tendinum subsultus*: porro *scorbuticis*, *sanguinis inordinationes*, *effervescentie incertæ*, *vagæ intemperies*, ac *febres erraticæ*, ac *hemorrhagiæ graves* passim contingunt. Præter hæc communia, & maxime assueta *scorbuti* symptomata, quorum modo plura, modo pauciora, eaque interdum hujus, quandoque istius generis, ac moris laborantes infestant, nonnunquam alia inassueta & prodigiosa accidentia huic morbo superveniunt.

Ad pleniorē hujus morbi notitiā huc referre visum est, quæ circa originem ejus, ac prima initia, sive invasionis modum passim observantur. Nempe advertimus, *scorbutum* propter varias causas, & occasiones produci: nam licet mala victus ratio, vita sedentaria, lienis inordinatio, & cruditates in primis viis congestæ plurimum accusantur; attamen longe potius in causa esse solent, *aëris insalubritas*, & *sanguinis crasis* à prioribus morbis vitiata: quare *scorbutus oris maritimis* aut *paludosis* sæpe *endemicus* existit: diu navigantibus, ac interea cibis salis ac fumo induratis, necnon aqua putida utentibus crebro supervenit: *febris diuturna*, aliisque morbis chronicis male curatis, item *hemorrhagiis* nimis, aliisque excretionibus immodicis; quin & evacuationibus solennibus, uti mensium & hæmorrhoidum, suppressis passim succedit: Porro hic morbus sine magna procataxi non raro per *contagium* excitatur, & quandoque *hereditarius* existit.

Ex his circa *affectionem scorbuticam* observandis manifesto liquet, *mate-* Morbi
viam hujus morbi *causam* haud in privato quodam loco, aut singulari *causa per*
 minera contineri, sed per totum corpus, & singulas ejus partes, tum in- *totum cor-*
 tus, tum extus diffundi: unde statim colligere licebit, *miasma scorbuticum* *pus diffusa*
 vel in *sanguine*, vel in *succo nervoso*, aut simul in *utrisque* fundari: Revera *vel san-*
sanguinis labem affigi, effervescentiæ ejus inordinatæ, macularum, aut tu- *guini, vel*
 berculorum eruptiones, urina rubicunda, & velut elixiviata plane testan- *succo ner-*
 tur; cum quibus pari indicio conspirat diversimoda hujus morbi produ- *voso, vel*
 ctio, quæ utplurimum massæ sanguinæ depravationi succedit: nec minus *utrisque.*
liquori nervoso vitium hæere, declarant molestissimi dolores, tum intus in
 membranis, tum extus in musculofo genere excitati; membrorum debi-
 litates, aut resolutiones, vertigo, spasmi, & crebra spirituum animalium
 deliquia. Cum itaque *humores ambo generales* in vitio deprehendantur, vi-
 deamus quis prior, aut potior in culpa fuerit, undenam labem suam con-
 trahat, ac quo ritu humori alteri, ac insuper partibus quibuscunque aliis
 affici solitis noxa communicetur.

Quoad *sanguinem* (in cujus massa scorbutus radices suas potissimum *Sanguinis*
 agere videtur) alibi ostendimus, eum in crasi sua ejusmodi particulis, & *& vinoræ*
 simili fere ritu temperatis, ac *vina* constare: porro ob duas præcipue cau- *dyscrasia*
 sas, uti *vinum*, ita *sanguinem* agrotare innuimus, nempe vel quoniam ali- *comparan-*
quid extraneum, & non rite miscibile huic aut isti *confunditur*; vel quo-
 niam *liquoris crasis*, sive *temperies pervertitur*, h. e. quatenus elemento uno
 forsan aut altero, quibus dominium debetur, suppressis, alia quæ subju-
 gari oportuit, exaltantur.

Circa prius, de *vinis* observamus, quod cum fæces prius secretæ, ac *Quoad*
 ad fundum detrusæ, denuo commotæ eleantur; vel si heterogeneum *res non*
 aliquid, uti sebum, aut sulphur exoticum dolio injicitur, exinde per- *miscibiles*
 turbatio insignis concitatur; quæ nisi brevi compescatur, vini crasis *utrisque*
 subverti periclitatur: Pariter quamplurimæ sunt res non miscibiles, quæ *confusas.*
sanguini confusæ motum ac circulationem ejus perturbant, & œconomia
 ritus, quo minus recte perficiantur, impediunt: *Liquor nutritivus*, fæcu-
 lentiis refertus, *sanguinem* inordinate fermentat: quin & liquor iste de-
 gener factus, *februm intermittentium* paroxysmos ciet, prout olim mon-
 stravimus: *Recrementa sanguinis vaporosa*, *serosa*, *biliosa*, ac *atrabilia*
 in sinu ejus retenta *catarrhos*, *hydropem*, *icterum*, *melancholiam*, plures-
 que alios affectus pariunt: quod si *extraneum* illud tempestive amovea-
 tur, *sanguis*, uti & *vinum*, mixtura extranea cito liberum, constitutionem
 pristinam brevi recuperat: attamen uterque liquor contentis heteroge-
 neis aliquandiu infectus, tandem à debita crasi degenerat, proindeque
 non facile restauratur.

2. Præterea quidem, & *vinum*, & *sanguis*, ob multas alias causas à recta
 temperie desciscunt. Quod spectat ad *vinum*, plures sunt modi, & ratio-
 nes, quibus liquor ejus à crasi legitima pervertitur: quibus etiam paralle-
 lōs subjungantur totidem, ac forsan plures *sanguinei liquoris* dyscrasie.
 (Hic etenim venenari, ac subito corrumpi solet, quod non facile vino
 accidit.) 1. Igitur de *vinis* observare licet, eadem aliquando *maturitatem*

non attingere, sed propter *πνδματώσεθ* defectum, quatenus nimirum spiritus, aliaque activa sulphuris, ac salis principia, crassioribus obvoluta sese extricare nequeunt, prorsus cruda manere: quare minime spiritualescunt, sed consistentiæ crassæ, & saporis ingrati, in vappam degenerant: simili fere ritu; quandoque sanguis spiritu, ac sulphure depressis crudus & aquosus, necnon vigoris expers, ac in corde vegete accendi inhabilis perstat. Huiusmodi sanguinis *μολύνσιν* Cl. Gregorius Horstius affectionis scorbuticæ causam asserit: attamen talis sanguinis dispositio picam & malaciam, necnon diathesin hydropicam potius quàm scorbuticam inferre videtur, prout mox plenius ostendemus. 2. Vini pars sulphurea præ cæteris exaltata, liquori immodicam effervescentiam, sive ebullitionem inducit; nostro idiomate dicitur, *fretting of vines*; pariter & sanguinis pars sulphurea nimium evecta, proindeque supra modum effervesce, ac in corde accendi apta, intemperiem febrilem accersit, & revera febrium *ἑσπερίων* plurimarum causa existit. 3. In vinis non raro spiritu fatisciente, & sulphure constrieto, pars salina in fluorem evecta cæteris præpollet; quapropter liquor in acetum transit. Cl. Sennertus sanguinem in scorbuto, sicut vinum in acetum de sanguinis gener, alterari putat; quod tamen secus fieri mox declarabitur. Interim dyscrasia ab acetosa sanguinis dyscrasia, melancholiam inferri olim monstravimus. scorbutica 4. Restat adhuc alia vinorum dyscrasia, cui equidem sanguinis diathesin scorbuticam satis apte comparemus: scilicet cum spiritu depresso, particula sulphurea & salina simul combinata exaltantur: cumque hoc in vinis duplici modo fiat, etiam ob sanguinem pariter affectum, duplicem scorbuti speciem illinc deducere fas sit, prout mox clarius patebit. Itaque de vinis vulgaris observatio est, quod præterquam quod in vappam aut acetum degenerant, eadem aliquando à spiritu depresso, atque sulphure, ac sale una exaltatis, aut rancida, aut pendula, sive mucilaginosæ evadant: nostro idiomate dicitur *Vines become over fretted, or become reapy*: In utraque mutatione, spiritu subjugato, particulæ sulphurea, & salina simul associatæ, cæteris elementis præpollent, atque ad indolem suam liquoris crasim deflectunt; attamen non eodem prorsus modo in utraque res agitur: quippe in priori vini dyscrasia, sulphur aliquantulum sale; ac in posteriori sal sulphure potius existit: quin & alterutrum potentiùs factum, excusso spiritus dominio, sibi alterum consciscit, & supra debitum tenorem attollit. Utriusque ratio ad hunc modum explicabilis videtur.

Rancida,
aut pen-
dula.

Cum vina generosa diu efferbuerunt, particulis multum agitatæ, invicemque allisis, spiritus partim evaporat, & partim elementis crassioribus obvolutus suppressitur: Interea sulphur, (cujus magna est copia) agitatione magis provehitur, proindeque spiritus jugo solutum sali adhærescit, ipsumque attollens, liquoris mixtionem alterat, cui dein, ob sulphuris cum sale combinati eminentiam, ranciditas accedit: pariter cum vina tenuia diutius asservantur, sal evectus, & fluore potitus spiritum deprimit, proindeque latici subjecto acorem inducit; dein postea sal eminens, sulphur, (quod in minori subest copia) sibi met asciscens, intimeque aduniens, liquoris consistentiam è tenui in crassam, & velut oleaginosam, & à sapore acido in valde ingratum, & quasi mucidum convertit.

Probabile

Probabile est, non absimili modo *sanguinem in affectione scorbutica* alterari, quàm *vina* quoties nimis *effervescentia* in *rancida*, aut *pendula* degenerant: quippe morbum istum non tam à *feculentis sanguini admixtis*, (quæ quamquam tales adfuerint, attamen denuo excerni, earumque supplementa præscindi possint,) quin à *sanguinis dyscrasia habituali* pendere, argumento est, quia scorbutus radicans adeo difficulter, ac interdum non omnino curatur: Porro *sanguinis dyscrasiam* scorbuti parentem, pariter ac *vini duplicem, nempe sulphureo-salinam, ac salino-sulphuream* statuere licet. Cum enim maxima sit varietas affectuum, qui scorbutu accensentur, omnes ad hæc duo quasi præcipua capita, seu velut binos mali fontes, satis aptè revocari possint: scilicet primo quod *sanguis* miasmate scorbutico tactus, aut *præfervidus* existit, in quo nempe *sulphur* prædominio potitum sibi salem asciscit: quapropter iste *rancidior factus* inordinate in vasis effervescent, atque recrementa adusta, nempe *sulphuris & salis* concretiones, perpetim à se amandat, atque huc illuc dispergit; quæ quidem *exterius suffusæ maculæ, exanthemata, tubercula, aut ulcera* producant: *interius* verò depositæ *vomitibus, cardialgiis, diarrhoeis, aut dysenterias*, porro *dolores atroces* pariunt. In hujusmodi *scorbutica sanguinis ranciditate* remedia solum temperata, ac crebræ phlebotomiæ; ac minimè *cochlearia, raphanus sylvestris*, aliaque acredine, & incitatione prædita conveniunt: pari quidem ratione ac *vina rancida* curantur eximendo è *fecibus*; insuper *lactis, amyli, ichthiocolle*, aliorumque demulcentium infusione. Vel secundo in *sanguine scorbutum* fovente, *sal* prædominio potitum, sibimet *sulphur* asciscit: quapropter iste non ita *fervidus*, quin *vini penduli* instar *crassus*, & quasi *mucilaginosus* evadit, pigre in vasis circulatur, & viscera, dum pertransit, infercire, iisque *feculentias* quasi limosas affigere aptus est. Taliter affecti, ut plurimum sine *exanthematis*, aut *eruptionibus cutaneis*, torpidi, anhelosi, ac *enervati* fiunt, *lassitudine spontanea*, & *pectoris angustia* laborant; quin & *passionibus cordis, spirituum deliquiis, vertigini, & convulsionibus* obnoxii reperiuntur: porro in hujusmodi *diathesi scorbutica* remedia calidiora, & *sale volatili* prædita, immo & *chalybeata* quæ sanguinem fundunt & exagitant, maximè ex usu esse solent: pari quidem ratione ac *vina pendula* tractantur, nempe plurimum conquassari, & agitari debent: porro iis *calx viva, alumen ustum, gypsum, sal marinus calcinatus, aliaque summâ acredine prædita* imponuntur. Hæc de *scorbuti principiis* in *massa sanguinea* radicatis: Adhuc explicandum restat, quibus de causis sanguis à propria indole degenerans hanc, illamve dispositionem morbidam, & scorbuti parentem concipit. Attamen prius ostendere oportet, quo ritu in *succo nervoso*, scil. altero humore generali, istius morbi semina jaciuntur.

E *sanguine cerebri* oras adpellente liquorem subtilissimum, pro spiritibus animalium tum *materia*, tum *vehiculo* exstillari, eumque per totum *ἐγκεφαλον*, & genus nervosum jugiter scaturire, alibi declaravimus: Latex iste, quandiu rectè habet, *spiritu*, & *sale* eidem combinato, seu *volatili-sato*, potissimum constat; his modicum *aqua* qua diluantur, accedit; *sulphure* ac *terra* parum opus esse videtur: attamen ista *spiritus & salis volatilis* concretio, humorem præstantissimum, qui scil. omnia permeat, penetra-

Quo ritu
labes scor-
butica li-
quori ner-
voso im-
primatur.

netrat, actuat, & irradiat, supra quod *chymici de Alchæst* somniarunt, revera constituit: *Circa scorbuti* initia, donec sanguinis crasis, ac cerebri tonus haud penitus vitiantur, liquor iste *cerebri & nervorum* irriguus, adhuc spirituosus, dulcis, atque ad destinata quævis munia haud valde inidoneus perstat; postea tamen è *massa sanguinea depauperata*, & plurimum effoeta, latex multo tenuior, & versus acetosum declinans exstillatur: porro è *sanguine* fæculento, & quasi rancido, aut limoso, particulæ heterogeneæ, atque regimini animali plurimum infestæ suggeruntur, ac intra *cerebrum* debilius factum, sine repulsa admittuntur, indeque in *appendicem* ejus tum *medullarem*, tum *nervosum* cum succo irrigante diffunduntur: hinc *spirituum animalium* in singulis regionibus scatentium, modo *deliquia & eclipses*, modo *distractiones*, *explosionesque dolorificæ* ac *spasmodicæ* sequuntur: Quapropter *paralysis, convulsio, vertigo, dolores, tremores, aliæque cerebri ac nervosi generis præternaturales affectiones*, *scorbuto* altiores radices agenti supervenire solent: de quibus infra speciatim dicetur. Interim adnotetur in genere, labem scorbuticam *succo nervoso* affixam in his *tribus*, scil. in eorum aliquibus, aut simul omnibus consistere: videlicet quod *liquor cerebri & nervorum irriguus* multo *tenuior*, seu *pauperior* evadat; quod à *crasi spirituosâ salina* versus *acetosam* degeneret; quod *particulis heterogeneis, & morbificis* referciatur.

Hactenus ostendimus quo ritu in *sanguine*, & deinceps in *succo nervoso* affectionis scorbuticæ prima quasi seminia conferuntur. Priusquâ morbi fructus, sive *symptomata*, propter malam utriusque humoris diathesin excitata, eorumque rationes, & fiendi modos perpendamus, in ipsius *morbi causas remotiores, & differentias* inquirere oportebit: nempe ut cõstet ob quas *περσπάρσις*, & quali apparatu dispositio scorbutica prædictis humoribus imprimitur.

C A P U T II.

De Scorbuti causis remotioribus, à quibus nimirum massa sanguineæ, & per consequens liquori nervoso labes affigitur.

O Stenfo in superiori capite, quæ sit *scorbuti causa conjuncta & proxima*, scil. *mala diathesis sanguini & succo nervoso* impressa: circa *causas remotiores*, ob quas *utriusque humori*, ac imprimis illi, qui potior & prior in culpa est, nempe *sanguini* labes infertur, disquirendum restat: etenim hujus depravatione detecta, facile patebit, quomodo in *alterum laticem* miasma morbificum derivatur. Cum itaque ratum habemus, affectionem scorbuticam in *sanguine* vitiato potissimum fundari, ejusque vitium quasi *vinorum* dum *rancida & pendula* fiunt, in *sale & sulphure*, dum *spiritus* deprimitur, indebite exaltatis consistere; sedulo perpendamus, quomodo hæc illæ *diathesis* *υοσπν* *massæ sanguineæ* imprimitur.

Atque

Atque hic præterire non debemus, quid alii *Authores scorbuti naturam* *Aliorum*
diligentissimè rimati, circa *causas & subjectum* ejus statuerunt. Super hac *sententia*
re cum plures extant sententiæ, fere omnes hoc respectu conveniunt, ut *de origine*
morbi fons & origo à viscerum culpa derivetur, ejusque producti sedes in *scorbuti*
massa sanguinea collocetur; nempe ut hæc illorum vitio ferè tantum inqui-
nata, labem scorbuticam contrahat. *Antiquiores* præcipuam hujus morbi
causam *lieni*, officio suo non rectè defungenti imputarunt: Verumtamen
cum *lienis* munus hoc à nonnullis, aliud ab aliis, & diversum ab istis con-
cipiatur, diversimodæ hujus morbi productiones fingebantur: *Vviersus*,
Echtius, *Albertus*, *Rossius*, *Eugalenus* cum multis aliis, ex supposito quod
lien sit receptaculum melancholici succi excrementitii à sanguine separati,
statuunt scorbuti causam internam proximam, esse copiam humoris lutulenti,
crassique melancholici solius, vel etiam cum aliis misti, peculiarem corruptionis
formam subeuntis, quæ circa lienem, ac jecur, atque in ipsis venis abundet. Hæc
opinio, si melancholici succi à liene secretionem neglectam, aut impeditam,
aliquando, & ex parte scorbuti causam esse pronuntiaret, merito assensum
nostrum vendicaret; sin morbum istum semper omnino hujus visceris
culpâ oriri statuatur, summe improbabilis videtur, prout inferius patebit,
ubi scorbuti longe potiores causas assignabimus. *Authores alii*, hæmato-
seos munus lieni attribuentes, scorbutum produci dixerunt, eo quod lien chyli
partem sibi destinatam in sanguinem laudabilem minimè conficiat. Cum vero
alii, humidiores & magis aquosas chyli partes in liene præparari, ac in
sanguinem converti statuunt, uti *Reusnerus*, &c. idcirco proxima & interna
scorbuti causa perhibentur aquosi & serosi humores, qui siquidem à liene haud
excipiuntur, sanguini confusi, scorbutum originem præbent. Interim alii, uti *Pla-*
terus, *Baubin*, &c. Chyli partem crassiorem sanguificationis causa à liene allici
dixerunt, & ex eo sibi & aliis partibus sanguinem idoneum præparari. Ex hoc
supposito *Gregorius Horstius* dicit scorbuti causam, esse crudum & ichorosum
sanguinem in toto corpore, potissimum tamen in hypochondriis, non quantitate
solum, sed specifica quadam corruptione peccantem, ob *μολυσμὸν* ex imbecillitate
lienis provenientem: quia scilicet per lienis affectum præternaturalem crudiores
chyli partes à sanguificatione jecoris non avertuntur; unde primo sanguis in
venis jecoris & lienis depravatur alienæ materiæ commistione, deinde jecoris
αἱμάτωσις impeditur, ratione objecti minus rectè dispositi, quatenus chylus, ob
lienis læsionem, justo modo non depuratur. *Horst.* append. ad lib. 2. p. 2. sect. 1.
de scorbuto. Hæc opinio facile concidit, quia asserit, contra legem hæma-
toseos, lienem sanguificare, atque chyli partes crudiores ad se attrahere: cum
notissimum sit, nullum chyli ad lienem transitum patere. Quin & eadem li-
tura refellitur *Reusneri* aliorumque sententia, qua asseritur, proximam & in-
ternam causam scorbuti esse serosos & aquosos humores, quos lien debue-
rat attrahere, & per peculiare suum hæmatoseos munus, in sanguinem
convertere.

Doctissimus Sennertus, licet cum prioribus sanguificationis munus etiam
lieni attribuat, *Institutionum lib. 1. cap. 9.* attamen aliunde, quàm ab hujus
visceris culpa, scorbuti causam derivat. Enimvero statuit ille, propter chy-
lum in primis viis male concoctum, & *αἰματώσιν* destitutum, feculentias sal-

*fas & tartareas circa mesenterium, & omentum congeri, easque novæ materia ap-
pulsu indies auctas, & sero dilutas, demum in lienem & hepar, indeque in veno-
sum genus transferri, illisque adeo totam massam sanguineam infici, atque cru-
dam & salsam reddi. Primam hanc scorbuti mineram, in primis viis agge-
stam, appellat humorem melancholicum, quem insuper dicit serosum esse, hu-
moribus pituitosis stipatum, atque ob moram in istis partibus peculiari ritu cor-
ruptum: Denique addit: humorem istum spiritus, & salis volatilis fixatione ge-
nerari, non secus ac cum vinum in acetum transsit.*

Scorbutus Huic opinioni, utut probabili, ne per omnia consentiam, quædam non
nō semper levis momenti rationes evincunt. Præterquam enim quod hæc etiam do-
*lienens, aut*ctrina cum circulatione sanguinis non exacte quadret, utpote cujus lege
primarum humores in vasis mesaraicis seorsim à reliquo vasorum genere vix conge-
viarū vi- runtur, saltem illis exinde in *lienem* transitus minimè patescit. Insuper
tio oritur. haud rectè statuitur *scorbutum* in primis viis solummodo incipere; namque
interdum *mero contagio* contrahitur: Nec etiam hunc morbum à *salis*
fixitate, aut *sanguinis, & humorum cruditate* provenire censemus; sæpenu-
mero enim febribus diuturnis succedit, proindeque à *sanguinis deflagra-
tione* nimia, & *adustione*, potius quam à chyli aliorumque humorum in
primis viis *μολώσθ* exoriri videtur: porro interdum aura maritima & palu-
dosa hunc morbum inducit, licet nullæ cruditates circa viscera gignantur:
siquidem laborantes ab initio circa appetitum & digestionem minimè que-
runtur. Revera quod attinet ad *cruditatem*, atque *salis* in *chymo aut sanguine*
fixitatem, πνδματῶσε & *defectum*, concedimus ab his causis diathesin vale-
tudinariam non raro produci, propterea tamen non statim *scorbutus*, sed
potius *malacia*, & *pica virginum*, *leucophlegmatia*, aut *dispositio hydropica*
succedunt. Cum itaque *scorbuti Aetiologia* ab Authoribus, quibus *sanguini-
nis circulatio* nondum innotuit, tradita veritati minus quadret; libet modo,
clavæ isthæ adhibita, rem totam denuo pertractare, atque morbi hujus
causas, tum *procatarcticas*, tum *evidentes*, juxta *αἱματώσεως* legem, qua te-
nuitas nostra potest, accuratius explicare.

Modo innuimus, esse plures *occasiones & procatarxeos modos*, à quibus
scorbutus originem suam ducere videtur. 1. Quibusdam locis *endemiis* exi-
stit, ut propter malignam aëris, & vaporum, quibus stipatur, influentiam
unà cum spiritu vitali *miasma morbosum* hauriatur. 2. Sæpenumero morbus
iste *febribus diuturnis*, aliisque *morbis chronicis* succedit, illorumque effectus,
sive productum merito censetur. 3. Nonnunquam *hereditario*, & à paren-
tibus scorbuticis per traductionem propagatur. 4. Interdum *mero contagio*
suscipitur. 5. *Mala victus ratio* inordinationes circa res non naturales, at-
que viscerum dyscrasie innatæ aut acquisitæ affectionem scorbuticam ali-
quando inducunt, sæpissimè ejus genesi contribuunt, aut fomitem præ-
bent. Singulorum hujusmodi effectuum rationes consideremus.

Quam ob 1. *Scorbutum aëris* vitio sæpius contrahi, nullus est è vulgi fæce qui non
rationem confiteatur: ferè omnium in ore est, loca maritima, lacustria, & uliginosa
humidus quosvis *febribus intermittentibus*, aut *scorbuto*, obnoxios reddere: quare va-
aër Scor- letudinarii, aut qui sanitatem suam colunt, procul ab hujusmodi locis
butum habitationes constituunt: Talis equidem humidus aër tetras exhalationes,
parit.

iones, & inquinamenta continuo diffundens, duplici respectu insalubris, & non raro scorbuti parens existit: scilicet ob *transpirationem præpeditam*, & propter *fermenti incongrui susceptionem*. Primo enim in aëre crasso & minus eventilato degentibus, meatus, & pori cutis valde constipantur: quare cum effluvia sanguinis haud debite satis exhalant, eadem intus retenta reliquam massam sanguineam fermentant, ejus particulas activas ad varias inordinationes disponunt. Dein secundo, quatenus eodem tempore vapores tetri salia, & sulphura incongrua redolentes inspirantur, propterea sanguinis spiritus valde deprimuntur, ac interea particulae ejus sulphureae, & salinae ad *ἀκρότητα* evehuntur, proindeque massa sanguineae crasis sensim mutata in morbidam degenerat. Cujus nimirum pars *sulphurea* siquidem per se exaltata sanguini *rancorem* insignem inducit, *febris* interdum *continua*, sæpius vero *intermittens*, aëri insalubri, propter rationes alibi ostensas ita familiaris, excitari solet: Quod si à tali *πυρρὰ* (uti frequentius assolet) una cum *sulphure principium salinum* evehitur, dispositio scorbutica, qualis supra describitur, scilicet *vini* aut *rancidi*, aut *penduli* æmula, sanguini imprimitur. Nec tantum ingens aëris humidi, & vaporosi tractus ad hunc modum insalubris est, verum incolere domos loco palustri confitas, vel stagno circumdatas, aut calce viva recens obductas, morbo isti obnoxios reddit.

2. *Febris diuturnior* sapissime *scorbutum* inducit: cujus ratio ex hypothese 2. *Quare* nostra manifesto liquet; etenim à crebra, nimis iaque sanguinis deflagratione *febris diuturnior* *spiritus* plurimum absumuntur, ut liquor pauperior & effectus evadat; quin *supervenit* & *sulphuris* purioris ingens copia deflagrando evaporat, interea quod hujus reliquum est, sibi *salem* asciscens, ipsumque evehens, sanguis in crasim morbidam & plane scorbuticam inferre solet. Observare est à *longiori febre*, propter *spiritum* & *sulphur* nimis exhalantia, atque plurimum *salis* cum *sulphure* residuo diutius concoctum, *sanguinem* valde *salsum*, & quasi *lixiviale* evadere: ita quidem ut deinceps ægre, & vix circulationi peragenda satis in corde accendatur: Cujusmodi sanguinis dispositio non nisi longo tempore restauratur, & difficulter admodum *scorbutum* ineundo vindicatur. Nec tantum *febris*, sed & aliis *morbis chronicis* male curatis *scorbutus* supervenit, idque propter *duplicem rationem*, sive afficiendi modum; nempe vel quia sanguis à morbo præsentis versus diathesin scorbuticam immutatur; vel quoniam ægritudo laborantes à quovis exercitio aut motu diu inhibet; proindeque illi à longo otio & secessu in *scorbutum* inclinantur: Prius cernitur in melancholia, ubi spiritus depressus, & sale in fluorem evecto, sanguis in acetosum vergit. Cujusmodi crasis, *sulphure* postea à sale ascito, & pariter evecto, facile in *scorbutum* transit. *Affectio hypochondriaca* in tantum *scorbutica* affinis est, ut sapissime hanc sociam inducat: nam facultati atrabiliariæ, quæ sanguinem pro istius affectus indole solummodo inquinant, postea crasim ejus pervertunt, adeoque scorbuticam reddunt: pariter *icterus* & *hydrops*, quæ sanguinem impura, aut incongrua mixtura primo tantum inficiunt, diutina mora temperiem ejus prorsus mutant 2. Plures alii morbi *scorbutum* accidentaliter inducunt, quatenus nimirum agrotantes à labore aut exercitio quovis impediunt; proindeque illorum sanguis

sanguis parum eventilatus pervertitur, non secus ac vina supra fæces suas diutius retenta, crasin amittunt, atque *salis & sulphuris* inordinationes subeunt. Hoc modo *paralysis, lumbago, ossium fractura, ulcera*, ac vulnera non nisi longo tempore sanabilia, homines *scorbuto* obnoxios reddunt.

3. Quo-
modo ha-
reditario
contrahi-
tur.

3. *Scorbutus* interdum *hereditario* contrahitur, ita ut morbi lues à paren-
tibus in natos derivata, absque aliis causis, sive externis, sive internis,
fructus morbidos, affectionis scorbuticæ indolem exacte referentes, pro-
ducat. Ita novi pueros stirpe valetudinaria oriundos, doloribus artuum
vagis, macularum eruptione, gingivarum, & dentium erosione & carie
affectos fuisse. Insuper observare est, parentum *lue venerea* tactorum na-
tos, symptomatis gravioribus, *affectionis scorbuticæ* æmulis, obnoxios de-
gisse. Hujusmodi affectuum ratio in hoc consistere videtur, quod *miasma*
morbidum humori genitali impressum instar fermenti venenati habet, quod
licet aliis particulis obvolutum aliquandiu lateat, tandem *suavis* suas
exerit, atque in sanguine aut succo nervoso symbola *salis & sulphuris* ele-
menta exsuscitat, eaque supra cæteras particulas evehendo, in labem scor-
buticam deflectit.

Quomodo
per conta-
gium.

4. Pari ratione, & afficiendi modo, *scorbutus* per *contagium* propaga-
tur; scilicet effluvia à corpore infecto decidua, atque vicini poros subeun-
tia, vel per anhelitum inspirata, aut sanguinem, aut succum nervosum, vel
simul utrumque fermentant, adeoque particulas *salinas, & sulphureas spiri-
tuosas* evehendo, liquoris crasin juxta indolem suam pervertunt.

Quomodo
viscerum
& prima-
rum via-
rum culpâ.

5. *Scorbuti causa* hætenus citatæ *massam sanguineam* immediatius respi-
ciunt, & morbum à latice ejus sine magno primarum viarum vitio in-
cipere ostendunt: attamen ne hanc regionem, cui à nonnullis culpa om-
nis attribuitur, prorsus immunem perhibeamus, juxta aliorum senten-
tias statuere visum est, scorbuti rudimenta etiam intra *coctionis visce-
ra* interdum concipi, atque illinc in *sanguinem* traduci. Si quando
enim à longo tempore accidit è chylo vitiatò *succum nutritivum* non nisi
incongruum, atque salium & sulphurum enormium particulis refertum,
massa sanguinea suppeditari, necesse erit hujus crasin tandem mutari, &
juxta materiæ, unde constat & quotidie suppletur, indolem perverti.
Quare observare est, qui cibis sale conditis fumoque induratis maxime
vescuntur, atque vinum, & aquas ardentes copiose bibunt, è quibus
particulæ *salina & sulphurea* in sanguinem rapiuntur, scorbuto plurimum
obnoxios reperiri: porro qui *carne porcina* aut etiam *piscium*, licet recen-
tium, ac imprimis *testaceorum* carnibus plurimum aluntur; siquidem hæc
alimenta *sulphuris*; & *salis* rancidiorum (uti colligere est ex putrescen-
tium insigni foetore) copiam præbent, facile in *scorbutum*, & quod majus
est, quandoque in *lepram* proclives habentur: E contra in hunc morbum
non ita prompte incidunt, qui *lacticia, fructus crudos & immaturos, ca-
seum recentem*, aliaque absurda comedentes, magnam *pituita* saburram in
ventriculo congerunt. Nec tantum è cibis pravis & dyspeptis, succus scor-
butum fovens producitur; sed interdum alimenta satis idonea, visce-
rum culpâ in materiam morbificam facessunt: quod tamen non semper
hepatis, aut *lienis* vitio, prout nonnulli arbitrantur, accidit; his enim
cum

cum *chylo* nihil negotii est : verum ipse *stomachus* fermento extraneo præditus , ingesta quævis pervertit, inque *pultem* modo acetosam, modo *salsam* aut *vitriolicam* mutat ; verisimile est etiam à *pancreate*, aut ducta *choleodocho* succum incongruum chylo permisceri , ipsumque tinctura heterogenea imbuere. Nec vero inficias imus , quin *lien* & *hepar scorbuti* productioni non raro contribuunt ; licet eorum culpas non *chylus* , sed ipse *sanguis* immediatius luit : quando *hepar* obstruitur , ut sanguinis recrementa adusta minus secernat , propterea hujus massa sæculentior , atque *salis* & *sulphuris* particulis simul incoctis nimis luxuriat. Quod spectat ad *lienem* , haud prorsus immerito est , quod circa scorbuti productionem tot querelæ in ipsum proferuntur. Cum enim hujus visceris munus (prout supra ostendimus) in his consistat , nempe tum ut *sanguinis* fœculentias atrabiliarias, quæ *sale fixo* & *terra* constant , secernat & excipiat ; tum ut easdem ulteriori coctione in fermentum sanguini remiscendum digerat ; si quando *lien* hisce muniis suis non recte defungitur , duplici respectu massa sanguinea inquinari solet ; nempe vel quia fœculentiæ atrabiliarie à *liene* obstructo , aut debilitato non omnino excipiuntur ; vel quoniam exceptæ , ibidem in fermentum inidoneum , & sanguinis corruptivum pervertuntur, massa sanguinea vel hoc, vel isto modo interdum male disponitur , & non raro propter hanc occasionem solitariam , aut aliarum causarum accessu , in diathesin scorbuticam degenerat. Enimvero à tali procatarxi affectionem *hypochondriacam* oriri olim declaravimus : cui quidem scorbutus (prout modo innuimus) adeo affinis est , ut illi sæpissime aut comitem se adjungat , aut superveniat. At vero *scorbutum* non semper , aut tantummodo *lienis* vitio oriri ; observatione superius citata liquido patet. Nempe olim *vir nobilis* affectione scorbutica , symptomatis quamplurimis , & maximè horrendis stipata , per plures annos laborabat ; hunc Medici celeberrimi dum curabant , *lienis* vitio ægritudinem contraxisse, & istius visceris causa mala gravissima pati pronuntiabant : Supra decennium doloribus fere continuis , necnon *paralyti*, & *convulsionibus* miserrime afflictus , tandem contabescens , *phthisi* interibat : Defuncti cadavere aperto , sensui constabat , *lienem* , utut pessime defamatum , omni culpa immunem fuisse : namque viscus hoc in figura , magnitudine , substantia , & colore laudabiliter habens , tumore quovis , aut obstructione carebat : insuper vasa sanguifera aperta , & infarctione libera , fibræ nervæ satis firmæ , atque *sanguis* intra *lienis* poros contentus , putredinis expers apparebat.

6. Inter *scorbuti causas*, à rerum non naturalium inordinatione derivari Quare solitas , merito hic *tristitiam* ponimus ; namque passim observare est , ho- tristitia & mites propter occasionem aliquam luctu ingenti percussos, & deinceps studia im- diu mœstos , *scorbuticos* fieri. Cujus ratio hæc videtur esse , ingens mœ- modica scorbutum stitia *animam inferiorem* , seu *corpoream* immediate afficiens , binas ejus par- gignunt. tes , nempe *sensitivam* & *vitalem* , intus compellit , earum *systases* à solitis expansionibus inhibens coarctat , ac in minus spatium contrahit ; hinc spiritus animales à debita expansione præpediti , œconomiam suam remittunt, quare & *sanguis* minori ambitu circuitus suos repetens, circa *cordis*

sinus agglomerari, ibidemque stagnare aptus est; hinc cum *spiritus* utriusque regiminis, scilicet tum *animalis*, tum *vitalis* praesides deprimuntur, & *sanguis* & *succus nervosus* secundum crases suas alterari incipiunt, & uterque vigorem suum sensim amittens, à liquore generoso versus acetosum & effœtum vergit: insuper *coctionis viscera*, solito spirituum influxu denegato, munia sua perperam obeunt. Hinc à chylo minus rectè cocto, aut inter coquendum depravato *succus nutritivus* nonnisi vitiosus & fœculentiis refertus, massæ sanguineæ infunditur, unde crasis ejus magis pervertitur, inque diathesin scorbuticam facilius transit: porro ob hanc rationem, *studia immodica* & nimis seria, & continua animi intentio, quatenus hinc spiritibus depressis, & viscerum muniis subversis, humorum præcipuæ crases in pejus alterantur, sæpe labem scorbuticam accersunt: Cui accedit, quod tum *mæsti*, tum *studiosi* vitam sedentariam perunque degunt; cujus causa & *sanguis*, & *succus nervosus*, tanquam aqua motûs defectu situm contrahens, vitari, & corruptelam scorbuticam promptius inire solent.

Labes
scorbutica
è sanguine
in cere-
brum &
genus ner-
vosum de-
vivatur.

Hæ sunt *scorbutica causa procatarectica*, si non omnes, saltem præcipuæ, quæ sanguini labem affigunt. Non opus erit *αιτιολογίαν* aliam, ut constet quomodo noxa à sanguine in succum nervosum derivatur, pertexere: etenim sanguis solenni ritu, & circulationis lege, spirituosum liquoris portionem in cerebrum exstillat: at vero, prout supra innuimus, è sanguine pauperiori facto, *latex tenuior*, & ex eodem falso (uti salinorum cum destillantur mos est) liquor acris prolicitur; item præterea à sanguine fœculento, & quasi limoso, *particula heterogenea*, & regimini animali infestæ suggeruntur; quæ tamen à cerebro firmiori & sano non facile admittuntur: quare ut tales particulae intra *ἰγκέφαλον* susceptæ, affectiones paralyticas aut spasmodicas scorbuto superinducant, causæ quædam præcedunt, è quibus cerebri constitutio debilitetur; cujusmodi esse solent, 1. ejus mala *diathesis hereditaria*: item 2. frequens *crapula* & *vini potus immodicus*, *somni meridiani*, *otium* & *exercitii defectus*, *venus immoderata*, *hemorrhagia* ingentes, aliæque occasiones, quibus aut spiritus animales nimis absorbuntur, vel cerebri pori & meatus relaxantur, ac nimis aperiuntur, ut quodvis præ foribus allatum admittant.

C A P U T III.

De scorbuti differentiis; item de morbi hujus signis, symptomatis, causis; imprimisque de illis, quæ propter labem sanguini impressam oriuntur.

Scorbuti
differen-
tiæ.

EX causis scorbuti hætenus descriptis facile erit hujus morbi differentias assignare. Primo etenim juxta duplicem causæ conjunctæ regionem, scilicet *sanguinem* & *liquorem nervosum*, affectio ista distingui potest, quod vel hujus,

hujus, vel istius ditionis maximè fuerit; atque modo in sanguine, modo in succo nervoso radices potiores egerit. Secundo juxta *duplicem sanguinis affecti labem*, nimirum quod ista *sulphureo-salina*, vel *salino-sulphurea* fuerit, etiam scorbutus iisdem nominibus insigniatur, aut secundum vulgares appellationes dicatur, vel *biliosus*, sive *calidior*, exanthematis, aliisque symptomatis apertioribus se prodens: vel *melancholicus*, cujus virus, quasi sub cineribus coopertis latens, facultatum læsione intrinseca, potius quam externis eruptionibus dignoscitur. Tertiò secundum *morbi originem*, & invasionis modum, quatenus scil. aut per *contagium* suscipitur, aut per *internam procatarxin* oritur; item juxta varium ejus statum, quod vel *inchoatus*, *perfectus*, vel *deploratus* fuerit, multifariam distinguitur, & circa curationem indicationes diversimodas requirit, de quibus postea explicatius dicetur. Interim vero *scorbuti signa & symptomata* recensere, eorumque causas, & fiendi modos subjicere incumbit.

Signa, quibus scorbuti indicia capiuntur, sunt vel *extrinseca*, scilicet *Signa & symptomata.* *accidentia* quædam, & circumstantiæ, quæ donec morbi notæ certiores adsint, suspicionem ejus præbeant. Ita si quisquam parentibus scorbuticis ortus sit, vel cum conjuge, aut sociis affectis diu conversetur, vel si juxta oram maritimam, vel loca paludosa, aut aliàs insalubria degat; vel si febrem diuturnam aliosque morbos chronicos prægressos habuerit, vel si à remediis antiscorbuticis juvamen senserit, talem, absque febre, aut alterius morbi certis indiciis, valetudinariè dispositum, *scorbuti* labem quandam contraxisse, merito arbitremur. Vel secundo, *morbi hujus signa*, sunt *affectus & symptomata præsentia*, scilicet corpori laboranti inhærentia; cujusmodi, cum multiplicia fuerint, variè distribui, & in classes quasdam redigi solent, nempe quatenus *scorbuto propria* sunt, aut huic cum aliis morbis communia; item in quantum vel circa *morbi initia, augmentum*, aut *statum* ejus pessimum excitantur: porro distinguuntur juxta quod in *variis partibus corporis* excitata, *interna*, vel *externa* fuerint; item quatenus utraque in *capite, thorace, abdomine*, vel *circa membra*, aut *habitum corporis* evenierint: Hoc ritu symptomata scorbutica superius recensuimus. Cæterum illa satis aptè distribui possunt, juxta quod oriuntur, vel propter *labem sanguini* præcipuè affixam, vel propter *succi nervosi vitia*, vel propter *utriusque humoris* enormis facti *congressus*, & quasi *conjunctas influentias*. Huic methodo, quæ licet, in recensendis explicandisque scorbuti symptomatis, & signis insistemus, quamquam interea plurimi affectus, qui ab *humoris hujus*, aut *illius* culpa singulari procedere videntur, etiam in causæ partem humoris alterius vitium aliquod consciscant: quod autem spectat ad *primarum viarum, & viscerum* in scorbuto affectiones præternaturales, licet tales interdum ab erratis in victu procedant, sæpissimè verò etiam istarum partium ægritudines, siquidem permanentes & habituales factæ, propter sanguinis aut succi nervosi inordinationes oriuntur, uti proprio in loco inferius declarabitur: Interim uni prospectui subjiciatur, quomodo præcipua *scorbuti symptomata* ab *humoris hujus* aut *istius*, aut conjunctim ab *utriusque* vitio procedunt.

1. Cum itaque *sanguis miasmate scorbutico* plurimum inficitur, ob tres potissimum *Cujus modi*

affectus
propter
sanguinis
dyscrasiam
scorbuticam
oriuntur.

tissimum rationes mala symptomata succedunt. Scilicet 1. quia liquor ejus depauperatus solito vigore caret, ut nec clare in corde accendatur, nec vegete & æquabiliter circuletur; quam ob causam, totius animæ dejectio, & velut subsidencia, mœstitia, anxietas, respiratio difficilis, pectoris angustia, pulsus intermittens, frequens leipothymia, caloris & frigoris suffusiones inordinatæ succedunt. 2. Sanguis faculentius scatens recrementa sua partibus, quas interluit, passim suffundit; quapropter exterius macula, exanthemata, tubercula, ac ulcera passim excitantur; hinc etiam catarrhi, hydrops, membrorum intumescencia, gingivarum ulcera, vomitus, diarrhœa, dysenteria, sputatio ingens, sudores, urina lixivialis, aut contentis saturata, quin & viscerum tumores, aut obstructions non raro sequuntur. 3. Sanguis pauper & faculentus, cerebro & nervoso generi liquorem non nisi vitiosum suppeditat; adeoque mediatè istarum partium culpas luere debet: porro sanguis depravatus, spiritibus intra fibras ubique scatentibus copulam pro facultatis locomotivæ actibus explosivam, haud satis idoneam immediatè præbet, unde lassitudo spontanea & impotentia ad motum ex parte procedunt.

2. In scorbuto succus cerebri, & nervosi generis irriguus, postquam labem morbida inficitur, sub triplo respectu peccat. 1. Quatenus à nobili & spirituosus in pauperem & tenuem declinat, unde languor, & totius corporis enervatio, hinc etiam atrophia aliquatenus procedit. 2. Quatenus liquor iste à spirituo salino in acetosum mutatur, inde melancholia & metus, spirituum fatiscencia, & à solito vigore suppressio; quin & partium nervosarum dolores, ac irritationes fere continuæ, & ossium crepitus inducuntur. 3. In quantum liquor iste particulis heterogeneis, & regimini animali infestis refertur, convulsio, spasmi, paralysis, vertigo, affectus soporosi, aut vigilia pertinaces, stultitia demùm, aut insania oriuntur.

3. In scorbuto inveterato & graviori, sanguinis & succi nervosi recrementa variis in partibus simul deposita, quatenus ea particulis salinis, quæ diversimodæ sunt indolis, prædita sunt, invicem congregiuntur, ac mutua lucta, & effervescencia symptomata terribiora produciunt: hinc enim dolores intolerabiles, præsertim nocturni; arthritidis vaga, rheumatismus, alique hujus generis affectus oriuntur. Ad hunc modum à gemino luis scorbuticæ fonte plurimi malorum affectuum rivuli quaquaversus decurrentes in singulis totius corporis partibus molestias creant. Quarum adhuc ut plenior notitia constet, ex re fore videtur singula prædicta symptomata recensere, & cujusque illorum rationes, & fiendi modos particulatim tradere.

Symptomatum causa explicantur. Lassitudo spontanea. 1. Primum scorbuti signum, quo sæpe morbi incipientis suspicio præbetur, lassitudo spontanea est, cui accedunt impotentia ad motum, item crurum debilitas, & velut gravitatis sensus. Hæc symptomata circa morbi initia oriri solita, à sanguinis potius quam liquoris nervosi (qui vix adhuc inquinatur) vitio derivantur: Hoc autem duplici respectu fieri potest, scilicet primò quatenus sanguis impurius factus, faculentias serosas inter circulandum exuit, easque musculorum poris & meatibus insinuat, quibus infarciuntur illi & aggravantur; proinde ut spiritus impediti, ac intercepti, explosiones suas locomotivas haud liberè satis ac vegete ineant; insuper partes velut sarcina quadam onustæ, non uti prius, facile & expedite

moventur. 2. A sanguine vitioso spiritus animalis *copula explosiva* non nisi degener ac imbecillis accedit; propterea illi neque motus locales prompte ineunt, nec vegete perficiunt. In scorbuto inveterato impotentiam ad motum, etiam à succi nervosi depravatione, & spirituum inopia oriri credimus.

2. *Respiratio difficilis*, ac ad motum quemvis *anhela*, familiare scorbuti ^{Respiratio difficilis,} *symptoma* est; cujus cum binæ solent esse causæ, modo ab una, modo ab altera, & aliquando simul ab utraque dependet. *Dyspnœa scorbutica*, si valde crebra, & fere constans fuerit, à sanguinis statu pauperiori, & quasi effœto, quo quidem in corde stagnare, & non statim accendi aptus est, provenit: quare à motu quovis, siquidem muscoli vasa sanguifera comprimendo liquorem contentum prorsum urgent, sanguis aliquanto uberius in cordis sinus irruit, qui cum illic non statim accenditur, & foras evehitur, cor aggravat, & functionis vitalis deliquium minatur: idcirco pulmones, ut suppetias ferant, celerius moventur, ut sanguinem citissimè exantlent; adeoque in *hunc finem*, nempe sanguinis effœti, & ex se penè immobilis circulationem, *respiratio* valde crebra & *anhela* instituitur: in hoc casu cum *respiratione laboriosa*, etiam *pulsus celer*, & *parvus* existit. 2. *Dyspnœa scorbutica* interdum à nervosi generis culpa procedit; postquam enim labes morbida *cerebrum* ac appendices ejus occupavit, particulæ heterogeneæ ab *ἐκκεῖλαι* dimissæ, uti nervos alios, ita pneumonicos aliosque affines, scil. diaphragmatis, & musculorum pectoris motui inservientes crebro subeunt; proindeque juxta quod nervi isti à muniis ritè defungendis aut inhibentur, aut pervertuntur, *respiratio difficilis* varii generis producit, estque ut plurimum aut *paralytica*, aut *convulsiva*: etenim particulæ morbificæ caudices nerveos subeunt, & circa eorundem plexus, aut extremitates uberius congestæ, spirituum copiis affiguntur: hinc aliquando accidit à tali particularum (si forsan illæ *narcotica* fuerint) cohæsiōe, spiritus quorundam nervorum incolas ligari prorsus, & ab actibus designatis inhiberi: unde respiratione impedita, ceteri spiritus nervorum adhuc immunium hospites, ut ipsi proprio Marte pensum commune perficiant, valde exercentur; adeoque qua licet, *respirationem* magis crebram, & *laboriosam* edunt: quandoque vero spiritus intra quosdam ex respirationis munere nervos scatentes, *copula heterogenea explosiva*, sive *spasmodica* afficiuntur, cujus elidendæ gratia, cum illi ob plenitudinem, vel propter occasiones aliquas excitantur, *motus convulsivos* ineunt; proindeque pulmones cum laboriosis, & crebrius repetitis, modo *systoles*, modo *diastoles* vicibus, *paroxysmis* quasi *asthmaticis* detinentur: In his casibus quandoque nervi diaphragmatis, interdum pneumonici, ac pectoris motus absolventes, item forsan aliquando bronchia amplectentes, ac illorum modo hi, modo isti seorsim à reliquiis, aut *narcosi*, aut *affectionibus spasmodicis* obnoxii sunt, ac propterea respirationis anomalæ variæ differentiæ, ac modi occurrunt, quarum species quasdam & exempla posthac adjiciemus. Scio quosdam prædictorum symptomatum causas *vaporibus* à ventriculo, ejusque vicinia elevatis ascribere: quorum sententia rationibus in contrarium allatis, alibi à nobis merito rejicitur. *Eugalenus*, *Horstius*

Horstius & Sennertus, quos alii sequuntur, *dyspnœa scorbutica* causam à visceribus imi ventris inflatis, aut tumefactis, proindeque septum comprimantibus deducunt, non secus ac in *gravidis* ac *hydropicis* fieri assolet: Attamen huic opinioni minimè assentior, quia symptoma illud non raro iis evenit, quibus venter, & hypochondria satis mollia, ac infra costas subsidencia, spatium pro diaphragmatis motu satis liberum concedunt, prout examine facto sæpius observavi: Quod autem *lien*is perturbationi *respiratio difficilis* passim in *hypochondriacis*, & quandoque forsan in *scorbuticis* succedat, ratio est, quia *nervi splenici* cum *pneumonicis* communicant: quandoquidem igitur utrique materia morbida, scilicet spasmodica obidentur, eadem in alterutris commota spasmos ciens, alteros in affectus consensum trahit, prout suprâ de passionibus hypochondriacis differens manifesto declaravi; in omni *respiratione difficili*, propter *nervosi generis culpam* excitata, *pulsus* utplurimum satis *fortis*, at debito *celerior*, ac interdum *intermittens* existit.

Pectoris angustia.

3. *Pectoris angustia scorbuticos* nonnullos graviter infestat: cuiusmodi symptoma, cum *respirationem* difficilem adjunctam habeat, eidem causæ, nempe septi à visceribus elevatis compressioni vulgò adscribitur: At vero licet pectus interdum eo ritu angustetur, ut affecti anhelosi spiritum altiorrem ducere nequeant, quin medio thorace *inspiratio* terminatur; tamen aliquando è contra *inspiratio* nimis profunde ducitur, ut laborantes ægrè & difficulter *expirent*, quod certè nullo modo viscerum diaphragmate inferiorum anomaliis, sed vel *sanguinis* in corde accensione haud ritè peractæ, vel potius *nervorum* *respirationi* inservientium affectioni præternaturali attribui debet, quin pari ratione etiam *inspirationis* difficilius causa ab eodem fonte deducatur: scil. in utroque casu *nervi* & *εισπνοῦν* & *ἐκπνοῦν* perficientes, quatenus materia morbifica, eaque vel *narcotica*, vel *spasmodica* occupantur circa propria munera defungenda, aut *nimis*, aut *minus* quam opus est peragunt. Quidam vero *scorbutici* interdum *pectoris angustia*, sine *respiratione* multum impedita, molestantur; sentiunt nimirum thoracis ambitum arctius constringi, ac in minus spatium contrahi: Interim affecti de *cordis anxietate*, potius quam de *pulmonum motu inhibito* queruntur: hujus causa videtur esse, quod membranæ præcordia investientes, quatenus humore seroso, unâ cum nerveo nimis irrigatæ, instar corii madidi contractiores evadunt: quin & earum fibræ in spasmos breviores irritatæ corrugantur nimis, proindeque partes continentes coarctari coguntur: porro huiusmodi *præcordiorum constrictio* ipsius cordis motui quadamtenus obsequitur: quippe dum sanguis pauperior factus, haud vegete satis è cordis sinu exsilit, nec apertè in pulmones deflagrat, propterea hos minus dilatari, aut expandi opus est: quinimo ut sanguinis circulationi in minori ambitu peractæ respondeant, & exacte quadrent membranæ investientibus, fibrisque nerveis ipsorum motui destinatis, quoad debiles expansionum limites regulantur: quare ista *præcordiorum constrictio*, sicuti in pluribus observavi, propter *gaudii* & *tristitia* occasiones subito remitti ac intendi solet; nimirum juxta quod sanguis uberius, aut parcius è cordis sinu exsilit, circulationi ejus spatium majus, minusve proportionatur.

4. *Pulsus inaequalis*, ac *intermittens*, item *frequens leipothymia*, ac ejusdem *Pulsus metus* scorbuto graviori saepenumero accidunt; quorum par ratio, ac res- ^{inordina-}pirationis anomalæ, modo *sanguinis in corde accensione indebita*, modo *ner-* ^{tus} *vosi generis inordinationi* merito ascribitur: *sanguis falsugineor* factus, ac insuper *faculentis scorbuticis* valde refertus, velut *ellyphni oleum sale* ac *sordibus limosis imbutum*, non nisi inæqualiter, ac interrupte accenditur: quare hinc *pulsus irregularis*, cum *spirituum vitalium* crebro *deliquio* cietur. Porro si quando *nervi cardiaci* etiam materia morbifica obsidentur, ut *spirituum animalium influxus*, quo cordis motus perennatur, haud justo dimenso, & æquabili ritu peragatur, propterea quidem accidit *cordis motum* aliquatenus inhiberi, ejusque reciprocationes varie perturbari: *pulsus in-* ⁱⁿ⁻ *aequalis*, vel *intermittens*, & *parvus ac debilis à dyscrasia sanguinis*; sin satis sit *magnus & fortis*, à *functionis animalis vitio* procedere videtur.

5. *Cordis tremor*, *palpitatio* & *magnis subsultus*, scorbutice affectis non ra- ^{Passiones}ro contingunt; cujusmodi *passiones* sunt mere convulsivæ, atque à *nervis* ^{cordis} *cardiacis*, nempe ad *cor ipsum*, aut *pericardium* spectantibus, materia spasmodica & explosiva obsessis omnino dependent: nam *spiritus animales*, ipsorum *nervorum*, *fibrarumque* appendicum hospites, inordinate explosi, totam cordis compagem immaniter succuti, & locomoveri cogunt; interea dum cordis integra moles eo ritu agitur, non raro proprios *systoles & diastoles* motus satis rectè perficit, prout in nonnullis observavi, quibus urgente tali cordis succussione, *pulsus ordinatus*, & laudabilis fuit.

6. *Febres erratica*, necnon *subitanea caloris ac frigoris* in variis partibus ^{Febres} corporis *suffusiones*, scorbuto inveterato supervenire solent: *priorum* ratio ^{vaga} est, quod materia extranea, sæpe cum succo nutritio sanguini illata, quin etiam ipse succus alibilis degener factus, quatenus non rite cum sanguine miscibilis, effervescentias ejus extemporaneas concitant: interea febris typum regularem observans, istam ob causam excitari solita scorbuticis raro contingit; quia *sanguis falsugineor*, licet incendio febrili correptus, haud diu, neque multum, saltem non æquabiliter deflagrat: Quoad *caloris ac frigoris suffusiones* subitaneas, illæ quidem aliquatenus propter *nervosi generis affectus* inferri videntur: quippe cum *nervi ac propages*, *surculique nervei*, *vasa sanguifera* in plerisque corporis partibus amplectuntur & varie circumligant, in istum fortassis usum, uti juxta passionum impetus, aliasque naturæ exigentias, sanguinis cursus, velut stimulus, & frænis urgeatur, coërceaturque: verisimile est, quod cum à *labe scorbutica* regiminis animalis œconomia pervertitur, plerisque *nervos* & *fibras eorum appendices* huc illuc protensas, *spasmos* sive motus convulsivos passim inire; propter eorum à *ταξίας* etiam *arteria*, & *vene ανωμαλίας* contrahuntur; proinde ut sanguis in has partes plus debito compellatur, ac ab istis nimis exulet, unde *caloris & frigoris* ejusmodi inordinationes procedunt.

7. *Sudores copiosi*, præsertim *nocturni*, scorbuticis quibusdam perquam ^{Sudores} molesti esse solent; cujus ratio est, quod cum succus nutritius in ^{nocturni} *mas-* ^{sa-} *sam sanguineam* quotidie illatus, propter hujus *dyscrasiam*, & illius *impuritatem*.

impuritatem ac sordes, minime assimilatur: à sanguine rejectus, sub sudoris forma amandatur. Quod vero liquor nutritius inter assimilandum degener factus, febrem intermittentem non more suo producat, in causa est *sanguinis intemperies saluginea*, qui propterea deflagrationibus periodicis minus habilis existit: hujusmodi sudatio immodica in *scorbuto* febris diuturnæ, aliisque morbis chronicis superinducto potissimum contingit, ubi nimirum liquor nutritius sanguinis assimilantis, magis quam viscerum coquentium culpâ pervertitur.

Vrina lixivialis.

8. In *scorbuto*, certiori quam in aliis affectibus, diagnosi *matulam* consulimus: nam si absque febre, aut *ictero*, *urina* intense *rubicunda*, & quasi *lixivialis* apparet, istius morbi hoc *signum indubitatum* pronunciamus. Enimvero dum latex serosus cum sale & sulphure solutis aliquamdiu circulatur, particulae salinae, & sulphureae eodem incoctae tincturam valde saturatam, & velut lixiviale impertunt: quod etiam talis *urina contentis*, quæ in lotio refrigerato ad fundum præcipitantur, plurimum abundat, particulis *succi nutritii* degeneris cum sero abreptis omnino debetur. Sed tamen *urina scorbuticorum* sæpe variant; aliquando namque *illa citrini coloris*, cum *cremore innatante*, aut *vitri parietibus affixo* apparent; unde sumitur indicium, sanguinem particulis salinis plusquam sulphureis abundare: Equidem si talis *urina* ad ignem exhalet, residua salina in subdupla liquoris quantitate remanebit: Porro interdum *agrotantium urina* de hoc, vel illo statu in contrarium mutantur, ut quæ hodie *rubicunda*, aut *citrina* sit, cras *limpida & tenuis* in copia ingenti excernatur: Cujusmodi lotium, siquidem constat haud diu cum sanguine circulatum fuisse (quia nullam ab eo tincturam suscipit) provenire statui-
mus à *sanguinis & succi nervosi recrementis aquosis*, partim intra *lymphaductus* contentis, partim intra *poros & meatus solidarum partium* depositis; quæ cum ad plenitudinem aggeruntur, fluore oborto, è receptaculis suis ubique exundant, inque massam sanguineam irruentia, exinde statim per renes amandantur.

Sputatio copiosa & oris affectiones ulcerosa.

9. Huic morbo ingravescenti supervenit *sputatio copiosa*, & plerumque *gingivarum sanguinolentia*, dein earum *flacciditas*, ac tandem *putrefactio*, quam *dentium erosio*, *vacillatio*, aut *casus* cum *oris foetore* comitari solent: Quorum ratio ut melius constet, imprimis advertendum est, circa partes oris peculiare quosdam *ductus*, nempe *salivales*, quibus serosi humores copiose excernantur, constitui: isti à variis glandulis, nempe *parotidibus*, *maxillaribus* & *sublingualibus* exorti, maxima ex parte circa *gingivas*, aut prope ipsas terminantur: horum munus constans & ordinarium est, salivam propter usus quosdam necessarios in cavitatem oris deponere. Præterea tamen observare est, humores superfluos, quin & vitiosos, crassiores forsitan quàm ut per *sudorem*, *urinam*, aliasve vias à sanguine secernantur, hac via foras amandari. *Argentum vivum* salibus subactum, & deinde *intus assumptum*, aut *corpori illitum*, à salinis corporis nostri particulis minutissime dissolvitur, iisque involutum penitissime immiscetur: hujusmodi *salinum & Mercurii concretiones*, per omnes humores, inque omnes totius corporis partes diffusas, cum natura, siquidem molestiam pariunt, expellere

pellere nititur, illarum excretionem per hæc oris emunctoria optime, & quidem facillime molitur: Etenim *sanguis*, & forsan aliquatenus *liquor nervosus*, recrementis istis mercurio-salinis onusti, eadem omni modo excutere satagunt; quæ tamen, cum crassiora fixioraque sunt, quam ut per *diaphoresin* exhalent exudentve, aut à renum fermento præcipitata per *urinam* amendantur; illa interdum arteriarum oscula *intestinis* inserta *perrumpentia aliquatenus* per alvum excluduntur; attamen istius pharmaci particulæ sero *obvoluta* promptissime in prædictis glandulis, aliisque ad os & gulam spectantibus depositæ, per salivationem uberius excitatam effluunt; quo effluxu gingivas, aliasque oris partes ulcerari, atque dentes cum foetore oris vacillare contingit: cæterum hujusmodi *salivatio* interdum sine *mercurio* in *februm male* judicatarum *declinatione*, *criseos loco* sponte succedit; atque humor excernendus non tantum apertioribus *ductuum salivalium* foraminibus, sed & *arteriarum osculis* ubique confitis exudans, frustra albicante oris cavitatem oblinat: Par equidem ratio *symptomatum* ejusmodi in *scorbuto* accidentium reddi debet: quandoquidem enim in sanguine depravato, *salis* ac *sulphuris enormium* recrementa plura & crassiora congeruntur, quàm ut diaphoresi, vel per urinam aut sedem satis excerni possint, ad *oris emunctoria*, quibus saliora sanguinis purgamenta exire solent, deferuntur: *salsamenta* ista sero diluta, non solum è *vasis salivalibus* exundantia sputationem copiosam creant, sed etiam per *arterias* advecta; molles & spongiosas gingivarum carnes subeunt, quæ primo, poris earum sanguine ichoroso oppletis, intumescunt; postea tamen ichore salso à sanguine abscedente, & continuo excreto, gingivarum caro propter laudabilis nutrimenti defectum flaccescit, dentes pene nudatos relinquens: porro à diuturno materiæ plane corrosivæ affluxu gingivarum caro corrumpitur, ut dentes stabilire nequeat, quin hi, alveolis dissolutis, laxantur, aut decidunt; atque ob particulas salino-sulphureas, partim humoris excreti, partimque gingivarum putrescentium, continuo expiratas, *foetor oris graveolens* excitatur.

10. *Maculae in cruribus*, aliisque partibus corporis erumpentes *scorbuti Macula* *signum pathognomonicum* habentur: hæc quandoque latiores, nummi de-
narii, non raro item solidi aream exæquant; interdum cutis ad magnitu-
dinem manus, aut supra in parte quadam sugillari videtur: porro *macula*
istæ diversicolores, scilicet modo *citrina*, modo *obfusca*, modo *purpurea*, *livi-*
da aut *nigra* apparent: porro quibusdam *exanthemata* varie extumescencia,
scilicet modo lævia, modo cum cute aspera, & quasi crusta, aut squamis
obducta in his aut istis membris vel in toto corpore erumpunt: inter *ma-*
culas & *exanthemata*, sive *tumida* & *aqualia*, sive *aspera* fuerint, hoc discri-
men in genere annotetur, nempe quod hæc materiam sanguini minus con-
gruam continent, quare à massa ejus in circuitu secreta in cute defiguntur;
nec tamen eadem prorsus à sanguine derelinquuntur, quin sanguis per-
transiens particulas subinde alias, novasque apponit: quo fit ut materia
extravasata, à continuo sanguinis appulsu vel denuo resorbeatur, vel sub-
tiliata foras exhalet (licet interdum partim hac via, partim illa res aga-
tur) vel denique materies ista suppurata in abscessus transit. Porro *exanthe-*

macula cujusque fere generis, non tantum in *scorbuto*, sed in plerisque aliis affectibus, immo si quando sanguis propter occasiones aliquas immodice ebullit, passim eveniunt. At vero *macula* sunt portiones à sanguine secretæ, & ab eodem prorsus derelictæ, adeo ut nihil illis cum sanguine circulato deinceps commercii fuerit; quare nec in molem accrescunt, nec suppurantur, nec facile evaporant: *maculae citrinæ* aut *obfuscae* videntur esse bilis flavæ aut atræ portiones quædam è sanguine in cutim suffusæ: quoad *stigmata* vero nigra aut purpurea advertere est eadem in nullis præterea affectibus, nisi in *febre pestilentiali*, *lue venerea*, & *scorbuto excitari*: in peste & febribus malignis videntur esse *sanguinis syderati*, & velut *venæ* affecti partes quædam rejectæ, quibus semper *malignitas*, & *contagium* adjunguntur, prout alibi fufius ostendimus: in *lue venerea* & *scorbuto*, etsi non tanta malignitas reperiatur, ut spiritus sanguinis valde mortificentur, ejusque liquor syderationes majores ineat, tamen suspicari fas sit, quod in utroque morbo ingravescente, *sanguis* aliquatenus *corrumpi* & *coagulari* aptus, in grumos minores concreseat; cujusmodi sanguinis concretiones arteriarum osculis extrusæ, in cute defiguntur, & juxta quod portiones istæ majores aut minores fuerint, & cruoris plus aut minus corrupti participant, etiam *macula* quoad *magnitudinem* & *colorem* insigniuntur.

Alvi fluxus.

11. *Alvi fluxus* & *diarrhœa*, in *scorbuto* satis frequenter accidunt, in tantum ut faeces alvi, quæ modo liquidæ sunt, modo compactæ & diversicolores, alimenta ingesta in quantitate excedere videantur. Cujusmodi fluxus, licet immodicus apparet, si medicamentorum usu sistitur, statim affecti, ventriculi, & hypochondriorum intumescencia, dyspnœa aut animi deliquio tentari solent. *Diarrhœa scorbuticæ* causa est, partim quod chylus non recte coquitur, neque per vasa lactea cito ac satis effertur; hinc in intestinis stagnans & degener factus foras amandatur: præcipue vero hoc contingit, quod è massa sanguinea impuritates interius admixtæ arteriarum osculis exudant; quapropter excreta interdum ingestis copiosiora existunt.

Vomitus, nausea, &c.

12. Pari ratione, crebro vomitui, rugitui, nausea, & *cardialgia scorbutici* æquè ac *hypochondriaci* obnoxii reperiuntur: quæ quidem symptomata frequenter in hoc morbo accidunt, partim quia *stomachi* tonus labefactatur, ejusque fermentum vitatur, quo fit ut chyli male concocti reliquiæ in pulvem *austera*, *salsam*, *vitriolicam*, aut alias degenerem faceant: præterea tamen *stomachus* male habet, quoniam & sanguinis recrementa interius restagnantia, in sinum ejus suffunduntur.

Dysenteria & hæmorrhagia.

13. Nonnunquam affectus dysenterici, item crebra hæmorrhagia è naribus, *venis sedalibus*, *renibus*, *thorace*, *gingivis*, aliisque locis *scorbuto* inveterato laborantibus succedunt: cujusmodi symptomatum causa est; quod sanguis falsior factus, proptereaque effervesce aptus, vasorum osculis facile erumpit; præcipue vero, quia cum partium solidarum tonus debilitetur, atque fibræ sint valde laxæ, vasorum ora fiunt patentiora, & discontinua, ita ut ex arteriarum extremitatibus in *venarum* oscula transitus non rectè ducat, quin sanguis inter vasorum aperturas interceptus, ibidemque

ibidemque stagnare, & diffuere aptus, qua data via facile erumpit, & se foras proripit.

Hæc sunt *præcipua symptomata*, quæ propter *labem massæ sanguineæ impressam*, & exinde in alias partes immediatè translata, *scorbutus* inferre solet, quorum aliquibus tamen in causæ partem, etiam *liquoris nervosi* depravatio accedit. Jam proximè consideremus hujus morbi effectus, & *accidentia*, quæ ferè tantum, aut potissimum *succi nervosi* culpâ excitari solent.

CAPUT IV.

Symptomata & accidentia quæ in scorbuto, propter labem cerebro & nervoso generi impressam exoriri solent.

1. **S**Uprà innuimus, *ingravescente scorbuto*, *liquorem cerebri & nervosi* appendicis irriguum, solito *tenuiorem & pauperiorem* evadere: quo fit ut pleræque functiones animales præpeditè admodum ac minus vegete exercentur; hinc potentia locomotiva plurimum vacillat, ut affectu otium, & secessum amantes, corporis exercitia, & labores devitent, penâ quævis ægrè suscipiant, eaque statim delassati remittant. Novi quibus tota *anima sensitiva* debito exilior, & quasi corpori impar facta videbatur, adeo ut ægri se nec ambulare, nec stare posse credentes, lecto excitari, aut exurgere omnino recusarent; cum tamen nulla evidens causa impediret, quin sua munera satis exequi valerent: porro tales utut prius ingeniosi, etiam animi labores, & studia abhorrentes, & plane nihil agendo vitam conterere affectant.

Puillanimitas & totius corporis languor.

2. In *scorbuto* inveterato *succus nervosus* à crasi spirituo-salina versus *acetosam* declinat; hinc, prout alibi ostendimus, *melancholia*, *animi fluctuatio*, *propositi inconstantia*, & *crebra mutatio* procedunt: porro cum fibræ nervæ à tali humore influo perpetuè irritentur, hinc *leviores spasmi*, *contractura*, & *dolores vagi* aliquatenus eveniunt: At vero maximum liquoris nervosi vitium esse solet, quod sordibus, & fæculentiis refertus, particulas heterogeneas, & regimini animali diversimode infestas contineat: quapropter affectus sæpe graviores, & horrendi scorbuticis contingunt; cujusmodi sunt symptomata sequentia.

Melancholia.

3. *Affectus paralytici*, scil. *impotentia*, aut *resolutio* unius, aut plurium membrorum, item *stupor*, & *formicationis sensus* scorbuto ingravescenti crebro superveniunt: cujusmodi tamen symptomata, ut plurimum non sunt valde fixa & permanentia, verum modo cessant, aut remittunt, mox repetunt, aut intenduntur. Scorbutica paralytis potissimum ob tria causarum genera excitari solet, quæ scilicet modò conjunctim, modo divisim hunc morbum producant. 1. Etenim *membrum debilitas* aut *resolutio* contingit, quia succo nervoso depauperato, spirituum animalium, quibus membra

Paralytis scorbutica. Ob tria causarum genera.

quævis actuentur, penus sive copia sufficiens desideratur: Hinc valetudinariis, tanquam senio confectis, circa crura & pedes, aliasque interdum partes extremas, ad quas spirituum influxus haud satis ubertim pertingit, facultas locomotiva vacillat: postea forsân, cum major spirituum affluxus membro affecto confertur, ac interim alibi deficit, morbus cessat, aut aliò transfertur. 2. Interdum spiritus animales, etsi copiosè satis in partes suppeditantur, tamen particulis heterogeneis, & quasi *narcoticis*, cum succo nervoso illatis inficiuntur; ita ut quasi ligati, & semiobrutii, nixus explosivos vegete satis inire nequeunt: hinc non solum impotentia *facultatis motiva*, verum & *sensitiva* depravatio quædam, scilicet *stupor* & *formicationis sensus* oriuntur: quippe dum spiritus animales copula incongrua aggravantur, eorum irradiatio haud aliter, quàm solis radiorum nebulosum aërem pertranseuntium, non nisi refracte & impeditè peragitur. 3. Licet spiritus animales uberi satis copia dispensentur, sintque narcosi quavis immunes, & liberi, sæpe tamen illorum viæ obstruuntur, ut intra membra quædam, commercia spirituum influorum, & insitorum commode peragi nequeant; namque interdum accidit, particulas crassiores, & terrestres nervorum corpora cum succo irriguo subire, quæ dein alicubi circa plexus nerveos, aliosque anfractus plenius aggestæ, ductus in tantum infarciunt, ut spirituum in hoc aut illud membrum irradiatio prorsus inhibeatur. Ita novi in aliquibus manum, aut pedem, quin & brachium aut femur, reliquo corpore valente, penitus resoluta evasisse.

Dolores,
quorum
varia sũ
species.

4. *A simili causa*, scilicet fæculentiis scorbuticis in nervorum corpora delapsis, etiam dolores, qui frequentissimum hujus morbi symptoma habentur, aliquatenus procedunt; attamen cum varii sint generis, etiam propter alias præterea causas oriuntur. Enimvero *dolores scorbutici* sunt vel *leviores, incerti ac cito transeuntes*, qui interdum à flatu membranas distendente, quandoque etiam à materia salsa, vel acri, modo à sanguine, modo etiam à liquore nervoso in partes nerveas suffuso dependent; cujusmodi materies, quatenus fibris nerveis improporcionata, eas vellicat, ac in corrugationes irritat, dolorifica evadit: in quantum vero eadem vel à sero affluente cito eluitur, vel à calore dissipatur, sensatio molesta à tali causa illata facilius dimovetur. Vel secundo *dolores scorbutici graviores* sunt, plurimum *acuti, difficulter mobiles*; cujusmodi item, vel sunt *fixi & determinati* ad particularem quendam locum, aut vagi, molestiam utut gravissimam ab uno loco subinde in alium transferentes; prout cernitur in *arthritide vaga, scorbutica & rheumatismo*, de quibus infra speciatim differemus: interim dolores fixi, & diu permanentes, in variis partibus, præcipuè vero in *ventre, lumbis, cruribus, sterno, ac capite* excitari solent: Operæ pretium videtur *pathologiam* ad singula hæc loca pertinentem breviter describere.

1. *Dolor ventris scorbutico* adeo familiaris est, ut juxta *idioma Germanicum*, exinde nomen acceperit. Hoc symptoma nonnullos affectos, in mitiori licet gradu, ferè continuo affligit; cui alvus modo soluta, modo summe astricta adjungi solet: quorum ratio esse videtur, quod cum & sanguis,

& *succus nervosus* impuritatibus scatent, tum *arteria*, tum *nervi* materiae excrementitiae copiam versus alvi cloacam deferunt, quæ circa *mesenterii*, aut *intestinorum* tunicas defixa, fibras nerveas perpetuo vellicando, dolores constantes ciet. Cæterum vero in quibusdam scorbuticis dolorum valde acutorum paroxysmi, tanquam *affectiones colicae*, frequenter eveniunt, qui per plures dies, immo interdum septimanas protracti, laborantes miserimè excruciant: nimirum hi, præ doloris atrocitate viscera quasi divelli, & dilacerari sentiunt: tormenta hæc vix ullis remediis nisi generosioribus opiat, compesci solent; & quamprimum hypnoticorum virtus absumitur, cum solita atrocitate repetunt; *paroxysmo* vero diutius persistente, cruciatus sæpenumero in *lumbos* & *dorsum* propagantur, & exinde demum in membra totius corporis diffunduntur: cujusmodi affectioni non raro *paralysis* succedit. Quod autem spectat ad *colicæ scorbuticæ* causam, haud probabile est, eam oriri ab acri materia intra *cavitates intestinorum* deposita, nec etiam ab humore quopiam simplici, utut retro, illorum *tunicis* impacto: hic etenim brevi discutiatur, aut in abscessum transit; porro iste enematum, aut purgantium usu facile exterminatur. Revera atrociam isthæc *ventris tormina*, non ob aliam causam quam à *salium* (qui diversæ sunt indolis) simul congregantium mutua lucta, & effervescencia, quo quidem fibræ nerveæ ab invicem divellantur & quasi dilacerentur, provenire possunt. Enimvero supponere licet, *succi nervosi* recrementa quædam *acetosa*, fragmatis vitriolici æmula, circa *mesenterii plexus*, aliasve istius regionis partes nerveas copiosè aggesta, quibus dein à *sanguine arterioso* effervescente colluvies serosa, *salis fixi* & velut *lixivialis* particulis abunde referta advenit, cumque iis turgescens, dolores velut lancinantes producit. *Semini morbi* prioris mineram è *capite* nervorum ductu in imum ventrem descendere, hinc arguere licet, in quantum cephalalgia inmanes, necnon vertigo, & scotomia ejusmodi colicam sæpissimè præcedunt, eique non raro succedunt: Porro è *massa sanguinea* particulas *salis fixi*, quasi *deliquium passas*, abunde suppeditari, hinc constat, quoniam urgente hujus morbi paroxysmo, ægrotantium *urina* coloris saturati, & sale plurimum refertæ, quasi *lixiviales* apparent, earumque superficies sæpenumero, instar caudæ pavonis, diversis coloribus variegatur: quamprimum vero morbus declinare incipit, *urina* melius habet, atque hinc convalescentiæ spes & signa desumuntur. Quod autem *ventris affectio* sæpenumero in *lumbos* propagetur, ratio est, quoniam *nervi lumbares* & *mesenterici* intimè communicant, ac pluribus in locis mutuo inosculantur; quare cum materies dolorifica in horum ductibus superabundat, in vicinos illorum processus facile transit: deinde autem, quod morbo ingravescente, dolores per totum corpus diffusi, singula ferè membra ac artus affligunt, ratio est, quia cum uberior *semini morbi* penus in *capite* progignitur, quam ut totus in nervorum imprimis affectorum, scilicet *pars vagi* & *intercostalis* caudices, derivari possit; *pars ejus*, aliorum insuper nervorum etiam *spinalis medullæ* corpora subiens, in plurimas totius corporis partes mineram morbificam, *salis acetosi* participem explicat; quæ ubique *salis fixi*, è *massa sanguinea*

2.

Dolores
quasi
colici.Eorum
causa.

accessu ἀλγυματώδης evadit: denique postquam nervis unà plurimis materia incongrua, scil. post mutuas humorum effervescentias residua, obsessis, & valde repletis, spirituum copia profligatur, emanationum viæ obstruuntur, eorumque mutua commercia abrumpuntur, nihil mirum est si *diuturni dolores* ultimo in *paralysin* terminantur. Nec tantum in *medio ventre*, ubi circa *mesenterii plexum* causa morbifica subsistere videtur, sed in aliis circumcirca locis dolores, colicis haud inferiores, exoriri solent. Novi *virginem nobilem cruciatibus acerrimis* prope os pubis, suprà mensis spatium durantibus, & pro data occasione repetere solitis, absque ulla *calculi*, aut *ulceris* circa vias urinarias suspitione obnoxiam fuisse: Cujusmodi affectionem à materia morbida, *plexibus nerveis* in *hypogastrio* confitis impacta, dependere arbitramur. Porro familiare est *scorbuticis*, in *hypochondrio*, modo *dextro*, modo *sinistro*, modo circa *ventriculi regionem*, dolorum valde atrocium paroxysmos experiri: quorum causas in *plexibus nerveis* ad viscera ibidem loci consita pertinentibus, latere putamus.

In lumbis & dorso. 2. Dolores *scorbuti* interdum *lumbos*, quin & *dorsi regionem*, modo summam, modo imam; absque prævio abdominis affectu, vel nephritidis culpa infestare solent. Novi plures à tali ægritudine decumbentes, aliquot dies & noctes de cruciatu intolerabili perpetuò conquestos: Cujusmodi *pathematis causam*, in liquoris nervosi recrementa acetosa, istarum partium membranarum & tendinibus suffusa, ac dein *salsamenti sanguinei* accessu in effervescentiam concita, referre visum est.

In pectore & pleura. 3. Propter ejusmodi *salium conjugia* membranarum præcordia investientibus affixa, dolores circa *pectoris regionem* perquam molesti, & non facile mobiles crebro inducuntur; hinc *pleuritis notha* adeo frequens *scorbuti* symptoma est. Novi plures *scorbuticos*, dolore molestissimo subter *sternum* excitato, perquam diu vexatos, ut in quibusdam ita affectis nihil minus quam *abscessum* in *mediastino* latentem suspicarer; cum revera symptoma istud tantum à materia heterogenea, illuc partim à *nervis*, partimque ab *arteriis* allata, & membranarum affixa, ibidemque effervescente penderet: quod & eventus sæpe comprobavit; nam ægotantes diuturno remediorum anti-scorbuticorum usu liberabantur.

In capite. 4. Hactenus præcipuas *dolorum intermedias corporis partes* infestantium species recensuimus. Cæterum in *scorbuto* non minus molestiæ, circa *partes extremas*, scilicet *caput* & *crura*, sequitur. Quoad prius, *cephalalgia* morbo isti tam raro deest, ut multi potissimum hoc affectu virus *scorbuticum* luant; cujus nempe mali paroxysmis gravissimis longo tempore protractis, & crebra vice repetitis, obnoxii fiunt. Hujus causam unicuique obvium est, humoribus in meningis suffusis ascribere; quod etiam *αὐτοψία* comprobavit. Nam in quorundam defunctorum capitibus apertis, *utrasque membranas coalitas*, & *tuberculis*, ac *tumoribus scirrhis* per totum obsitas vidi. Cujusmodi *tumores* & *concretiones*, à *gemini humoris* dolorifici, post crebras effervescentias, *mutuis coagulationibus* exoriri videntur.

In cruribus. 5. Nec quidem aliter statuendum erit circa dolores, ægotantium *crura* & *tibias*, nocturno præsertim tempore, gravissimè molestantes: plures etenim

etenim *scorbuto inveterato* laborantes, quamprimum lecto incalescunt, circa suras & femora, atque alias interdum partes, cruciatus intolerabiles pati solent, ita ut inclament, carnes suas, velut canum morsibus, aut laniena corrodere, ac dilacerari: *Tortura hæc*, si lecto eximantur, paulo remissius habet; secus affecti, per totas fere noctes miserrime excruciantur. In hoc casu nihil aptius concipi potest, quam *succi nervosi recrementa acetosa in tibiis*, utpote in loco maxime declivi sitas, decumbere, earumque membranis copiose affigi, quibus à *sanguine*, propter lecti calorem, insignius rarefacto, & agitato, dum *reiectione salina* accedunt, cumque iis, pro *salium more*, fermentescunt, propterea quidem à mutua particularum diversi generis *lucta & effervescencia*, fibræ nerveæ supra modum vellicatæ, & divulsæ, *corrugationes* valde *dolorificas* ineunt; nec quidem citius *ἀλγύματα* hæc cessant, aut remittunt, quàm particulae tunc aggestæ aut evāporant, aut mutua lucta subactæ & attritæ ab effervescencia conquiescunt; subinde vero intra breve spatium, utriusque materiæ penus recens in novum paroxysmum deponitur. Propter huiusmodi *salium diversi generis*, & ab humore duplici prodeuntium *ὀξυγίας*, mutuamque effervescenciam, etiam *arthritidis vaga*, *rheumatismus*, & quidam alii affectus, quos merito ad *conjunctas sanguinis & succi nervosi dyscrasias*, & velut in malo confœderationes referimus, producuntur. Porro in eadem classe *dolorum scorbuticorum* species quædam modo tractatæ poni debuerant: attamen quia doloribus aliis, à *singulari succi nervosi aut sanguinis vitio* oriundis affines sunt, idcirco affectionum *ἀλγύματ' ὅδ' αὖ* theorias diversimodas hic simul conjunximus.

In *scorbuto*, prout *symptomatum diversi generis confluxus* occurrit, ita & materies morbifica multiplex, & variæ indolis progignitur: scilicet particulae heterogenæ *cerebrum & nervosum genus* cum succo irriguo subeuntes modo sunt *narcotica & paralyseos*, modo *salina & dolorum parentes* (uti dictum est) quandoque etiam *nitrosulphurea & explosiva*, à quibus *affectiones spasmodica* oriuntur: Enimvero propter huiusmodi particulas in *cerebro* aggestas, *vertigines*, *scotomia*, ac interdum *insulcus* quasi *comitiales scorbuticis* contingunt: A tali causa, *genus nervosum* occupante, in *visceribus & membris motus convulsivi*, *tremores*, *succussiones*, & non raro *contractiones horrendæ* succedunt. De *convulsionum natura*, *differentiis*, & *causis* supra satis fuse differuimus. Porro *huius affectionis casus* quosdam admirandos, à *labe scorbutica* oriundos, plene descripsimus, ut non opus videatur super hac re jam plura differere; namque *hypothesis* superius tradita quibusvis *scorbuto* symptomatis spasmodicis facillime accommodatur.

6. *Scorbuto inveterato* laborantes *vertigini* ut plurimum valde obnoxii *vertigines* fiunt: super hoc affectu, uti & de plerisque aliis cephalicis, *disquisitiones speciales*, aliquando forsan publici juris faciendas instituimus. Interim hic verbo annotetur, *symptoma istud* oriri, eo quod *spiritus animales*, de solitis expansionum suarum viis aliquatenus pervertuntur; nempe statas series, & ordines vel *impediti*, vel *alio propulsi*, abrumperere coguntur: hæc, uti in aliis casibus, ita præsertim in *scorbuto*, propter duas potissimum causas, nempe alteram, aut simul utramque fieri contingunt; scilicet vel quia *cerebri meatibus*

meatibus & poris quibusdam ab hospite extraneo occupatis, spirituum commeatus alicubi obstruitur; vel secundo spirituum manipuli quidam copula heterogenea onusti, aut pone reliquos subsistere, vel tractibus suis excedere coguntur: In hoc morbo, siquidem à sanguine valde impuro liquor cerebro instillatus plurimas faculentias secum refert, qui secus fiat, quin particulae heterogeneae cerebri poros passim infarciant, atque spiritibus animalibus accrescendo, eos aggravent, aut in explosiones adigant?

Somnolentia.

7. Propter similem fere causam, *somnolentia*, & torpor insignis scorbuticis frequenter accidunt, in quantum scilicet *spiritus animales* particulis vel *aquosis* aut *narcoticis* onusti, ac plurimum aggravati, intra *cerebrum*, etiam valde *obstructum*, motus pernices & expeditos non facile ineunt, neque functionum suarum actus & exercitia diu continuant, quin succumbere, ac otio, & quieti *indulgere amant*. Porro huiusmodi affectus quandoque à *spirituum* animalium defectu & penuria excitatur; etenim à sanguine plurimum vitiato, & quasi effæto, liquor non nisi tenuis, & vigoris omnis fere expers, *cerebro* & *nervoso* generi suppeditatur: à tali *νεκρῶσι* in moribundis *lethargum* excitatum novi; quo scilicet affecti, licet somno continuo indulgere viderentur, interpellati tamen, illico adstantes noscere, & affatis quibusvis respondere solebant; spirituum vero animalium copia fatiscente, diu evigilare, nec ad colloquia longiora attendere valebant. Tales demum cum somno perpetuo obrutos aperui, *cerebrum* satis exsiccum, ac *hydrope*, aut colluvie serosa, quibus *lethargici* plerunque afficiuntur, prorsus immune deprehendi.

Et vigilia.

Interdum vero è contra, *scorbutici* quidam *vigilia* fere constanti molestantur. Cujusmodi symptoma aliquando ab *animi affectibus*, dolore, *pathematis convulsivis*, *leipothymias metu*, *passionibus cordis*, etiam à *stomachi*, aliorumque viscerum perturbationibus procedit; in quantum scilicet ob spiritus in quapiam *anima sensitiva* parte vehementius commotos, *tota* eorum *hypostasis* à quiete, sive statu tranquillo ineundo detinetur. Novi autem quosdam *labe scorbutica* tactos, qui licet dolorum, aut spasmodorum immunes fuerint, etiam animi affectu quovis immodico liberi, per plures tamen septimanas dies & noctes prorsus *vigiles* duxerunt; ac sæpe, *opiat* validioribus licet assumptis, ne tantillum somni capeßere potuerunt: Interim ac si somno minime carerent, sine capitis gravitate, absque sensuum aut mentis torpore, usque vegeti, atque ad labores obeundos satis expediti perstiterunt. *Hujus ratio videtur esse*, quod interdum una cum *succo nervoso*, particulae quaedam *nitro-salina*, naturae scilicet efferae & irrequietae, (cujusmodi sunt effluvia ab *aqua forti*, aut *spiritu nitri* decedentia) spiritibus accrescentes, eos perpetim agitari, ac indefinenter in motu esse cogunt: quemadmodum enim vapores ab *aquis stygiis* emanantes, nunquam prorsus figuntur, aut quiescunt; ita particulae heterogeneae, quae istiusmodi sunt indolis, spiritibus *cerebri* incolis adhærentes, eos fere nunquam otari, aut somno indulgere sinunt. Hæc sunt præcipua symptomata, quæ in *regimine animali*, propter *scorbuticam* labem liquori *cerebri*, & *nervorum* irriguo impressam excitari solent; quibus præmittuntur illa, quæ *sanguinis* à recta crasi degeneris vitio contingunt. Quod spectat ad magnos istos,

& plane *Herculeos morbos*, nempe *apoplexia*, & *epilepsia* insultus, qui interdum scorbuticis accidunt: in hujusmodi casibus, prior affectio quasi alteri digniori maritata, nomen suum amittit, ac in illius *pathologiam*, velut *prosapiam* transit. Ultimo inquiramus quæ sunt *scorbuti symptomata*, propter *conjunctas sanguinis*, & *succi nervosi dyscrasias*, & veluti in malo *confederationes* repullulantia.

CAPUT V.

De scorbuti symptomatis, quæ propter conjunctas sanguinis & succi nervosi dyscrasias oriuntur.

IN hoc censu imprimis collocetur *atrophia scorbutica*: qui enim hoc morbo diutius laborarunt, absque notabili *pulmonum* labe, aut *phthiſeos* suspicionem, sæpe in *marasmm* incidunt, ita ut carnes prorsus decidant, ac cutis valde flaccescens vix ossibus cohæreat. Cujus causa non tantum *sanguinis* à recta crasi degeneris culpæ attribui debet; namque hic, utut depravatus, aliqualem succi nutritii portionem plerumque assimilât, partibusque enutriendis apponit: at vero, si quidem *liquor nervosus* etiam male habet, facultas nutritiva omnino inhibetur; quin *hujus defectu*, aut *vitio*, nutrimentum à *sanguine* elaboratum prorsus infœcundum ac inutile existit: Quo munere circa *nutritionem*, uterque *liquor*, scilicet *sanguineus*, & *nervosus* defunguntur, alibi ostendimus: ex *hypothesi ista*, quam rationes satis probabiles astruere videntur, facile sequetur, *atrophiam scorbuticam* familiarem, à *conjunctis utriusque facultatis nutritivæ anomaliis* pendere. Quatenus enim *sanguis* alimentum non nisi vitiosum suppeditat, atque *liquor nervosus* in eo actuando, assimilandoque delinquit, necesse erit partes solidas victu suo continuo fraudatas emarcescere.

2. *Arthritis scorbutica*, quæ ut plurimum *vaga*, partem modo hanc, modo istam successive, modo simul plures afficit, atque ab una in aliam, vel ab his in illas transfilit, à *duplici seminio*, non secus ac *colica* superius descripta, pendere videtur; attamen modo prorsus inverso. Enimvero supponere licet in hoc morbo, *salis fixi* plures quasi congeries è *massa sanguinea* hic illic circa membra, aut articulos, velut totidem *nidos* disponi; quæ quidem intra totidem distinctas cellulas reconditæ, tanquam *piscium ova*, sive *semen foemininum* maneat; quibus postea *liquoris nervosi recrementis*, velut *semen masculinum* accedant, easque fertiles reddant; nampe in quantum *sales diversa indolis* una commisti valde effervescent; proindeque à mutua particularum lucta & agitatione, membranæ, fibræque nerveæ insigniter vellicatæ, in corrugationes dolorificas aguntur: Revera primam hujus morbi, sicut etiam *arthritidis communis*, mineram à *massa sanguinea* deponi, eamque à *succi nervosi* recrementis actuari,

inde constat, quia cum dolorum insultus in variis partibus simul, aut successive oriuntur, sanguis haud supra modum effervesce, nec fassa-menta sua tunc temporis deliquium passa, copiosius exuere videtur; quippe nec pulsus citatior, neque urina lixivialis evadit. Attamen urgente paroxysmo, acetosa succi nervosi recrementa fluorem pati, arguunt prægressæ ut plurimum cephalalgia, capitis gravedo, aut vertigo, membrorum inquietudines, & non rarò tendinum subsultus, cujusmodi symptomata dolorum insultus sæpe præcedunt, aut comitantur. Huc etiam spectat, quod *liquores acidi* epoti paroxysmos arthriticos accersunt. In *scorbuto*, siquidem utraque minera uberius progignitur, *arthritidis* nidi longe plures jaciuntur, in iisque dolores multo citius pullulant: porro è sanguine valde impuro, *materies salina*, sive *tartarea* non tantum in pedum, aut crurum articulis, sed ubique fere circa membranas, & musculorum interstitia aggeritur; cui etiam à *succo nerveo copula acetosa*, pluribus in locis suffusa, dolorum prolifica existit; dein quatenus utraque minera in materia minus crassa consistit, atque in locis patentibus colligitur, brevi ut plurimum tempore, aut à sero affluente eluitur, aut à calore dissipatur, vel à sanguine resorpta alio transfertur.

3.
Rheuma-
rismus.

3. *Rheumatismus*, prout ab authoribus modernis describitur, scorbuto inveterato crebrò supervenit. Cujusmodi affectio dolores fere in omnibus corporis partibus seriatim excitans, licet *arthritidi vagæ* modo descriptæ similis apparet; tamen ab ea differt, tum respectu dolorum, qui in *rheumatismo* citius transeunt, & crebrius sedem mutant, iisque *febricula*, & partium affectarum *tumor*, & *phlogosis* ut plurimum adjunguntur; tum ratione *causæ conjunctæ*, quæ quidem isti, quæ *colicam scorbuticam* parit, affinis, *arthritidis vagæ* causa inversa est: videtur enim quod in primum hujus morbi apparatus *minera acetosa* à *succo nerveo*, quasi *semen foemininum*, pluribus in locis deponatur; cujusmodi symbolis hic illic varie relictis, dum *sanguis* effervesce *exuvias salinas* copiose rejectas suffundit, statim à mutua particularum dissimilium lucta, & congressu dolores inferuntur. Porro quia sanguinis recrementa in medio suo decursu exposita, motum ejus aliquatenus impediunt: idcirco in parte affecta *tumor* & *phlogosis* inducuntur: dein quia *sanguis* materiam à se modo rejectam denuo resorbet, ac aliò transfert, dolorum ita crebræ *metastases*, ac mutationes contingunt. Hæc affectio peculiarem considerationem mereatur: super eadem hic pauca quædam in genere, quatenus nimirum *scorbuti symptoma* est, annotasse sufficiat.

Hactenus *scorbuti symptomata*, à triplici causarum genere oriunda explicavimus; cujusmodi *pathologia* affectus alios multiplices, ac inter se longe diversos in se continet: de quibus tamen observatu dignum est, quod cum plures morbi ad *cerebrum* & *nervosum genus* pertinentes, qui sæpenumero per se, ac solitarii existunt, etiam *scorbuto* superveniunt; tamen quoad *rationes suas formales*, & quoad *medendi methodum* in his ac illis adhibendam, discrimen insigne occurrit. Enimverò *paralysis*, *vertigo*, *convulsio*, *letbargus*, alique morbi affines, cum per se contingunt, semper à causa fixiori, ac ut plurimum ab insigni *capitis* ac *appendicis nervosi* labe dependent;

ut differ-
unt mor-
bi per se

dependent; cumque *remedia cephalica*, ac in istis morbis tantum appro-^{excitati,}
priata conveniunt, tamen successus haud facile, neque semper votis re-^{scorbuto.}
spondet. Interim pro *sanguinis emendatione*, aut parum curæ impenditur,^{επιγν-}
aut si adhibetur, plerumque incassum cedit: at verò cum *pathemata isthæc* ^{νόμῳ}
à *scorbuto* inducuntur, minoris sunt periculi; atque licet paroxysmos cre-
briores habent, isti tamen facilius transeunt: cæterum *morbi curatio reme-*
diis antiscorbuticis felicius quam *specificis*, & cum *sanguinis* ad debitam
crasin *reductione*, potius quam *cerebri* & *nervosi* generis malis occurrendo,
perficitur. Eadem observatio locum obtinet in *tumoribus*, *ulceribus*, *hydropse*
& multis aliis affectibus à *lue scorbutica* productis, qui, secus ac cum per
se excitantur, *remediis* non nisi *antiscorbuticis* sanantur. Horum ratio est,
quod in *scorbuto*, symptomatum & affectuum plurimorum causa conjuncta
ferè tantum in humoribus, nempe *sanguine* & *succo nerveo*, ac nondum in
partibus solidis, scilicet *visceribus*, *præcordiis*, ac *cerebro* consistit: quare
cum *illorum dyscrasia* multo facilius, quam *horum mala conformationes*
emendantur, ejusdem generis morbi, propter *scorbutum*, quàm per se exci-
tati, certius, ac cum minore negotio curantur. Attamen cum, ægritudine
ista radices altiores agente, partes etiam solidæ principales (prout sæpius
usu venit) noxam contrahunt; videlicet cum *sanguinis* & *succi nervosi* re-
crementa iisdem diutius impacta, tonos lædunt, poros, & meatus infar-
ciunt, & non raro in iis tumores scirrhosos, aut abscessus pariunt; hinc
prædicta symptomata, quamvis labi scorbuticæ ferè tantum imputata, raro
aut nunquam sanationem admittunt; & propter hujusmodi causam in-
vincibilem, demum ipse *scorbutus deploratus* evadit.

CAPUT VI.

Scorbuti prognostica.

CUM in *affectione scorbutica*, simul plura, ac interdum valde tetra, & In scor-
horrenda symptomata urgere soleant, *prognosticon* à medico expecta-^{buto pro-}
tur: immo ipse, quo melius medendi methodum instituat, qualis morbi^{gnosis non}
eventus futurus sit, sedulo perpendat: attamen judicia in hoc casu sint^{sit teme-}
cauta, diu suspensa, ac minimè temeraria: plures enim (uti nostræ ob-
servationi constitit) pro desperatis habiti, convaluerunt. Vidi quos fre-
quens & horrendum *asthma* jamjam suffocare videretur, alios à crebra
leipothymia continuo moribundos, quin & alios aut *paralyse*, aut
paroxysmis convulsivis, aut *colica* gravissima tentatos, intra breve spatium
medicamentorum ope prorsus liberatos: Novi quosdam *scorbuticos* ab *hy-*
dropse per totum corpus intumefactos; alios *atrophia* in extremam maciem
reductos, denuo ad perfectam sanitatem restitutos. Quamvis igitur hoc
morbo laborantes, interdum affectibus summè periculosis urgentur, si
tamen adhuc viscera mediocriter sana, aut saltem non multum vitiata
fuerint; de malis istis, propter meram *scorbuti* labem excitatis, minimè

desperetur : è contra autem quando symptomata minus terribilia apparent , si *hypochondriorum & abdominis* contenta obdura & velut scirrhusa evaserint , aut si *pulmones* corrumpi incœperint, circa morbi sanationem nihil ingens , aut benignum promittatur : In casibus vero nondum deploratis , ubi spes valetudinis recuperandæ relinquitur , aut saltem mortis subitæ metus longe abest , si forsan quæstio fiat , quàm cito, aut tarde , facile , aut difficulter *therapeia* succedat , hujusmodi *criteriis* insistatur.

1. *Scorbutus* uti non statim affectos jugulat, aut versus statum insanabilem præcipitat, ita nec cito, nec facile curatur : etenim morbi causa potissima in *dyscrasia sanguinis* consistens , non multo facilius tollitur, quam *vina*, dum *rancida*, aut *pendula* fiunt, ad debitam crasin restituntur : quare hujus labe correpti per plures menses, ac interdum annos, immo aliquando per totam vitam ejus noxam luunt.

2. *Ægritudo* hæc ab intemperie sanguinis *sulphureo-salina* , sive calidiori, *vini rancidi* æmula, dependens ægrius curatur, quam si eadem à *dyscrasia salino-sulphurea* , sive minus adusta , *vini penduli* æmula, procedat : namque hæc mala sanguinis, aut vini constitutio, in statum à quo decidit, quodammodo rursus evehi ; verum ista in statum, quem transiit, non facile reduci solet.

3. *Scorbutus* *febris* diuturnis, aliisque *morbis chronicis* male curatis superveniens ; aut etiam constitutioni originaliter, vel propter occasiones quasdam valetudinariæ superveniens, difficilioris curationis habetur ; quia nimirum in his casibus , & sanguinis crasis plus vitatur ; non raro item visceribus noxa quædam affigitur. Proximè his, ægre sanantur, qui mala victus ratione, ac imprimis ab assiduo liquorum generosiorum potu, labem hanc cum læso *ventriculi*, aliorumque viscerum tono contraxerunt : attamen qui propter contagium , aëris insalubritatem, navigationem, aut vitam sedentariam scorbutici evadunt, sæpius & cum minori negotio sanitati restituntur.

4. Hic morbus adhuc recens, quamdiu labes fere tantum massa sanguinea inclusa, nondum cerebro ac nervoso generi imprimitur, neque in solidis partibus symptomata durabilia excitavit, non raro sanationem perfectam admittit : sin vero affectio radices altiores agens, in regimen animale propagatur, ibidemque *pathemata spasmodica ac dolorifica* producit, ac insuper virus suum, *macularum & exanthematum* eruptione, *gingivarum & dentium erosione*, aliisque signis pathognomonicis latius prodit, vix unquam radicitus extirpatur ; quin præcipua medicinæ opera, symptomatis maxime urgentibus occurrendo, eorumque incrementa, & extremitates supprimendo, impenditur.

5. Qui scorbuto inveterato laborantes, *medice vivere* recusant, sed male sano appetitui, & in pessima quævis proclivi indulgent, ac insuper in assumendis remediis difficiles ac morosi existunt, medici operam, utut sedulo adhibitam sæpissimè eludunt ; revera ut præstet, eos malo suo genio relinquere, quam medicamenta utilia, hic omnino incassum præscripta, defamare.

6. Quandoquidem, hoc affectu ingravescente, materies morbifica multiplex, & diversimoda, utpote symptomatum varii generis, ac indolis causa progignitur: idcirco remedia non tantum unius generis adhibentur: sed cum *medicina methodus* quædam, licet cum summo judicio præscripta, parum aut nihil versus *therapeiam* profuit, non statim relinquendi sunt ægri, sed medicamenta alia, & subinde alia tententur: Enimvero non eadem omnibus, neque semper eidem personæ conveniunt: In corpore affecto *salium* ac *sulphurum* potestates, & combinationes passim variant; perinde etiam medicamenta minus juvantia aliquoties mutantur, donec in aliquod maximè congruum & juvans inciditur.

7. Quod si non obstante, aut non rectè adhibito remediorum usu, *scorbutus* sensim ingravescent in deteriorem statum indies evehatur, tandem *hydropem*, vel *phthisin* inducit: ab hoc, aut illo morbo proximus in mortem fit transitus; postquam enim sanguis plurimum depravatur, recrementa sua, copiosius demum aggesta, aut *pulmonibus*, aut *imi ventris* visceribus suffundit; proindeque hujus aut illius generis affectus pariter exitiales accersit.

CAPUT VII.

De Scorbuti curatione.

Quod spectat ad *scorbuti therapeiam*, siquidem haud unica & simplex affectio præternaturalis, sed *legio* quædam profliganda est, idcirco medendi methodus *indicationes multiplices*, easque variè *complicatas*, ac *subordinatas* perstringere debet: quas tamen vulgari modo ad tria hæc capita *Indicatio triplex.* referre visum est: nempe ut sint *præservatoria*, quæ morbi *causam*; & *cura-* toria, quæ *morbum ipsum* & *symptoma* ejus respiciunt & tollunt; & denique *vitales*, quæ patientis *robur* ac *vires* tuentur vel restaurant.

Ab ipso curationis initio contra *morbi causam* collimare debemus; hac enim velut radice præcisa, vel avulsa, statim truncus, rami, & fructus emarcescent. Cum itaque ostendimus, *scorbuti causam* in *sanguinis dyscrasia*, scil. aut *sulphureo-salina*, aut *salino-sulphurea* fundari: imprimis danda erit opera, quo melius illa, tum hujus, tum illius indolis, emendetur: in hanc rem, primo impedimenta tollantur, dein ipsa primaria intentio perficietur: propter utrumque scopum remedia à Diætâ, Chirurgia & Pharmacia expetuntur. Quoad Diætâ, specialis victus ratio inferius apponetur; interim ut de reliquis procedamus.

Sanguinis ad debitam crasin per remedia appropriata reductio, propter hæc duo potissimum impeditur; scil. *primò*, quia succi nutritii non nisi vitiosi penus ei continuo infertur; dein *secundò*, quia recrementa in sinu ejus producta, per idoneas cloacas non satis amandantur. Itaque providendum erit, tum ut *chylo* eos negotium in primis viis rectè peragatur, tum ut *recrementa vaporosa* per diaphoresin, *serosa* per renes & lymphæ ductus, *biliosa*

biliosa per cystin felleam, *atrabiliaria* per lienem, atque alia cujusque præterea generis, per propria emunctoria satis expurgentur: dein hisce muniis rectius institutis, *sanguinis dyscrasiam* per medicamenta specifica, ac imprimis sale volatili prædita, reducere nitentur. *Remedia* singulas hasce intentiones respicientia una complicari, ac simul in usum adhiberi debent: quo tamen ritu, ac quibus administrationum modis, adhuc particularius designare oportebit.

Intentio-
nes thera-
peutica.

1. Ut *chylosis* in primis viis rectè perficiatur, curandum erit, ut materiæ excrementitiæ saburra in iis congesta exterminetur, ut fermenta deperdita, aut depravata restituantur, ut meatus & pori quoquomodo infarcti & obstructi referentur. In hos fines *medicamenta cathartica, digestiva & aperientia* destinantur.

2. Excrementa in massa sanguinea collecta, cum per propria emunctoria non satis amendantur, per alias vias maximè idoneas subinde educantur: in hanc rem etiam *cathartica*, ac insuper *diaphoretica, & diuretica* conveniunt.

3. Sanguinis dyscrasia scorbutica emendetur *phlebotomia & remediis specificis*. Quare, ut *indicationis præservatoriæ* res tota in summam redigatur, remedia quæ præcipuas ejus intentiones perficiunt, sint *cathartica, phlebotomia, digestiva, aperientia, diaphoretica, diuretica & antiscorbutica, sive specifica*: Dein quatenus remedia *digestiva*, ac *aperientia* sæpius coincidunt; siquidem utraque particulis *acidis, acribus*, aut *salinis* præcipuè imbuuntur; porro, in quantum ejusmodi pharmaca *diaphoresin*, aut *diuresin* aptè satis movent: idcirco *apparatus pharmaceuticus* intentionibus prædictis requisitus, in angustiores adhuc limites redigi potest: nimirum ut fere tantum constet medicamentis *catharticis, digestivis*, ac *antiscorbuticis*, quibus *phlebotomia* pro data occasione adjicitur: illorum formulas qualdam & præscripta, ac insuper utendi modum, designare incumbit.

CATHARSIS.

Cathar-
sis.

1. *Methodus medendi* scorbuticis ferè quibusvis præscripta, à *catharticis* incipiat: Erenim nisi primæ viæ mundantur, medicamenta in alios quosvis usus destinata, ab illarum sordibus inquinabuntur, quapropter *vomitio* interdum non minus quam *purgatio* conveniat.

Per vo-
mitum.

Si ventriculus (ut crebro assolet) materia *viscida, acescente*, aut *nidorosa* aggravatus, sarcinam impuram nausea aut vomendi nixu sursum ejicere molitur, atque patiens talem evacuationem olim satis robuste ac cum *Æposia* tolerare solebat, nihil vetat, modo vires non sint nimium prostratæ, *pharmacum emeticum* exhibere. Fortioribus, *infusio croci metallorum*, aut *Mercurius vita*, aut *tartarus emeticus Mynsichti*, vel *sulphur antimonii Glauberi* propinetur: qui sunt constitutionis imbecillæ, aut teneris, *vinum scilliticum*, aut *Gillam Theophrasti* assumant; quibus in exigua dosi exhibitis, serum lactis in magna copia superbibant, dein ventriculo ad nauseam repleto, digito, vel penna gutturi immixtis, vomitio facillima provo-

provocatur, & aliquoties pro libitu iterari potest. Hoc vomendi ritu, mera stomachi contenta, à plicis ejus deterfa excernuntur: neque in aliis circumcirca visceribus, aut membranis (prout à stybiatis fieri solet) vellicationes dolorificæ, aut convulsivæ, tum leipothymia cientur. Quibus ventriculus, propter malam digestionem, pituitæ, aliufve materiæ degeneris saburram facilè congerit, præcepi (& sæpius bono cum successu,) ut semel in mense, talem vomitionem utpote tutam, & salubrem proritent.

Ubi vomitio locum non habet, à purgatione incipiatur; saltem posito aliquot dierum interstitio, evacuatio hæc isti succedat. Quod olim de præparatione humorum ab Authoribus passim inculcatur, aut supervacaneum, aut non intellecta sanguinis circulatione, prorsus erroneum esse duco: quin istius intentionis vice, viscerum fermenta restaurantia, & sanguinis crasin alterantia substituantur: interim ut primarum viarum sordes, & liquoris tum sanguinei, tum nervosi superfluitates recrementitiæ amendantur; Purgatio primò lenis & blanda instituat, ac postea juxta patientis tolerantiam, aut semel intra septimanam, aut crebrius vel rarius irritetur; & medicamenti vires juxta primæ doseos successus proportionentur: In hunc finem pilula, potiones, apozemata, electuaria, pulveres, & plures aliæ medicamentorum formulæ præscribi solent,

Si ægrotantis constitutio sit calidior, atque scorbutus in sanguinis dyscrasia adusta, scilicet sulphureo salina, fundari videtur, aloëtica, & diagrydiata quævis vitentur, & temperatiora solum à senna, rhabarbaro, & aliis, quæ sanguinem & humores non exagitant, exhibeantur.

Remedia
indicata
in scorbuto
calidiori.
Pilula.

℞. Folior. senna ℥. j. rhabarb. ℥. vj. epithymi ℥. iij. rad. polypodii qu. rhabarb. Angli. an. sicc. an. ℥. ℞. santali citrini ℥. ij. spica celtica ℥. ℞. salis absynthii ℥. ij. incisa & contusa digerantur in matracio calore arena, cum vini albi, & aq. fumarie an. ℔. j. (vel cum aq. magistralis antiscorbutici nostri ℔. ij.) per duos dies: colatura clara evaporetur lenissimo balnei calore, ad consistentiam mellis, dein adde pulveris foliorum senna, rhabarb. an. ℥. j. ℞. specierum diatrion santalon ℥. j. cremoris tartari ℥. j. ℞. f. massa pilularis. Dosis ℥. ℞. ad ℥. j.

Vel paretur talis infusio, quæ evaporetur leni calore ad consistentiam syrupi, addendo circa finem manna colata, & sacchari albissimi, an. ℥. ij. fiat syrupus. Dosis cochlear j. ad ij. cum vehiculo convenienti.

Vel ejusmodi tinctura ℥. iij. vel vj. pro dosi exhibeantur, addendo cremoris tartari ℥. ℞. & si edulcoratione opus sit, syrupi de pomis ℥. iij.

Vel tinctura præscripta imponantur uvarum corinthiacarum mundatar. ℥. vj. Passula digerantur calidè donec uvæ intumescant, quibus exemptis, liquor ad syrupi consistentiam evaporetur, addendo sacchari & manna colata an. ℥. j. ℞. dein uvæ denuo impositis, medicamentum in vase vitreato probe obturato fervetur.

Dosis cochlear j. vel ij.

Vel tinctura prædicta ad medietatem evaporata adde cassia recentis, pulpa tamari- marindorum cum aqua antiscorbutica extracta, an. ℥. iij. conserva violarum, rosarum. farum damascenarum, an. ℥. ij. pulv. senna compositi majoris ℥. j. rhabarb. pulv. ℥. ℞. cremoris tartari, specier. diatrion. santalon, an. ℥. ij. simul terantur in mortario

mortario lapideo donec redigantur in formam electuarii. Dosis qu. nucis juglandis, plus minus, juxta operationis successum.

Pulvis.

Quibus stomachus nauseabundus, pharmaca nonnisi in exigua quantitate, ac forma eleganti admittit. ℞. Resina scammonii ḡ. iiij. ad viij. cremoris tartari ℥. ss. spica celtica ḡ. vj. misce, f. pulvis, detur in cochleari panatellæ, vel in pilulas formetur.

Cathartica in scorbuto frigidiori.

Qui affectione scorbutica laborantes, frigidioris sunt constitutionis, atque morbus in sanguinis diathesi nitro-sulphurea, vini penduli æmula, fundari videtur, iis cathartica asperiora, & particulis calidioribus prædita exhibeantur.

Pilula.

℞. Pilular. stomach. cum gum. ℥. ij. resina jalap. ḡ. 20. tartari vitriolat. ḡ. 16. olei juniperi ℥. ss. cum s. q. ammoniaci solut. in aq. lumbricor. f. pilula 16. sumantur quatuor pro vice, semel intra septimanam.

℞. Pilular. tartar. Bontii ℥. j. ss. resina jalap. ḡ. 12. salis tartari ℥. ss. cum s. q. syrupi Augustani. f. pilula 12.

Extractum ac syrupus.

℞. Extract. pilular. Ruffi ℥. j. extracti hellebori nigri ℥. j. salis tartari ℥. ss. cum s. q. ammoniaci solut. f. pilula 9. sumantur iiij. pro dosi.

℞. Folior. senna ℥. j. rhabarbari ℥. vj. mechoaca, turbit, gum. an. ℥. ss. fibrarum hellebori nigri ℥. iiij. salis tartari ℥. ij. santali citrini ℥. j. ss. corticis Vvinteran. ℥. ij. incis. & contus. digerantur in vini albi lb. ij per duos dies. f. colatura clara sine expressione, sumatur vel per se ab ℥. v. ad ℥. vj. vel in extractum, aut syrupum, aut electuarium redigatur, prout tinctura superius descripta, addendopulv. arthritici, vel diasenna q. s. &c.

Tinctura.

Vel paretur hujusmodi tinctura, qua detur viris robustis ad cochlear j. vel j ss. ℞. Salis tartari ℥. j. spiritus vini tenuioris lb. j. ss. digerantur donec flavescat: huic à facibus per inclinationem effusa, infunde folior. hellebori nigri in aceto macerat. ℥. j. santali citrini ℥. j. flavedinis aurantii ℥. j. ss. f. digestio clausa & calida per tres dies. Colatura clara destilletur in balneo ad medietatem, liquor residuus ad usum servetur.

Apozema.

℞. Rad. lapathi acut. polypodii qu. urtica urentis, cherefolii, an. ℥. vj. folior. eupatorii, veronica, an. M. j. santal. albi, citrini, an. ℥. j. ss. carthami ℥. j. tartari vini albi ℥. ss. coquantur in aq. fontan. lb. ij. ss. ad medietatem, adde vini Rhennani lb. j. & statim coletur, cui impone senna opt. ℥. ss. rhabarbari ℥. vj. folior. hellebori nigri ℥. ss. flavedinis aurantii ℥. ij. f. infuso clausa & tepida per horas 12. Colatura servetur in vitro occluso. Dosis ℥. v. ad vj.

In promptu hic esset, plures alias cathartorum formulas subicere: verum in his non magna varietas requiritur: è prædictis aut hæc, aut illa, quæ melius conveniunt, exhibeantur; & subinde intra quinque aut sex dies, prout occasio requirit, iterentur. Nimis crebra, & violenta purgatio vires prosternt, viscerum robur valde labefactat, atque morbum interea non tollit.

Phlebotomia.

Post unam aut alteram purgationem, si missio sanguinis indicatur, aut phlebotomia in brachio, aut hirudinum suctu in venis sedalibus celebretur: non multum interest, quæ vena secetur; nec enim salvatella apertio tanti, prout vulgo perhibetur, meriti est. Quod inter Authores valde ambigitur de vena aut jecoraria, aut cephalica, vel alia quavis potiori in scorbuto incidenda

incidenda, à quo sanguinis circulatio innotuit, in nihilum recidit. *Phlebotomia* indicatur à *sanguinis copia*, & *vitiositate*, quem præstat aliquoties in quantitate modica, quàm semel in magna educi: Cum enim liquor sanguineus valde impurus evasit, nullo remediorum genere certius emendatur, quàm crebra & parca extramissione: quippe sanguini veteri corrupto, quoties educitur, recens melior, & defæcator succedit. Interim cautione opus est, ne semel in quantitate nimia subtrahatur; nam penu ejus confertim diminuto, *sanguificatio* labescit, propterea ut *hydrops* aut *cachexia* sequatur.

Præter *catharsin*, & (si opus fuerit,) *phlebotomiam*, plura alius generis remedia, non minus necessaria in scorbuto requiruntur: de quibus tamen ordine præscribendis, statim considerare oportet, utrum *indicationes* solum *præservatoriae* hic locum habeant, ac an non iis *curatoriae* quædam, nempe quæ *symptomata* gravius *urgentia* respiciunt, intercalari debent: Quod si vacat, in *morbi causam*, totam *therapeias* operam impendere, juxta methodum sequentem procedatur: Inferius ostendetur, quali interea *symptomatum* (si forsan occasio exigit) *cura* adhibenda sit.

Itaque si præcipuam medicinæ operam, in *scorbuti causam* imprimis, ac per se eradicandam impendere liceat; propter hunc scopum, insuper *remedia digestiva* & *specifica*, seu *antiscorbutica*, prout modo innuimus, omni tempore, exceptis *purgationis* diebus, usurpentur: quibus interdum, si opus fuerit, *diaphoretica*, aut *diuretica* adjiciantur. Medicamentorum hujusmodi *intentiones* perficientium *formula*, & *præscripta* multiplicia, ac varii generis apud authores passim extant. Libet hic selectiora quædam apponere; quæ quidem juxta *duplicem causam scorbuticam* indolem, nempe sanguinis *dyscrasiam sulphureo-salinam* & *salino-sulphuream*, in duas classes distinguere visum est: & primo, quæ in hoc posteriori affectionis modo conveniunt, ubi nimirum medicamenti incitatione quadam præditis, atque sale volatili plurimum refertis opus est, trademus.

Remedia digestiva, quæ ventriculi fermentum restituant, ejusque ac *Digesti-* aliorum viscerum chylosi inservientium, functiones juvant; atque *an-* *va.* *antiscorbutica*, sive *specifica*, quæ sanguinis dyscrasiam tollunt, aut in eadem compositione junguntur, aut saltem eodem die successivè assumantur.

Inter *medicamenta digestiva* meritò recensentur *tartari cremor*, *chryalli*, *sal. tinctura*, *tartarus vitriolatus*, *chalybeatus*. *Elixir proprietatis*, *mixtura simplex*: Cujusvis horum bis in die exhibiti usus sæpenumero prodest.

Porro *tincturas* & *elixires magistrales*, varii generis, & *digestivas*, & *scorbuto appropriatas*, cum *duobus menstruis* sequentibus facile conficies.

℞. *Spiritus vitrioli rectificati* ℥.vj. *spiritus vini alchalisati* ℥.xvj. *misc* & destilla in retorta vitrea cum ternis cohobis: in vitro probe occluso ad usum serva: *Elixir proprietatis* cum hoc menstruo composito facilius, & melius, quàm vulgari modo paratur.

℞. *Corticis Vvinteran.* *ligni aloës*, *rad. galangæ minoris*, *an.* ℥.ij. *cinnamomi*, *caryophyllor. cubebæ*, *an.* ℥.j. *seminis ameos, nasturtii*, *an.* ℥.℞. *contusis* affunde prædictum menstruum ad supereminentiam trium digitorum: digerantur in ma-

tracio in furno arena per 6. dies. Colatura servetur in vitro occluso. Dosis gutt. 20. plus minus in cochleari vini Canarini, vel aq. appropriata. Exhibeatur bis in die.

℞. Succini albissimi, gummi hedera, caranna, tacamabaca, an. ʒ. j. croci ʒ. ʒ. caryophyllor. nucis moschat. an. ʒ. ij. contus. affunde prædictum menstruum, & s. a. extrahatur tinctura. Dosis gutt. 20. ut supra.

℞. Salis tartari cerulei ʒ. iiij. digerantur in matraccio cum spiritus vini alchalisati lb. j. ad extractionem tinctura: hoc sit aliud menstruum, quo è gumm. aromatis, &c. eodem modo, uti cum priori menstruo, elixyres parabis.

Specificæ,
sive anti-
scorbutica

Dum hujusmodi remedia in dosis perexigua vesperi, & primo mane exhibentur, horis medicis, scilicet octava ante, & quarta p. m. alius generis medicamenta antiscorbutica sumantur, quæ quidem ut plurimum in duplici forma, nempe in solida & liquida, simul capienda præscribere solemus; ita ut solido præmisso, liquidum superbibatur, utriusque variae extant species, & compositionis modi, vid. in forma solida, electuaria, confectioes, pulveres, pilulae & tabulae: in liquida, sunt decocta, infusiones, expressiones, aq. destillatae, vina & cerevisia medicata: Cujusque horum generis medicamenta selectiora quædam proponemus.

ELECTUARIA.

℞. Conserva cochlearia, absynthii Romani, fumaria, an. ʒ. ij. pulv. cort. Vvinterani, rad. angelice, Arian. ʒ. ij. spec. diatrion santal. ʒ. j. lb. pulv. oculor. cancri ʒ. j. salis absynthii ʒ. ij. Cum s. q. syrupi è corticibus citri, f. electuarium.

℞. Conserva folior. cochlearia, beccabunga cum aequali parte sacchari facta an ʒ. iiij. trochiscor. de capparibus, de rhabarbaro, an. ʒ. ij. salis absynthii, cochlearia an. ʒ. j. eboris pulv. corallii calcinat. an. ʒ. j. cum s. q. syrupi à succo cochlearia, f. electuarium.

Præscribere soleo conservas è cortice exteriori limoniorum & aurantior. item è floribus purpureis arboris fraxini, è foliis & floribus cardamines, è radice lapathi acut. & rhabarbari Anglicani, cum aequali parte sacchari parandas, quæ inter se, aut aliis conservis, & speciebus permixta ejusmodi electuaria ingrediuntur.

℞. Conserva flavedinis aurantium, limoniorum, flor. fraxini, an. ʒ. ij. pulv. rad. contrayervæ ʒ. j. lb. galangæ minoris ʒ. lb. rad. Ari ʒ. ij. spec. aromatici rosat. ʒ. j. salis absynthii ʒ. ij. cum s. q. syr. conditura nucis moschat. f. electuarium. Dosis hujusmodi medicamentorum qu. nucis moschat. superbibendo liquorem appropriatum.

Rusticis & pauperioribus, à quibus medicamenta facile parabilia, & minus cara expetuntur, ad hunc modum præscribo. ℞. Folior. cochlearia, beccabunga, an. ʒ. iiij. sacchari albissimi ʒ. viij. simul contundantur in mortario, addendo pulv. cort. Vvinterani ʒ. lb. tartari cum nitro calcinati ʒ. iiij. cum s. q. vini Hispanici, redigantur in electuarium. Dosis qu. nucis juglandis bis in die, superbibendo liquorem appropriatum.

℞. Foliorum cochlearia lb. j. passular. exacinat. sacchari albissimi, an. lb. ʒ. facul. rad. raphani sylvestris ʒ. ij. simul contundantur in mortario, & redigantur in formam electuarii. Dosis qu. nucis juglandis, bis vel ter in die.

CONFECTIO

CONFECTIOES.

℞. Pul. Ari composit. ℥. j. cort. Vvinterani pulv. ℥. ℞. spec. diatrion. santal. trochisc. de capparibus, an. ℥. ij. salis absynthii, cochlearia, an. ℥. j. ℞. flavedinis aurantii condit. ℥. iiij. simul terantur in mortario, dein adde sacchari alb. solut. in s. q. aq. lumbric. ℥. iiij. s. a. f. confectio.

℞. Rad. eryngii, & scorzonera condit. an. ℥. ij. nucum jugland. myrobalan. condit. an. num. ij. electuarii de sassafras, ℥. vj. pulv. cubebar. cardamom. an. ℥. ij. pulv. rad. zedoaria, angelica an. ℥. j. ℞. salis absinthii ℥. ij. cum s. q. syrup. conditura nucum juglandum, f. confectio.

℞. Pulv. rad. China, ligni sassafras, an. ℥. ℞. santal. citrini, albi, an. ℥. ij. sem. eruca, cubebar. nasturtii, granor. paradisi, an. ℥. ℞. spec. dialacca, cinnamomi, iridis, galanga minoris, an. ℥. j. salis absynthii ℥. ij. conserva flavedinis aurantii, & sacchari anthosat. solut. in s. q. aq. limacum, an. ℥. iiij. s. a. f. confectio. Dosis qu. nucis moschat. bis in die, superbibendo liquorem appropriatum.

In quibusdam scorbuti casibus, ubi chalybis usus indicantur, aut chalybis ^{Medica-} cum sulphure preparat. ℥. iiij. aut vitrioli Martis ℥. ij. cuilibet è præscriptis ^{menta} aut confectio, aut electuario adjiciantur; & post medicamentum aut se- ^{chalybea-} mel, aut bis in die assumptum, corpus pro ratione virium exerceatur.

PVLVERES.

℞. Pulv. Ari compositi ℥. j. ℞. cort. Vvinteran. ℥. ℞. cubebar. granor. Paradisi, cardamomi, an. ℥. ij. salis absynthii ℥. iiij. tabul. aurant. ℥. iiij. f. pulvis. Dosis ℥. j. in liquore appropriato.

Pulveri prædicto adde nucleorum fructus Indici, cacao ℔. ℞. in mortario calido redigantur in massam, sive pastam. Dosis ℥. ij. eo ritu quo confectio chocolate assumitur, scil. in aq. fontan. cum foliis rorismarini, aut betonica, aut radice scorzonera, aut etiam rasura eboris, vel C. Cervi incoctis.

PILULÆ.

Quibus medicamentum in dosi minori, & forma pilulari magis arri-det. ℞. Rad. serpentaria Virginiana, contrayerva, an. ℥. ij. cort. Vvinteran. cubebar. sem. eruca, an. ℥. iiij. salis absynthii, cochlearia, an. ℥. j. ℞. extracti, sive rob. juniperi ℥. ℞. c. s. q. syr. conditura nucis moschat. fiat massa. Dosis pilula iiij. bis in die, superbibendo liquorem appropriatum.

TABULÆ.

Pro delicatoribus tabula, sive tragea ad hunc modum præscribantur. ℞. Pulv. cort. Vvinteran. oculor. cancri, an. ℥. j. ℞. margar. pulv. ℥. ℞. sacchari albis-simi solut. in s. q. aq. lumbric. & ad tabulat. coct. ℥. vj. sp. cochlearia ℥. ij. s. a. f. tabula, qua singula pendant. ℥. ℞. capiat circiter ℥. j. bis in die, superbibendo li-quorem appropriatum.

Tabulæ aurant. quæ in pharmacopolis Oxoniensibus
prostant.

℥. Cort. aurant. limoniorum, citri, condit. an. ℥. j. rad. eryngii condit. ℥. ℞. nucleorum pini, pistach. an. 20. amygdal. dul. excorticat. num. x. sem. amisi pulv. ℥. ℞. Zinziberis condit. ℥. ij. spec. aromat. rosat. nucis moschat. an. ℥. j. ℞. rad. galangæ ℥. j. caryophyllor. num. x. ambra grisea ℥. iiij. moschi, zibetæ an. ℥. ij. sacchari albissimi solut. in aq. rosar. & ad tabul. coct. ℔. j. ℞. s. a. f. tabulæ.

Medica-
menta li-
quida.

Hæc de medicamentis in forma solida, sive substantia crassiori scorbuticis exhiberi solitis, quorum virtus ut melius, & cum majori emolumento in massam sanguineam deferatur, iis ut plurimum liquida superbibenda præscribuntur. Quamvis horum & magna extat varietas, & diversimoda componendi ratio, præcipua tamen, & usitatissima sunt qualia supra innuimus, & cujusmodi singulorum modo formula subjungentur.

I. Decocta.

Etsi decocta sunt maximè familiare medicamentorum liquidorum genus, in scorbuto tamen rarius usurpantur, quia simplicia, quæ huic morbo præcipuè conferunt, uti cochlearia, beccabunga, & c. virtutes suas à sale volatili acceptas, coctione amittunt: Attamen quoniam remedia hoc ritu facile ac cito parantur, interdum admitti debent; quin eorum nonnulla efficacia fuisse, experientia comprobavit. Pro rusticis & pauperibus, medicamentum hoc paratu facillimum à plerisque authoribus commendatur. ℥. Folior. nasturtii aquatici M. iiij. acetosa minoris M. ij. concisa macerentur in lactis ℔. vj. & coquantur ad tertie partis consumptionem: sumantur. ℥. vj. ad viij. bis in die. Decoctum absynthii ab Eugaleno & aliis laudatur. Remedium sequens cum bono successu ego sæpius expertus sum. ℥. Summit. genistæ M. iiij. minutim incis. coquantur in cerevisiæ fortioris ℔. iiij. ad medietatem, exhibeantur ℥. ij. ad iiij. bis in die.

2. Infusiones.

Infusio decocto superaddita medicamentum utilissimum præstat. ℥. Rad. scorzonera, cherefolii, an. ℥. j. folior. eupatorii, chamæpytios, an. M. ℞. C. Cerviusti ℥. ij. passul. M. ℞. coquantur in aq. fontana ℔. iiij. ad tertie partis consumptionem, adde vini Rhenani ℔. ℞. & statim coletur in vas vitreum, cui imponantur folior. cochlearia, beccabunga contus. an. M. ℞. cort. aurantii condit. & minutim incis. ℥. ℞. f. infusio clausa & calida per 6. horas. Colatura servetur in vasis occlusis. Dosis ℥. vj. bis in die post medicamentum solidum.

℥. Seri lactis, cum vino albo, aut pomaceo facti ℔. j. ℞. huic incoquantur rad. bardana, eryngii condit. an. ℥. vj. baccar. juniperi condit. ℥. ℞. liquor ad tertie partis consumptionem decoctus coletur in lagenam, cui imponantur folior. cochlearia, beccabunga, an. M. j. f. infusio calida, & clausa per horas 6. Dosis ℔. ℞. bis in die post medicamentum solidum.

Infusiones item per se factæ nonnunquam egregii sunt usus. ℥. Fol. cochlearia M. j. rasuræ rad. raphani sylvestris M. ℞. cort. Vvinteran. contus. ℥. ij. ponantur in vitro cum vini albi, aut pomacei, & aq. cochlearia, an. ℔. j. fiat infusio in cella per duos vel tres dies. Dosis ℥. vj. ad viij. bis in die, ut supra.

3. Succī & expressiones.

Commendatissimus herbarum aut fructuum antiscorbuticorum usus est, ut illarum succi, & expressiones per se, aut cum aliis liquoribus appropriatis, bis, aut ter in die assumantur: sic enim remedii virtus integra, ac illibata exhiberi præsumitur.

℥. Folior. cochlearia, nasturtii aquatici, beccabunga, an. M. iij. contusis exprimatur succus, servetur in vitro occluso. Dosis ℥. j. ℞. ad ℥. iij. bis in die in haustulo cerevisiæ, vini, aut aq. destillatæ.

℥. Folior. cochlearia M. iij. acetosellæ M. ij. contusis exprimatur succus, qui vitro occlusus brevi clarescit: namque acetositas lujulæ præcipitat crassiores cochleariæ partes. Idem succedit si succus aurant. succo cochlearia permiscetur. Dosis ℥. ij. vel iij. bis in die.

℥. Folior. cochlearia M. iij. beccabunga, nasturtii, an. M. ij. piperis longi ℥. iij. rasura raphani sylvestris ℥. ij. simul omnia contus. ponantur in olla vitreata cum vini Rhenani, vel Hispanici, si potius videtur. ℔. ij. orificio probè occluso, stent in cella frigida per ij. dies, dein f. expressio fortis. Dosis ℥. iij. bis in die, post medicamentum solidum.

℥. Folior. cochlearia M. iij. beccabunga, nasturtii, lujulæ, an. M. j. contus. affunde aq. limacum, & lumbric. an. ℥. vj. f. expressio fortis, quæ servetur in vitro occluso. Dosis ℥. ij. bis in die.

4. Syrupi.

Propter eandem rationem, qua decocta, etiam syrupi in scorbuto minus probantur, in quantum scilicet simplicium maximè efficacium virtus intra coquendum evaporat: quia tamen aliquibus pro liquorum appropriatorum edulcoratione tali medicamento interdum opus esse videtur, præparationem hic nostram, reservatis qua licet ingredientium viribus, proponemus.

Itaque ℥. folior. cochlearia hortensis M. vj. cort. 4. aurant. & duor. limoniorum tenuiter deras. rasur. rad. raphani M. ℞. piperis longi pulv. ℥. iij. omnibus simul contusis exprimatur succus, qui statim vitro probe obturato inclusus, collocetur in cella frigida, donec per subsidentiam clarescit: dein liquor clarus per inclinationem in vitrum aliud effusus, & occlusus, in calore Balnei m. detineatur, interim pro singulis unciiis. ℥. Sacchari ℥. j. ℞. ejusque tota quantitas cum parum aq. lumbric. dissoluta, ad tabul. coquantur: cui mox liquor prædictus calidus sensim affundatur, & cum spatula agitetur: Quamprimum incorporatur, compositio igne eximatur, & frigefacta vitro imponatur. Hic nodulus in vitro suspendatur. ℥. Cinnamomi contus. ℥. j. ℞. sem. nasturtii, eructa pulv. an. ℥. j. misce.

5. Aqua destillata.

Aqua destillata, quia sunt elegans & jucundum remedium, inter præscripta antiscorbutica ferè utramque implent paginam. Harum dispensationes quædam in nostra pharmacopœa perquam utiles & concinnæ habentur, ut *aq. Raphani composita, lumbric. & limacum magistralis*. Præterea extant celebres hujusmodi aquarum præscriptiones à *Quercetano, Dornorelio, Sennerto, Doringio*, aliisque Authoribus traditæ. Insuper unicuique Medico in promptu est tales cujusque ægrotantis conditioni appropriatas, pro re nata præscribere: recipiuntur enim *ingredientia antiscorbutica*, ac insuper *accidentia quædam, & affectus particulares respicientia*: quibus concisis & contusis liquor idoneus, scil. *vinum album pomaceum*, aut *serum lactis* ex utrovis paratum affunditur: dein tota mixtura in cucurbita, aut in organis rosaceis destillatur. Libet hic formam unam, aut alteram nobis usitatas subungere.

℞. Folior. cochlearia utriusque, beccabunga, nasturtii aquatici, summitatum genistæ, an. M.iiij. foliorum chamædryos, chamæpytios, an. M.ij. rad. raphani sylvestris ℥. ℞. Ari, angelica, imperatoria, an. ℥.iiij. cortices externa quatuor aurant. & totidem limoniorum, radic. calami aromatici ℥. j. cinnamomi, caryophyllor. an. ℥. ℞. contusis, & concisis affunde pomacei opt. ℥. viij. digerantur per duos dies in olla vitreata occlusa: dein destillentur in communi destillatorio: aqua primo, & ultimo avocata misceantur.

Tempore brumali, cum herbæ virides sunt rariores, juxta hunc modum præscribatur. ℞. Folior. cochlearia M.iiij. summitatum genistæ, pini, juniperi, an. M.iiij. cort. mediani sambuci, fraxini, an. ℥. iiij. rad. raphani sylvestris, polypodii qu. an. ℥. iiij. cortices quatuor aurant. & totidem limoniorum, cort. Vvinteran. ℥. iiij. contusis & concis. affunde vini albi, vel pomacei, vel seri lactis cum alterutro facti, ℥. viiiij. destillentur.

Aq. simplex folior. Ari verno tempore destillata contra scorbutum efficax remedium est, si ℥. iiij. vel iiij. bis in die cum alio medicamento exhibeantur.

Aqua simplex cochlearia, foliis recentibus contusis reaffusa, & exstillata, adeoque crebris cohobiis iterata, efficax remedium evadit. Porro cochlearia spiritus ardens ad hunc modum paratur. ℞. Folior. cochlearia q. s. contusa in pilas, quales ex glasto pro Tinctor. usu parari solent, formentur: dein pile istæ in olla vitreata, aut aq. cochlearia, vel vino ejusdem, ad quatuor digitorum supereminentiam affusa, per tres aut quatuor dies exactè clausa, in loco frigido detineantur: dein tota materies, alembico imposito destilletur: aqua destillata cucurbita indita rectificetur: primo exhibit spiritus ardens, cum ℥. 15. vel 20. in idoneo vehiculo propinetur.

6. Vina & cerevisia antiscorbutica.

Vinum antiscorbuticum simplex egregii usus ad hunc modum parare soleo. Verno (aut æstivo tempore. ℞. Fol. cochlearia sub sereno calo collect. q. v. succo

succo è contusus expresso, doliolum iij. aut iiij. congior. capax impleatur; flor. cerevisia cochleari j. vel ij. impositis, per duos dies fermentari sinatur: dein vas occlusum in cella vinaria per 6. menses collocetur: dein liquor clarus, ac instar vini Hispanici flavescent, in utres exhauriatur, ac usui servetur, per plures annos incorruptus perdurat. Dosis ℥. iiij. vel iiij. bis in die.

Vina medicata, quorum cyathus unus aut alter horis medicis, aut etiam inter prandendum quotidie assumantur, ad hunc modum parentur. ℥. Folior. cochlearia M. iiij. rasura raphani sylvestris ℥. iiij. cort. Vvinteran. contus. ℥. ℞. cortices exteriores quatuor aurantior. & totidem limoniorum; ponantur in vitro, cum vini albi, Rhenani, aut tenuioris Hispanici ℔. xij. vas obturatum servetur in loco frigido: vinum effundatur clarum quoties usu opus est.

Usitatus est allam, aut cerevisiam medicatam scorbuticis pro potu ordinario constanter bibendam præscribere. Paretur cerevisia pro doliolo quatuor congiorum capaci: vice florum lupuli incoquantur summitatum pini, vel abietis M. iiij. post fermentationem in doliolo peractam, imponantur folior. cochlearia M. iiij. rad. lapathi acut. preparat. ℥. iiij. cortices quatuor aurantior. postquam per septimanam subsidentia inclaruit, potui exponatur.

Hujusmodi cerevisia cum aliis ingredientibus medicata, juxta patientis temperamentum, & affectionem diversimode parari possunt: quo remedium genere, siquidem particulæ medicamentosæ, sanguinis dyscrasiam alterantes, massæ ejus unâ cum alimentosis continuo inferuntur, in tollenda scorbuti causa, sæpe multum proficitur. In quantum vero hujus causam, uti & morbi speciem, duplicem esse ostendimus, & medicamenta hæcenus proposita, sanguinis intemperiem salino-sulphuream fere tantum respiciunt, proxime incumbit medicamenta, quæ in altera sanguinis dyscrasia scorbutica, nempe sulphureo-salina, conveniunt, subjicere.

CAPUT VIII.

De medicamentis, cujusque prædictarum formula generis, scorbutum, in constitutione calidiori, & sanguinis dyscrasia sulphureo-salina, excitatum respicientibus.

IN quibusdam scorbuticis, cochlearia, raphani sylvestris, corticis Vvinteran. aliorumque acrium, & sale volatili valde prædicatorum usus multum officere deprehenditur: quare in ejusmodi casibus, ubi causa morbifica in calidiori sanguinis dyscrasia, vini rancidæ æmula, consistit, medicamenta temperata, & humorum particulas per se effervescent aptas, minus exagitantia indicantur; quare formulæ, eodem quo superiores ordine, ac velut ὀξυγὰς subjicientur, atque imprimis de remediis solidis agemus.

ELECTUARIA.

℞. Conserva beccabunga, cardamines, cum equali parte sacchari fact. an. ℥. iiij. spec. diatrion. santal. diarrhod. abbatis, an. ℥. j. ℞. eboris pulv. ℥. j. margar. ℥. ℞. salis absinthii, tamarisci, an. ℥. j. cum s. q. syr. è coralliis. f. elect.

℞. Conserva lujula, cynorrhodii, an. ℥. iiij. (vel conserva rad. lapathi acut. rad. cichorii, an. ℥. iiij.) trochisc. de rhabarbaro ℥. ij. spec. diamargar. frigid. ℥. j. ℞. cort. tamarisci ℥. j. salis prunella ℥. j. ℞. myrobalanor. condit. num. ij. c. s. q. syr. conditura myrobalanor. f. electuarium.

Pauperioribus hoc αὐτοχεδίαιον præscribere soleo. ℞. Folior. beccabunga. ℥. vj. lujula ℥. ij. sacchari albissimi ℥. viij. contundantur addendo farine sem. fœniculi d. ℥. ℞. eboris pulv. ℥. ij. salis prunella ℥. j. ℞. cum s. q. syrupi è succo beccabunga, f. electuarium.

CONFECTIONES.

℞. Pulv. rad. China, peonie maris, an. ℥. j. santal. albi, citrini, an. ℥. iiij. eboris ℥. j. ℞. margar. ℥. ℞. oculor. cancri ℥. j. corallii cum succo aurant. irrorat. ac in marmor. levigat. ℥. ij. tartari albissimi ℥. j. ℞. sacchari albissimi solut. in s. q. aq. scordii composit. ℥. vj. f. confectio.

℞. Rad. eryngii condit. scorzonera condit. an. ℥. iiij. pulv. Ari composit. ℥. ℞. spec. diatrion. santal. ℥. ij. salis prunella ℥. j. ℞. cum s. q. syrupi cariophyllor. f. confectio.

PULVERES.

℞. Pulv. folior. chamæpytios, Ari composit. an. ℥. j. ℞. eboris pulv. corallii rubr. preparat. cum succo aurant. an. ℥. ij. tabularum aurantium ℥. ij. misce. f. pulvis. Dosis cochl. i. bis in die.

PILULÆ.

℞. Spec. diatrion. santal. diamargar. frigid. an. ℥. ij. sem. citri, cardui contus. an. ℥. j. ℞. rad. dictamni Cretici, peonie maris, an. ℥. j. ℞. salis tamarisci ℥. ij. cum s. q. gelatina à cervi, vel exuviis anguinarum. f. massa.

TABULÆ.

℞. Spec. diatrion. santal. diamargar. frigid. an. ℥. j. ℞. margar. pulv. corallii rubr. prepar. eboris pulv. an. ℥. j. sacchari solut. in aq. scordii & ad tabul. coct. ℥. vj. f. a. f. tabula.

Quod si cum antiscorbuticis hujusmodi temperatis usus chalybis indicatur, electuario, vel confectio, aut etiam pilularum massa addantur, magisterii Martis Mysyncti, vel extract. chalybis preparationis nostræ ℥. ij. In quibusdam casibus roci Martis circiter ℥. ij. ℞. vel ℥. iiij. tali cōpositioni addantur, sæpius tamen liquores solidis medicamentis superbibendos, quàm prædictas compo

compositiones, chalybeatos reddere præstat. Restat modo liquorum formulas præscribere.

Decocta.

In scorbuto post febrem diuturnam excitato, hujusmodi decocta, quæ sanguinem purificant, & urinas copiosè movent, cum fructu exhibentur.

℞. Rad. cherefolii, scorzonera, acetosa, petroselini, an. ℥. j. folior. eupatorii, lingue cervina, an. M. j. C. Cervi usti ℥. ij. cortices trium pomorum, uvarum Corinthiacarum ℥. ij. glycyrrhiza ℥. iiij. coquantur in aq. fontana ℔. iiij. ad tertiæ partis consumptionem, adde salis prunella ℥. ij. vel iiij. Dosis ℥. vj. bis vel ter in die.

℞. Rad. eryngii condit. ℥. vj. graminis ℥. ij. folior. aparin. M. ij. eupatorii, epatica, an. M. j. passular. ℥. ij. santal. albi ℥. j. glycyrrhiza ℥. ij. coquantur in aq. fontana ℔. iiij. ad tertiæ partis consumptionem. Dosis ℥. vj. post medicamentum solidum.

Rusticis & pauperioribus, ne post febrem in scorbutum incidant, præscribere soleo, ut bis in die capiant haustum sequentem, nempe ut rad. & fol. taraxaci M. j. ℔. in liquor. Posset. ℔. j. ℔. coquantur ad tertiæ partis consumptionem; coletur pro duabus dosibus.

Vel ℞. rad. taraxaci M. ℔. sem. citri, cardui, an. ℥. j. coquantur in liquore Posset. cum pomis, vel pomaceo fact. ℔. j. ℔. ad tertiæ partis consumptionem.

Infusiones.

Apozemata modo præscripta, contra scorbutum præstantiora evadent, si absque glycyrrhiza parata, colentur in lagenam, cui imponantur folior. beccabunga & nasturtii aquatici vel cardamines, an. M. j. dein f. infusio calida & clausa per 6. horas. Liquor denuo colatus servetur in vasis occlusis. Dosis ℥. vj. bis vel ter in die. Quin & serum lactis, cum rad. taraxaci, aut foliis fumariæ incoctis, coletur in vas continens folior. beccabunga, chelidonii minoris, an. M. j. f. infusio, &c.

Infusiones chalybeata crebro in usu esse solent, nempe chalybis sal, magisterium aut extractum in decocto quodam, aut aq. destillata infundantur; cæterum, prout acidulæ naturales, sic etiam artificiales è nostr. præparatione chalybis in aq. fontana dissoluti, atque antiscorbuticorum infusione imprægnati, cum insigni commodo bibuntur.

Succi & expressiones.

℞. Folior. beccabunga, nasturtii aq. an. M. iiij. lujula M. ij. contusis exprimatur succus, vitro occlusus cito per subsidentiā depurabitur. Dosis ℥. j. ℔. ad ij. cum vehiculo convenienti.

℞. Folior. beccabunga M. iiij. caulium rhabarb. Anglicani M. ij. contusis exprimatur succus.

℞. Folior. beccabunga, nasturtii, cardamines, chelidonii minoris, acetosella, an. M. ij. contus. exprimatur succus, adde succi aurant. p. 4. serventur in vitro.

H h h h

Syrupi.

Syrupi.

Quoties *syrupus*, cuilibet alii compositioni addendus exigitur, aut *syrupo de succo lajula*, vel *fumaria*, vel è *coralliis composito* utimur; aut etiam *magistralis de succo beccabunga*, eodem ritu, quo *suprà*, de *cochlearia succo* præscribitur, parari potest.

Aqua distillata.

Aqua distillata temperatiores parantur, mutando aut *ingredientia*, aut *menstruum*, aut simul *utrumque*.

Quoad prius, juxta hunc modum proceditur. ℞. *Folior. beccabunga, nasturtii, fumaria, lingua cervina, hepatica, melissa, summitatum tamarisci, cypressi, an. M.iiij. santal. om. contus. an. ℥.℞. rad. lapathi acut. polypodii qu. an. ℥.ij. cort. exteriores quatuor aurant. limacum mundat. ℔.ij. incis. & contus. affunde seri lactis cum pomacei fact. ℔.vj. Distillantur in communi destillatorio.*

2. Ut *menstruum* sit debilius, *ingredientia* sint moderate calida.

℞. *Folior. cochlearia, beccabunga, cardamines, nasturtii, an. M.iiij. cort. quatuor aurant. limacum ℔. j. minutim concisis affunde seri lactis communis, vel lactis recentis ℔.vj. Destillantur vulgari modo.*

3. In *scorbutica atrophica & dispositione tabida*, ubi nihil calidum sanguinem, humores, ac spiritus exagitans, admitti debet, tum *ingredientia*, tum *menstruum*, sint temperata, & sanguinem demulcentia.

℞. *Folior. beccabunga, cardamines, lingua cervina, adianthi, hepatica, veronica, eupatorii, an. M.ij. limacum mundat. ℔. j. ℞. (vel pulpam caponis, aut cordis ovilli incis. semicocti & incisi) omnibus simul contusis affunde lactis recentis) vel aq. fumaria) ℔.vj. destillantur communi modo.*

Vina, & cerevisia medicata.

Etsi *vinorum* usus in *scorbuto*, propter calidiorem, sive sulphureo-salinam sanguinis dyscrasiam excitato minus convenire videatur, si quando tamen aut stomachus debilior, aut longa consuetudo, *vini* saltem *oligophori* potum exigunt, ejusmodi liquor simul temperatior, & quodammodo medicatus parari potest. Imprimis etenim *vina* tenuia aquâ diluta, & *melissa, borraginis, aut pimpinella*, aliorumve infusione imprægnata concedi debent.

Porro *vina* parentur è *succis ribium, cerasorum, aliorumve fructuum horariorum*, quæ cum fermentatione maturantur, stomacho perquam grata, & sanguinis depurativa existunt; dein *pomaceum*, familiare & fere genuinum patriæ nostræ vinum, modo hoc defæcatum, mite, ac sine acore quovis dulce fuerit, in *scorbuto* plurimum juvat: Porro huic liquori facibus exempto, & doliis reposito *ingredientia* varii generis infundantur; cujusmodi nimirum sunt *summitates pini, vel abietis, flores tamarisci*; item *rasura C. Cervi, vel eboris*, quæ liquorem edulcorant, & ab aciescentia præservant; in quantum scil. particulae salis fluidi in pomaceo scatentes, ipsique acorem inducere aptæ, prædicta *ingredientia* dissolvendo, impenduntur.

Cerevisia medicata temperatiores, ad hunc modum præscribantur, scil. paretur *alla tenuior*, pro doliolo 5. vel 6. congiorum capaci, cui vice florum lupuli incoquantur summitates *pini, abietis*, vel *tamarisci*, aut rasuræ ligni cujuscvis illorum; dein post fermentationem, vasi imponantur *rad. lapathi acuti* exsiccatæ (quibus certe nullum in scorbuto præstantius remedium est:) His interdum addantur folia *beccabunga, nasturtii aquatici, barbarea*, &c. item *poma citrea*, vel *aurantia* in taleolas discissa.

Folia *lingue cervina*, doliolo cerevisiæ mediocris post fermentationem imposita, ipsi *saporem* simul, ac *odorem* gratissimum inducunt.

C A P U T IX.

De Scorbuti indicatione curatoria, qua ipsi morbo, & symptomatibus præcipue urgentibus occurritur.

H Actenus circa *scorbuti therapeiam*, quæ *indicationem præservatoriam*, scil. causæ morbificæ remotionem spectant, scil. tum *medendi intentiones*, tum *remedia indicata* designavimus. Cujusmodi methodus tempestivè incepta, ac rite instituta, sæpe rem totam perficit; in quantum scil. ægritudinis causa, sive radice præcisa, affectus ab ea pendentes sponte emarcescunt. At vero, hunc *cursum*, *iatrogenus* non semper *directè*, quin varie *deflectendo ad latus*, conficere licet: quippe interdum *accidentia*, & *symptomata* graviora contingunt, quæ peculiarem, & quasi extraordinariam medicinæ operam requirunt, quibus nempe immediate, ac interrupta sæpe *cura generali*, attendere oportebit: Super his observeretur, quod cum affectus qui scorbuto superveniunt, pro cujusque ipsorum natura ac patientis indole, appropriata exigunt remedia; hisce tamen *antiscorbutica* semper admisceri debent. Non opus erit contra morbos, & affectus omnes, quibus scorbutus stipari solet, *methodum therapeutica* instituere, ita namque huc tota *medicina praxis* transcriberetur; quin ad symptomata solum præcipue urgentia, à quibus nempe vel *patientis vita periclitatur*, vel *cura principalis obstruitur*, respiciendum erit: quo ritu, ac quibus medicamentis talia farentur, modo ostendemus.

De curandis difficili respiratione, & paroxysmis asthmaticis.

Respiratio difficilis, cum *pectoris angustia* & *paroxysmis asthmaticis*, remediis statim appropriatis, & extra methodum generalem præscribendis tolli debet; secus enim ægrotans cito in vitæ discrimen adducitur. Cum hujusmodi mala in scorbuticis utplurimum, vel sanguinis in corde

stagnantis vitio, vel propter nervos pneumonicos in functione sua impeditos oriantur, idcirco medicamentis, aut *cardiacis*, aut *antispasmodicis* curantur: *sp. C. Cervi, fuliginis, sanguinis, cranii*; item *tinctura castorei, antimonii, vel sulphuris*; *flores salis armoniaci, flores benzoini*, item *elixir proprietatis*, in his casibus sæpe egregii sunt usus: cujusmodi remedia exhibeantur crebra vice, cum dosi liquoris cujusdam antiscorbutici etiam contra prædictos affectus appropriati. Pro subita dyspnœæ mere spasmodicæ, si quando gravissime urgeat, sedatione, nullum præsentius remedium expertus sum, quam *Laudani opiatum* tincturam nostram ad gutt. 10. vel 12. in liquore convenienti exhibitam: quippe somno obrepente, spiritus inordinationes suas remittunt, ac interim refecti, debito postea ritu pristina sua pensa resumunt. *Ensmata acriora*, quæ alvum copiosè subducunt, item *decocta sudorifera*, ac *diuretica* sæpe juvamen præstant.

℞. Rad. bardana, petasitidos, cherefolii, an. ℥. j. folior. adianthi, chamædrios, an. M. j. sem. bardana, carthami, an. ℥. iiij. passularum ℥. ij. incis. & contus. coquantur in aq. fontan. ℔. iiij. ad tertiæ partis consumptionem, adde vini albi ℥. iiij. colentur in lagenam, cui imponatur fol. cochlear. concis. M. j. rad. Elenii condit. & minutim incis. ℥. ℔. f. infusio clausa & calida per horas tres. Dosis ℥. vj. bis vel ter in die.

De ventriculi affectibus scorbuto accidere solitis.

Scorbutici interdum magna *ventriculi oppletione & dolore*, item *nausea & ructibus*, & nonnunquam etiam *vomitu crebro*, ac immani tentari solent. Cujusmodi vitia interdum à chylo illic in putrilaginem degeneri, sæpius tamen à materia morbifica, aut *sanguinis*, aut etiam *succi nervosi* commeatu advecta, & vel intra *stomachi cavitatem* deposita, vel *plexibus nerveis & membranis* infixæ oriuntur: In hujusmodi casibus, si materia viscidâ, nidorosa, aut alias infesta inter vomendum rejicitur, & suspicio sit causam intra ventriculi cavitatem subsistere, lene vomitorium ex vino scillitico, aut *sale vitrioli* propinare conveniat; vel *extracto rhabarbari*, aut *infuso ejus*, adjecto *sale* aut *cremore tartari*, humor peccans per alvum deturbetur: sin materies intra *membranas*, aut *plexus nerveos* penitus adhærescat, *diaphoretica*, aut *salium effervescentias cohibentia* potius conducunt. *Elixir proprietatis*, vel *flores salis armoniaci*, vel *spiritus fuliginis*, cum *aq. raphani composita, lumbricorum*, aut alio liquore antiscorbutico crebra vice sumantur. Interim semel, aut bis in die, *fotus ex absynthio, centauro, floribus chamomille, rad. gentiana*, aliisque vino albo incoctis, cum stuphis laneis calide intinctis & expressis, ventriculi regioni applicentur. *Enematum* usus convenit. Non raro *opiatum* juvamen magnum conferunt.

De dolore ventris, & colica scorbutica.

Nulla propemodum affectio citiorem medicinæ opem postulat, quàm quæ in scorbuto frequenter accidunt, *colica & ventris tormina*. Contra hæc mala, *lysteres* varii generis, *fotus, linimenta & cataplasmata* adhibentur.

Opiatum

Opiatarum usus hic valde necessarius deprehenditur. Certè in hoc casu, illud *Riverii* præscriptum, ut *catapotia purgantia*, cum *laudano admixto* exhibeantur, maxime locum habet; namque à somno concitato, ac alvi solutione uberiori proritata, non raro paroxysmus solvitur. Cæterum *pulveres testacei*, à quibus *sales acetosi* imbibuntur, aut figuntur, causæ morbificæ profligandæ plurimum conducunt. E. g. ℞. *Pulv. oculor. cancri, testarum ovor. an. 3. j. B. margar. 3. j. f. pulvis*, dividatur in 12. doses, quarum una sextâ qualibet horâ sumatur cum aq. *scorbutica*, vel cum decocto rad. & seminum *Bardane*, qualis supra describitur, aut etiam cum liquore *Posslet. cum rad. & seminibus Bardane, foliis majorane odorata, ac saxifragiæ incoctis, foliisque cochlearia infusis*. In colica *scorbutica*, etiam in ventriculi affectibus modo descriptis, *acidularum purgantium*, quales apud nostrates juxta vicos *Epsum & Barnett* prostant, usus egregium sæpe commodum præstat.

De diarrhæa & affectibus dysentericis.

Diarrhæa inveterata, qualis *scorbuticis* frequenter accidit, haudquaquam medicamentis astringentibus sisti debet, nec etiam alterantibus, aut anti-*scorbuticis* quibuscumque facile curatur: *acidula ferro*, aut *vitriolo imprægnata*, hujus affectus remedium optimum existunt: his succedunt *acidula artificiales*, aut *medicamenta chalybeata*, quæ juvamen insigne præstare solent: *Crocus Martis* recte præparatus, cæteris omnibus jure præfertur. *Methodo sequenti* sæpe bono cum successu usus sum. Imprimis purgatio ex pulvere, aut infuso *rhabarbaro*, aromaticis astringentibus adjectis, instituitur, & aliquoties, scilicet trium, aut quatuor dierum intervallo iteretur. Cæteris diebus, *electuarii sequentis* dosis ad quantitatem nucis moschata mane & hora quarta sumatur. ℞. *Conservæ absynthii vulgaris, cum aq. parte sacchari fact. 3. vj.* (in constitutione calidiori, hujus vice, *conserva rosar. rubrar. recipiatur*) spec. diarrhod. abbatis 3. ij. *santal. albi, rubri pulv. an. 3. j. croci Martis opt. 3. B. cum s. q. syr. chalybis, f. electuarium.*

In affectibus dysentericis, ac tenesmo, simili methodo procedendum erit; præsertim *acidularum* usus, si fieri potest, adhibeatur: Insuper enemata, è decoctis vulnerariis parata, crebro sint in usu. Nuper ego quendam dysenteria diuturna, ac gravi laborantem, qui scil. quotidie plures uncias sanguinis per alvum à longo tempore excreverat, hoc remedio sanavi. ℞. *Rhabarb. opt. pulv. 3. j. santal. rubr. pulv. 3. ij. cinnamomi 3. j. croci Martis 3. iiij. balsami Lucatelli q. s. f. massa pilularis*; sumpsit quatuor pilulas, diebus modo singulis, modo alternis, per duas septimanas, & perfecte curatus erat. Huic etiam cerevisiam medicatam ex rad. *lappathi acut. & foliis beccabunga infusis* constanter bibendam præscripsi.

De vertigine, ac leipothymia, aliisque affectibus eidem in affectione scorbutica adjungi solitis.

Vertigo scorbuto inveterato crebro supervenit; cui etiam *leipotymia* frequens, ac fere constans ejus metus, insuper in membris stupor, ac formicationis

sensus modo huc, modo illuc excurrentes, adjungi solent. Cujusmodi affectus, modo à spirituum animalium in ipso fonte, & modo ab eorundem intra nervos, tum *cardiacos*, tum *membrorum motui* inservientes, deliquis procedunt: cumque à *cerebro & nervoso genere*, sale scorbutico plurimum obsessis, dependent, non facile curantur. *Remedia cephalica*, qualia in *vertigine & morbis paralyticis* per se excitatis conveniunt, cum *antiscorbuticis* admixtis adhiberi debent. Itaque facta imprimis *totius provisione*, per *cathartica* idonea, & qualia in scorbuto conveniunt, cum remediis contra prædictos affectus appropriatis, ad hunc modum procedatur.

Circa initia curationis, *sanguinis detractio* è venis sedalibus hirudinum suctu celebretur; & nisi aliquid contra indicat, crebra vice postea iteretur.

℞. Pulv. rad. *peonia maris* ℥.℔. coral. rubr. prepar. ℥.ij. cranii humani, ungulae alcis, an. ℥.j. ℞. Sacchari opt. solut. in aq. *peonia composit.* vel in aq. *raphani sylvestris*, & ad tabul. coct. ℥.viii. olei succini opt. rectificat. ℥.℔. s. a. f. tabula, sumantur ad ℥.j.℔. vel ℥.ij. mane & vespere, superbibendo haustum aq. destillat. sequentis.

℞. Fol. *cochleariae*, *beccabunga*, *nasturtii*, *lilii convul.* *salvia*, *rorismarini*, *betonica*, an. M.iiij. jugland. viridium ℔.j. cort. *aurant.* & quatuor limoniorum, rad. *peonia maris recent.* ℔.j.℔. contusis & concisis affundantur phlegmatis vitrioli ℔.j. seri lactis cum pomaceo fact. ℔.v. Distillantur more vulgari, aq. simul tota miscetur. Dosis ℥.iiij. ad iiiij.

De hemorrhagiis.

Hæmorrhagia, in affectione scorbutica, sæpe ingens periculum minantur, nimirum quasi laborantes propterea in mortem præcipites traderentur, dum sanguis fere ad animi deliquium, modo è *naribus*, modo fluxu *menstruo*, aut *hæmorrhoidali* erumpit: præterea iste interdum è *pu' monibus*, aut *ventriculo* rejectus, ulceris, aut saltem magnæ debilitatis in parte affecta delitescens suspicionem præbet. Quare excretiones sanguinolentæ, si vel immodicæ fuerint, aut loco inconvenienti accidunt, in præsens sisti, ac imposterum præcaveri debent.

Pro sistendo sanguine quando immodicè erumpit, methodus satis vulgò nota est; ac nihil magis, aut peculiare in hoc affectu propter scorbutum, quàm propter alias occasiones excitato, agendum restat. Attamen ad præcavendas hæmorrhagias, remedia adhibeantur, quæ sanguinis acrimoniam tollunt, & vasorum ora nimis laxa & dehiscencia constringunt. Utraque intentio medicamentis *chalybeatis* optimè perficitur. *Acidularum vitriolicarum* usus in hanc rem maximè idoneus est: porro *chalybis infusiones*, extracta, sales, ac ejusmodi præparata, quæ *salinam*, sive *vitriolicam ferri naturam* præcipue continent, contra hæmorrhagias semper utilissima existunt. Qua ratione *ferrum & præparata* ejus hos effectus, aliosque diversimodos in corpore humano producant, superius ostenditur.

℞. Conserva rosar. rubrar. cynorrhodii, an. ℥.iiij. spec. diarrhod. Abbatis, diatrion satalon, an. ℥.j.℔. salis chalybis ℥.j. croci Martis opt. preparat. ℥.ij. corallii

coralli rubr. prepar. ℥. j. β. cum s. q. syr. de chalybe, f. electuarium, sumatur ter in die qu. nucis moschat. superbibendo liquoris appropriati haustum.

Pauperibus ad hunc modum præscribere soleo. ℥. Summitatum cypressi, urtica urentis, an. ℥. iij. beccabunga ℥. ij. Contundantur in mortario cum ℥. x. sacchari albissimi: dein adde squamar. ferri tenuissimè pulv. ℥. j. pulv. santal. albi, rubri, an. ℥. ij. cum s. q. syr. è succo urtica, f. electuarium. Dosis qu. nucis jugland. bis in die.

℥. Aq. destillata, vel decocti antiscorbutici temperat. ℔. ij. chalybis nostri prepar. ℥. ij. misce in vitro. Dosis ℥. iij. vel iij.

℥. Summitat. urtica urentis, folior. beccabunga, an. M. iij. contusis exprimatursuccus, servetur in vitro. Dosis ℥. ij. vel iij. bis in die, cum aq. destillat. antiscorbutica.

De vitiis oris propter scorbutum oriundis.

Quamprimum labes scorbutica partes oris incessit, ut gingivæ intumescant, earumque carnes fungosæ evadant, protinus remedia, quæ putredinem ab iis arcent, sedulo adhibeantur: Inter hæc, collutiones oris, ac linimenta, & morbo circa has partes incipiente, & illo ibidem ingravescente, præcipui sunt usus; quæ tamen, uti varias intentiones respiciunt, ita diversimode parari solent, scil. gingivarum caro primo intumescens, à sanguinis, aut feri falsi, & corrupti incurfibus liberari & exsiccari; postea earundem caro flaccescens, ac à dentibus subsidens, à putredine vindicari, quin etiam ut dentes arctius complectatur, constringi debet; propter has, & forsan alias intentiones, gargarismi, five oris collutiones varii generis instituantur: quorum fere omnium præcipua ingredientia sunt vegetabilia incocta, ac mineralia infusa. Herba, aut radices, quæ liquore idoneo, scil. aqua, aut vino incoquantur, plerumque sunt vel acres, vel amara, vel styptica: dein ejusmodi decocta imprægnantur aut sale volatili, lixiviali, vitriolato, seu chalybeato, vel aluminoso. Libet hic formulas quasdam cujusque generis subjicere.

1. Cum itaque gingivarum caro propter feri ac sanguinis falsi & corrupti influxum, primo intumescit & fungosa evadit. ℥. Cort. mediani sambuci, Ulmi, an. M. β. folior. satureia, salvia, erysimi, nasturtii, an. M. j. rad. Pyrethri ℥. ij. contus. & concisa coquantur in aq. calcis ℔. iij. ad tertia partis consumptionem: si edulcoratio requiritur, adde mellis rosat. ℥. ij. f. gargarismus. Vel ℥. Vitrioli camphorati ℥. j. (vulgò apud nostrates insignitur nomine pulveris Capitanei Green) aq. fontan. ℔. ij. misce in vitro, conquassetur, & dein liquor per subsidentiam clarescens usurpetur. Vel paretur lixivium è cineribus geniste, aut rorismarini, vel è tartaro & nitro calcinato: hujus ℔. iij. incoquantur folior. satureia, thymi, salvia, rorismarini, an. M. j. colatura superfundatur folior. cochlearia M. ij. f. infusio calida & clausa per horas tres, iterum coletur & servetur ad os colluendum sæpius in die.

Propter eandem intentionem, etiam linimenta intermediis temporibus, ac præsertim noctu applicentur, ut illorum virtus ægrotantibus, vel interdormiendum communicetur. Apud Authores præscriptum frequens celebre, & longo usu expertum habetur. ℥. Pulv. folior. aquilegia, mentha

crispa,

crispe, salvia, nucis moschat. myrrha (quæ tamen aliquando omittatur) an. 3.ij. aluminis usti 3.ß. mellis virginei 3.iiij. vel q. s. f. a. f. linimentum.

2. Si quando gingivarum caro flaccescens, dentium radices destituit, Scarificatio levis sæpe adhibeatur; insuper hoc decocto os colluatur. ℞. Summitatum rubi, cypressi, folior. sanicula, cardamines, an. M.j. coquantur in aq. ferrata lb.iiij. ad tertia partis consumptionem, colatura adde mellis rosat. 3.ij. misce.

Linimentum hujusmodi applicetur. ℞. Pulv. rad. ircos Florentina, folior. salvia, hyperici, an. 3.ij. boli Armeni, salis prunelle, an. 3.j. mellis virginei calentis q. s. agitatione bene incorporentur.

3. Quando gingivæ putrescunt, & corrumpuntur, simulque dentes carie obfiti vacillant, ac tetrum odorem exspirant, medicamenta fortiora, & putredini valde resistentia adhibeantur; vitrioli camphorati, etiam lapidis medicamentosi infusio, hic adprimis locum habent.

Vel ℞. rad. Gentianæ, Aristolochiæ rotund. incis. an. 3.ß. folior. centaurii minoris, absynthii Pontici, satureiæ, aquilegiæ, an. M.j. coquantur in aq. calcis, aut lixivialis, etiam modo ferrata, modo aluminosa lb.iiij. ad tertia partis consumptionem. Colatura adde mellis crudi 3.ij. vel iiij. misce.

4. Si dentium casus præcipue metuatur. ℞. Cort. rad. prunor. sylvestrium 3.j. tormentilla, & bistortæ totius, an. M.j. malicorii, balaust. an. 3.ß. coquantur in aq. fontana lb.iiij. Colatura adde aluminis 3.ij. vel iiij. mellis opt. 3.ij. misce. ℞. Vitriol. camphorat. C. Cervi usti, an. 3.j. nucis moschat. 3.ß. mellis opt. q. s. f. linimentum. Vel ℞. Pulv. rad. bistortæ, malicorii, boli Armeni, aluminis usti, an. 3.j. mellis rosacei q. s. adde spiritus vitrioli 3.j. f. linimentum.

5. Si quando (uti interdum assolet) ulcera putrida & profunda, gingivas, aliasve oris partes incessant, remedia prædicta fortiora erunt sæpius adhibenda: Insuper loco affecto petia unguento Egyptiaco, in spiritu vini dissoluto, vel lapidis medicamentosi aut sublimati infusione intincta, aliquoties applicetur. In his casibus Chirurgo perito curatio delegetur.

De doloribus crura, ac alios interdum artus, noctu potissimum infestare solitis.

Contra hos dolores, siquidem acerbissimi interdum existunt, præter generalem scorbuti curandi methodum, remedia specifica, & symptomati isti occurrentia indicantur: Itaque in tali casu, purgationis ritu bene instituto, etiam phlebotomia (si opus sit) celebrata, & pharmacia interna & topicis externis morbum adoriri convenit.

Quoad prius, quæ per sudores, etiam & quæ per urinas movent, sæpe juvamen præstant, in quantum sanguinis, & succi nervosi recrementa lixivialia & acetosa, in parte affecta congregari solita, alio deducunt: potissimum vero adhibeantur, quæ utrumque humorem ab indole sua prava, scilicet tum salina, tum acetosa, vindicant: pulveres testacei, oculorum cancri, mandibularum lucii, item sp. & flores salis armoniaci, sp. sanguinis, tinctura antimonii, corallii: Decocta rad. & seminis bardanæ, chamæpytios, chamædryos, adprime conferunt. Cujusmodi remedia cum aquis destillatis antiscorbuticis

bis aut ter in die sumantur. *Aqua destillata*, ex *stercore equino*, additis *cochlearia*, *beccabunga*, *iua arthritica*, & similibus, interdum valde proficua est. Interea *fotus*, *linimenta*, *cataplasmata*, aut alius generis applicationes, quæ dolores sedant, exterius admoveantur.

De Arthritide vaga scorbutica.

De hoc affectu *Eugalenus*, *Uviers*, *Medicus Campensis* & *Gregorius Horstius*, ex composito scripserunt; in septentrionalibus *Belgiæ* plagis, valde frequens perhibetur. Cujus certum indicium constat, *lumbricum vivum loco dolenti* imponendo; nam ille statim exsilire, circumgyrari, incurvari, labascere, & mori solet; quod quidem in hoc morbo, etiam apud nostrates satis crebro, evenire expertus sum. Cujusmodi experimenti ratio (uti videtur) hæc est: *Doloris & tumoris* in parte affecta excitati, causam esse statuimus, quod à *sanguine faculentia salina*, sive *lixiviales*, simulque à *succo nervoso acetosa*, in eodem loco depositæ, mutuo effervescent, non secus ac *spiritus vitrioli salis Tartari deliquato commissus*: porro à tali particularum dissimilium lucta, & agitatione, uti *dolor & tumor* cientur, ita quidem effluvia valde acria, & velut corrosiva copiose abscedunt, quæ *lumbricum* loco dolenti impositum, nihilo minus, quam super liquores istos ebullientes suspensum enecant: Propter experimenti istius effectum, morbi curatio per *lumbricos*, sc. remedia ex iis parata instituitur, qui tamen nescio, utrum intus sumpti tam certo profligabunt morbum, ac illi exterius admoti à morbo profligantur. Utcumque *lumbrici*, uti *limaces*, *aselli*, & alia *animalcula exsanguia*, in quantum *sale volatili* abundant, in remedium satis efficax non raro cedunt.

Henricus Petrus refert duo remedia contra hunc morbum in *Vestphalia* usitata. ℞. *Novem lumbricos*, cum *duobus cochlearibus uni in mortario contusos*, & per pannum expressos, his addatur *dimidia vini mensura*, sumantur *cochlearia iij. mane, meredie, & vesperi, per plures dies*. ℞. *Sabinæ ramulos ij. vel iij. mellis virginei cochlearia ij. coquantur cum mensura vini ad subsidentiam duorum digitorum. Colatura sumatur ad cochlearia iij. vel v. ter in die*. Priori medicamento affinis est potio quædam vulgaris, ab *Horstio* citata, dicta *Monasteriensis*. ℞. *Salvia, betonica, Ruta, an. folia s. lumbricorum cingulis rubris in collo num. s. sabinæ parum, & rad. succisæ num. ij. cum aqua flor. sambuci contundantur, & succus expressus pro sudore movendo exhibeatur*. Etiam simile præscriptum à *Medico Campensi* apud *Forestum* proponitur.

Certe in hoc affectu, *aqua lumbricorum magistralis*, in *pharmacopœa Londinensi* præscripta egregie convenit: quin *sp. & salern C. cervi, sp. sanguinis, flores salis armoniaci*, cum bono successu sæpius adhibui. Porro *pulveres testacei*, sc. *oculi cancrorum*, *corallia*, *margaritæ*, & *vegetabilia*, quæ *arthritidis antidota* feruntur, uti *rad. aristolochiæ, folia chamaepytios, chamaedryos*, & similia antiscorbuticis conjuncta, morbi hujus sanationi conducunt. Exterius pro doloribus sedandis, præter *anodyna*, quæ sub forma *linimenti, fotus*, aut *cataplasmatibus* usurpantur: *Oleum lumbricorum, ranarum*, & *bufonum* non raro sunt valde proficua. Accepi à viro Insigni

huic morbo valde obnoxio, quod aqua è contentis ventriculo bovis nuper mactati exemptis per destillationem prolita, & cum petiis ei calide intinctis, atque pro fotu applicatis, levamen certissime adferret.

*De affectibus convulsivis & paralyticis, scorbuto
supervenire solitis.*

Si quando labes scorbutica in cerebrum & nervosum genus irrumpens, liquorem utrisque provinciæ irriguum valde inquinavit, propterea quidem diversimodi affectus, ac imprimis *paralytici*, aut *spasmodici*, prout supra ostendimus, oriri solent: nimirum juxta quod materies morbifica regimini animali illata, aut *narcotica*, aut *explosiva* fuerit. Cujusmodi affectus, licet in hoc casu symptomatici fuerint, attamen ingravescentes, præ scorbuto parente & nomen, & potiore curationis partem sibi vendicant, itaut ægrotans *paralyti*, aut *convulsione*, magis quam *scorbuto* laborare dicatur; etiam *medicamenta* istis affectibus dicata, quibuscunque aliis eodem tempore, propter alias intentiones requisitis, præponantur.

Pro sanandis hujusmodi affectibus, *scorbuto* superinductis, id potissimum agatur, ut remedia iisdem appropriata, cum *antiscorbuticis* rite complicantur. Quoad *morbos convulsivos*, quæ in superiori tractatu prostant, huc facile transferantur. Cæterum de *paralyti*, *lethargo*, necnon plerisque aliis *cerebri*, & *nervosi* generis pathematis, disquisitiones speciales aliquando forsan lucem visuras instituimus: interim haud par est, *methodos therapeuticas*, quæ ad *pathologias* istas spectant, hoc in loco præoccupare; quin potius, quod ex re fore videtur, sub calcem hujus operis, *scorbuticorum quorundam*, simul ab istis morbis decumbentium *casus* & *curationes* proponemus.

*De atrophia, item de febre scorbutica, quæ sæpe illius aut
causa est, aut affectus.*

Tria sunt *causarum genera*, serie quadam pendentia, à quarum una, aut pluribus, *atrophia scorbutica*, absque pulmonum phthisi existens, produci solet, scil. aut *chilus primarum viarum culpa pervertitur*, quominus penus ejus sufficiens, aut laudabilis, sanguini inferatur. Secundò aut isti illatus, tamen *sanguinis vitio*, non recte in sanguinem & succum nutritium mutatur. Tertiò, aut denique succus nutritius in massa sanguinea præparatus, propter *quorvis nervosi* culpam, solidis partibus non rite assimilatur.

Remedia huic symptomati appropriata, aut *primarum viarum*, aut *prædictorum humorum* emendationes respiciunt. Quoad prius, interdum accidit ob *stomachi tonum præfractum*, aut *fermentum vitiatum*, alimenta ingesta non rite coqui, sed in putrilaginem inutilem facessere. Hujusmodi malis *lenia cathartica*, *digestiva*, *corroborantia* adhibeantur. Sapius tamen propter *tumorem scirrhusum*, modo *ventriculo*, modo in *me enterio*, aliæve circumcirca partibus excitatum, chylificationis opus inhihetur:

in hoc casu *deobstruentia*, & *dissolventia* conveniunt, *acidularum usus* quibusvis remediis palmam præripit. Porro *fotus*, *linimenta*, aut *emplastra* exterius applicari debent.

Insuper interdum accidit, sine tumore in visceribus excitato, *vasa lactea* à materia crassa ac viscida iisdem impacta in tantum obstrui, ut chyli satis laudabilis, & copiose licet confecti, penus haud sufficiens in sanguinem feratur. In hoc affectu alvus ut plurimum copiose dejicit, albida tamen, instar lactis coagulati, ac non, uti aliorum excrementa, bile tincta aut foetida. Quorum ratio est, quod sanguis depauperatus bilem flavam, è qua intestinis suffusa, excrementorum color ac foetor procedunt, parcius progignit. In hoc casu *acidulae* imprimis conveniunt, item *deobstruentibus* intus exhibitis, *linimenta*, *fotus* & *balnea* exterius usurpentur.

Contra *marasmm*, sanguinis à crasi degeneris vitio exortum, *lac asinum* aut *vaccinum aqua hordeata*, aut *alia idonea destillata dilutum*, saepe opem conferunt: *Limacum jussula*, aut *lacteata cum iisdem incoctis*, porro *aqua destillata ex lacte*, aut *sero lactis cum limacibus* & *herbis antiscorbuticis temperatis*, in hoc casu valde conducunt: in hunc finem etiam *decocta ex herbis vulnerariis* & *antiscorbuticis infusis bono cum fructu sumuntur*. Interea partibus externis *friktiones* cum pannis, *unguento resumptivo*, aut *oleo amygdalarum* recenti madidis, & *intepesactis*, quotidie adhibeantur.

Cum *sanguinis* affecti, proindeque *succum nutritium* pervertentis vitio *atrophia* exoritur, plerumque *febrem erraticam*, cum sudoribus nocturnis adjunctam habet; in quantum scil. massa sanguinea, à succo isto degeneri in effervescentias inæquales, ac incertas cogitur, atque materies ita molesta sudore nocturno ejicitur. In hoc casu victu tenui iustituto, *decocta* & *aquæ destillatae*, quæ sanguinem infundunt ac purificant, cum *antiscorbuticis* admixtis crebrò sumantur.

℞. *Rasura eboris*, C. *cervi*, an. ʒ. ij. ℞. *rad. eryngii conditi* ʒ. vj. *rad. cherefo'ii*, *taraxaci*, an. ʒ. ℞. *folior lingua cervina*, *hepatica*, an. M. j. *pomum j. incisum*, *passular*. M. j. *coquantur in aq. fontana* ℔. iij. *ad tertia partis consumptionem*. *Colatura superaffundantur folior*, *beccabunga contus.* M. ij. *salis prunelle* ʒ. j. ℞. *vel nitri fixi* ʒ. j. *f. infusio clausa, & calida*, per horas tres, sumantur ʒ. iij. *vel vj. ter in die*.

℞. *Folior. beccabunga* ℔. iij. *oxalidis*, *taraxaci totius*, an. M. ij. *limacum mundatar.* ℔. j. ℞. *cort. duorum aurantiorum: contusis & concisis affunde lactis recentis*, *vel seri lactis cum pomaceo facti*, *vel succi pomor. recentis* ℔. vj. *destillentur more vulgari*. *Capiat* ʒ. ij. *bis vel ter in die*.

De rheumatismo.

Hunc affectum à *salium*, qui sunt diversæ profapiæ ac indolis, nempe *fixi* à *sanguine*, & *acetosi* à *liquore nervoso* adventantium, congressu & mutua effervescentia provenire statuimus. Utriusque salis subjecta, sunt *faculentia superflua*, à prædictis humoribus in turgescencias quasdam actis depositæ, atque in partes modo has, modo illas suffusæ: quare ut morbus curetur, & *humorum turgescencia sedentur*, & *faculentia eorum*

superflua expurgentur, etiam sales utroque ritu degeneres, ad volatilitatis statum reducantur.

Propter duas priores intentiones levis purgatio & phlebotomia imprimis requiruntur, & aliquoties pro tolerantia virium iterari debent: quin & diuretica & diaphoretica, quæ ferositates salinas quoquo modo foras convehant, subinde exhibeantur. Cujusmodi evacuationes, ut sedate, & cum *dispositis*, & natura assistente melius succedant, opiata crebro sint in usu. Propter alterum scopum, in quo præcipuus curationis cardo versatur, alterantia, & præsertim quæ sale volatili prædita sunt, valde conducunt: quare in hoc casu vulgaris, sed non contemnenda medicina est, infusionem stercoris equi musculi, in vino tenui, aut cerevisia, aut aqua destillata appropriata factam, ad ℥. iij. vel vj. bis aut ter in die propinare. Quin & pharmacum paulo gratius & non minus efficax parari potest, si ex stercore illo cum ingredientibus antiscorbuticis, vino albo, aut pomaceo infusis, aqua destilletur, quæ ad ℥. iij. vel iij. bis in die exhibeatur: spiritum C. cervi, ac sanguinis sæpius in hoc casu, cum insigni ægrotantis commodo præscripti.

De hydrope.

Cum hydropem scorbuto supervenire solitum, duplicem statuimus, scilicet habitualement & occasionalem; circa prioris medelam, plerumque & opera & oleum perditur: nulla etenim remedia hepar, atque pulmones, aliaque interdum viscera prorsus vitata, atque sanguinis crasin penitus subversam restituere possunt. In tali casu si quid agendum videtur, medicinæ ambitus perangustus existit; neque enim catharticis, nec diaphoreticis, neque aliuscujusque generis evacuationi fortiori locus relinquitur: cardiacis, ac diureticis præcipue ac fere tantum insistendum erit. In hos fines, elixyres, tincturae, electuaria, pulveres, infusiones, decocta, aqua destillata, &c. quæ partim antihydricis, partim antiscorbuticis constant, exhibeantur; quorum tamen, quia parum aut nihil significant, formulis præscribendis supersedere visum est.

Hydrops scorbuticus, à causa evidenti, sive occasione quadam, uti ostensum est, subito excitatus, non raro curationem admittit, quæ quidem ut facilius succedat, naturæ tumultus imprimis sedari, ac inordinationes compesci debent: quamobrem si vigilæ adhuc plurimum infestant, somnus opiarum usu concilietur, & subinde quoties valde opus sit, denuo accersatur. Quamprimum pro ratione virium purgare licet, sequens pulvis sumatur, & debitis intervallis aliquoties iteretur: interim à crebro enematum usu alvus soluta reddatur. ℞. Mercurii d. ʒ. j. resin. jalapæ ḡ. v. ad 10. caryophyllor. ʒ. ʒ. misce, detur in cochleari panatella. Aliis temporibus diuretica, ac interdum diaphoretica sedulo propinentur. ℞. Tinctura salis tartari millepedum infusione imprægnata q. v. detur ʒ. j. ad ʒ. ij. bis in die, cum liquore appropriato. ℞. Sp. salis armoniaci q. v. Dosis ʒ. ʒ. ad gutt. 15. eodem modo. ℞. Millepedum preparat. ʒ. iij. salis tartari ʒ. ij. nucis moschat. ʒ. j. misce: f. pulvis. Dosis ʒ. ʒ. bis in die, cum liquore appropriato. Vel ℞. Apum siccant. ʒ. pulv. ʒ. ij. sem. ameos pulv. ʒ. j. olei juniperi

℞. j. terebinth. q. s. f. massa pilul. Dosis ℞. j. ad 3. ℞. bis in die, superbibendo liquorem specificum.

℞. Fl or. cochlearia utriusque, nasturtii aq. lepidii, persicaria, an. M. iij. rad. Ari, Bryonia, iridis Florentina, an. 3. iij. corticis mediani sambuci M. ij. cort. Vvinterana 3. ij. cort. externa quatuor aurantior. trium limoniorum, baccarum juniperi recentium 3. iij. incis. & contusis affunde vini Rhenani ℔. iij. vini è succo baccarum sambuci ℔. ij. Destillentur more vulgari, aqua tota confundatur. Dosis 3. iij. ad iij. bis in die, post dosin alicujus medicamenti superius prescripti.

Parentur decocta & cerevisia medicata, qualia supra prescribuntur, adjectis ingredientibus antihydropsicis.

De crepitu ossium.

Restat adhuc *symptoma*, scorbuto interdum, licet rarius superveniens, scil. *crepitu ossium*; in cujus rationem superiori *pathologia* omissem, & *therapejam*, ex re fore videtur hic loci inquirere. Novi quosdam, vix tamen ultra tres aut quatuor, qui scorbuto dudum laborantes, noxam ejus non tantum in humoribus, & partibus carnis, sed in ipsis demum ossibus luerunt: quoties enim membrum quodvis ullo modo flecterent, ossium capita quasi nuda essent, inter se attrita, strepitum ingentem edebant; porro cum lecto decumberent, ibidemque è latere in latus se devolverent, è vertebrarum collisione, tanquam à *scelet*o asperius tractato, *crepitus ingens*, vel ipsos affectos perterrefaciens exaudiebatur.

Hujus *causa conjuncta* forsan videtur esse, quod molli ossium interstitio, scil. *adipe, membranis*, & *ligamentis* valde absumptis, ipsorum juncturae, velut lapides molares prorsus inaniti, propter mutuum attritum, resonarent: attamen rem secus habere constat, quia nec summe *tabidis* adest *ossium crepitus*, neque hoc affectu laborantes semper intabescunt: quare potius dicendum erit, quod *symptomatis* hujus *causa immediata*, sit *ossium ariditas*, sive *medulla*, ita proprie dicta, quam intra ossium cavitates, ac imprimis capita ipsorum, contineri oportuit, defectus; nam siquidem ossa quævis *medullam*, sive *humorem unctuosum*, aut *cavitatibus magnis*, aut *poris & meatibus exiguis* ubique excusis includunt: hujus usum statuimus, tum ut ossa eodem irrigata minus fragilia evadant, tum insuper, ut humor iste, ossium nodis exudans, articulos quosvis, velut *machinae commissuras* pinguedine linitas, lubricet, eorumque adeo motus faciliat; quare ossium capita hac medulla destituta, crepant non secus ac currus rotæ rarius inunctæ.

Quod si de *morbi* hujus *causa procatartica* inquiretur, quamobrem scil. unctuosum illud articulorum oblinimentum deficit: hoc equidem vel sanguinis vitio imputandum erit, quasi hic alimentum *sulphuris*, æque ac salis particeps, ossibus haud rite suppeditet; quod equidem minus verisimile est, quoniam massa sanguinea, etiam in scorbuticis, particulas utriusque generis prædictis continet; quin & *ossium crepitu* laborantes cutim, & musculos pinguedine satis oblitos ostendunt; vel secundo potius videtur, *humorem unctuosum*, quo articuli lubricentur, ipso-

rum ossium culpa desiderari, quia scilicet horum pori, & meatus à materia quadam extranea, forsan limosa, aut tartarea per sanguinem advecta, in tantum obstruuntur, propterea ut balsamum iis destinatum non satis excipiant, nec pro humectandis ipsorum commissuris exudent; non facile erit (quia res tota in abstruso latet) particulares hujus effectus rationes investigare, neque in *Ætiologia hac*, ultra hujusmodi conjecturam, pergere.

Nec minus in luto hæremus, cum ad *morbi hujus curationem* proceditur: nam licet *primaria indicatio*, scilicet *ossium aut articulorum humectatio* satis obvia fuerit, quo tamen ritu, & quibus remediis ea perficitur, non ita plane constat. Etenim in hoc casu novi plurima pharmacie genera, & varios administrationum modos, omnino incassum tentatos. *Vir quidam ingeniosus* ab hoc morbo per multos annos gravissime laborans, plurimum, & quidem celebrium Medicorum consilia expertus est; præter usitata contra *scorbutum* remedia (una cum crebris *phlebotomiis & purgationibus*, è quibus haud quicquam levaminis recepit) *varios insuper & magnos medicine cursus*, sine quovis successu tentabat: namque post methodum ab uno Medico per aliquot menses frustra adhibitam, mox ad alium se conferebat, & ita deinceps ad plures: interim à singulis nova semper *medendi ratio*, à prioribus intentata, præscribitur; *fotus, linimenta & frictiones* singulis artubus quotidie adhibentur. *Thermis Bathoniensibus* aliquamdiu utitur; postea *acidula* varii generis, modo hæ, modo istæ bibuntur. Quibus nihil juvantibus, *cursus chalybeatus*, alio tempore *decoctum lignorum temperatorum*, interdum *diata lactea*, porro nullo non tempore, *electuaria, aqua destillata, apozemata*, aliaque remedia ex *antiscorbuticis* parata sumuntur: cumque hoc ritu supra tres annos fere constanter *medice & misere* vixisset, circa prædicti affectus *therapeiam* ne hilum proficitur; interim vero ille *viribus ac stomacho* mediocriter valuit, uxorem duxit, & quoad reliqua magis communia scorbuti symptomata melius habuit: hinc ut constet, quam pertinax morbus, nullisque fere remediis cedens, *ossium crepius* fuerit, quod etiam aliis eodem affectu laborantibus, atque medici operam prorsus eludentibus, comprobatum novi.

C A P U T X.

De indicatione vitali, qua includuntur medicamenta cardiaca, opiata & diata, sive victus ratio in scorbuto requisita.

H Actenus *indicationes* tum *præservatorias*, tum *curatorias*, quæ *scorbuti therapeiam* spectant, fuse explicavimus; restat adhuc dicendum de *indicatione vitali*, nimirum ut declaretur, quâ *methodo*, & quibus remediis ægrotantium

ægotantium vires , aut nimis ad fatiscendum aptæ sustineantur , aut labefactatæ , vel prostratæ restaurentur. Propter hos fines cardiaca & opiata , juxta decumbentium exigentias assumenda præscribantur , ac insuper *recta victus ratio* , siquando opus fuerit , *analeptica* , & semper *antiscurbutica* præscribatur.

Quoad *medicamenta cardiaca* , quæ sc. sanguinem in corde stagnantem exagitant , flammam ejus semiobrutam resuscitant , spiritus animales oppressos , vel distractos libertati ac debitæ irradiationi restituunt ; ob-
vium est , plura remedia , quæ propriè *antiscurbutica* dicuntur , has intentiones perficere , cujusmodi nimirum sunt , *aqua raphani composita* , *limacum & lumbricorum magistralis* , *spirit. Cornu cervi* , *fuliginis* , *pulveres testacei* , cum multis aliis , quæ non tantum quibusdam horis , & juxta methodum certo ordine præstitutam , sed insuper pro data occasione , quoties *syncope* , aut quævis *spirituum deliquia* contingunt , cum fructu sumuntur.

Attamen præterea , qui *cordis passionibus* , *crebra leipothymia* , *nausea* , *vomitui* , *tremori* , *vertigini* , aliisque horrendis symptomatis valde obnoxii reperiuntur , etiam præsto habeant alijsmodi medicamenta magis proprie cardiaca , quibus omni spirituum exsolutioni immediatè succurratur. In hunc finem egregie convenit , *elixir vite qu. majus* ; in *destillatione ejusdem elixiris* , *aqua secunda* , quæ edulcorata ad cochlear j. exhiberi potest , item *aqua mirabilis* , *aqua bezoartica* , *aqua Gilberti temperata* , *theriacalis* , *cinnamomi* , quibus singulis , aut inter se compositis , adjiciatur *confectio alchermes* , *confectio de hyacintho* , *pulv. margaritar.* aut *magisterium corallii* , *syrupus cariophyllor* , vel è corticibus citri , è cinnamomo : ex his , aliisque hujus farinae medicamentorum formulæ diversimodæ præscribi solent. E. g.

℞. Aq. theriacalis , mirabilis , an. ℥. iiij. melissæ iiiij. syrupi cariophyllor. ℥. j. B. confectiois alchermes ℥. j. misce. Dosis cochlearia iiij. vel iiiij.

Vel. ℞. Aq. mirabilis ℥. vj. limacum , juglandum , an. ℥. ij. margarit. pulv. ℥. j. confect. de hyacintho ℥. j. syrupi cariophyllor. ℥. j. misce.

Cum mulieres *scorbutica affectibus hystericis* , ac viri *convulsivis* tentari solent , ℞. Aq. melissæ , pulegii , an. ℥. iiij. Aq. bryoniae composit. ℥. iiiij. tinctura castorei ℥. B. tinctura croci ℥. j. syr. cariophyllor. ℥. j. B. castorei nodulo ligat. & in vitro suspensi ℥. j. Dosis cochlearia iiij. vel iiiij.

Quibus remedia cardiaca in forma solida potius expetuntur , *electuaria* vel *tabulae* præscribantur.

℞. Conserva flor. tunica ℥. iiij. confectiois alchermes ℥. B. margaritar. pulv. ℥. j. cum s. q. syrupi è coralliis , f. electuarium.

℞. Specier. diamargarit. frigid. diarrhod. abbat. an. ℥. j. B. margaritar. pulv. ℥. j. sacchari albissimi solut. in aq. theriacali , & ad tabulat. coct. ℥. iiiij. olei cinnamomi gutt. vj. s. a. f. tabula.

Quod spectat ad opiata & medicamenta anodyna , in quibusdam *scorbuticorum affectionibus* malle quovis præterea medicamentorum genere , quam illorum usu destitui : nec enim solummodo contra dolores & vigilias perennes , verum in *paroxysmis asthmaticis* , in vomitu , diarrhoea , quin

etiam in *vertigine* & *pathematis convulsivis*, quoties natura supra modum irritata, inordinationes immaniores concipit, nullum præstantius remedium sæpius expertus sum, quam ut *narcotico tuto* adhibito, somnus concilietur: interim maxima opus est cautione, ne sumantur, siquando aliquid in *agrotantis constitutione*, aut in *morbi conditione*, vel *tempore*, talis medicamenti exhibitionem prohibeat.

Præter *hypnotica* in *pharmacopolis* usitata, scil. *laudanum opiatum*, *nepenthen*, *philonia*, *diacodium* & *syrupum papaveris erratici*, duæ insuper *opii* præparationes mihi innotescunt, quas in forma *tinctura*, sive *extracti liquidioris* à gut. 10. ad 20. cum alio quovis liquore appropriato exhibere soleo.

Diata, sive *victus ratio* à scorbuticis observanda, in *methodo therapeutica* haud minimi momenti est; qua scil. neglecta, aut perperam instituta, reliqua medicinae præscripta parum, aut nihil versus sanitatem proficiunt. *Regimen diateticum*, cum ad varia extenditur, præcipuè circa *aërem* & *habitaculi situm*, *cibum*, ac *potum*, atque *corporis motum*, vel *quietem* versatur.

Quoad *prius*, cujusmodi, respectu *cæli* ac *soli*, mansiones & commorandi loca scorbutum pariunt, ac proinde vitari debent, è supradictis abundè constat. Qui hunc morbum aut cavere, aut curare student, aërem moderate calidum & siccum, qui etiam tenuis & purus, & satis ventilatus fuerit, eligere satagant.

Cibi tantum *ευχυμοι* & *ευωσμοι* conveniunt; *crassi*, *viscidi*, ac *fumo indurati*, *mucidi*, ac *rancidi*, porro *alimenta infermentata*, aut *valde composita*, *legumina*, *lacticia*, *fructus immaturi* evitentur. *Saccharo condita*, aut *plurimum imbuta*, in tantum vituperò, ut illius inventionem, ac usum immodicum, scorbuti in nupero hoc seculo immanis, augmento plurimum contribuissè existimem: Enimvero *concretum istud*, *sale satis acris* & *corrosivo*, cum *sulphure* tamen delinito constat, prout ex analysi ejus spagyricè facta liquido pater. Quippe *saccharum* (prout supra innuimus) per se destillatum, exhibet liquorem aqua stygia vix inferiorem: quod si ipsum in vesica, plurima aquâ fontana perfusum destillaveris, quamvis *sal fixus* non adeo ascendit, prodibit tamen liquor instar *aquæ vitæ acerrimæ urens*, ac summe *pungitivus*: cum itaque *saccharum* quibuscvis ferè alimentis commixtum, ita copiose à nobis assumatur, quam verisimile est, ab ejus usu quotidiano *sanguinem* & *humores salios*, & *acres*, proindeque *scorbuticos* reddi. Author quidam insignis, *tabis Anglica* causam in immoderatum sacchari apud nostrates usum retulit: nescio an non potius etiam hinc *scorbuti* increbrescentis fomes derivetur.

Potus sit *cerevisia mediocris*, *mitis*, ac bene *defecata*, quin & *ingredientibus antiscorbuticis*, citra ingratum saporem alterata; non sit *crassa* & *dulcis*, nec etiam *vetusta nimis* & *acescens*: hæc in modica quantitate, ac fere tantum statis prandii ac cœnæ temporibus sumatur. Quæ apud multos invaluit consuetudo, nempe ut quamprimum lecto excitantur, statim *haustui matutino* (uti vulgo dicitur) largiori indulgeant, perniciofa admodum videtur. Etenim hac ratione, siquidem vasa sanguifera, chyli

chyli recentis penu fere perpetim suffuso, nimis replentur, & cruditates & fæculentiæ morbificæ in sanguine gignuntur, & hæmatoseos munus valde debilitatur; præstat sanè plerosque homines (nisi quibus ventriculus, quamdiu sit vacuus, molestè contrahi & corrugari solet) usque ad prandium jejunos manere. Nec minus sanitati adversatur mos iste vulgaris, statim à victu poculis plenioribus sese ingurgitare. *Vina ac pomacea* modo sint mollia, sincera ac minime adulterata, modicè sumpta non nocent; iisdem vero fucatis, rancidis, austeris, aut acescentibus, nihil magis noxium, ac sanitati nostræ injurium.

Exercitia, ac *labores* pro scorbuto tum sanando, tum præcavendo, sunt commodi adeo insignis, ut multi hoc solo remedio integram valetudinem aut tuentur, aut recuperant: etenim otiosis, & vitam sedentariam agentibus, *sanguis & liquor nervosus*, tanquam *aqua stagnantes*, quasi *lentorem & situm* contrahunt: à motu vero corporis assiduo & multo, humores & spiritus inclarescunt & vigorantur, particulæ excrementitiæ, & heterogeneæ evaporant, viscerum infarctiones expediuntur, eorumque tonus corroboratur.

CAPUT XI.

*Scorbuticorum historia quedam,
& casus rariores.*

QUæ circa scorbuti & theoriam, & therapeiam hætenus protulimus, *agrotantium exemplis*, sive *historiis* in medium productis, & juxta *hypothesein* prædictam explicatis, adhuc clarius elucescent. Cum vero ab hoc morbo laborantium casus multiplices, ac diversimodi existant, libet hic quosdam rariores, propter labem *cerebro ac nervoso generi*, non minus quam *sanguini* affixam, excitatos proponere.

Fœmina illustris, procera & venusta, in ætate 25. circiter annorum, propter varios errores in victu *labem scorbuticam* contraxerat: Cujus ^{1.} *Observatio.* indicia fuerunt *lassitudo spontanea, respiratio difficilis, tibiæ dolores & macula*, atque *gingivæ insuper tumida & sanguinolenta*: verno tempore, post *abortum*, in *febrem tertianam* incidens, cito languida, & imbecillis evasit: à quo tamen morbo primum methodice curata, brevi convalescerat, nisi quod carniæ, aliorumque incongruorum appetens, cito recidivam pateretur. Tunc autem, medicinæ pertæsa, remedia tantum empirica cepit, quibus interdum paroxysmi febriles abigebantur, mox subinde redituri: interim ægotans pallida, ad motum impotens, & anhela, juxta ventriculum, & hypochondria tumida, & inflata manebat. Circa tertium ægrotationis mensem, in *ventre tormina*, & *cruciatibus acerrimos* pati cœpit; quibus modo ad *dorsum*, modo ad *ventriculum* excurrentibus, dies & noctes fere continuo affligebatur. Insuper *crebra vertigine*, ac interdum *paroxysmis quasi hystericis* afficiebatur: item *vomitibus frequenti* molestata, *pituitam viscidam & spumeam* quotidie

rejiciebat: Intra mensis spatium morbus hic fines suos explicans, *dolores* in *dorso*, ac *lumbis*, dein postea in singulis corporis partibus excitabat. Cæterum hoc tempore, de summa *pectoris angustia*, & magna *viscerum contractione* conquesta erat. Interim habitus corporis plurimum emaciabatur, ut ossa carne destituta vix cuti cohærent. *Urina* fuit pauca & rubicunda, in cujus superficie pellicula, instar caudæ pavonis variegata accrescebat. Brevi posthæc, *stupor* & *formicationis sensus*, modo in *ventre*, modo in artubus sentiebantur, & deinceps tormina & dolores remitti cœperunt; attamen illorum vice, *paralysis* successit, quæ intra hebdomadæ spatium singula totius corporis membra ita pervadebat, ut nec *manum*, aut *pedem*, aut etiam quamvis partem flectere, aut latum unguem loco movere potuerit.

Ætiologia.

Quoad prædicti casus Ætiologiam hic obvium est, symptomata isthæc graviora, omnino à *radice scorbutica* pullulasse; namque ob labem sanguini imprimis affixam, *lassitudo spontanea*, *respiratio difficilis*, quin & *febris intermittens*, *vaga* & sæpius recurrens, aliorumque symptomatum velitationes, quasi præviæ, ac leviores inducebantur: porro *urina lixivialis*, & coloris variegati, sanguinem dyscrasia sulphureo-salina correptum plane indicabat: cujusmodi lotium eo ritu insignitum, in pluribus aliis, simili morbo affectis annotavi. Cæterum in hac domina ægro tante, quando seminium morbidum copia adauctum, & in massam sanguineam exundans, in cerebri & nervosi generis confinia explicaretur, affectus adhuc graviores subnascebantur; nempe materies *viscerum* particulis heterogeneis & irritativis constans, intra *cerebrum* deposita, *vertiginem* & *scotomiam*, cum diathesi spasmodica intulit; dein portio ejus in *nervos paris vagi*, & *intercostalis* illapsa, eorumque ductu ad *plexus mesentericos* detrusa, *colicam scorbuticam* excitavit; cumque eadem materies in immensum aucta, plerosque alios nervos subiret, affectus dolorifici fere in singulas corporis partes propagabantur; in quantum scilicet *recrementa acida*, stagnatis vitriolici æmula, passim è *succo nervoso* deposita, cum *salsamentis lixivialibus*, ubique etiam à *sanguine* suffusis, congregarentur; ultimo dein cum nervi omnes, à materia morbifica sensim oppleti & infarcti in tantum obstruerentur, ut spirituum irradiatio, & commercia inhiherentur, *paralysis* in toto corpore successit.

Curatio.

Hæc domina procul hinc degens, ex Medici vicini consilio cepit medicamenta contra *affectionem colicam* usitata; quibus non obstantibus, cum morbus ingravesceret, patiens Oxonium adducta, remedia quamplurima tum *antiscorbutica*, tum *antiparalytica*, cujusque fere generis ac formæ, sine quovis tamen fructu, tentavit. Postquam igitur ordinaria quæpiam medendi methodus huic morbo impar videretur, ad *remedia magna*, & quidem periculo haud prorsus libera, pervenire visum erat. Quare huic ægrotanti, utut debili & emarcidæ, pharmacum mercuriale, *salivationis* excitandi gratia, exhibebamus. Cujusmodi effectus ex voto successit: namque *fluor oris* intra biduum exortus, & sine malo quovis symptomate per plures dies blande persistens, illustrissimæ Domine plurimum

plurimum levaminis conferebat. Doloribus enim mitigatis, membra aliquatenus movere, alimenta melius appetere & concoquere, quin & somno quieto frui coepit: *salivatione* finita, cepit *decoctum* è *sarsa* & *Cbina*, cum ingredientibus antiparalyticis, per paucos dies; dein *Bathoniam* adducta, ibidemque *thermis* temperatis aliquandiu usa, mediocrem valetudinis statum recuperabat. Tota hyeme medicamenta contra *scorbutum*, & *paralysin* constanter sumebat; cumque anno sequenti thermarum usum repeteret, perfectè convaluit; & postea plurium liberorum læta mater evasit.

Vir *quadragenarius*, temperamenti melancholici, à multis annis *scorbuto* Observatio. laborans, multiplicia & diversimoda ejus symptomata variis anni temporibus experiri solet. Circa crura *macula*, & *stigmata* nigra latiora, tanquam vibices apparent; *ventris dolores*, cum alvo soluta, crebro instant; urina ut plurimum lixivialis apparet, *lassitudo spontanea*, *languor virium*, & *inappetentia* fere constanter adsunt: Præter hæc mala ordinaria, & velut assueta, insuper ægrotationis paroxysmis atrocioribus, iisque varii generis obnoxius degit. Ante biennium, quando hunc primò invisebam, de respiratione difficili, tanquam suffocari periclitaretur, cum tremore cordis, spirituum deliquiis, & crebro leipothymias metu gravissimè conquestus erat: insuper si quid horum in præcordiis pathematum paulò remitteret, ut plurimum scotomia gravis, & vertigo eum incessabant. Ab his affectibus, postquam remedia antispasmodica cum antiscorbuticis complicata aliquandiu ceperat, perfectè convaluisse visus erat: deinceps vero intra paucas septimanas nausea & cardialgia, cum hypochondriorum inflatione afficiebatur: urina erat pauca, & valde lixivialis; brevi abdomen intumescebat, dein pedes, & crura summe oedematosa *hydropis* ingruentis indicium præbuere: postea femora, necnon dorso, & brachiorum carnes ejusmodi tumor incessit, qui tamen affectus, licet deploratus videretur, remediis *antiscorbuticis* cum *catharticis* & *diureticis* adjectis, facile curabatur. Attamen vir egregius, licet valetudini restitutus, non ita diu perstitit: etenim binis anni quadris vix elapsis, de *cephalalgia* gravi, cum *vertigine*, & *vigilia* pertinaci queri coepit; deinde sine causa evidenti, *vomitum horrendo* corripiebatur: brevi postea *paroxysmi asthmatici*, cum *tremore cordis*, & *spirituum deliquiis* redibant. Hoc etiam tempore, cum pene deploratus videretur, rursus medicamentorum antiscorbuticorum usu brevi convaluit. Ex hoc casu liquido constat, quantum malorum *miasma scorbuticum*, fermenti instar, tum in sanguine, tum in succo nervoso latitans, & pro data occasione virus suum explicans, inferre potest. Cujusmodi tamen affectus, utut horrendi ac terribiles videntur, dummodo ab humoribus tantum in crasi vitiatis, ac minimè à visceribus in *tono*, aut *conformatione* læsis dependent, plerumque facili negotio, scilicet methodo antiscorbutica, juxta patientis, æque ac morbi conditionem apte designata curari solent.

Clarissima Domina 25. circiter annos nata, temperamenti sanguinei, Observatio. gracilis corporis habitus, *ευχρηστος* & venusta, affectione *scorbutica* dudum tio.

laborarat : nam præter *maculas latas*, & *herisipelata* in diversis corporis partibus erumpentia, *dolores & cruciatus* acerrimos, noctu potissimum ingravescentes, modo in tibiis, modo in brachiis, à longo tempore pati solebat ; medicinam, curationis gratia sæpius inceptam, quia prægnans fuerat, statim omittere cogebatur. Post novissimum puerperium, siquidem lochia copiosius effluerant, per plures dies languida, & imbecillis, cum respiratione difficili, & ad motum quemvis anghela permanfir : Post exactum à puerperio mensem, lecto excitata, & ambulare aggressa, in *dyspnœam* gravissimam, cum tremore cordis, & crebro spirituum deliquio incidit : è vestigio lecto commissa adhuc tremens, & creberrime palpitans, per integrum fere diem perstitit : porro membra inferiora, tanquam instante letho, prorsus algida, nullis frictionum, aut pannorum excalefactorum applicationibus intepescebant : tandem nycthemero pene elapso, à cardiacis fortioribus frequenter exhibitis, circa præcordia melius habuit : succedebat tamen juxta inguen sinistrum in summitate femoris dolor valde acutus, usque in suram protensus, atque intra paucas horas tumor subdurus tactui resistens totum illud spatium occupabat. Hoc tempore accersitus, cum ægrotans adhuc *δύσπνοα* & anghela fuerit, statim enemate mox injiciendo præscripto, exhibui *℞. C. cervi gut. 12. in cochleari julepii sequentis*, ejusdem *℥. ij.* postea ebibitis. *℥. Aq. limacum ℥. vj. hystericæ ℥. iiij. jugland. simpl. pulegii, an. ℥. iiij. sacchari ℥. j. castorei petia ligat. & in vitro suspens. ℥. j.* Hæc medicamenta sexta qualibet hora iterabantur. *Vesicatorium* amplum internæ parti femoris applicandum curavi : dein vespri, siquidem toto hoc paroxysmo adhuc insomnis perstiterat, exhibui *landani ḡ. j. margarit. pulv. ḡ. vj. confect. alchermes sine mofcho ℥. ss.* Placide dormivit, & mane sequenti plurimum alleviabatur : dolor, & tumor femoris aliquantulum remiserunt : etiam dummodo in lecto quiescit jacuit, circa præcordia recte habuit, verum erecta, aut in latus conversa, illico præ *dyspnœa* fere expirare visa erat : Usus *℞. C. cervi & julepii* sexta qualibet hora iterandum per plures dies continuavit. Cæterum quoniam siti molesta premebatur, atque urinam usque parcam, rubicundam & contentis saturatam reddebat, *apozematis* sequentis dosin ad *℥. vj.* bis in die capiebat. *℥. Rad. graminis, cherefolii, eryngii condit. an. ℥. vj. rasur. eboris, C. cervi, an. ℥. ij. C. cervi usti ℥. j. ss. passular. ℥. ij. pomum j. incisum, liquiritia ℥. ij. ss. Incis. & contus. coquantur in aq. fontan. ℔. iiij. ad tertia partis consumptionem ; dein additis vini albi ℥. iiij. coletur in lagenam, cui imponantur foliorum cochlearia, beccabunga, an. M. j. salis absynthii ℥. ij. f. infusio clausa, & calida per horas tres : Colatura servetur in vasis occlusis.* Diebus modo singulis, modo alternis enema injiciebatur. Horum usu in dies melius habere videbatur, ut intra hebdomadæ spatium lecto excitata per duas aut tres horas juxta focum in cathedra sedere potuerit : Si tamen paulo magis, quam par erat, aut lecto abstineret, aut movendi nisum exereret, illico in *dyspnœam*, sive *paroxysmum asthmaticum* incidere solebat : ita ut quodam die extra lectum diutius morata, morbi insultum graviolem perpeffa, respiratione difficili, totius corporis

poris tremore, ac crebris spirituum deliquiis afficeretur: Propter hanc dominæ ægrotantis recidivam, denuo accersitus, *ss. C. cervi ad gutt. 20.* cum *julapio* supra præscripto, atque vesperi *laudani* nostri dosim exhibui; cum exinde circa præcordia melius haberet, dolores & tumores in femore, & tibia dextra, quales antea in sinistra evenerant, succedebant: *Vesicatoria* etiam isti femori applicanda præcepi, atque præter remedia hætenus citata, cœpit bis in die *vini nostri è succo cochlearia* ℥. iiij. cum *aq. magistralis anti-scorbutica* ℥. ij. Insuper *purgationem ex syrupo nostro solutivo* superius præscripto institui; quæ cum bene successit, intra tres, aut quatuor dies iterandam præcepi. His remediis intra mensem convaluit.

Quod spectat ad *symptomatum rationes* in prædicto casu observandas, *Ætiologia.* imprimis obvium est, à maculis, & artuum doloribus, & sanguinem & succum nervosum labe scorbutica dudum fuisse tactos; quæ tamen intra prædictos humores, quousque spiritu vitali ac animali pollebant, velut subjugata, absque malo insigni latebat: post ingentem vero hæmorrhagiam, cum *sanguis & liquor nervosus* in crasi fatiscerent, morbidi semini particulæ, instar fermenti commotæ affectus terribiles excitabant: *dyspnœa* gravissima propter duplicem causam, sive gemini mali concurrentem exoriri videbatur; nempe & quia sanguis depauperatus in corde stagnaret, & quia nervi quidam pneumonici materia scorbutica obsessi circa respirationis munus inhiherentur: Hinc etenim necesse erat, pulmones, ut sanguinem è corde haurirent, citissime moveri, atque respirationis actus à nervis impeditis, debiliores, proindeque crebriores & valde laboriosos fieri. Urgente *dyspnœas* paroxysmo, cum sanguis circa præcordia plurimum exaggeraretur, partes extremæ (ubi tum pene defecerat) propter ejus absentiam algebant; postea cum pulmonum spasmus remitterent, atque sanguis materia morbifica, quam ibidem resorbuerat, valde imbutus, à stagnatione sua solutus, circulationi redderetur, iste in femora, scil. modo dextrum, modo sinistrum prius desertum, impetuose irruens, proindeque canales suos exundans; unà cum serosa colluvie extravasatus, tumorem subitum cum phlogosi inducebat. Attamen propter hanc materiæ morbificæ in partes ignobiliore metastasin semel iterumque factam, morbus licet valde periculosus videretur, remediis humorem dyscrasias alterantibus, atque mineræ morbificæ reliquias blande auferentibus, facile cedebat.

Vir nobilis in ætate 33: circiter amor. temperamenti, uti videtur, sanguinei, procerus & gracilis, ingenii maxime acuti, animique sagacis, etsi à longo tempore studiis immodicis ac intempestivis, una cum inordinata victus ratione se plurimum exercuerat, usque tamen vegetus ac vigore plenus, mente sana in corpore sano fœui videbatur; paulo ante biennium, cum per noctem integram inter convivas tripudiando se valde delassasset, mane lecto frigido intra cameram nimis humidam commissus, & somno aliquanto potitus, ægrotare cœpit. Experrectus enim in maximas circa præcordia perturbationes, cum gravissimis spirituum deliquiis, quasi jamjam fuisset moribundus, *Observatio.*

incidit. Post vini haustum, & remedia quædam cardiaca assumpta, paulo melius habuit, subinde tamen recidivam passus, ut toto isto die, tum ipse, tum amici ejus, aut *syncopen lethalem*, aut *apoplexiam* imminentem vererentur. Cæterum postquam hic morbi insultus præterierat, usque tamen cordis passionibus quotidie obnoxius degebat, & propter graviores quemvis in victu errorem, rursus paroxysmo immaniori affligi solebat. Non obstante remediorum usu, morbus ingravescens, intra paucos menses non tantum *præcordia* infestabat, verum in *toto corporis habitu* modo *frigoris*, modo *caloris* suffusiones, porro in *artubus*, aut *stupor*, aut *formicationis sensus*, aut *leviores spasmi*, ac *subita contractura* excitabantur. Nuper autem, præter symptomata hæcenus citata, quæ etiamnum Dominum Illustrissimum valde molestant, insuper *crebra vertigine*, & *spirituum cerebri anterioris incolarum distractionibus & deliquiis*, gravi modo afficitur, in tantum ut studiis & negotiis (quibus semper addictus fuit) politicis, immo & severiori quavis mentis intentione abstinere cogatur: secus namque tum in *capite*, tum in *nervoso genere* ejusmodi perturbationes persentit, ut vel morbi *attoniti insultum*, vel *affectiones spasmodicas* horrendas pertimescat: Urgente hujusce ægritudinis paroxysmo majori, plerumque etiam *ventriculus* perturbatur: Cæterum à vomitu aut sponte naturæ, aut medicamenti emetici ope suscitato, sæpius levamen percepit. Hinc nonnulli morbi causam omnino circa stomachum aut hypochondria subsistere arbitrati sunt: Attamen huic medicamina *cathartica*, *emetica*, *digestiva*, *cephalica*, *antiscorbutica*, *chalybeata*, aliaque cujusque fere generis à Medicis celeberrimis, quinetiam ab empyricis & agyrtis, per biennium præscripta, pro morbi curatione minus profuerunt. Nuper *acidulas Astropenses* expertus, ab earum usu, siquidem deterius habuit, statim desistens, jam proximè consulitur ut *aquas sulphureas* apud *Knarborough* in agro *Eboracensi* potaret: quo tamen successu, dum hæc scriberem, mihi nondum constitit.

Ætiologia.

Hic *casus*, quia propter variorum symptomatum syndromen, ad nulum præterea peculiare morbi genus spectat, non immerito ad *scorbutum* refertur. Enimvero suspicari licet, ægrotationis istius *procatarxin* jamdudum in vitiosa *sanguinis dyscrasia* positam fuisse, nempe quod liquor ejus à dulci, balsamico & spirituofo, in acrem, sive sulphureo-salinum, propter elementa isthæc suprâ modum evecta, degenerasset: quod equidem accidisse videtur, partim ob errata in victu; quippe vir insignissimus post negotia, & studia severiora ad *μεσομένητιον* sæpe protracta, tunc temporis cœnare, & statim lecto commissus obdormire solebat: Porro hic morbus partim oriebatur à lienis, aliorumque forsan viscerum, fermenta morbida sanguini suppeditantium, diathesi valetudinaria: nec enim prorsus sine ratione fuisse censemus, quod *lien* accusaretur.

Sanguis dyscrasia prædicta laborans, proindèque recrementa heterogenea congerens, à causa evidenti adjutus, eadem capiti facile suffundit: quare cum cerebrum propter studia immodica & intempestiva nonnihil debilitatum injuriis minus resistere valeret; cumque propter

ocasio


occasionem superius citatam, massa sanguinea in majorem ebullitionem eversa, totius corporis poris mox constrictis, satis eventilari nequireret, ejus magna in caput suffusio primam ægrotationem manifestam inferebat: nempe à cruore circa capitis regionem nimis aggesto, imprimis faciei intumescencia, & phlogosis evenerunt: porro ab eodem tunc temporis τὸ ἐγκέφαλον confinia impetuosius irruente, ac ibidem stagnante, particulæ heterogeneæ, partim *narcotica*, partim *explosiva* in nervorum origines decumbabant: quibus ita materia incongrua obsessis, perturbationes istæ circa præcordia excitatæ (propter rationes in pathologia spasmodica ostensas) successerunt. Porro in quantum eadem materies versus occiput delata, nervos à spinali medulla oriundos subiens, totos eorum ductus, ac processus extremos pervaderet, in toto corpore *stupor*, *formicatio*, atque *spasmi* leviores ciebantur. Porro quia *nervi*, eorumque propagines vasa sanguifera circum ambientes, spasmis affecti, varie contrahebantur, ob sanguinem quasi *frænis* & *stimulis* modo coërcitum, modo exagitatum, subitæ istæ frigoris & caloris diffusiones in toto corpore exoriebantur.

Circa morbi initia, quia materies νοσῆσθαι è massa sanguinea suggesta, aut in *cerebelli* regionem primò irrumpens, aut intra cerebrum licet admissa, illinc denuo statim amandata, circa *nervorum origines* potissimum defigeretur; idcirco sine *vertigine*, aut *scotomia* præviis, aut principibus animæ potentiis insigniter læsis, præcipua labe in appendice nervosa, atque circa exteriores ejusdem processus apparebat: postea vero ob sanguinis dyscrasiam indies auctam, atque τὸ ἐγκέφαλον constitutionem magis labefactatam, particulæ heterogeneæ etiam *cerebrum anterius*, sive regale animæ palatium, perrumpentes, spiritibus ibidem incolis, & deliquia & distractiones intulere. Adeo morbus hic, post radices alicubi intra ἐγκέφαλον semel actas, non obstante remediorum usu, fines suos quotidie explicabat, ut cum primo tantum origines nervosæ *paris vagi*, ac *intercostalis* afficerentur; deinde mox horum, aliorumque totius corporis nervorum processus, & ductus interiores materies morbifica subiret; quibus oppletis, demum illa è sanguine adhuc impuro in *cerebrum* ipsum suggesta, nobiliora ejus claustra occupabat: Cujusmodi affectionum cephalicarum similes progressus in multis aliis observavi; ita ut plane constet symptomata isthæc, tali serie excitata, ob causas prædictas, ac minime propter *vapores* à visceribus elevari suppositos, oriri.

Quod autem paroxysmo vigente, sæpenumero *ventriculus* perturbatur; item quod à *vomitione* levamen subito conferri solet, non difficile erit, salva hac hypothese, rationes ostendere. Quoad prius, nihil magis obvium est, quàm ventriculum subverti, atque nauseam aut vomitum succedere propter molestiam circa nervorum origines inflictam, prout in superioribus fusè ostendimus; dein plures sunt rationes, ob quas vomitio juvamen præstet: Primo namque, siquidem *nervi paris vagi*, & *intercostalis* hoc modo plurimum succutiuntur (uti partium nervosarum mos est) *εὐταξίας* suas, à causa interna excitatas, statim remittunt, scil. membrum pruriens.

pruriens, aut dolens, si fricatur aut scalpitur, à molestia liberatur. Cæterum prædicti nervi, inter vomendum valde succussi, & contracti, materiam *morbificam* in principiis eorum, aut extremitatibus infixam, facile excutiunt; quibus accedit, quod sæpe materies acida, vel acris, aut alio modo infesta, intra primas vias aggesta, ibidemque aut sanguinem fermento noxio inficiens, aut corpora nervosa in spasmos irritans, per vomitum educitur, proindeque morbi fons, aut irritamentum evocatur.

Quoad *methodum therapeuticam*, in hoc casu, aliisque similibus usurpandam, *duæ sunt intentiones*, quibus præcipue insistendum erit: sc. *primo* sanguinis massam depurare, ejusque fermenta noxia à ventriculo, liene, aliisque forsan visceribus suggesta subducere oportet. Secundo cerebrum & nervosum genus, ne particulas extraneas admittant, corroborari: quin & succus nervosus istarum partium irriguus, à recta crasi in acetosam, aliasque morbidam degenerans, restitui & rectificari debet. Prior harum *catharticis*, *emeticis*, *phlebotomia*, ac imprimis medicamentis specificis cruoris labem scorbuticam corrigentibus, aut penitus auferentibus perficitur: Quod autem *acidula ferrata* sive *vitriolica*, celeberrimum sanguinis *καθαρόποιον*, huic Domino obfuerunt potius quam opem præstiterunt, in causa esse videtur, tum quòd cerebrum, propter affectiones cephalicas imbecillius factum, aquæ colluviem sanguini immisam ægre excludit; quin ab ea confinia sua impetuosius adpellente, inundari periclitatur: tum insuper quia cum liquor nervosus à crasi sua degener, in *acetosam* vergit, ab *acidularum sale fluido* magis perverti solet. Quare passim observamus, in *rheumatismo* & *arthritide*, ab ejusmodi aquarum potu diathesin morbidam augeri. *Secunda intentio* per *remedia cephalica*, ac imprimis sale volatili prædita, cujusmodi sunt *sp. & sal sanguinis*, *fuliginis*, *C. cervi*, *radix & sem. paonia*, *folia visci qu.* &c. quibus *antiscorbutica* commiscentur, optimè instituitur.



AFFECTIONUM HYSTERICARUM,

E T

HYPOCHONDRIACARUM

PATHOLOGIA SPASMODICA

VINDICATA;

Contra Responſionem Epistolarem NATHANAELIS
HIGMORI M. D.

*Cui accesserunt Exercitationes duæ Medico-
Physicæ. I. De Sanguinis Accensione.
II. De motu Musculari.*

P R Æ F A T I O.



Uò d à pluribus scripta mea subinde aggressis,
impetitus vindicias antehac nullas, jamque has
ita serò apparaverim, id (CANDIDE LECTOR)
nostrâ utriusque causâ factum esse scias, ne scil.
alienâ patientiâ, proprio utique otio abuterer.
Magnâ quidem cum pompâ dici solet, veritatem ex discep-
tantium conflictu, tanquam ignem ex attritis silicibus oriri:
Scintillulas fateor aliquas fugaces, & evanidas ita interdum
executi; at si quis lumen, ignemque expetat, non tam per-
cussu, quàm blanditiis, & molli benignoque afflatu opus erit,
quo cæca flammæ rudimenta jubar induant, seque leniter ex-
plicantia, unâ aspiciant, & imitentur diem. Reverà ingeniosæ
aliquæ argutiæ, & captiunculæ non ingratae sæpe inter dispu-
tandum

tandum enascuntur; sed frustra quispiam sobria rationum momenta, ac justa rerum pondera speraverit, ubi non veritas, adeò quàm fama, & triumphus spectantur.

Quandoquidem igitur Empirici nonnulli, arreptâ tam quidlibet impunè scribendi, quàm ludendi de corio humano licentiâ, placita mea, quæ non satis intelligunt, passim dilacerant, & convellunt; & quo speciosius merces suas venditent, libellorum titulis *me Triumphatum* prædicant; hos ego non aliter quàm silentio, & contemptu redarguam, utpote quorum scripta & responso indigna sunt, & spreta exolescent. Nec majoris illos æstimo, qui Argumentorum loco, tantum opprobria & convitia ingerentes, debacchari potius, quàm philosophari videntur. Interea uti præter spem semper, & votum fuit, hypotheses nostras uspiam omnibus arrisuras, ita non est ut ægrè feram, si quisquam circa abditas rerum causas, ubi tantum conjecturis locus est, in contraria versatur opinione, aut à nostra quavis dissensum suum apertè profiteatur; modò id candidè fiat, & non barbaris rixis jurgiisque purissimæ scientiæ deturpentur: Quocirca cum Doct. *D. Highmorus* Pathologiæ nostræ circa Affectiones Hystericas, & Hypochondriacas, suam etiamnum opponat, atque ad rationes conferendas provocet; lubens in Arenam descendo, eoque lubentiùs, quòd proinde sperem, Doctrinam nostram Spasmodicam, si post fortissimi Adversarii insultus, & Arietes nequicquam admotos, obistere valeat, stabilem prorsus & inconcussam in posterum permansuram. Verùm ne solo controversiarum pulvere Lectorum oculos exciperem, visum est mihi, ex Arenâ ipsos paululùm ad amœniora deducere, & Paradoxa quædam à me Pridem tradita, nempe *Sanguinem accendi*, & *Spiritus Animales quasi elasticos explodi*, jam demum fusiùs explicata, necnon rationibus, & experimentis confirmata, responsioni nostræ adjicere. Revera exercitationes hæ duæ posteriores, ad *ψυχολογίαν* nostram, in lucem aliquando forsan prodituram, propriè spectant: quia tamen propter notiones quasdam insolitas, & non receptas, proles aliquatenus suspectæ habeantur, idcirco has per se priùs educendas censui.

Vale.



AD VIRUM DOCTISSIMUM
NATHANAEL. HIGHMORUM,
M. D.

RESPONSIONEM tuam epistolarem (*Egregie Domine*) de affectibus hystericis, & hypochondriacis ad me datam, atque adversus me scriptam, eo animo perlegi, ut in quam partem graviora argumentorum pondera deducerent, ad eam inclinarem: neque enim propriæ sententiæ tam pertinaciter unquam adhæsi, ut ad veriore à quocunque oblatam, non lubens transferim; verùm libratis utrinque rationibus (cum me nondum moveri aut immutari sentiam) tuisque in unam lancem, nostris in alteram impositis, utra demum pars præponderet, aliis judicandum relinquo. Occurrunt fateor in Pathologia phænomena quorundam solutiones conjecturali (prout res ferebant) modo, licet obiter tantum, à me traditæ, quas securius cavillari poteris, usque tamen immota perstabunt fundamenta, quæ in vestra hypothese planè vacillant, & invitis omnibus, quæ nuper substituísti, fulcris, prorsus corruent.

Prima inter nos orta est controversia, de *Passionis Hystericæ* natura, causis, & sede primaria; utpote quam Tu *sanguinis & pulmonum*, egomet *cerebri* potius, & *generis nervosi* affectum esse sentio: quanquam & ipse in recitanda hujus morbi historia, prima ac ultima symptomata ad caput, & functiones animales retulisti. Dicis enim *paroxysmi prænuntios esse magnos capitis, frontis maximè, temporumque dolores, aurium tinnitus, & pulsationes, ac cordis tremores*: dein quòd *paroxysmo invasuro, cordis gravitas insignior, & animalium actionum omnium torpor exeruciant*; qui revera tum capitis, tum cordis affectus in fibris nervosis, aut nervis ipsis consistentes, ad *genus nervosum* potius quam ad *sanguinem* spectant. Insuper *paroxysmi catastrophen* describens, asseris *deliria, convulsiones, cum syncope, spuma nonnunquam per os perfluente, tragædiæ huic complementum addere*. Verumtamen hæc omnia, quasi pro nihilo habenda penitus tibi exciderant, morbum per causam ejus postea te definiturum professus, dicis *passionem hanc (hystericam dictam,) esse strangulationem à imio sanguinis subtilis, ac flaculenti in pulmonum vasibus, cordisque thalamis infartu ortam, quo pulmones motum sequi thoracis, ac diaphragmatis inhabiles, ac cor suos sinus ab infarctu illo pleniori, per pulsus licet frequentiores liberare ineptum, redduntur*; atque hinc necessario insequitur, primò *dyspnœa, & inde suffocatio, quam ut effugiat natura, facultatem invuat animalem, quæ ne simul cum vitali pereat, spiritus suos copiosè licet, inordinate & irregulariter emittit, qui sic profusi motus tales irregulares, quos convulsivos vocant, excitant*.

Hypothesin hanc Tuam (*Vir Clarissime*) si quo modo licuisset, in-

tactam olim, atque illibatam reliqueram; neque enim aliorum placita, nisi coactus necessitate, unquam attrigi. Sed dum propriæ sententiæ viam aperirem, Tuamque, quæ obsepiebat, paululum tantum, & leviter amoverem; sensi tandem urticas, quo mollius tractantur, eo certius urere, spinaeque non tantum nocere attritas, quam si tenerâ manu demulceantur: Proinde liceat mihi (prout res nunc postulat) Ætiologiam tuam paulo liberiùs excutere, quamque in prioribus scriptis solummodò minus esse verisimilem, modestè innuebam, tandem diligentius examinatam, non tantum improbabilem, sed & impossibilem prorsus asserere: quod certè satis constabit, ubi *hæc tria* ostendero. *Primò*, sc. sanguinem, utut subtilem, & quantumvis flatulentum, nunquam ita turgescere, ut donec intra vasa continetur, ductus uspiam sanguiferos, multò minùs *cordis thalamos*, & *vasa pneumonica* nimis opplendo infarciat, ac penitus obstruat. *Secundò*, Affectiones istas pro pathognomonicis à Te habitas, nempe *suffocationis sensum*, & *dyspnœam*, in multis hystericis prorsus deesse, & cum adfuerint, nec primas, nec præcipuas semper reperiri. *Tertiò* Prædictas istas in thorace passiones, reliqua morbi hystericæ symptomata, nempe quæ in *abdomine*, in *capite*, ac in *membris* contingunt, nullo modo producere posse. His solidè ac breviter expeditis, postremò *responsiones*, *objectionesque* ad vestram pathologiam stabiliendam, nostramque evertendam à Te allatas discutiamus.

1. *Sanguinem* particulis activis, aut (si malis) elasticis constare, ultro Tibi concedimus; hinc ut sponte ad turgescendum aptus, tum circuitu perrenni faciliùs circumagatur, tum in effervescentias febriles, aut aliàs inordinatas proclivis existat; dummodò intereà pariter concedatur, neque has, neque illum unquam fieri sine cordis & corporum impellentium actione, seu molimine animali. Quinimò sanguis quantumcunque intra ductus satis apertos effervescit, nisi aut ipse coaguletur, aut partium à quibus impellitur, virtus motiva deficiat, eos nunquam ita inferciendo obstruit, ut sibi viam præcludat. Enimverò si hoc uspiam omnino contingeret, saltem ubi sanguis maximè turgescit, sc. in febre *Causone*, aliarumque acutarum proxiymis; in quibus sc. tota massa sanguinea velut in flammam acta, & plurimum rarefacta, ductus omnes, quæ licet, rapidissimè trajicit, atque rapido hoc cursu calorem intensissimum ubique diffundens, vasa valde implet, ac immaniter distendit, ita ut *Cerebri* claustra sæpe perrumpens, functiones animales perturbet, & non rarò penitus evertat, quapropter si omnino ab illa sanguinis turgescencia cor, & pulmones periclitarentur, ab ista sanè non tantum oppleri, sed planè obrui oporteret; quod tamen ita evenire observatio communis nunquam testatur: nam cor & respirationis organa, magno labore & nixibus creberrimè repetitis, sanguinis impetuolissimè sese ingerentis circulationem expediunt: siquando autem ab immodico febris æstu deliquium aut mors accidant, id propterea evenit, vel quòd muscoli pneumonici, & cor ipsum à vehementi diuturno exercitio, fractis tandem viribus, fatiscunt; vel quia massa sanguinea insigniter depravata, & quoad crassam exsoluta ad fermentandum ampliùs, sive accendendum inhabilis evadit.

Quod

Quod verò instas, sanguinem multis aliis modis turgescere, prout in hæmorrhagiis, catameniorum fluxibus, subitis tumorum, dolorum, aliorumque affectuum translationibus, *sine aliquo eminente præcurrente, quas in instanti, & dicto citius fieri statuis*; Haud inficias imus, sanguinis fluxiones à parte in partem contingere, & materiam morbificam huc, illuc variè transferre: tamen æquè certum est, hoc nunquam tam citò ac *immediate* peragi, prout innuisti, sed trajecto priùs corde, & sanguine per multiplicia ejus ostia minutatim, & partitè traducto, non aliter quàm hominum catervâ per fores angustas viritim transeunte, adeò ut donec sanguis nondum extravasetur, periculum nullum sit à subita ductuum circa præcordia sitorum infarctione. Siquando autem obstructio circa vasorum extremitates contingit, sanguis arteriosus sese usque prorsum urgens, primò effluvia vaporosa, dein serum, & quævis alia recrementa exuens, venas ingreditur; sin amotis istis se expedire requeat, sui portionem quandam extra vasa propellit, & seponit, quo reliquus latex in circulatione liberiùs pergat; adeò sanguis, quousque vegetè plenus, ubique viam inveniet, aut faciet, neque ulla huic ex propria culpa remora contingit, nisi quando à maligno fermento profligatus subitò coagulatur, vel effœtus, aut nimis aquosus ad fermentandum, atque ad spiritus animales cerebro & nervis suppeditandos, inhabilis evadit.

Sed regeris Tu, *incursum sanguinis in pulmones magis favire, quia in partem spongiosam, nimiumque capacem particula flatulenta & elastica (in cordis ventriculo quasi accensa) exploduntur*. Miror Te hic causam eandem fulminantem pro sanguinis turgescentiâ explicandâ adduxisse, quam à me pro elastico spirituum animalium impetu describendo assignatam, in ipso epistolæ tuæ vestibulo irrifisti: porrò admirari subest, quare pulmones, tanquam *nimium capaces*, sanguinem autem, quòd *subtilis & flatulentus* sit, criminariis; quæ conditiones utrosque ab omni culpa potiùs eximere videntur, quàm in ipsos morbi causam transferre: an quòd *hic* magis fluxilis est, inque *istis* spatium liberiùs, & apertius nactus fuerit, eo constipationi minùs obnoxius evadit? Et profectò cuipiam seridè perpendenti *cordis & organorum respirationi* dicatorum actiones, & usus, manifestum erit, has partes præ quibuscumque aliis, immo omnino à sanguinis, modò sit fluxilis, infarctu immunes esse.

Cor, Musculus in toto corpore robustissimus, motu perpetuo, molen-
dini hydraulici instar agitatum, sanguinem duplici circuitu, nempe per pulmones ac per totum corpus impellit: in præcordiis quo meliùs cursus ejus regi, atque tum à stagnationibus, tum ab exundationibus inhiberi possit, ita cautum est, ut cordis *sinus dexter* sanguinem minutis tantùm portionibus & velut cochleatim admittens, in pulmones ejiciat, atque eodem tempore, pari passu, & ferè dimenso, *sinus sinister* eum ex pulmonibus cochleatim excipiens, foras trumat; in utroque cordis sinu bina constituuntur, quæ vicissim aperta, & statim occlusa, unicâ vice, unicam sanguinis portionem, hîc illic inducunt, educuntque, adeoque semper cavetur, nec istæc aut à tergo, aut à fronte ab altera obruatur, aliamve obruat.

Cæterum ob majorem circuitus sanguinei intra præcordia securitatem pulmones perpetuò agitati, & spiraculis instructi, sanguinem pertranseuntem succutiunt, ac promovent, simulque eventilant, & effluviis deciduorum sarcinâ liberant; quin & ipsum aëris inspirati particulis imbuunt, proinde ut rarefactus, magisque efflagrans, sive fermentescens, eo vegetior & circulationi peragenda aptior reddatur. Enimverò si qua accensio sanguini (uti nostra fert sententia) contingit, omnino intra pulmones, & nequaquam in cordis sinubus peragitur; prout argue-re licet ex colore, & consistentia sanguinis ibidem, ac minimè in corde immutatis, in quantum scilicet iste, dum ex arteriis pneumonicis in venas transit, ab atro, purpureo, & crassiori, in coccineum, & vividiorum alteratur.

Ex his satis liquere arbitror, sanguinem (qualis à Te morbificus habetur) nempe subtilem, & flatulentum, atque intra vasa coërcitum, nullo modo in vasis pneumonicis constipari, aut præcordia ad rigiditatem infarcire posse: proculdubio longè magis periculi imminet, quando sanguis vel extravasatur, utpote in *peripneumonia*, vel in corde, & vasis ap-pensis coagulatur, prout in *peste*, & *febris malignis*, vel in iisdem concre-scit, uti in *polypo cordis*; vel denique *effusus* in præcordiis minùs, aut non omnino accendi, aut rarefieri potest, prout in *picâ malaciâ*, & *diu-rurno languore* affectis, *moribundis* accidit: Attamen in hujusmodi casibus nunquam strangulatio, aut subita præcordiorum oppletio, & im-mobilitas, sed primò nixus majores, postea crebriores, dein functionis motivæ languor, & fatifcentia, ac ultimò concidentia obtingant: ho-rum instantias, & exempla quotidianæ ægrotantium observationes abun-dè suppeditant.

Verum *secundò præfocationem*, & *dyspnœam*, quas morbi hystericæ pro-prias passiones habuisti, in quorundam paroxysmis, sc. modò alteram, mo-dò utrasque deesse, cuipiam aut diversimodos insultus uterini Typos ob-servanti, aut plures ægrotantes super variis symptomatum ritibus scisci-tanti facillimè constabit. Sæpe adverti in nonnullis affectionem cum globi ascendentis sensu in hypogastrio incipientem, infra diaphragma cum subitis hypochondriorum tensionibus, cumque magna eructatione, rugitu, & non rarò vomitû terminari: novi in multis aliis passionem hanc supra thoracem inchoari, nempe quatenus laborantes imprimis cir-ca guttur aliquid sursum convelli sentiunt (quod simul deglutionem, & anhelitum impediens, nequaquam ad pulmones inflatos, sed ad gulæ mus-culos contractos referri debet): præfatio autem isthæc interdum sine graviori præter vertiginem symptomate transire solet) quandoque tamen in cerebrum violenter resiliens, primo *ἀναισθησιαν*, & mox membrorum, & totius corporis spasmos, & jactationes horrendas inducit: quot ego foeminas hystericas novi, quæ ex subita violentæ passionis occasione sta-tim *ἀπώγιναι* corruerunt, insultu proculdubio ab eclipsi facultatum anima-lium incipiente: cui mox respiratio non difficilis & laboriosa quasi à pulmone inflato, & infarcto, sed illico suppressa, & penè nulla cum *ἀπώγιναι*, & aspectu cadaveroso successit; dein post aliquod intervallum

spasmi in membris excitari, etiam viscera instar globi ascendenti inflari, & praeordia immaniter agitari coeperunt; proculdubio materia morbifica ab *ἐνερῆ* parte medullari in nervorum origines decumbente: nec minus usitatum est (uti prius ostendi) affectus (paroxysmo ab imo ventre exoriri viso) imprimis circa hypogastrium, *inflatione*, seu *molis ascendenti sensu* tentari, quae superius lata non nisi post aliquod spatium thoracem invadens dyspnoeam, aliaque praecordiorum pathemata inducit; quae tamen si abdomine manu compresso, aut fasciis constricto, molis ascensus inhibetur, interdum praecaveri solent; clarissimo certe indicio, istam imi ventris molem nequaquam, uti Tu supponis, à pulmone inflato procedere. Enimvero ut daretur tibi sanguinem praecordia *αἰθρῶς* irruentem eadem inflare, ac ad rigiditatem infarcire; attamen reliqua quae huic catenae annectis symptomata, minimè cohærebunt.

3. Nam quod ad ventris globum spectat, cum interdum sine ulla dyspnoea oriatur, ac transeat, ac saepe etiam prior fuerit, certe huic causae ascribi nequit. Usitatum est hystericas circa paroxysmi initia postquam in ventre molem ascendentem sentiunt, adstantes alloqui, ab iis suppetias, atque ut comprimatur venter rogare, donec affectu ad thoracem delato, cum respirationis organa laborare incipiant, plerumque moles abdominis evanescit: porro quisquis molem istam cum impetu exsilire & quasi aliquid fortiter arietet, manum toto nixu deprimentem attollere sentiet, ipsam à visceribus propter diaphragmatis descensum conglobatis, oriri nunquam putabit.

Nec minùs incongruum videtur, à pulmonibus sanguine infarctis, aut motu impeditis affectiones spasmodicas in aliis partibus, aut in toto corpore excitatas, deducere: Quippe advertimus passiones istas solummodo à spirituum animalium, in cerebro aut nervoso genere scatentium *irritatione* procedere; atque ut plurimum aut à materia morbifica intra partes istas aggesta, aut à vellicatione insigni iisdem inflicta pendere; quorum neutrius pulmones infarcti, & immobiles facti causa esse possunt: Quaecunque enim pars per consensum partes alias in motus convulsivos rapit, necesse est ut ipsa primò convellatur; quod de pulmonibus, dum immobiles perstant, nec ipse statuis, nec fieri potest. Quod autem instas, *naturam, ut praecordiis oppressis subveniat, facultatem animalem ad motus convulsivos invitare*; id quidem à constanti ejus ritu & consuetudine abhorret, quae sicubi insultu morbo, aut molestia premitur, instinctu quodam quasi divino edocta angustiis sese expedire, & non majoribus implicare solet. Si forsan regeras, spasmos interdum *σπασμωδῶς*, & immensis haemorrhagiis supervenire, & non rarè moribundis accidere: dico hoc non ex *natura invitatione*, sed ex nimia tum ipsius, tum facultatis animalis prostratione fieri. Quippe in magnis languoribus spiritus animales plurimum distracti, aut absumpti, solitum in nervoso genere tensitatis sive irradiationis suae filum, ac continuitatem sustinere nequeunt: quare ab invicem divulsi, ac quasi in manipulos fracti, dum rursus aduniri quaerunt, nixus motivos ubique divisos, & quasi per subsultus ineunt. At verò neque membrorum, nec aliorum viscerum spasmos ex molestia praecordiis illata

il'atâ facile oriri, præter rationes modò citatas, insuper *observationes pathologicae* clarissimè evincunt. Qui *Asthmate*, *Peripneumoniâ*, *Anginâ*, *Pleuritide* horrendis, aut funestis laborant, inter diros paroxysmorum cruciatus aliarum partium motus convulsivos haud facile incurrunt. Memini in Adolescentulâ *polypum cordis* post morbillos accretum, & in arterias pneumonicas illapsum, eas ferè in totum, (uti ex cadavere postea dissecto constabat) obstruxisse; ut hinc sanguis intra dextrum cordis sinum aggestus, & ultrà progredi non valens, maximum illic gravamen & oppressionem, cum respiratione difficillima, & maximè laboriosa intulerit: puella autem postquam tres dies continuo hujusmodi agone afflicta jacuerat, facultate animali sensim fatiscente, & demum attritâ, expiravit; nec tamen ulla interim ab hoc morbo invincibili præcordia infestante, aliarum partium symptomata quasi hystERICA, aut convulsiva oriebantur.

Dum hæc Typis mandarem, Filiolus *Nobilissimi Comitis* circiter decem menses natus, antea satis sanus, eodem morbo obivit: postquam ille per quatuor aut quinque dies tussi cum febricula laborasset, subitò deterior factus, respiratione crebra, & laboriosa, lingua sicca, magna inquietudine, & jactatione totius corporis afficiebatur; quibus symptomatibus ferè continuò infestantibus, intra biduum extinctus est. Cadavere aperto, viscera imi ventris sine culpa; Thoracè inspecto, pulmones sanguine stagnante infarcti, discolores, scilicet purpurei, inque multis locis nigricantes apparebant; erant tamen abscessu, tumoribus, aut ichoris suffusione satis immunes, ut illorum affectio, febris productum, potius quam causa videretur: dum verò hanc, & lethi adeò subiti occasionem sedulò rimamur, tandem corde dissecto in sinibus ejus polypi ingentes, concretionibus adiposis similes, inque omnes arterias exporrecti, earumque cavitates obstruentes reperiiebantur. Novi insuper ante aliquot annos, puerum alium triennalem propter eandem causam morbificam subitò, ac ferè improvisò diem obiisse. Quin etiam suspicari fas sit, plurium aliorum morbos, aut mores, vulgò dentitioni, aut lumbricis imputari solitas, à tali cordis affectione procedere; in cujus naturam, causas, & curationem non otium erit nunc inquirere: attamen observare est in hujusmodi casibus, *naturam circa præcordia, gravissimè licet afflictam*, non propterea *functionem animalem ad motus convulsivos invitasse*. In promptu hic esset (Vir Doctissime) plures adhuc rationes, & argumenta proferre, quæ *hypothesin* vestram planè erroneam esse demonstrent. Sed tam facili nodo melioribus cuneis non opus est; nec majorem machinarum apparatu structura oppugnanda est, quæ concussis fundamentis, & compagibus solutis, sponte corruit. Itaque receptui canam, & responsiones tuas, & objectiones contra me intortas, jam proximè discutiam.

Cùm objeceram ego, in hystericis frigidis, atque etiam picâ, & malacia affectis, sanguine, utpote effoetum, & stagnare aptum, tam immodice in pulmonibus ebullire non posse, sine aliquibus effervescentiæ notis alibi conspicuis. Regeris Tu, *sanguinis incursum, & infarctum in pulmones, non à frigiditate, nec calore solummodo dependere, sed à fermenta-*

tionem, ex salium diversa natura commistione, mutuaque pugna, sine caloris aut frigoris excessu; & rursus, à succis elasticis & fermentiscibilibus sanguini communicatis, æstum & motum inordinatum, & quasi ebullitionem excitari, sine calore aliquo eminenti præeunte. Quamquam hic satis esset Te Tibimetipsi in sequenti pagina contradicentem opponere; ubi dicis *particulas morbificas elasticas in cordis ventriculo quasi accensas, in pulmones explodi*; (cujusmodi certè *causa fulminans* absque calore satis intenso intelligi nequit) ut tamen aliunde etiam appareat, quàm suspecta nobis esse debeat tua ratiocinatio, sponte concedes, (opinor) sanguinem fermentescentem, & cum ebullitione, ac æstu (uti prius denotas) in pulmones irruentem, pervenire illuc omnino non posse, nisi dexter cordis sinus, quo ipsum rapidius transmittat, crebrius ac fortius vibret. Quod si fiat, annon eodem tempore, & pari passu etiam sinister cordis sinus, æque crebro ac fortiter vibrans, sanguinem in totum corpus cum pulsu vehementi & calore aucto ejiciet? Enimvero perpetua observatione constat, quandocumque pulsus fit creber, & vehemens, calorem intendi (cujus rationem postea subdemus.) Quare cum necessum fuit, Te hujusmodi pulsum pro subito pulmonum infarctu supponere, haud rectè incalescentiam exclusisti. Nec quicquam pro Te facit quod nonnunquam in febribus anomalis aliisque morbis calor internus magis urgeat dum extrema frigent; id enim sanguini dum libere intra vasa circulator ascribi non debet, verum aut ob viscera (vel membranas) torrefacta, phlegmone obsessa, & non raro bile aut humore acri suffusa accidit, aut quoniam cor debile & elanguescens sanguinem æstuantem à se longius propellere nequit.

Quod spectat ad *sales diversa natura & fermentiscibiles, à quibus sanguini communicatis, & æstum & ebullitionem ejus excitari putas*, declarasse oportuit, quo transitu, & per quos ductus in sanguinem feruntur, an per vasa chyli-fera, aut per venarum oscula excipiantur: utrovis modo aut vis elastica infringetur, aut particulae fermentiscibiles ab invicem dividuntur, priusquam ad pulmones pervenitur: Porro (quod ad rem præsentem haud parum pertinuit) cur locum non assignasti ubi sanguis, insiliente paroxysmo hysterico, ebullire incipit? utrum ante cordis ingressionem, vel intra ejus sinum, vel in ipsis pulmonibus certè? Nulli horum Pathologiam tuam accommodare poteris.

Quod asseris ob *χλωρόσιν* exsanguem sanguinem fluxilem, elasticum, ideoque movere, ac in fermentatione immodicè concitari promptiorem habere, à vero maximè alienum videtur. Quippe observatione vulgari constat, earum sanguinem maximè aquosum, & particulis activis adeo destitutum esse, ut calori vitali per totum corpus diffundendo vix sufficiat. Quare pro his curandis, medicamenta quæ sanguinis fermentationem promovent, ac adaugent, uti salina & sulphurea, ac imprimis chalybeata exhibemus; quæ certe sanguini ex se nimium fermentiscibili valde officerent. Nec minus aberras asserendo tales *anhelosas fieri propter copiam sanguinis in pulmones infarctam*: Hoc enim si ita se haberet, copiosa sanguinis missio iis emolumento esset; cujus contrarium semper experimur: quinimo sanus quispiam & robustus, post ingentem hæmorrhagiam, statim anhelosus

evadit, indicio quidem certissimo, hunc affectum non à sanguinis copia procedere; sed è contra symptomatis hujus causa in eo potius consistere videtur, quòd sanguis depauperatus, & proinde copia imminutus, non facile rarefieri, aut sponte turgescere aptus existit; quin gravis, & segnis, merà cordis & partium impellentium operà circumducitur: hinc à motu aut exercitio corporis, cum membrorum muscoli agitati vasa comprimunt, adeoque sanguinem versus Præcordia paulo citatius impellunt, iste ponderosus, ac hebes è cordis sinibus, ubi plus solito aggeritur, non ita promptè exsilit: quapropter & cor ipsum, simulque respirationis organa nixibus creberrimis adnituntur, ut lacum hunc semimortuum sine stagnationis periculo per pulmones traducant.

Quod circa *peripneumoniam* replicas, contra te facit; quoniam ut nòdum istum solveres, sanguinem hystericum, quem immodicè ebullire supposueras, usque intra *vasa pneumonica continere cogeris*, unde hypothesis tua difficultate majori premitur: quippe si ipsum, aut serosam ejus partem ibidem extravasari sineres, exinde pulmonum infarctio minùs improbabilis videretur.

Sanguinem cerevisia novella lagenis inclusa conferens, proximis ferè verbis *particulas ejus in corde accendi, & in pulmones exsiliare statuis*: Quod si verum esset, quid ad rem tuam faciat, non video, nisi ebullitio sanguinis ad paroxysmum hystericum à Te requisita universalis foret, ipsique à frigore incipienti, mox, febris intermittentis ritu, calor intensus succederet; cujusmodi omnes affectus superius à pathologia tua penitus exemisti.

Nec minus à proposito est, quòd *sanguinem, aequè ac succum* (uti ais) *merum nutritium* (puto velles *nervosum*) in motus violentos explodi posse contendis: quippe nullam ego latici huic *vim elasticam*, sed solummodò *irritativam* assignavi. Ipsi sunt spiritus animales, quibus succus ille tantum pro vehiculo est, qui impetus motivos, seu potius explosivos, à sanguine quantumvis effervescente inimitabiles exerunt.

Ad *Hystericarum experientiam provocasti*, utrum in ipsarum paroxysmis præcordiorum affectus primarii non sint, atque præcedant reliqua symptomata? Quæ si fortè se aliis in locis primò convelli fateantur, Tu interim (provisto antè subterfugio) securus respondes, in hoc casu morborum *complicationem adesse, & affectum hystericum cum spasmo uniri*. Quæcumque adeò hystericis accidunt, si tuæ non quadrant hypothesei, sub novo morbi genere collocanda sunt, non amplius hysterica, sed convulsiva appellanda: Sed neque sic evasurus es (*Vir Doctissime.*) Nam ex istis pathematis, quæ hystericorum classi pathologia tua non satis cautè accensuit, scil. *cordis anxietas, palpitatio, pulsus frequentia, anhelitus gravis, suspiria alta*, & similia; ex his inquam pleraque ad nervosum genus præcipuè spectant, & meritò convulsiva habentur, prout ex sequenti experimento colligere licebit; nempe si in vivo quopiam animali nervorum scil. paris vagi ac intercostalis, ad præcordia pertinentium truncos ligaveris, statim prædicti affectus cum dyspnœa & suffocationis sensu, quin & alia symptomata insultus hystericæ *Typum* imitantia orientur.

Globi in abdomine ascensum, à septi depressione non procedere arguo-
bam.

bam, ex eo quod in paroxysmo septum haud semper versus inferiora deprimitur: sed convulsio interdum versus superiora contingit, ac pulmones sursum impellens, Thoracis systolen violentam, & diutius quam par sit protractam inducit. Argumentum hoc cum diluere nequeas, quo melius saltem eludas, occasionem arripis me convitio quodam insectandi, propter diaphragmatis motum minus rectè (ut innuis) à me expositum, nempe quod in affectibus spasmodicis, systolen ejus versus superiora, & diastolen versus inferiora contingere posse affirmarim: hic genuinum dentem infigens, simul illudis, & quantum in Te est, acriter mordes, nostramque inscitiam videris tibi eo falsius irrisisse, ubi ignorantiam tuam tam liberè profiteris: in omni motu (inquis) est pars mobilis & altera immobilis, nullaque fit alicujus contractio, nisi pars mobilis ad immobilem trahatur. [Quàm egregiè, & Axiomaticè hæc, mox ostendetur.] Septum autem (ais) infima thoracis parti, tanquam ad immobile affixum, ipsum autem in omnibus suis partibus mobile, & quid costis quasi appensum est: cum verò contrahuntur fibrae, totum ad partem fixam attrahitur, ac tensum magis, ad infimum costarum sinum deprimitur, ultra verò metam istam transire nequit, &c. Quomodo igitur (Doctissime Vir) ut juxta Aetiologiam tuam, globi ascensum efficiat, ad inferiora se contrahit, ac se in abdominis cavitationem qualibet contractione altius deprimat prout asseruisti exercit. pag. 29. Nam si ultra infimum costarum situm, quod quidem in omni systole defertur, transire nequit, certè in Abdominis cavitationem, ut contenta ejus depellat, se minimè deprimat. Ne quid non dicas contra meam hypothesein, hic planè evertisti tuam.

Verùm ut ad summum controversiæ revertar, vocabula hæc *Systole*, & *Diastole*, neque ad *diaphragma* per se, nec propriè ad *cor*, cum sint muscoli, pertinent; attamen usu apud omnes Anatomicos obtinente, ad respirationis organa, quæ talia, applicata, Thoracis ampliacionem, & constrictionem denotant: cum autem reciprocos hosce pectoris situs diaphragma non tantum exactè observat, sed ad eos excitandos aut cooperatur, aut ad coagendum rapitur; ecquid absurdi implicat, eandem quæ totius pectoris est, etiam *diaphragmatis systolen* appellare? idque potius quoniam in pectoris motibus violentis, septum è motu proprio æquabili abreptum, aliorum musculorum, aut viscerum spasmis, aut impulsibus, ultra solitas metas, huc illuc contrahitur, aut abripitur: quod sanè in quopiam animali, vivisectionis torturam diutius passo, aut aliàs moribundo, cum respiratio languide aut inordinate peragitur, oculis discernere licebit: Enimverò ab inspiratione vehementi, ac diutius protracta, quæ subinde in moribundis contingit, Diaphragma primò cum fibris abbreviatis stringi, ac ad planum reduci; dein ultra hoc cum iisdem fibris magis usque ac magis extentis deprimi, ac versus intestina valde convexum fieri observamus. Cujusmodi septi motum, à pulmone longius inspirante quidni *diastolen* ejus appellemus? Deinde verò, ut pulmones ab aëre ita distenti, ad expirandum reduci possint, Septum versus superiora contrahi, & cum fibris contractis primò ad planum, dein ultra illud, cum iisdem relaxatis, in concavum referri videbimus: atque ad hunc modum diaphragma pro inspiratione (qualis tunc requiritur) intensiore, sæpius distendi, ac deprimi;

ac dein pro expiratione sursum contrahi, ac elevari, sensu percipiemus: Unde minus admirari subest, quod *Arantius se in equa & visu & tactu observasse ait, diaphragma in expiratione constringi*: & quidem in affectibus Thoracis convulsivis, septum utroque modo, scil. modo sursum, modo deorsum inordinate convelli, aut corripì observationes pathologicae extra dubium ponunt. Nam ut nihil dicam de Asthmate, tussi, ac risu spasmodicis, nec ut historias à me olim annotatas, aliasque plures quæ quotidie eveniunt, recolam; puellæ cujusdam, dum hæc scriberem, & alterius olim à me curatæ, quæ latratu quasi canino afficiebantur, casus oppidò raros inferius subjiciam.

Quod autem statuis, à diaphragmatis, aut pulmonum ascensu neque dyspnœam, nec cordis oppressionem induci, & rationi, & communi omnium observationi repugnat: Nam in pectoris systole violentâ, & diutius protractâ, æque ac in tali ejus diastole laborantes de suffocationis metu, etiam de cordis gravamine, & oppressione magna, passim queri advertimus: nec mirum, quia præcordia, si quando aër inspirari, non minus quam cum expirari nequit, pariter rigida, ac fere immobilia facta, sanguinem è corde non facile exantlant, aut circulandum trajiciunt.

Ubi nunc triumphus iste, quem ita fastuosè in septilogiam nostram egisti? Te sane ab hoc temperasse oportuit, donec quæ ad *motum musculorum, septi fabricam, & actionem* spectant, quorum nulla adhuc intellexisse videris, rectius didicisses. *Clarissimus Stenon* jamdudum questus erat, vix quidquam rectè in libris Anatomicorum, de vera diaphragmatis figura, & usu traditum fuisse. Expectandum erat, quod *Tu celeberrimus Anatomicus* culpam hanc (quam etiam mihi imputas) ipse aut olim, aut nunc demum *exemisses*: quantum verò ab hoc defeceris ex sequentibus patebit.

In omni motu (dicas) esse partem mobilem atque partem immobilem, quibus termini fibrarum utrique figuntur, atque partem mobilem ad immobilem trahunt. Vellem exposueris quomodo hæc *Cordi musculorum* principi, aut *intermediis septi carnibus* applicari possint. Porro si musculorum quorumvis aliorum motus per vivisectiones examinaveras, prorsus contrarium vidisses. Enimverò fibræ carneæ, quæ tantum sunt motrices, neque versus partem mobilem, neque etiam immobilem trahunt; verum ab utraque recedentes, in sese, scil. ab utrisque ipsarum finibus, versus spatia intermedia feruntur. Quod igitur ita Dogmaticè, & tanquam ex Tripode pronuntias, *Nullam fieri Attractionem, nisi ad partem immobilem*, omninò falsum esse, *auto-φω-σ* patet. Quippe motus omnis muscularis & *principium, & terminus ad quem*, in ipsius medio, nempe in fibris carneis, & plerumque in mediis ipsarum partibus consistit? Hæc namque spirituum ab utroque tendine accitorum incurfibus inflatæ, & utrinque adeò in spatia breviora adactæ, simul intumescunt, & decurtantur; quapropter dum undequaque trahunt, partem sequi habiliorem, quæ modo hic Tendo est, modò iste, & non rarò alteruter vicissim, cum parte appensa versus se ducunt.

Cæterum si nulla sit attractio nisi ad partem immobilem, edicas velim, quomodo animal se totum movere, & penitus de solo sublevare possit: quippe motus totius sequitur motum singularum partium motricium. Quamobrem

si hæc tantum una versus aliam trahi, & non virtute quadam elastica se totas efferre, & elevare queant; fateor me non intelligere qua ratione, & quibus præterea Technis, Animal se totum humo attollere, & huc illuc profilire valeat. In mechanicis observamus, machinas elatere destitutas, uti sunt peritrochium, horologia ponderibus actuata, & similia, meris tractionibus nihil admirandum præstare, quin & motore extrinseco semper indigere. Verum Automata, quæ sponte partes suas huc illuc proferre, & non raro se tota proripere, & exsilire solent, præter contractionum motus, organa quædam elastica aut explosiva, à quibus attractiones omnes dependent, necessariò requirunt. Pariter quoad functionem motivam Animalem, ex eo quod viventia interno motus principio donata, non solum progredi, at se tota efferre, ac ad distans profilire valent, arguere licebit, ad partes motrices actuandas, nixus expansivos, sive explosiones quasdam exigi, & non meras contractiones sufficere.

Porro quod asseris, *utrosque fibrarum terminos parti immobili figi, atque septi fibras non nisi ad partem immobilem, scil. ad costas aut infimum thoracis terminum attrahere*, nullatenus verum est: quia fibræ motrices, quæ scilicet contrahi ac abbreviari aptæ, solummodo sunt carneæ, rarò admodum immediate, sed sæpiissime tendinum, aut membranarum interventu, parti immobili figuntur; quod etiam Ingeniosissimus Stenon de septo jampridem observavit, *ejus nempe carnes posteriores membranarum & fibrarum interventu reliquis adharere denotans, in quantum tota, radios ejus inter & costas intercepta, peripheria portio, si pleuram separaveris & peritoneum, omnino libera sit conspicienda, lib. de muscul. pag. 9.* Hoc cuivis septi fabricam intuenti, ejusque in zootomiis motum observanti primo aspectu apparebit: nempe quod cum musculo huic composito plures insint fibrarum carnearum series, harum duæ interiores ex utroque *œsophagi* transeuntis latere consistæ, nulla ex parte quâ carneæ sunt, *infimum thoracis terminum* attingunt; insuper dum in motu sunt, non ad ipsum, velut *partem immobilem* contrahuntur, sed in sese, nempe versus medium, in utroque fine contractæ, breviores, simulque tumidiore evadunt, proindeque ad *musculi aream*, velut *Tympani velum*, arctius stringendam conducunt. Ex his plane constat (Vir Egregie) *Te musculi motum, necnon diaphragmatis conformationem & usum*, in quibus me erudiendum suscipis, nondum didicisse.

Insuper hinc colligitur, quàm invalide ex eodem falso supposito, circa *membranarum motus* contra me arguis; namque *viscerum, abdominis, intestinorum, & mesenterii motus, tantum contractiones esse, quas ad centrum immobile, nempe ad dorsum, cui affiguntur, fieri contendis*: itaque supponere videris spiritus motores juxta extremitates fibrarum consitos, ipsas, quasi totidem funes versus se convellere, adeoque partem movendam cui appenduntur, attrahere; aut si spiritus intra ipsas fibras scatere sinas, illis solummodò *depressionis*, sive ad centrum tendentiæ, & non omnino *expansionis* motum concedes: quod quomodo illorum, quos postea *igniculos spiritales*, ac *Æthereos* vocas, naturæ congruat, fateor me non intelligere: Verum enimverò è contra statuendum erit, *spiritus motores*, cum non sint *organici*, nullam *tractionem per se efficere*; verum in membranis, non secus ac in musculis fi-

brarum mixus motivos, omnino à spirituum illos subeuntium expansione quadam procedere.

De *membranaceorum motu* alibi speciatim dicemus: in præsentiarum verò advertimus, istorum fibras, non uti musculares, duplicis esse generis, scil. partim *carneas*, & partim *tendineas*, sed per totum homogeneas, & texturæ ab utrisque illis nonnihil diversæ. Porro fibræ membranaceæ non semper rectæ, ut parallelæ incedunt, sed plerumque aut radiosæ sunt, aut spirales, sive tortuosæ; cæterum non unica serie, sed duplici, & non rarò triplici disponuntur, quæ multifariam tendentes, se variè intercussant.

Ex huiusmodi fibrarum in membranis apparatu, varii illarum usus, & officia designari possunt. *Primo* enim multiplici serie disponuntur, quia motus diversi generis, scil. modò sursum, modò deorsum, modò contractionis, modò expansionis, eadem membrana obire debet. *Secundò*, Fibræ istæ per totum sunt homogeneæ, quoniam omnes ubique pariter sunt motrices, ut non opus sit, spiritus motores recondi, seu asservari in una parte, unde profilientes exspatiari, seu explodi possint in alia, quamobrem & visceris membranacei motus non ita subitò ac simul in toto peragi, sed à parte in partem successivè traduci solet. *Ultimò* visceris cujusque cavi fibræ ideo sunt spirales, sive tortuosæ, ut dum paulatim contrahuntur, intestina cava, velut manicam colatoriam intorquendo, constringant, adeoque ipsorum contenta à parte in partem lentè promoveant.

Enimverò juxta solennem naturæ ritum, spiritus animales intra prædictas fibras blandè scatentes, lenes aut *contractionum*, aut *vermiculationum* motus ferè constanter obeunt: sin verò iidem spiritus plurimum incitati, in fibras istas *æthæras*, aut tumultuariè insiliunt, ita ut densiùs aggesti, statim progredi, & pertransire nequeant, eas valde distendunt, à se mutuo divellunt, proindeque membranas quibus intexuntur, dilatant, quin & ipsas, quasi à vento concluso inflatas, attolli & antèrius propelli faciunt; hinc ut mesenterii plicæ à spiritibus elasticis agitatae, extumescant, immo & cum subsultibus exsilire, ac intra abdomen arietare videantur: nec minùs ventriculi, ac intestinorum tunicae à spiritibus eo ritu expansis, ac imperum facientibus elatae, in varias distensiones, ac inflationes urgeri solent; ac ita potius si juxta utramque visceris cavi extremitatem spasmus inceptus simul utriusque generis fibras se mutuò intercussantes occupabit: tunc enim propter ipsas adeò utrinque inflatas, & ab invicem divulsas necesse erit membranæ cavitatem, secundum omnes suas partes exterius propulsam extumescere.

Quod autem objicitur, spiritus perturbatos, membranarum sæpe *corrugationes*, & *contractiones* violentas, potius quàm *distensiones* inferre, quod quidem molestiæ sensus planè indicat: Dico horum utrumque interdum accidere, sed cum manifesto discrimine, cumque diverso effectù: nimirum in *passionibus dolorificis*, cum spiritus perculsi fugantur, ac subitò versus fibrarum principia resilire coguntur; ipsas ideo fibras corrugari, atque viscera cum doloris sensu contrahi faciunt: è contra autem, in *affectionibus spasmodicis*, ubi spiritus velut æstro perciti, aut explosi, in fibras motrices impetuosè irruunt, ipsasque adeò immaniter inflant, aut distendunt,

viscerum

viscerum intumefactiones, aut subsultus inducuntur. Propter hujusmodi subitos, & violentos spirituum *insultus*, aut *recessus*, etsi membranæ *tendibus* careant, adsunt tamen iis *plexus nervei* hic illic passim dispositi, qui satis idonea spirituum promptuaria existunt; è quibus nempe dum spiritus inordinate in *fibras* motrices profiliunt, *affectus convulsivi*, dumque *ex his* in *istos* tumultuariè resiliunt, *dolorifici* inferri videntur.

Et quidem viscera membranacea præternaturaliter affecta, non solum contrahi, & corrugari, sed interdum immaniter distendi, ac instar vesicæ inflatæ extumescere, adhuc clariùs per observationes pathologicas, quæ infra subdentur, evincemus.

Quod itaque spectat ad argumentum tuum Herculem, cujus unico velut ictu Te hypothesein nostram prorsus dejecisse consideras, quàm facile ad nihilum decidit! Nam quod assumpseras, *tantum duas motuum differentias in fibris omnibus esse, scilicet contractionem & relaxationem*, verum non esse vel ipse fateberis: e. g. Cum ventriculi parietes, sive à vapore intus concluso, & magis magisque rarefacto; sive ab alia causa plurimum inflari, ac ita ut totum attollatur epigastrium, intumescere advertis, utrùm hîc fibras motrices contrahi, aut relaxari dices? Non prius, quia longiores evadunt; non alterum, quia in maximam tensitatem urgentur: Quin verò planè constat hîc fibras plurimum distendi, ab invicem divelli, totumque proinde viscus in majorem capacitatem ampliari, sive expandi. Porro cum *Diaphragma, ne suo deesse officio videatur, fibras suas vehementius ac creberrimè stringere, & se in abdominis cavitatem qualibet contractione altius deprimere* finxeras: An commentitium hunc septi motum Tuum, ejus *contractionem*, aut *relaxationem* appellabis: Certe hîc patellæ Tuæ operculum nimis angustum finxisti: quippe nec *relaxari* hic septum dicas, quia motu contrario urgetur; nec etiam contrahi, quia si qualibet strictione altius ac altius deprimitur, tandem fibræ ejus ultra solitam tensitatem depressæ, & versus abdomen convexæ, longiores evadent.

Sed forsan inquires, hos fibrarum motus præternaturales, & violentos esse; quinetiam ita sunt illarum, dum *spasmodicè* afficiuntur: & quidem si fibris violenter distentis, ac in majorem amplitudinem dilatatis, illico spirituum incolarum major expansio, & velut rarefactio obsequitur; quidni etiam spiritibus à causa morbifica expansis, & velut explosione quadam rarefactis, fibrarum dilatatio, sive extensio succedat? Enimverò motus animales tum naturales, tum præternaturales, respectu spirituum agentium, potius quàm fibrarum patientium habito, determinare oportet; atque illo respectu dicantur omnes esse *spirituum* aut *excursus*, sive emanationes, aut *recessus*; à priori corporis motivi tum *contractio*, tum *extensio* sæpe procedunt: à posteriori autem ejusdem *relaxatio*.

Hæc uti clarissimè in perfectiorum animalium *A'vropis*, ita non multum obscurè etiam in motibus imperfectiorum, scilicet *vermium*, aliorumque reptilium cernuntur. Quæ licet se tota simul efferre, & loco movere nequeunt, tamen partes unà plures non modò contrahunt, & relaxant, verùm & procul emittunt, atque longè extendunt; etenim

observare

observare est, de *hirudinibus & lumbricis*, quod dum progrediuntur, anteriora corporis prius contracta educunt, eademque interdum summè extensa de plano elevant & longissimè exporrigunt. Cujusmodi certè motus non est *relaxatio*, quia cum maximo nixu & tensitate peragitur; nec quidem est *contractio* ad partem immobilem, quin potius ab illa discessus est, & corporis extenti *elongatio*; quæ reverà propter contractionem postea habendam instituitur, nempe ut capite ad solum affixo, posteriora corporis versus ipsum ducantur.

Argumentum Tuum à *levamine*, quod ex *sanguinis missione*, *hystericis* nempe, *contingere* asseris, petitur, & ita crebrò inculcatum, nihilo felicius succedet. Nam ingenuè profiteor, mihi phlebotomiam in hystericis sæpius experto, successum istum, tam confidenter à Te promissum defuisse. Urgente paroxysmo, haud minus quam instante febris crisi, sanguinis missio raro indicatur: quippe natura cum hoste suo acriter decertans, quo minus perturbatur, eo citius & melius se expedire solet. Semel cum accessio hystERICA diutius perdurasset, memini me venam incidisse, è cujus orificio satis largo sanguis effluxit, non tenuis, & flatulentus, sed crassus, & antequam frigeret, in pelvi concrevens; nec tamen paroxysmus illico transiit, aut *serenitas universalis*, quam ita gloriòse spondes, omnino inducta est. Ex hoc remedio, si juvamen aliquod contigerat, aut forsan aliquando continget, quidni materiam morbificam, à *cerebro*, aut ab *origine nervosa* per phlebotomiam evocando, interdum in hoc morbo, prout in *apoplexia & epilepsia* assolet, profuisse dicatur? Extra paroxysmum multis hystericis sanguinem detraxi, at solummodo præcavendi gratia, ne fæculentus iste, & nimium turgescens materiam spasmodicam *cerebro*, & *nervoso generi* suffundat, at nihil interim minus metuens, quàm pulmonum ab incurfu ejus subito infarctum. Denique quamvis hoc remedium aliquibus temperamenti calidioris, non raro emolumento fuit, ex eo tamen non in omnibus æque, nec constanter ullis juvamen expectare licuit, quin frigidis, hydropicis, & valde cacochymicis fere semper nocuit. Plures ego novi invaletudinarias, quæ cum affectibus hystericis primo tantum levius, & rarius obnoxia fuerint, post copiosas aut phlebotomias aut hæmorrhagias spontaneas, statim istius morbi paroxysmis gravioribus, & crebrioribus infestari cœperunt.

Quæ fuerat nostra sententia de liquore cerebrum & appendicem nervosam irrigante, aut non satis intelligis, aut nimis callide dissimulas, eumque prorsus alium, quàm ego statueram finxisti: Quippe liquorem istum cum *succo nutritio* confundis, quem ego semper à nervoso distinguens, omnino per arterias deferri asserueram. Quare quod objicis contra *doctrinam istam novam*, de *succo nutritio per nervos distribuendo*, & *cruoris oceanum*, quasi magnificam & opulentam penum, invisibili nervorum vectigali, & copia umbratili, quæ partes nutriuntur & crescunt, præfers, prorsus nostram extra causam est. Proximo in loco pariter *Αἵματος* eis larvamque umbratilem ipse erigis, quæ facilius dejicias, ubi me dicentem introducis, *impetum & explosionem non à leniore illo invisibili succo nutritio solum, sed præcipuè à partium heterogenearum cum illo commistione, & elisione violenta dependere*. Quæ verba à me

nullibi dicta, à te autem excogitata, nihil miror si improbabilia esse facile ostenderis. Objicis motus convulsivos interdum ab *irritatione solùm, ut in nervi punctura, lumbricis, &c. excitari posse*: ergo non opus esse alterius cooperatoris, scil. *copulae heterogeneae*. Dico in ejusmodi casibus, ubi *causa evidens fortis* motum convulsivum per se excitat, alterum cooperatorem nec requiri, nec semper adesse; sed cum sine illo spasmi immanes non raro statis temporibus & juxta peculiare symptomatum typos oriuntur, aut à copula elastica, aut malo quodam Dæmone eos induci fateberis. Olim hanc objectionem præoccupans, ostendi sub quo discrimine *causa evidens solitaria*, & quo ritu, cum vel sine hac, *causa procatartica* affectiones spasmodicas excitare solet. Tu planè hic nodum prius solutum nectis, & denuo solvendum opponis.

Verùm insuper contra succi nervosi existentiam arguens dicis *spiritus animales tali latice in quo fundentur non indigere, quia nimirum sunt igniculi spirituales, subtiliores multò, magisque Ætherei, quàm ut liquore aliquo implicari possint*: quinimò sicut lux, Æther, ventus, aut flatus in nullo latice fundantur, dico hanc ipsam ob causam, quia spiritus animales adeò subtiles sunt, idcirco latice, seu vehiculo, in quo subsistant, potissimum egere. Secus enim quàm possibile est eos ita Æthereos, & avolare, aptos, intra corpus ubique pervium, & poris innumeris apertum manere, quin citò erumpentes, *tenues evanescerent in auras*? Spiritus vini summè rectificatus de vase in vas, quin ferè dispereat, transfundi nequit: ex eodem vase cui includitur, nisi firmè obturato, erumpit, & brevi totus evaporat: Quare ut spiritus animales, animæ corporeæ hypostasim constituentes, intra corpus animatum subsistent, & operentur, eos vinculo quodam frui, seu potius vehiculo aquoso dilui oportet.

Ultimo quod instas, Te non videre quomodo *spiritus explosione jam factâ ad animi nutum in instanti revocari possint*: si *explosionem spasmodicam* hîc intelligis, fatuor quidem nec me hoc videre, quoniam spiritus cum explodi incipiunt, non instanti, immo non nisi post aliquot horas ac interdum dies, ad animæ nutum revocari solent, quin invitis omnibus & voluntatis, & naturæ dictatis inordinationes suas continuant, aut subinde repetere cōguntur, donec materia penitus elisa, plurimi spiritus absumantur, in quorum loca è promptuariis passim consitis novæ statim copiae eliciuntur: Quod si de spiritibus pro motu regulari explosis hoc dubium proponis, inferiùs, ubi de functione motiva animali agemus, solutum habebis.

Iamque affectuum, qui dicuntur *hysterici*, Pathologiâ spasmodicâ, contra responsiones, objectionesque Tuas omnes, vindicatâ, ut doctrinæ hujus veritas, quæ satis ad aliorum, adhuc clariùs ad Tui intelligentiam luceat; ejus illustrandæ gratiâ libet hic, coronidis loco, Historias quasdam, & observationes pathologicas subjungere: Atque imprimis ut contra Te appareat, Diaphragma nonnunquam in paroxysmis convulsivis sursum rapi, & propter violentam pectoris systolen diutiùs protractam, aut crebriùs iteratam, à libero descensu inhiberi, illud casus sequentes oppidò rari, planè ostendunt.

Virgo in ætate 13. annorum *ἐκφοβ.* & *ἐνσπασμ.* convulsionibus admi-

randis laborans, sub cura nostra, dum hæc scriberem, tenetur. Hæc à mensibus diu suppressis male habens, primò de crebra vertigine, item de inflatione circa ventriculum, & hypochondria conquesta, ad motum quemvis anghela, *δύσπνοια* evasit, postea in hypochondriis subsultus, & laterum versus superiora contractiones, cum respiratione difficili instantes perpeffa erat: tandem hujusmodi paroxysmis ingravescens, illa exspirare sæpius, ac longius quam inspirare potuit; coacta sonitum stridulum, & acutum, latratui canino simillimum edere, & subinde crebro iterare solebat: hinc ut parentes & amici eam veneficio læsam suspicarentur: At verò timor iste intra paucos dies evanuit, quia morbus se latius explicans, speciem planè hystericam induebat: nam præter hypochondriorum subsultus, & pulmonum quasi latratus, qui ipsam ferè continuò exercebant; bis aut ter in die in paroxysmos quasi uterinos incidebat, scil. post molis in Abdomine ascensum, suffocatio cum respiratione impedita, dein *ἀναισθησία*, ac ultimò membrorum spasmi oriebantur. Unde concludere licebat symptomata hæc omnia convulsiva fuisse, atque materiam morbificam ab *ἐνερπάλω* in nervos delapsam, ab initio tantum eos qui Thoracis systoli efficiendæ inserviunt, occupasse; quare muscoli Abdominis, aliique cooperatores spasmodicè affecti, dum sursum convellentur, & septum, & pulmones unà corripuere, adeoque propter subitam & violentam pectoris systolen, ejulatio isthæc quasi latrantis edebatur: postea cum plures alii nervi eadem labe afficerentur, spasmi graviores in plerisque totius corporis partibus, quales sunt qui hystericis perhibentur, succedere. Puella hæc remediis Antispasmodicis juxta methodum nostram utens, intra duas septimanas multò melius habuit, & jam vix mense elapso planè convaluit.

Ante biennium Virgo alia 12. annos nata, latratu simili, sed crebriori, acutiorique laborans, mihi curanda tradebatur: Hæc plures quotidie paroxysmos habuit, in quibus per horæ semissem & amplius *ἰσχυρὰ* vehementem, & solito crebriorem obire coacta, quaque vice ejulatum valdè stridulum gannitui similem edebat; interim de gravi dyspnœa, & cordis oppressione maxima, quasi deliquio jamjam imminente conquesta; paroxysmo dein sensum transeunte, duarum aut trium horarum intervallis mediocriter habere solebat; alio mox, & subinde aliis latratus paroxysmis ordine succedentibus. Postquam remedia Antispasmodica per unam aut alteram septimanam huic exhibueram, latratus omnino cessabat; atamen paroxysmi convulsivi, & quasi hystericæ, tum in visceribus, tum in capite & in membris succedentes, ipsam quotidie semel aut bis affligebant: ejusmodi verò medicamentis, addito crebro epispasticorum usu, diutius assumptis, intra sesquimenssem perfectè convaluit, & etiamnum integrè valet. Profectò in his casibus aut pectoris systolen violentam, cumque septo & pulmonibus sursum correptis, & non rarò aliquandiu suspensis, accidere concedes, aut symptomata istæc Dæmonis cujusdam præstigiis ascribere induceris.

Quod autem spectat ad globi in abdomine ascensum, crebrosque ibidem aut subsultus, aut inflationes, facilè hic esset historias & instantias medicas.

medicas, quæ pathemata istæc omnino esse convulsiva, atque viscera affecta extumescere, ac inflari potius quam contrahi ostenderent, quamplurimas proferre. Ne Tædio fuerim, tantum pauciores quasdam selectas hic breviter annotabo.

Olim pro fœmina Illustri quinquagenaria consulebar, quæ à frigore suscepto, circa imum dorsi ejusque viciniam, paralyfi spuria, cum musculorum spasmis quasi intertextis afficiebatur; nempe illic loci stupor & fornicationis sensus, quasi in artubus incubatis, continuò infestabant; cæterum aut contractiones dolorificæ, aut subsultus, aut inflationes subinde oriri, & illinc in coxas & crura excurrere solebant, ita ut juxta partes istas, modò aliquid convelli aut corrugari, modò exsilire, modò huc illuc instar vivi animalis prorepere, atque toto tractu carnes quasi Tetano affectas extendere videretur. Hic morbus, non obstante remediorum cujusque ferè generis usu, in dies ingravescebat, demùm ut spasmi circa lumbos incepti, haud tantum in musculos crurales, sed etiam in viscera abdominis translati, crebros in imo ventre subsultus, inflationes, & extumescencias quasi hystericas producerent: quod proculdubio evenit propter eandem causam morbificam à nervis lumbaribus ad intercostales, cum quibus communicant, & exinde in plexus mesentericos propagatam: Nam sicut materies spasmodica primò circa spinalis medullæ finem, & nervorum cruralium origines defixa, ibidemque spiritibus accrescens, musculis omnibus, ad quos nervi isti pertingunt, diathesin convulsivam intulerat: ita cum ejusdem materiæ se latius explicantis portio quædam in nervos intercostales irrepserat, propterea item pares affectiones spasmodicæ Abdominis viscera occupabant. Hinc ut constet ventris inflationes, aliaque istius regionis symptomata hystericis usitata in nervoso genere consistere, per nervos huc illuc traduci, & propagari, proindeque omnino convulsiva existere.

Ut verò constet viscera membranacea præternaturaliter affecta non solum contrahi, & corrugari, sed interdum subsilire, immaniter distendi, quin & instar vesicæ inflatæ extumescere; non opus erit privatas quasdam Historias citare; quinimò hic densa laborantium agmina, qui illud ferè quotidie in seipsis persentiunt & experiuntur, in medium proferre licebit. Usitatum est in *hystericis*, & *hypochondriacis*, passiones, vulgò *flatus* dici solitas, excitari, quæ revera nihil minus quam viscerum distensiones convulsivæ esse possunt. Sæpius adverti à perturbatione in Abdomine, aut hypochondriis incepta, ventriculi regionem in tantum subito extumescere, ut necesse foret vestimenta accingentia statim laxari aut aperiri; interim licet stomachus quantum extendi potest extensus, magnos subindè ructus, aut rugitus edat, à flatu tamen copiosè emissio nihil levaminis succedit, donec spirituum expansione irregulari sedata, aut demùm finita, ista visceris inflatio sponte cessat; dumque omnia derepente adedò in flacciditatem concidunt, haud major ructus aut venti eruptio à ventriculo subito subsidente, quam ab eodem prius ad summum inflato, ac quasi rigido erumpebat, emittitur: indicio sanè luculento, stomachi intumescenciam istam non à vento incluso & parietes ejus distendente, sed à

fibris subito inflatis, proindeque ab invicem divulsis, inque majorem capacitatem adactis, excitatam fuisse.

Sæpius observavi, quibus intestina admodum tenera, & nimis facile irritabilia fuerunt, ab enemate, licet tantum lactis saccharati, injecto, primo ventris tormina excitari, mox abdomen intumescere, demumque ventriculi inflationem cum rugitu, ac vomitu immani succedere. Cujusmodi symptomata impossibile videtur aut humores fermentiscibiles, aut flatus sese huc illuc proripientes excitare posse: quia nimirum ab intestinorum cavitate inferiori (ubi Clyster operari incipit) ad superiorem raro admodum transitus patet. Quare affectio spasmodica fibris membranosis impressa, solummodo illarum ubique continuarum ductu per tota intestina, sive ab unâ illorum regione ad alteram communicatur. In promptu hic esset similes intestinorum, ventriculi, ac œsophagi inflationes spasmodicas nonnunquam à pharmaco cathartico, aut emetico excitatas; etiam in singultu, oscitatione, & quibusdam aliis affectibus, eas interdum sponte contingentes ostendere. Verum ad rem ita suâ claritate conspicuam, argumentorum plures hic faces accendere, penè idem esset ac soli lumen inferre.

Haftenus *pulmones*, & *sanguinem* ab *effectus hysteric* labe immerito ipsis aspersa vindicavimus; jam proximè incumbit, ut *passionem hypochondriacam ventriculo* haud minus iniquè imputari ostendamus; quod quidem facilioris negotii res erit, in quantum ipse nunc in primo *responsionis* tuo aggressu locum cedere, sive tergiversari videris: quippe *morbi hypochondriaci* causam immediatam, & sedem non uti prius *stomacho* alligasti, verum ipsi vitio vertis, quod *sanguini* *acorem*, *caloremque alienum* communicat; dein quod *sanguis* è *particulis chyli acidis, flatulentis, elasticis constitutus*, in *secunda coctione* non ita corrigitur, ut *suas qualitates in ventriculo acquisitas exuere* queat. Profectò, hæc eadem causa morbis ferè quibuscumque aliis assignari poterit, quippe vulgo dicitur, *primæ coctionis vitia non emendari in secunda*, sed *sanguini, & visceribus* modò his, modò illis noxam affigere: qui & ipse superiùs eandem prorsus rationem assignas, quare *picâ, & malaciâ affectæ*, interdum morbo hystérico laborent; dicis enim à *cibis præter naturam alienis & pravis, avidè semper petitis, succos ejusdem naturæ elasticos, & fermentescibiles sanguini communicari, à quibus cum astus, & motus inordinatus, & quasi ebullitio excitentur*, profectò incertum est utrùm hæc causa hystericam, an hypochondriacam passionem parturiet. Nam illic talem sanguinem *pulmonum infarctum* minari, atque hic à *fermentatione concitata, cordis tremores, palpitationes, deliquia, & lipothymia metus* supervenire statuis.

Interim mirari subest, Te *cordis tremores, palpitationes, & lipothymia metus* fermentationi sanguinis attribuire; cum pathemata isthæc solummodo ad *motum cordis* (qui merè animalis est) impeditum, aut depravatum pertinentia, omnino ad *cerebrum & nervosum genus* referri debeant.

A dolore, & inflatione, quæ versus latus sinistram hypochondriacos excruciat,

Excruciat, translata ad *ventriculum* culpâ, lienem eximis; quoniam *et si lien sinistrum occupet latus, stomachi tamen fundus* (ut ais) *usque ad latus sinistrum, immò usque ad lienem, & penè ad umbilicum protenditur*; quasi verò id unum ventriculi condemnationi sufficeret, quòd in loco suspecto inveniatur, cum interea innocentissimum hoc viscus, nisi reatu vacaret, culpam suam celare omnino non potuerit; neque enim cavitas ejus ad sinistrum latus inflari, nec fibræ illic vellicari possint, quin ab utrisque per totum continuus, uterque affectus tum in medio, tum in latere opposito sentiretur.

Quòd Bibones, aliosque ventriculi debilitate, & vomitione crebra laborantes, *ideò quoniam sapius vomunt*, à reliquis istius morbi symptomatis absoluis: miror Te non idcirco, *vomitum quotidianum* pro hypochondriacis, uti remedium certissimum præscripsisse; attamen effectum hujus contrarium observationes medicæ passim testantur: porrò si materies morbificâ constanter in ventriculo gigneretur, nulla vomitio præcavebit, quin propterea chylus aut crudus, aut labe ejus infectus, sanguini transmittatur.

Circa *lienis officium*, quem *ventriculi calori fovendo*, natum olim asserabas, minùs jam confidens videris; quin mihi tandem concedis *potissimum fortè ipsius munus, illud non esse, & sine fermento activo concoctionem fieri non posse fateris*. Usque tamen *calorem conjunctum moderatum requiris, quoniam usum, & necessitatem ejus in digestionem, & fermentationem opera Chymica demonstrant*. Verùm enim verò ut daretur Tibi, ventriculi actionem nonnihil à calore juvari; annon *hepar*, quod multo calidius est, & stomachum ferè totum arctius complectitur, aut etiam *pancreas*, quod & substratum, huic usui magis accommodata videntur? Nec quisquam tamen hæc viscera solummodo in eo finem condita, nempe ut ventriculum calefacerent, pronuntiabit; quanto minus *lienem*, quem & ipse fateris in multis animalibus, quoad maximam ejus partem, procul à ventriculo amoveri? Porrò cum *pisces*, & multa *reptilia* actu frigida, *liene* donentur, in his certè alium ejus usum quàm pro calore, quo prorsus destituuntur, exhibendo, denotare oportebat.

Quod attinet ad *colorum* differentias, & ipsarum rationes *Hepati, Lieni, & Pulmonibus* à Te assignatas, licet me non posse ignorare supponis: attamen hæc in re & incertitiam meam, & dissensum fateri cogor: nam quod dicis, *humoris biliosi colorem flavum hepatis parenchymati magis floridam conciliare tincturam*, mihi quidem, ut ne quid asperius dicam, paradoxum videtur: quia nempe passim videmus, maximè floridum vultus & cutis rubore nitentis colorem, ab humore bilioso, in ictero suffuso protinus deleri, ejusque loco turpem flavedinem induci: quoad *pulmones*, cum postea ostendetur sanguinem intra ipsos accendi, & maximè efflagrare, quanto verisimilius erit, colorem quo præditi sunt subalbidum, ab ipsorum elixatione, potius quàm *ab aëre particulis membranaceis intertextis*, deducere? dein quod *lienem ex puro puto sanguine cum omnibus suis partibus coagulato constituis*, & propterea nigrescere affirmas, hallucinatio non simplex, sed errorum complicatio videtur. Nam imprimis *lien* haud in omnibus nigrescit, quippe pueri, & impuberes eo sapius florido, & rubicundo præditi sunt; in adultioribus tempe-

ramenti sanguinei, quos, uti in adagio est, *splen ridere facit*, colore etiam vivido imbitur; in melancholicis, senescentibus, atque invaletudinariis maximè nigrescit: quo sanguis impurior est, eo majorem lieni atredinem faculentiis suis impertit: quòd verò in omnibus *lienem ex puro puro sanguine coagulato constitui* asseris, satis mirari non possum, quoniam & sanguis purus putus, dum calore vitali imbitur, coagulationi minimè obnoxius est; insuper à sanguinis coagulatione, quam Tu lieni naturalem statuis, natura plurimum abhoret, utpote à qua sanguinis præpeditur circuitus, & crasis depravatur.

Circa *lienis officium* differens, non invitè concedis, *fermentationem hic aliquam sanguinis fieri, quæ ipsum forsan supradictam quadam inspiret*: utinam innuisses cujusmodi *fermentum* hic stabulari fines, quia quod ego statueram, nullo modo approbas; quare valde prolixa, & non minùs obscura argumentatione opinionem nostram de lienis usu refellere laboras, cum multo compendiosius egisses, hypothesein tuam meliorem (si modò talem habueris) suggerendo.

Itaque imprimis me carpis, quòd *fermentum lienare ex portione sanguinis faculentiore*, scilicet ex *materia terrestri*, & *sale fixo* constitueram: in hunc usum Tu *puriores sanguinis partes, magisque spirituosas*, ut citius in fermenti naturam degenerent, seligeres; cujus rationem à pane, & vino in fermenta alteratis petens, contra vulgarem, & quæ de trivio est, experientiam *fermentum farinaceum magis acutum, ex pane puriori, & qui furfuris minus habet, confici*: etiam *vina quo fortiora, ac subtiliora, magisque spiritu abundant, celerius fermentationem inire, & cum acescunt, aciditatem insigniorem acquirere*: Si panificos, & œnopolas consulisses, illi Te prorsus aliud docuissent; aut si Rationem audire digneris, ipsa Te longè aliter instituat: quippe, ut *massa farinacea* in fermentum, & *vina* in aceta transeant, requiritur, ut spiritu depresso, partes salinæ exaltentur; quod certè, ubi sunt majores spirituum copię, eo tardius succedit. Dum spiritus præpollent, & reliquæ particulae subjugantur, fermentatio cessat: lis oritur cum inter particulas dissimiles pro dominio certatur; porrò spirituosæ vix omnino fermenti naturam induunt: etenim spiritus ardentes, & vina generosa massæ cuiquam, vel liquori fermentandis commissa, nullum orgasmum cient. Attamen *levum* austerum, atque vini, aut cerevisiæ fæces, aut flores, particulas alias activas in fermentationis motum citò exsuscitent.

At verò *ζύμωσις*, quam modò lieni concesseras, eidem mox iterum detrahis, nullumque in eo fermentum reconditum latere asseris, quoniam à *poris lienis haud satis strictis nec separari partes sanguinis faculentiore, nec (si discerni queant) diu contineri posse contendis, quin perpetuis cruoris fluctibus eluantur*. Miror Te qui suprà *lienem è sanguine coagulato constitutum* scripseras, mutata sententia tua hic statuere, sanguinem ita rapide per ipsum traduci, ut nihil ibidem in transitu exuere, ac ne tantillum commorari permittas: verum enimverò quisquis *lienis fabricam* perpendit, argumentum tuum non magni esse ponderis facile advertet: quippe in *liene* vasa anguifera non sunt per totum clausa, & sibi mutuo continua, verum in atteribus, cum sint plurimis foraminibus pertusa, & circa extremitates

valde

valde dehifcentia (prout D. D. Gliffonius observavit) sanguinem in ipsius parenchymatis poros ubique passim emittunt , ab iisque excipiunt : quare sanguis lienem trajiciens , non uti in aliis visceribus , & carnibus , simul totus continuato filo , in hos ductus ab illis immediatè transfertur ; sed veluti rivus lacum percurrents , utrinque ad latus divertit , ac intra cavitates licet minores , se insinuans aliquandiu stagnat ; interim pari fere dimenso ac una portio sanguinis per arterias intrat , altera propulsa per venas exit ; hinc facile erit concipere , sanguinis partem faculentiorē extra flumen facilius protrudi , ac intra porositates diutius hærere , donec ipsius visceris fermento (quod nempe à cruore stagnante recipit) inspirata , & mobilior facta , cruoris usque recentis appulsu sensim promota , demum in alveos venosos illabitur , ac paulò dein citatius effertur ; certe hic minime timendum erit , ne aut sanguis fermentandus , aut fermentum ipsum à perpetuis cruoris fluctibus eluantur ; siquidem intra penitiores lienis recessus , sanguinem à stagnatione vix securum esse liceat. Hinc constat (Egregie Vir) quàm temerè , atque incautè hypothefin tuam extruxisti : cui ut servias , coactus es , inverfis Naturæ legibus , sanguinem intra Pulmones torpidum , & stagnantem effingere , per quos ipsa voluit rapido , & pleno torrente decurrere ; contrà in Liene , ubi cruorem Natura jussit morari paululum , & lentè fluere , hic Tu cursu violento , & fluctibus omnia secum rapere statuisti.

Porro , ex eodem ut opinor supposito , negas *pulsationem in sinistro hypochondrio , à sanguinis intra arteriam celiacam regurgitatione procedere* : porro talem sanguinis arteriosi regurgitationem , aut impossibilem , aut malorum , quæ in lienis vicinia excitantur , insontem pronuncias.

Quoad prius vel ipse fateberis , pulsationem istam , quia cum corde rythmum observat , arteriæ cujusdam insignis esse ; qualem in isto loco præter celiacam nullam invenies ; hanc autem propterea tantum ita vehementer pulsare concedes , quia sanguine supra modum turgescēte impleta distenditur (quippe vasa sanguifera , utpote partes membranaeas , proprior motu tantum contrahi , aut relaxari , & non omnino distendi , aut ampliari posse superiùs statuisti) quòd igitur sanguis in privato loco turgescens , arteriam celiacam distendat , ac immaniter pulsare faciat , unica causa esse potest , nempe quòd in obicem quendam alicubi impingit , ac proinde cursu obstructo , plenius aggeritur , & quā dantenus regurgitare cogitur : ob eandem rationem in phlegmone cum sanguis obstruitur , immunis arteriæ pulsatio circumcirca percipitur : ostenso igitur arteriam celiacam , quatenus obstruitur , sanguine uberius aggesto impleri , & distendi , proindeque vehementius pulsare , nullus dubitabit , quin obstructio ista in *liene* fuerit , ad quem scilicet præcipui , & *maiores* istius rami feruntur ; ac in quo , præ quibusvis aliis partibus stagnare aptus , sibi transitum præcludere solet : quòd autem curiosius requiris , *quo tempore* , ac *utro arteriæ motu* , sanguis regurgitare possit , dico circa *finem diastoles* ; nam quoad naturalem sanguinis *poscā* , ac projectorum violentam , pariter habet , motus scilicet directus quantum impeditur , tantum in reflexo compensatur. Quare cum iste pleno uti soleat

alveo,

alveo, lienem subire nequit, ex parte resiliens arteriam distendit, & quadata, per alios ejusdem vasis distenti ramos, via in partes vicinas irruit, inque iis, partim quatenus fibras nerveas violento incurfu divellit, ac irritat, & partim quia fæculentias lieni destinatas illis affigit, effectus spasmodicos, & dolorificos per totam lienis viciniam parit.

Tacite Me fugillas, quòd lienem à plurimorum morborum abditorum culpis, & immeritò passim imputatis vindicans, etiam ipse illum multis affectibus hypochondriacis aut causam, aut fomitem præbere insinuem: quasi nihil intra hæc duo, scilicet lienem aut mali ominis, aut prorsus nullius authorem esse, intersit; atque perinde sit ipsum causa indicta, aut palàm ostensa reum arguere.

Porro quod ob sanguinis labem à liene acceptam, atque ad cerebrum, & nervosum genus translatam, symptomata spasmodica interdum excitari statueram: urges Tu, propterea *morbum ita productum, non esse convulsivum, sed à sanguinis dyscrasia dependere*. Quasi nihil discriminis inter morbum ipsum ejusque causam conjunctam, atque causam ejus procatacticam, sive remotam fuerit? Si quis ab immodico vini, aut aquæ ardentis potu, primò in vomitum cum ebrietate, deinde in febrem, ac ultimò in lethargum, aut apoplexiam lethalem inciderit, dicesne hunc à nullo cerebri affectu, sed tantum à crapula interiisse?

At verò rem totam, argumento invincibili, & apodeictico tandem esse Te confecturum suscipis: nempe ostendendo *sanguinem in hypochondriacis aciditatem à ventriculo potius acquirere, quàm à liene, quia talis aciditas in liene non generatur, verum in stomacho gignitur*: porro *quicquid acescit, non ob salis fluorem* (uti nostra ferebat sententia) *sed ob salis acidi dominium, produci asseris*. Qua ratione hæc assumis, aut probas, & quid inde sequitur, paululum expendamus.

Primò igitur hîc supponis, *morbum hypochondriacum* cum toto symptomatum ejus apparatu, omnino ab *aciditate* provenire: quod tamen frequenter secus habere, observatio vulgaris, & quotidiana experientia clarissimè evincit: nam præter effectus qui in toto corporis habitu, materiæ aut humoris modò atribilarii, modò acris, falsi, aut amari præpollentiam denotant, cujusmodi sunt vultus luridus, cutis subflava & quasi ictericia, sudor falsus, & incrustari aptus, sapor oris modò falsugineus, modò amaricans, & non rarò vitriolicus, aut aluminosus, urina modò lixivialis, modò aquosa, & insipida; insuper ructus, & vomitiones humorem non semper acidum, at sæpenumero acrem, aut amaricantem, immo interdum mirè dulcescentem, & quasi saccharatum in ventriculo progigni, aut in eum suffundi testantur: hujusmodi humores, sive materiam in hypochondriacis morbificam, sicut in multis aliis præter stomachum locis, progigni constat (in quantum scilicet cruoris, plusquam chyli recrementa, sanguini, & visceribus majorem noxam imprimunt;) ita lienem, præcipuum quendam materiæ hypochondriacæ focum, sive mineram esse, rationes à nobis suprà allegatæ ac insuper Authorum cujusque seculi suffragia testatissimum reddunt.

Nec minùs à vero aberras, dicendo *aciditatem in ventriculo potissimum, aut solum*

solummodo progigni? Quippe ut nihil dicam de liquore pancreatico, cujus acori nimis fermentiscibili, nuperi Authores plurimum morborum causas probabiliter imputarunt: advertere poteris salivam à tota massa sanguinea in glandulas oris dimissam, valde acidam esse, in tantum ut pro hydrargyro in minutias dissolvendo menstruum satis idoneum existat, quinimo & fermentum est pro cibis masticandis, & aliquatenus dissolvendis; fermento stomachali prævium, adeò ut ipse ventriculus, à ductibus salivalibus aciditatis suæ prima rudimenta accipiat: porro sæpenumero observavi, propter materiæ morbificæ, à capite, à membris externis, ipsisque interdum visceribus quibusdam metastasin in oris emunctoria factam, circa palatum, & gulam, immo in toto œsophagi ductu, inque ipso ventriculo succum acidissimum, cum ingenti catarrho suffusum fuisse; nonnullos hujusmodi casus in pathologia nostra spasmodica olim annotavi, pluresque alios ejusdem generis hic adjecisse poteram; adeò ut ventriculus ipse ab aliis partibus humorem acidum mutuari, potius quàm talem illis impertire videatur. Tantum abest ut eum credamus vel solam vel præcipuam illius Humoris scaturiginem existere. Quin & ipse in pathologia tua priori, licet viscosam pituitæ saburram in ventriculo aggestam accescere statuas; attamen illam, ut gravem, & ponderosam, usque ibidem relinquis, ac interea chyli partes solùm tenuiores & spirituosas in vasa lactea citò corripis, è quibus sanguinem non acidum, sed tenuiorem, & flatulentum, & nimis spirituosum generari dixeras: nunc autem quasi veteris hypotheseos haud satis memor, sanguinem à ventriculo aciditatem acquirere statuis.

Quòd verò *aciditatem omnem non à salis fluore, sed à salis acidi dominio* provenire statuis, non solum entia, sed & entium principia sine causa multiplicas: quippe non unum elementum salis, cujus salina omnia participant, sed totidem, quot sunt salium genera, scilicet *acidum, nitrosum, salinum, vitriolicum, ammoniacum, & per plura alia supponere velis*; unde in scientia physica, doctrina omnis de corporum naturalium compositione ac resolutione prorsus corruiet: quo tamen jure, non otium erit hic inquirere. Attamen super hac re, quoniam ad artis Chymicæ experimenta provocasti, illicet per hæc controversia decidatur.

Statueram egomet, aciditatem omnem à principii salini fluore, hoc est à sale sui juris facto, sive supra alias particulas elementares evecto, aut ab iis quadantenus separato procedere: Hujus probationem ab inductione amplissima, scilicet corpora omnia tum naturalia, tum artificialia complectente, institueram; nam de singulis ipsorum observatio hæc constans, & perpetua habetur, in quolibet subjecto, quando spiritu, ac sulphure depressis, aut evaporatis, particulæ salinæ vehiculo aquoso potitæ sese reliquorum jugo expedire, iisque præpollere valent, acorem sive aciditatem induci: hujusmodi versus aciditatem mutatio in liquidis, ac corporibus minus compactis, aut sponte, aut levi *ἰσχυρισμός* facile succedit, prout observare est in vino, lacte, mulso, herbarum succis, aut infusis, vegetabilium, aut carniū decoctis, in cremoribus, & pultaceis omnibus, quorum sapes cum prius varii, & multiplices fuerint, postea omnes

in acorem transeunt : porrò subjecta solidiora , quæ sale abundant , uti sunt ligna ponderosa , & pleraque mineralia , quoties per destillationem ab igne resoluta , particulas salinas copiosas emittunt , idem stigma acidum constanter exhibent , ac interim in capite mortuo , levi admodum facto , parum , aut nihil salis relinquitur : indicio quidem certissimo , & quasi apodictico idem esse in quibusque mixtis elementum salinum , quod varia licet in singulis sub larva obscuretur , quamprimum suæ potestatis fit , eandem omnibus communem aciditatis suæ indolem fatetur.

At verò generali huic observationi refragaris , quia *non intelligis quomodo separatio elementorum ab invicem, saporem illum specificum proprietate naturali inherentem, alterare in diversum poterit.* Parcas (Vir Egregie) ignorantia meæ , si Te in Chymia versatissimum hic non intelligo ; nec quidem concipere datur , quomodo mixti sapor specificus , qui omnino à plurium elementorum crasi dependet , quando illa ab invicem separantur , conservari possit , nisi forsan accidens sine subjecto , aut illud idem numero manens , ex uno in aliud migrare posse contendis.

Verum instas , *particulas salinas ab invicem solutas magis salsas existere :* Sed qualem hîc salis analysin designas ? Illam puto quæ fit solvendo in aqua fontana , & dein evaporando , ubi idem usque mixtum à faculentis liberatum perstat. Vera salis resolutio , quæ tantummodò per destillationem ab igne perficitur , ipsum omnino in stigma acidum reducit.

Dicis in *salium omnium extractione ex herbis, terris, &c. saporem salinum conservari, & quo perfectior fuit separatio, eo puriores, acutiores, magisque salsos fieri sales :* Unquamne igitur deprehendisti eundem saporem , salinum scilicet lixiviale , qui in sale fixo reperitur , in planta unde extrahitur præfuisse ? Quin sapor tuus falsus , à *specifico misti sapore* multò magis alienus est , quàm noster acidus : porrò ipsius elementi salini in sale fixum resolutio , nec perfecta , nec ultima est , quia nimirum sal fixus , sive alcali , destillatione violenta propulsus in acidum transit , & deinde ulterius resolvi nequit.

Verum enimverò non unicum salis elementum , sed plura , & diversimoda statuens , censum eorum nobis egregium tradis : *nempe salia alia sunt salsa, uti sal commune, & herbarum salia* [quæ , cum toto genere differunt , nescio quo jure copulasti] *alia sunt acida, ut Vitriola & Tartarum* (miror quo palato sapis , qui vitriolum acidum denuncias) *alia sunt dulcia, ut saccharum, alia austera ut alumen, nonnulla etiam insipida, quæ tamen ut salia coagulantur & solvuntur* [quid per salia insipida intelligis , divinare non possum] *aliaque innumera nobis non ignota.*

Qualem modò , & quanto sale conditam halographiam nobis opposuisti , alii dijudicent : Mihi interim Te interrogare liceat , annon rerum naturalium principia , quo pauciora , & simpliciora assignantur , eo melius naturæ instituta , quæ regulariter , & compendiò semper agit , explicare , & scientiæ physicæ , quæ circa corporum syntheses , & analyses tradendas potissimum occupatur , plus conducere videntur ? Cum itaque de corporibus sale copioso refertis evidentissimè constet , quòd à particulis salinis , aut intra idem subjectum dominio potitis , aut resolutione

ne ultima illinc depulsis, & quantum resolvi possunt, resolutis, aciditas perpetuò inducatur; ecquid probabilius affirmari possit, quàm saporem acidum elemento salino essentialem, ejusque propriam passionem esse? Nec mea tantum ita fert opinio, verum & Monsieur de Claves, æquè in philosophia, ac chymia peritissimus, nuper idem statuit. Sed Tu contra experimenta Logicam apponis, *nihil dat quod in se propriè non habet, sal nihil dare potest præter falsedinem*: modò negaveras omnia falsa esse falsa, verum alia acida, vitriola, & quædam alia insipida esse dixeras; utrùm & hæc falsedinem dare concedes? quomodo Te Tibi hic reconciliem, me nescire fateor.

Experimentum de salium destillatione à me annotatum falso supposito fundari asseris; etenim verum ste (inquis) quòd liquor iste violento igne à sale propulsus, valde acidus evadit: sed illud quod caput mortuum vocas, à quo liquor iste propellitur, saporem suum falsum non amittit, hoc linguae testimonio evincis; immo falsedinem ejus in cauterii naturam exaltari, porrò totum ab aëre humido rursus falsum evadere, & saltem per vasis parietes terreos in strias oblongas erumpere, non solum propriam, sed plurimorum experientià didicisti. Super his ut paulò certior fias, digneris modò ab experientia mea aliquid amplius addiscere. Cum à sale quopiam ab igne reverberii destillato, stigma acidum emanavit, & tamen caput mortuum falsum remanet, signum est destillationem nondum satis peractam fuisse; quin plures relinquuntur particulæ salinæ, quæ si igne intensissimo diutius urgerentur, omnes propulsæ in recipiens acidæ evaderent, capite mortuo insipido prorsus relictò: sal verò à destillatione partiali relictus, acrior existit, ob particulas mitiores quibus demulcebatur, abactas, earumque in loco igneas subingressas; dein aër humidus accedens, rursus igneas abigit, atque salis cum terra conjugium redintegrans, eundem ac prius saltem resuscitat; at verò non totum inde caput mortuum, sed tantum partes quædam sale, & sulphure residuis imbutæ, prioris concreti formam recuperant: huic cuipiam advertere licebit, cum post imperfectam vitrioli destillationem colcothar aëri expositum, ex parte in vitriolum redit, quippe non totum, sed hic, illic calchanthi glomeres quosdam reperies: sin verò, ut semel expertus fui, destillationem vitrioli communis igne violento aliquandiu continuaveris, cum aqua, & spiritu oleum rubicundum acidissimum, & causticum exstillabit, & caput mortuum elegantissimè purpureum prorsus insipidum, quodque non omnino ab aëre deliquescit, nec ab aëre humido, aut aqua affusa, in vitriolum redit, habebis.

Quod autem (quasi oppidè rarum esset) Te, & alios observasse innuis à destillatione salium strias oblongatas vasis terrei parietibus accrescere, satis tritum est, & Tyronum quorumcunque observationi quotidie obvium, nempe stigmati acidi virginis propulsi particulæ quædam, retortæ poros subeunt, ac inter penetrandum densius aggestæ, in crystallos mixto appropriatos coagulari incipiunt, adeoque dum ab ipso vase particulas quasdam terrestres, & ab aëre humidus sibi consciscunt, prioris concreti formam aliquatenus assumunt; attamen sal ita concrevens, & terra minori contentus, & sulphure penè orbatus, purior existit, & in acorem vergit.



EXERCITATIO I. MEDICO-PHYSICA.

De Sanguinis Incalescentia, sive Accensione.

Am diu est, quòd circa reliquam *cerebri*, & *nervosi generis* pathologiam, meditationes meas Typis destinarem: Sed cum plures istius generis morbi, *spiritus animales*, & non rarò integram *animam corpoream hypostasim*, immediatius, quàm *humores*, aut *partes solidas* afficiant: idcirco necessarium duxi, de istius *animæ natura*, & *subsistendi modo*, necnon de *partibus*, & *potentiis* ejus disquisitiones præmittere; ut ex istis ritè præcognitis, demùm *pathemata* ejus *præternaturalia* melius innotescant: Super his autem, velut summè arduis, & extricatu difficillimis, cum *Theorias* probabiles ac (ut opinor) rationales condere cœpisssem; satis vidi, eas utpote insolitas, & paradoxas, aliquibus non arrisisse: quod equidem haud decet Me ægrius ferre; quinimo unicuique semper liceat in suo sensu abundare, ac in omnibus iudicium usque liberum, ac in nullius plicata seductum habere: è multis verò conjecturaliter (ubi non aliter licuit) à me propositis, imprimis contra *hæc duo* præcipui instituantur Elenchi; nempe quòd *sanguinem* pro vita proroganda *accendi*, atque *spiritus animales* propter actus motivos *explodi* statueram: quæ vocabula, etsi asperius forsan, aut impetuosius sonare videantur, quàm ut *œconomia Animalis* applicari debeant; attamen si rationes, & *argumenta* quæ utriusque sententiæ veritatem suadeant, perpendat quispiam, nullus dubito, quin aut assensum suum præbebit, aut mihi met meum facile condonabit Imprimis igitur, quia de *sanguinis incalescentia* tam variæ feruntur opiniones, quatenus nimirum alii hunc effectum *calido insato*, alii *cordis flammula*, nonnulli eum *massa sanguinea fermentationi*, aliique ejus *accensione* attribuunt, idcirco rem penitiùs introspicere, ejusque causam genuinam, tametsi valde abstrusam, ratiocinio, quo licet certiori, eruere adnitar.

Olim de *Anima* ista, quæ *Brutis* perfectioribus, cum *hominis* subordinata sive inferiori communis est, differentes, eam revera *corpoream* esse, atque binis constare partibus ostendimus; harum *unam* in *sanguine* radicatam, *flammeam*; atque alteram in *Cerebro*, & *nervoso genere* gliscentem, *lucidam* appellavimus. Cum de priori tantùm hîc loci sermo instituitur, puto non difficile esse, ejusmodi rationes, ac instantias proferre, quæ verè aut saltem verisimillimè concludent, *primò sanguinem Animatum* esse; dein *secundò, Animationem* istam in ipsius *accensione*, aut in affectu huic maximè Analogo consistere.

I. Sanguinis animationem, non solum placita Philosophorum, sed indubitata Sacræ Scripturæ testimonia planè asserunt: nimirum in lege Mosaïca sanguinis usus interdicebatur propter hanc rationem, quia

sanguis.

Sanguis est vita, sive anima; quod etiam ex observatione Clarissimi Harveii sensui constat, utpote cujus motus oculo discernendus, indicat ipsum primò vivere, & ultimò mori. In ampliorem hujus probationem satis vulgo notum est, animalia tantum, quousque sanguis in debita copia & motu perstat, vivere: hujus autem si aut nimia detrahatur quantitas, aut motus supprimatur, protinus interire.

Quoad secundum verò propositum, nempe *sanguinis efferventis animam, sive vitam* ab incendio ejus pendere; satis hoc probabile videbitur, si ostendero primò, Sanguinis liquorem in perfectioribus animatis plurimum incalescere debere. *Secundò*, Incalescentiam istam nullo præter accensionem modo in sanguine produci, aut conservari posse. *Tertiò*, præcipuas quasdam affectiones, sive *proprias, ignis, flammæque passiones, soli* præterea *sanguinis incalescentis vita* competere. *Quartò*, denique his clarè ostensis, accidentia & proprietates quædam aliæ minùs insignes, quibus *flamma vulgaris*, ac *vita* communicant, subdentur; tum etiam quatenus, & quo respectu inter se differunt, explicabimus.

Quoad prius, advertimus sanguinem in cunctis animalibus perpetim moveri, insuper in perfectioribus *æstuare*, sive actu incalescere: Revera motus ejus indiscontinuuus requiritur, tum propter ipsius sanguinis crasin conservandam, cujus liquor alioqui stagnationi, & putrendi obnoxius foret; tum præterea, ut in toto corpore circumactus, tributa singulis partibus debita erogare possit. Quippe sanguinis munia, saltem in perfectioribus animalibus, diversimoda & multiplicia existunt; scil. materiam pro spiritibus animalibus cerebro, & nervoso generi instillare, succum nutrimentum in parres quascunque solidas dispensare, copulam elasticam partibus motivis suggerere, insuper recrementa quæque, & particulas effectas secernere, ac emunctoriis idoneis deponere.

Quancquam autem in minus perfectis animalibus, merus sanguinis motus, aut saltem modica ejus turgescencia, qualis in vino, aliisque liquoribus in fermentationem agitata cernitur, naturæ œconomiam sustentare, & exequi valet; quatenus nimirum è cruoris licet frigidi rivo, in singulas totius corporis partes jugiter affluente, & nutrimentum crudius ubique suscipitur, atque spiritus pauciores, crassioresque velut percolatione secreti, cerebrum & nervosum genus ea copia subeunt, qualis pro motu locali, & sensuum pauciorum organis ruditer actuandis sufficiat: attamen sanguis animalium perfectiorum corpora irrigans, quo longè præstantius istiusmodi munia exequatur, non tantum motu perenni, & rapidiori circumagi, sed plurimum turgere, immò actu effervere, seu incalescere debet: eum nempe ob finem, ut compage ipsius valde laxata, particulas respectivas varii generis, à se ubique deciduas, copiosius emittat, & hic, illic, juxta naturæ usus & indigentias disponat.

Imprimis verò, siquidem spiritus animales, copia ingenti è massa sanguinea jugi suppeditari, & particulas elasticas ad functionem locomotivam requisitas, exinde in musculos omnes perpetim suffundi opus fuerit, perquam necesse videtur, liquorem è quo supplementa hæc

multiplicia, & generosa decedunt, actu incalescere, seu potius deflagrare; nempe ut prædictæ particulæ è liquoris compage, non nisi per calorem, aut incendium satis referenda, liberrimè se foras proripiant: Quod equidem liquet, quoniam è vino, atque etiam ex ipso liquore sanguineo, aliisque quibuscunque spirituosus, humor subtilis & spirituosus nonnisi per destillationem calore aut igne peragendam, copiosè prolucitur. Quinimò particulæ sulphuræ, quamvis è liquore quovis ad exhalandum minùs aptæ fuerint, attamen per subjecti accensionem promptissimè erumpunt: Ex his propter functionis animalis, atque etiam vitalis perfectionem, sanguinis incalescendi necessitas apparet. Cæterum ut constet quo ritu fiat, scil. utrùm per *accensionem*, aut *fermentationem*, aut alio quopiam modo; primò in genere inquirendum erit, quot modis, & quibus de causis *liquida quævis incalescere solent*, dein considerare oportet, cuinam ex istis *sanguinis incalescentia* attribui debet.

Super his advertimus, esse *tres tantum modos*, sive totidem causarum genera, à quibus liquida fervorem concipiunt, scil. *primò*, à *calido admoto*, ut cum aqua super ignem æstuat, aut ebullit, vel à solis, balnei, aut æstuarii cuiuspiam calore, aut calcis vivæ dissolutione effervet, quorum omnium instantiæ satis vulgo notæ sunt. Propter eandem rationem *Aqua Thermæ* æstuaræ videntur. Nam ut de nostris *Bathonianis* instemus, illæ nimirum, nec sulphure, nec sale fixo imprægnantur, prout eas destillando, evaporando, & liquores præcipitatorios infundendo, planè expertus sum; quinimò cum sulphurea dissolvendo, & multiplici alio respectu. *Aqua calcis* simillimæ existunt, illas pariter ab eadem causa, scil. corpuscula ignea alicubi intra tellurem recondita imbibendo, incalescere putamus. Super his, si *πρόσφορον* esset, disquisitionem ampliorem, alibi forsan tradendam, hic inserueram. *Secundò*, cum *salina corrosiva*, quæ diversæ indolis sunt, aut *invicem*, aut *sulphureis* commissa in se mutuò agunt, cumque ingenti particularum lucta, & agitatione, non rarò calorem, immo aliquando fumum, & incendium excitant; uti cum *spiritus & butyrum Antimonii*, vel cum *aqua Stygia salibus lixivialibus deliquatis*, vel cum *oleo Terebinthina* aliisve destillatis confundatur; porrò cum liquores corrosivi corpora metallica exedunt, sæpe incalescunt. *Tertius*, ac solus præterea (ut opinor) quo, *liquidum incalescit*, *modus* est, quando humor quispiam sulphure, aut spiritu plurimo imbutus, à flamma admota incendium concipit, adeoque deflagrando effervet: Hoc passim cernitur in liquoribus oleosis, aut valde spirituosus accensis, & inflammatis.

Restant alii quidam calefactionis modi, scilicet *fermentatio*, *putrefactio*, & *attritio*, à quibus corpora crassiora, aut solida non rarò fervorem concipiunt, in liquidis verò talem effectum minimè producant: Dum massa farinacea fermentatur, particulæ activæ in motum concitæ, sese quaquaversus explicant, & subjecti molem attollunt; interea quatenus particulæ sulphuræ simul agitæ se mutuòprehendunt & combinari incipiunt, calor quidam, licet remissus, excitatur; pariter à *putrefactione* finis aut fœnum madidum, ardorem concipiunt; in quantum scil. particulæ sulphuræ intus conclusæ, densius agglomerantur, dein simul combinatæ,

turmatim

turmatim foras erumpunt : attamen nulli uspiam *liquores* , sive tenues, sive crassi, utut *fermentescentes* , aut *putrescentes* , propterea incalescunt : Et enim *vina* dum fermentescendo dolii latera diffingunt , aut cum ingenti strepitu & ebullitione vasis ora exundant , non actu effervescunt , immo ne minimùm intepefcunt : *Sanguis* corpore eductus , ac in vitris idoneis quovis modo ad fermentandum aut putrescendum dispositus , calorem actualem non omnino adipiscitur. Revera sanguinem in viventibus fermentari , & fermentando depurari , quin & alia quædam œconomix animalis munia obire concedimus : porrò olim ostendimus à fermentatione ejus impedita , aut nimis aucta , vel alias depravata , diversa morborum genera produci. Attamen sanguinis calorem per fermentationem excitari negamus. Quia nec frigidorum animalium sanguis , nec *vina* , nec quivis alii *liquores* , utcunque summa fermentatione exagitentur , propterea actu incalescunt. Et quidem ratio satis evidens videtur , nimirum quia in subjectis crassioribus particulæ sulphureæ exsuscitatae , licet se mutuòprehendunt , & densius agglomeratae calorem cient : attamen in liquidis ejusmodi particulæ quantumvis concitæ , aut agitatae , ab aquosis semper intervenientibus disjunguntur prorsus , ac à mutuo amplexu aut combinatione prohibentur , adeò ut per se fervorem actualem producere nequant : Propter eandem rationem corpora dura invicem affricta , aut violenter attrita , non modò calorem , sed & ignem sæpè producunt , cùm tamen liquida , utut plurimùm concussa , & agitata , haudquaquam intepefcant. Cùm itaque sunt tres tantùm modi quibus calor actualis in liquoribus quibuscvis progigni possit , inquirendum erit cuinam ex istis incalescentia sanguinis ascribi debeat.

Primò , quoad primum , ex sententia tam veterum , quàm recentiorum quorundam , sanguis ob *rei calidæ admotionem* incalescere perhibetur , nempe dum illi *calidum innatum* , atque hi *flammulam in corde* stabulari , & sanguinem pertranseuntem excalefacere statuerunt ; verùm utraque harum opinionum facilè concidit , ex quo liquet *Cor merum esse musculum* , nec in se fomitem ullum pro flammula , aut calido (nescio quo) implantato perennandis idoneum continere : Nam licet fatendum sit à continuo hujus visceris motu , (qui tantùm animalis est) sanguinis circulationem dependere , calorem tamen *cor* omnino à *sanguine* , & non *sanguis* à *corde* mutuatur.

Secundò , quod spectat ad secundum liquidi excalefaciendi modum , quoscil. à salinis corrosivis invicem , aut etiam oleosis , vel corpori metallico corrodingo commissis , fervor ingens excitatur ; neminem opinor esse qui seriò asserat , à tali causa sanguinem effervere , utpote cujus liquor in statu naturali semper homogeneus existit ; & quanquam sale copioso , tamen eo volatili tantùm , miti , ac benigno refertur : Cæterùm neque in *corde* , nec in alio quopiam foco *mineram salinam* , aut aliàs heterogeneam detegere licebit , in quam liquor sanguineus agendo , vel corrodingo fervorem concipiat : nempe istiusmodi aut *mineram* , aut corpus corrodingum perpetuò renovari oporteret ; quoniam ebullitio , & fervor à salium lucta excitatus cessat , quamprimùm sales combinantur , aut corpus corroditur.

roditur : Si quando in corpore nostro humorum particulæ salinæ à re crassa desciscunt , atque enormes & efferaciores evadunt , propterea sanguis, quoad calorem & motum , anomalias quasdam subit ; attamen impossibile videtur , ipsum à salium congressu , & colluctatione , aut corrosione originaliter , & perpetim effervere.

Tertiò , quoad *tertium* , quo liquida effervent , modum ; licet durus videatur sermo, *sanguinem accendi* , attamen cum nulli præterea possumus, quid vetat huic causæ incalescentiam ejus attribuere ? idque eo magis , quod *proprie ignis , flammæque passiones , soli præterea sanguinis vitæ* competant.

Enimverò præcipua , & maximè essentialia , ad flammam perennandam requisita sunt hæc tria. *Primò* , sc. ut huic quamprimum accenditur , libera & continua aëris accessio concedatur. *Secundò* , ut pabulo sulphureo constanti fruatur. *Tertiò* , ut recrementa ejus tum fuliginosa , tum crassiora perpetim amendantur. Proinde si ostendero hæc eodem ritu *flammae* , ac *vite* , iisdemque *solis* competere , extra dubium habendum esse arbitror, *vitam ipsam flammæ speciem quandam esse*.

Primo igitur ut flamma accendatur , maneatque accensa , libero , & indiscontinuo aëris accessu opus est , idque non solum ut effluvia vaporosa, flammæ suffocationem minantia , foras convehantur , & perpetim decedant ; attamen longè potius , ut *pabulum nitrosum* propter cujusvis rei incendium necessariò requisitum , ab aëre suppeditetur : Enimverò omnis *ignis* sublunaris , ac potissimum *flamma* , omnino conflatur à *particulis sulphureis* , è corpore combustibili confertim erumpentibus , atque *nitrosis* , quæ ubique in aëre scatent , iis in occursum datis : Quando *sulphuris* particulæ tardè , aut , impeditè erumpentes , *nitrosas* pauciores tantum , propè confitas sibi consciscunt , *ignis* qualis in carbone vivo conspicitur , produci solet. Cum verò priores impetuosius , aut sponte emanantes , aut à flatu abactæ , statim plurimas *nitrosas* in toto ambitu scatentes apprehendunt, oritur *flamma* : Profectò universa hæc aëris regio *corpusculis nitrosis* abundè refertur , quæ ubique ad *ignem* vel *flammam* constituendam præstò sunt, iisque ubivis accensis , fluidorum more occurrunt , licet non pari semper more , aut mensura : quippe observare est , quibusdam temporibus, præsertim in frigore brumali , quando aër plus *nitro* abundat , *ignem* aut *flammam* intensius ardere , & calorem *longius* diffundere : è contra autem in pluvioso cælo , etiam cum solis radii æstivi focum illuminant , adeoque aëris vicini nitrum dissipant , *ignem* adeò retundi , ut vulgò dicatur, *ipsum à sole extinguere* : Siquando *nitrosæ* aëris particulæ , subjecti cujusvis *sulphureis* inter accendendum erumpentibus præcludantur , & *flamma* & *ignis* cito dispereunt ; quod exinde constat , quoniam hic , aut ista vitro imposita , post aërem eductum vel exclusum , citissimè exspirant : porro in aëre aperto , licet *ignis* nudus , *ignem* in re cremabili mero contractu propaget , attamen *flamma* vix sine *flamma* admota , aut igne valdè intenso accenditur : quia , sc. ad flammam excitandam plurimæ aëris *nitrosæ* particulæ circumcirca confitæ simul accendi debent ; veruntamen si *nitrum* & *sulphur* commune simul trita commisceantur (quoniam *ambo incentiva* convenerunt) vel minima scintillula tali mixturæ incidens , flammam maximè

maximè impetuosam gignit ; quæ insuper pabulum nitrosum haud ulterius desiderans , in quovis loco , nempe subter aquas , in spatio aëre vacuo , æquè liberè ac sub dio accenditur. Pariter si nitro in crucibulo ignito , ac fuso , res minùs sulphureæ , utpote ligni ponderosi frusta injiciuntur , eadem primo statim contactu flammam concipiunt , eandemque donec penitus consumuntur continuant : Quòd autem ignis & flamma spatio aëre vacuo inclusa , propter *subductum nitri pabulum* , potiùs quàm à propria fuligine suffocari exspirant , Vir Illustrissimus D. Rob. Boyle plurimis experimentis clarissimè demonstravit. *Namque lucerna accensa globo vitreo capaci immissa, & vase obturato, quamprimum aër per antliam exsugbatur, flamma exspirabat* : Porro , quod pro hypothesi nostra concludit, observavit ille, *flammam à prima facta exsuctione, secundum omnes suas dimensiones se contraxisse ; dein post aëris exantlati secundum aut tertium haustum, flammam, extrema summitate excepta, ceruleam admodum apparuisse, ac à sebo magis, magisque recessisse; donec tandem summum ellychnii cacumen attingens exspiraret: eadem rursus lucerna accensa, & recipienti inclusa, expertus est vir Doctissimus, usque quo aëre non exhausto, possit lucem suam sustinere, & comperit multò diutius, quàm priùs perdurasse lucidam.* Ex his manifestò liquet , flammam inclusam non tam propria fuligine suffocatam , quàm nitroso aëris pabulo destitutam , exspirasse : nam in priori experimento , ab aëre exhausto , plus spatii fumo , ac fuligini, ne mox flammam obruerent , concedebatur ; & tamen hæc citius in recipienti vacuo , quàm in eodem aëre pleno interibat : porro flamma *interiens cerulea evasit* , quatenus scil. plus sulphuris , quàm nitri particeps fuit ; insuper *sebum relinquens , juxta ellychnii cacumen exspirabat* , inquantum hæc pabulum suum maximè necessarium , scil. nitrosas aëris particulas , quousque poterat , insequuta est : Idem experimentum in *carbonibus viris* factum pariter successit ; *nudus scil. ignis, post subductum nitri pabulum citò disperuit* : huc etiam facit, quod lucernæ flamma in cryptis subterraneis , ubi aër nitrosus aut deficit , aut dispellitur , primò contractior , & cerulea evadit , dein paulò postea exspirat.

Hoc argumentum ideò fusiùs prosequutus sum , quoniam ad *sanguinis vitam* sustinendam simili prorsus ritu , atque ad *flammam* continuandam , par utrobique sit aëris hauriendi necessitas : calidiora enim animalia , si respiratione prohibentur , citò exspirant ; quare maximè vulgaris & promptissima eadem interficiendi ratio est , spiritum præcludere , quo penitus obstructo , *vita* , uti flamma , perit : Quòd si objiciatur , suffocatos interire , quia fuligines retentæ massam sanguineam inflant , & intumesciunt , quæ proinde , mole aucta , & ferè immobilis facta , cordis situm opplet , ejusque motum inhibet ; dico hoc improbabile esse , quoniam si arteriæ ubique in artubus , & circa collum ligaturis constringantur , ut sanguis , quoad circuitus sui ambitum coarctatus , circa præcordia plurimùm constipetur (plus certè quàm à mera fuligine retenta evenire potest) propterea tamen neque statim mors , neque lethalia symptomata insequuntur : hinc ut constet , respiratione prohibitos interire , quia *sanguinis flamma vitalis , nitroso aëre*

pabulo destituitur, potius quàm quod eadem à propria fuligine detenta obruitur: Quod etiam *Clarissimus Boilius* experimentis extra dubium posuit. Namque observavit ille *calida animaliaglobo vitreo imposita, & occlusa, longè citius ab aëre extracto, quàm ab eodem intus relicto exspirare*; licet in priori casu plus spatii pro fuligine, ne retenta sanguinem citius constipet, suscipienda relinquatur. Utcunque tamen, si calor, & incalescentia sanguinis, à *fermentatione*, aut particularum dissimilium congressu, aut ab ebullitione propter calidum admissum, aut à quavis alia causa, præter accensionem, oriretur: profectò tantum abest, ut effectus iste propter aërem exclusum inhiberi, aut suppressi posset, ut potius è contra multo inde intensior evaderet. Namque observatione maximè vulgari constat, liquores maximè fermentiscibiles, quo strictius vasi occluduntur, plus effervere, & ab aëre per foramen apertum admissò, mox ab orgasmo cessare: porrò *experimenta Boiliana* clarissimè ostendunt, *effervescentias è particularum dissimilium ebullitione, aut corrosione excitatas, item aqua ferventis ebullitionem in sphaera vitrea, post aërem exsuctum supra modum augeri*. Experimentor. Physicomachanicor. 41. 42. 43. Ingeniosissimus iste prædicti Authoris Tractatus multa experimenta suppeditat, quibus abundè constat, *intestinos particularumistarum, cujusvis firè rei, præterquam ignis, & vitæ motus, intra spatium aëre vacuum plurimum intendi; horum verò actus illico post aërem subductum extinguere*; hinc ut recta cum ratione concludere liceat, *animalis vitam esse aut ignem, aut aliquid ei valde analogum*: Horum affinitas adhuc clariùs observatur à mineralium fossoribus, qui passim experiuntur, in cryptis subterraneis, ubi vel nitrum deficit, vel à vapore quodam alieno abigitur, si quando animi deliquium imminet, vel planè urget, eodem tempore lucernæ flammam diminui, cæruleam evadere, & demum exspirare.

Secundum *flamma sustinenda* requisitum, est *constans pabuli sulphurei*, quod continuò depascatur, *supplementum*, quo subtracto, aut propter incongruam mixturam depravato, flamma extinguitur; uti cernitur in Lampade, quæ oleo denegato, aut si aqua vicè ejus suffundatur, exspirat: porrò prout sulphureum pabulum istud magis aut minùs, utque modò uberius, modò parcius suggeritur, flamma magis aut minùs intensa, etiam modò clara, modò fumosa producitur; interea pabulum incendio continenter absumptum, partim in effluvia vaporosa abit, partimque in cinerem, qui terræ, salis, & sulphuris aliquot particulis constat; Sed multò fecus habet in liquoribus ad fermentandum expositis, quibus si novæ particulæ continuò suggeruntur, atque veteres decedunt, fermentatio inhibetur, aut perturbatur.

Eodem planè, quo *flamma* ritu, *calidorum animalium sanguis* (& è cunctis naturalibus, præter ignem, hic unicus) *pabulum sulphureum*, constans, & copiosum exigit, illudque brevi atterens, magna ex parte in effluvia vaporosa absomit, capite mortuo terræ, salis, foetidique sulphuris relicto; interim è pabulo suo per accensionem attrito, particulas quasdam in alios usus necessarios disponit. *Sanguinis vitam, sive flammam* alimento continuo egere, nullus est quin quotidie in seipso experitur: Nam si aliquandiu illud denegatur, sanguinis vigor minuitur, quin & partes solidas at-

terens, earum ramenta, aliosque corporis humores, quibus depascatur, in sinum suum rapit: Si nutrimentum ab assumptis quotidie suggestum, tenue nimis, & aquosum fuerit, sanguinis fervor instar flammæ jejunæ remitti solet; sin pabulum valde sulphureum, ac spiritu vinoso turgidum copiosè ingeritur, cruor statim inflammatur, ac non rarè in *febrem*, quasi apertius incendium, erumpit: interim ex isto sanguinis pabulo, uti videtur, per *accensionem* attrito, effluvia calida cum fuligine, & vapore copiosissima decedunt, quæ juxta Sanctorii computationem cætera quæque totius corporis excrementa longè superant, & quod ipsorum indolem planè igneam testatur, non rarè linguam, & fauces torrefaciunt, & velut caminum, atredine inficiunt; porrò sanguine conflagrante, fæces adustæ instar *capitis mortui*, in *vesicam fellis*, *lienem*, & alia forsan emunctoria amandantur.

Tertiò, Ut flamma accensa aliquandiu permaneat, jugi *eventilatione* opus est, nempe ut effluvia ejus fuliginosa continenter avolent, quæ secus in vicinia densius aggesta, & detenta ignem suffocant, in quantum scilicet corporis accensi poros obstruendo, materiæ sulphuræ inflammandæ eruptionem impediunt. Quamvis hæc conditio cum altera potentiori, scilicet *pabuli nitrosi* ab aëre hauriendi necessitate sæpissimè coincadat, ut vix ab ea distingui possit: attamen planè cernimus, à fuligine detenta, & circa ellychnium accreta lucem extinguere: quam ob causam lampas, cujus ellychnium *alumine plumoso*, aliæve materia incombustibili constat, non (uti promittitur) longo tempore durabit; quia scilicet fuligo ellychnio adhærens, olei ad flammam accessum inhibet; propter hanc rationem, ab aëre, ventique afflatu fuligines abstergente, flamma non modò redditur clarior, scilicet fumo, ac vapore crasso magis libera, sed & pabulo satis concessa, durabilior evadit.

Pariter ac *flamma*, etiam *sanguinis vita eventilationem* continuam exigit; in quem finem præter majora *tracheæ* spiracula, minora innumera, scilicet *pores cutis*, ubique per totum corpus hiantes, effluvia à sanguine æstuante decidua copiosè emittunt; quos si constipari, ac nimis occludi accidit, propterea sanguis, quasi fumo & vapore obsitus, inordinate effervescebat: porrò necesse habet circuitum suum corripere, ut crebriori vice pulmones pertransiens, illac totam, quæ licet, fuliginem suam dispellat: Cum flagrante cælo aër quasi immotus stagnare videtur, circa præcordia plurimum æstuari solemus, in quantum scilicet cruor pabulo nitroso parciori refectus, non tam clarè ardescit, sed incendio magis intrinseco, & suffocativo gliscit: porro in quantum aëris particule minus agiles, quando inspirantur, expiranturque, vaporosa sanguinis effluvia haud ita promptè foras convehant; hinc est quòd flabello auram ventilamus, ut mobilior facta, è præcordiis nostris fuliginem uberius, celeriusque educat.

Restant adhuc aliæ quædam *ignis*, & *flamma* considerationes inferiores, utpote non tam *essentiam*, quàm *productionem* & *extinctionem* utriusque respicientes; quæ insuper an, & quatenus *sanguinis vita* conveniant, breviter disquiremus.

Ignis, aut *flamma*, duobus modis produci solet, nimirum aut ab alio

igne, vel flamma succenditur, vel ab intestino particularum sulphurearum motu progignitur: utriusque species, & fiendi modos in Tractatu nostro de Fermentatione fusè ostendimus (excepto tantum quòd pro ipsis sustinendis, necessarium *pabuli nitrosi* accessum illic omisimus): pariter ac *flammam*, etiam *sanguinis incalescentis vitam* duplici modo produci observamus, nempe aut ab alia vita sive anima succenditur, uti in *viviparis*; vel particulæ intrinsecæ ad animationem prædispositæ, à diuturno caloris externi fotu, demum cum sanguine in vitam suscitantur, prout in *oviparis*.

Quòd si amplius inquiritur, quando, & quomodo *flamma vitalis* in sanguine primò accenditur? Dico hujus parva quædam initia, ab ipso conceptu in humore genitali deponi: nempe tunc *anima corporeæ* rudimentum, à parentum animis delibatum, velut scintillula à flammis istis excussa, in materia idonea reconditur, quæ deinceps à calore materno exsuscitata, parùm gliscere, & micare incipit, atque postea cum sanguine producto, & sensim aucto indies dilatata, corpori, quod actuat, & animat, coextenditur: attamen quamdiu fœtus ovo, aut utero includitur, *ignis vitalis* pabulo aëreo paucò admodum, aut vix omnino potitus, nondum in flammam apertam erumpit, verùm instar titionis cinere obvoluti, tardè ac minutè solum ardet, & calorem vix ullum dispergit: quapropter embryonis tum formatio, tum accretio, à caloris materni, aut alius analogi fotu plurimum dependet, quo destitutus perit: quamprimum verò fœtus, partu tempestivo in lucem editus, spirare incipit, *ignis vitalis* pabulum nitrosum illicò accipiens, se latè explicat, ac per totam massam sanguineam effervescentia excitata, quandam quasi *flammam* accendit; & quia sanguis tum primò in pulmones irruens, ibidemque aëris accessu potitus, exardescere incipit, visceris istius caro prius rubicunda, mox in subalbidam, instar carnis elixæ, mutatur, atque sanguis insignem alterationem subit; nam qui è dextro cordis sinu in vasa pneumonica *atropurpureus* fluit, inde statim è pulmone redux, *colorem coccineum* & quasi *flammeum* induit, adeoque rutilans sinistram cordis sinum, & arterias appendices pertransit.

Profectò, quòd in recens natis: *pulmonum color* tam subito mutatur, sanguini illic primò apertius accenso, eorumque carnes velut elixanti aliquatenus deberi arbitror, quanquam insuper mera pulmonum inflatio, embryone mortuo, similem effectum producat, in quantum sc. pulmonum membranæ, & parenchyma distenta & in majorem capacitatem aucta, sanguinem stagnantem discutunt, adeoque in rivulos minores, & vix conspicuos distrahunt.

Quod autem spectat ad *calorem sanguinis*, inter circulandum ab *atro-purpureo* in *coccineum*, & ab hoc in illum, tam variè immutatum: dico hujus *causam* immediatam esse, *aëris nitrosi* cum *sanguine admixtionem*. Quod certè constat, quia mutatio in coccineum ibidem loci incipit, ubi sanguis aëris accessu maximè potitur, sc. dum ex arteriis pneumonicis in venas transfertur; nam in *istis atropurpureus*, in *his* per totum *floridus* apparet, prout Doctissimus D. D. Lovverus observavit: Porro hanc coloris alterationem, ab aëre admixto procedere, adhuc amplius liquet, quoniam

quoniam iste *color coccineus* in superficie cujusunque sanguinis extravasati propter aëris occursum succedit ; & si flos eximitur , mox suboritur alter : insuper sanguis è vena extramissus , & virgula plurimum agitata , per totum coccineus evadit : pariter & *viventium sanguis* primò intra venas pneumonicas , scilicet mox ab aëris per tracheam influxu rutilat ; & exinde propter easdem aëris succensi particulas adhuc retentas , omnes arterias usque floridus pertransit : interim ab aëris nitro , particulis sulphureis admisto , cumque iis conflagrante , sanguis valde rarefactus , & revera in flammam expansus , intra totos venæ pneumonicæ , & magnæ arteriæ ductus impetuosè turgescit , halitus copiosos , & effluvia calida à se dimittens ; ad fines verò arteriarum delatus , & versus cor redux , ut strictiora venarum oscula subeat , particulas aëreas adeò turgidas , & efflagrantes deponit , statimque sedatior factus , & semiextinctus , proindeque tum vigore , tum etiam colore mutato , per ductus venosos regreditur , ut denuò pulmones incurrens , incendium suum redintegret ; juxta hunc modum , ut sanguis accensus flamma perenni , & aquabili per totum corpus deflagret , ac in omnibus suis particulis accensionem successivè renovet , ab accensionis foco in partes omnes , & ab his in istum perpetua vice circumferri debet : Propter hunc finem cordis machina , tanquam embolo aut syphone opus fuit , quod scil. duplici sinu instructum , sanguinem recens accensum , à toto pulmone in se recipiat , quem adhuc flagrantem , mox in singulas totius corporis partes propellat , simulque sanguinem deflagratum , & semiextinctum , à toto corpore reducem suscipiat ; quem succo novo inflammabili imbutum , pulmonibus reaccendendum tradat.

In hoc munere exequendo , licet *cor merus sit musculus* , & motu tantum animali exercitus , solummodo sanguinis circulationi inservire videtur ; intereà tamen ad moderandam sanguinis accensionem , ejusque incendium juxta passionum *ἐμψυχῶν* , aliaque corporis animati opera & usus dirigendum , tantum confert , ut vitalem , sive flammeam animæ partem in corde & pulmonibus sedem præcipuam , & quasi imperialem habere putemus : In omni affectu , ut *doloris* , *gaudii* , *timoris* , & similium ; porrò in morborum paroxysmis , cor vario modo disponitur , atque hinc efficit ut sanguis influens æstu diversimodo fluctuet , & accendatur ; de quibus alibi , cum de passionibus agetur , opportunior dicendi locus.

Interim advertimus *sanguinis incendium* , proindeque *vitalem* , sive *flammeam animæ corporeæ partem* , non eodem modo , aut mensura semper , aut in omnibus vigere ; attamen juxta varias ipsius sanguinis constitutiones , prout nempe plus aut minus *sulphureus* , *spirituosus* , *salinus* , aut *aquosus* existit ; quinimo juxta diversas tum *pabuli* , quo hæc flamma nutritur , tum *spiraculorum* , quibus eventilatur , ac insuper ipsius *cordis* , quo huc illuc corripitur , & agitur , constitutiones , & conformationes , ne non propter alias accidentium quorundam rationes , *accensio sanguinis* in singulis variat ; nimirum ut flamma ejus modò sit magna , clara & expansa , modò minuta , contracta , aut nebulosa , modò æqualis & ordinata , modò inæqualis , ac sæpe interrupta , quin & multis aliis mutationi-

bus obnoxia evadat ; propterea item ipsamet *anima* variam indolem nata, diversimodas affectiones, & mores concipit, de quibus postea dicemus : quippe haud minimum est, quod à massæ sanguineæ temperamento, ejusque accensionis gradu, & modo, totius animæ dispositio pendeat.

Ignem, & *vitam* pluribus modis pariter interire, sive extinguere, ex superioribus satis liquet, nempe de utrovis actum est ; si aut pabuli nitrosi accessus, aut effluviorum decessus inhibentur, vel si alimentum oleosum, sive sulphureum utrique requisitum absumitur, nimis subducitur, aut ab indole inflammabili pervertitur ; de singulis ita clarè liquet, ut explicatione uberiori non opus fuerit.

Ostenso hæcenus *sanguinis vitam*, sive animæ partem in eo gliscentem, *flamma* speciem quandam esse, jam porrò videamus quo ritu ad efflagrandum disponitur, & quatenus ad *lucernæ*, sive *lampadis* ardentis similitudinem accedit.

Lampas vulgaris, sive ad calefaciendum, sive ad illuminandum destinatur, ut plurimum eodem modo conformari solet ; nempe oleum ellychnio perpetim affluens pabulum flammæ continuum suppeditat ; quare cum sit unicus sive *lucis*, sive *caloris focus*, utriusque actio loco tantum uni limitatur ; proindeque quoties plura simul loca, aut diversas ejusdem spatii aut corporis partes, aut illuminare, aut calefacere opus fuerit, plures lucernas simul accensas hic illic disponimus : Verum enimverò si instrumentum summo artificio elaboratum (cujusmodi quidem est corpus animatum) unico liquore intus contento, per totum excalefacere, & semper calidum servare incumberet, liquorem istum haud in ellychnio tantum, sed in tota superficie leviter accensum, per Tubos idoneos ad universas machinæ partes derivari oporteret ; dein siquidem liquor ardens secundum omnes suas partes, aëris nitrosi accessu frui, effluvia, aliaque recrementa deponere, quin & constantis impendii supplementa resumere deber, cujusmodi munia non passim ubivis, sed tantum in stasis quibusdam locis obiri possint ; idcirco liquor efflagrans perpetua vice per totum circumferri debet, ut singulæ ejus portiones singulis istis privilegiis successivè fruerentur, simulque machinæ continentis totam capacitatem, sc. tum interiores, tum exteriores recessus calefacerent : profectò hujusmodi Thermautomaton artificiosè fabrefactum, circuitus sanguinei, & quæ in ipso ardet, *biolychnii mechanici* planè divinam, satis aptè repræsentaret.

Quod autem objicitur, *sanguinem* ex sua natura minus inflammabilem videri, porrò cum nulla hujus efferventis flamma oculis conspicitur, meritò dubitari, an talis reverà subeat, necne : Dico imprimis *cruoris Analysis Chymicam* plures sulphuris, ac spiritus particulas, quinimò olei inflammabilis uberem satis penum exhibere, cui tamen alia crassiora elementa, utpote nimiae accensionis fræna, in justa proportionem commiscuntur ; nempe ut liquor iste minutim, & per partes tantum pauciores, pro *vita lampadis* benignâ & mitiori constituenda deflagraret : quare sanguis è vena eductus, & igni candenti affusus, aliquatenus ardescit, licet non uti spiritus vini, aut terebinthinæ oleum, totus in flammam agitur : porro haud tota *sanguinis massa*, uti *lampadis oleum*, cremari debet ; quinimo incendium

cendum ejus in eum finem instituitur , ut dum particulis omnibus mixtione liberatis , quædam sulphuræ , & spirituosæ efflagrando absumuntur , plures aliæ subtiles , pleno agmine manumissæ in necessarios regiminis animalis usus erogentur , simulque aliæ crassiores , & nutritiæ , velut coctæ aut assatæ , in partes omnes alendas dispensentur ; insuper effœtæ omnes , & recrementitiæ per idonea emunctoria amendantur , aliis in eorum loca per nutritum constanter substitutis.

Interim verò , quòd *flamma vitalis* , quam tot muniis destinatam in sanguine accendi supponimus (secus ac *flamma vulgaris* quæ maximè conspicua est) non omnino appareat , ratio saltem probabilis assignari potest , quòd eadem tenuissima cum fuerit , ac in corde , & vasis appensis , quasi in receptaculis ferè clausis ardeat , non clarè efflagret , sed forsan sub fumi , seu vaporis , aut halitus specie permaneat ; quinimo etsi sanguis apertè efflammaret , tamen fieri posset , fulgorem ejus , utpote tenuissimum , à visu nostro haud percipi , prout sub clara diei luce , nec *ferrum ignitum candens* , nec *micantes* , nec *ignes fatuos* , nec *ligna putrida* , nec multa alia noctu lucentia conspiciere possumus ; cur non *ignis vitalis* , vel istis tenuior , visum nostrum omnino fugiat ? Quamvis interdum calida animantia ignem , sive flammulam quandam noctu solummodo conspicuam emittere solent : Quippe novimus in quibusdam sanguine calido & vaporoso præditis , cum vesperi cubitum ituris vestes interiores prope ignem , aut lucernam exuerentur , flammam pertenuem & candentem emicasse , quæ totam inferiorem corporis regionem occupavit. Cujus affectus ratio prorsus eadem videtur , ac cum tedæ recens extinctæ fumus evaporans , à levi quovis succendiculo in flammam reducitur , & manifestò arguit flammam aliam hujus extrinsecæ radicem , intus in corpore latere : Propter hanc itidem causam est , quòd ex equorum jubis , felium , aliorumque calidorum animalium pellibus succussis , scintillulæ quasi ignis exsiliunt , & non rarò flammæ in tenebris solùm conspicuæ accrescunt. Insuper hic advertimus in febre causo , item ab immodico vini , aut aquarum ardentium potu , sanguinem , quasi flamma ejus plurimùm adaucta , supra modum effervere , halitus siccos & effluvia caloris acerrima , qualia reverà neutiquam è liquore ebulliente , aut fermentante , sed tantum ab accenso procedere solent , emittere : quid quod nonnulli febricitantes ignes ardentes flammæque omnino oculis observari imaginantur ; quod quidem arguere videtur , sanguinis flammam valde intensam etiam in Cerebri claustra penetrare. Novi quendam calidioris cerebri ingeniosum , qui asserbat se à pleniori vini potu , etiam sub atra nocte literas clare perlegere potuisse ; hinc etiam colligitur , *sanguinis* pariter ac *liquoris* ardentis accensionem , iisdem prorsus modis intendi ac augeri , scil. *partium agitatione* , & à *pabulo sulphureo uberius affuso*.

Cæterum quòd in calido viventium sanguine , *ignis* seu *flamma* proprietates , affectiones , aliaque multa accidentia , absque *forma* aut *specie* ejus manifesta reperiuntur ; quid si dicamus in causa esse , quòd *sanguinis flamma vitalis* , *forma alteri* , scil. *anima corporea* subjungatur , sive subordinetur ? Quare licet flammæ vulgaris qualitates præcipuas & affectiones retinet , attamen

attamen flammæ, aut ignis speciem amittit: Nam in omni mixto naturali, forma superior in particulas quascunque inclusas, utut ex se efferas, & indomitas, jus, & principatum exercet, easque specie propria exuens, in actiones isti concreto peculiare ordinat & disponit: Quando ignis forma præpollet, iste cum fulgore ardens, ut fines suos latè propager, objecta quævis inflammabilia destruit, & consumit: Sin verò igni intra sanguinem accenso, *anima corporea forma* superinducitur, hinc sine fulgore, aut subjecti destructione efflagrat, ejusque flamma invisibilis, & quasi subjugata, pro vita & muniis ejus sustinendis ordinatur: enim verò corporum naturalium formæ providentia divina, ac ipsa mundi creatione prædeterminari videntur, nempe ut totidem quasi Typi existerint, juxta quos unaquæque portio materiæ concretionem subeuntis, sive animata, sive inanimata, modificari possit: ita nimirum ut massæ, juxta seminum latentium virtutes, hoc aut illo modo dispositæ, forma lapidis, plantæ, aut bruti, aut alterius cujusquam speciei accedat; dein formam ipsam actus, & affectiones tali speciei appropriatæ consequantur. Cum itaque vita, sive anima perfectiorum animalium, in ejusmodi functiones destinatur, quibus peragendis, sanguinem ritu liquorum ardentium, perpetuo incalescere, & velut accendi oportebat; quid vetat, quin vitæ sive animæ istius corporeæ actus (particularum subtilissimarum, & maximè agiliū motu, & agglomeratione constans) *massa sanguinea incendium* quoddam, sive ignis perennis dicatur? Cui licet ignis vulgaris accidentia, & qualitates præcipuæ in sunt, tamen forma ignis obscuratur, utpote formæ nobiliori, sc. animæ corporeæ, subjugata: non multum absimili ritu, veluti cum *aqua in glaciem*, aut *nivem* congelata, aquæ speciem ad tempus deponit, atque ad usus longè alios, & à fluiditate diversos, applicari potest.

At verò licet *Animam corpoream sanguini* inhærere, haud tamen huic adæquatam, & limitatam esse statuimus: quippe dum crassior ejus portio, tanquam Arboris cujuspiam radices telluri affixæ, *massa sanguinea* inferuntur, pars ejusdem animæ nobilior, veluti rami altiores, in *cerebro ac systemate nervoso* expanduntur; seu, quod prius innuimus, cum pars animæ vitalis, sive flammea in *sanguine*, ejus portio *animalis*, sive *lacida* in ἐγκεφάλῳ ejusque appendice continetur: quo utriusque sphaera justo limite definatur, nec flamma vitalis regionem animalempetuosè perrumpat, ei frigidior, simulque translucida *cerebri* substantia, tanquam obex glacialis, aut vitreus opponitur; cujus interiorē compagem sanguinis non nisi exiles & minutissimi quidam rivuli, caloris fovendi gratiâ subeunt: at verò è latice ejus juxta cerebrī oram ubivis aggesto, ibidēque quasi ad exstillandum deposito, particulae spirituosæ copiosissimæ dimanant, quæ quidem ἐγκεφάλῳ ubertim immersæ, magisque exaltatæ, materiam suggerunt, è quâ procreantur spiritus Animales per nervos in varias corporis regiones derivandi.

EXERCITATIO II. MEDICO-PHYSICA.

De Motu Musculari.



Um duæ primariæ sint animæ corporeæ facultates, nēpe *sensitiva* & *motiva*; utriusque generis potentias quasdam *exteriores*, quæ potissimum in nervoso genere; atque alias *interiores*, quarū exercitia intus in *Cerebro* peraguntur, quales nēpe sunt *imaginatio*, *memoria*, *appetitus*, &c. assignavimus. De *sensibus* tum *internis*, tum *externis*, quæ olim publicè differuimus, aliquando fors in lucem edenda, publici juris fient: intereà temporis, quoniam de *motu* tum *naturali*, tum *convulsivo* in me lites inferuntur, in præsentī opportunum erit, quæ de *potentiâ motivâ* meditatū fueram, quāque hypothesin de re tam ardua, summēque intricata conceperam, hīc in medium proferre.

Facultas motiva, aliūsmodi *animæ corporeæ* gestu ac *sensitiva*, scil. cum diverso spirituum animalium aspectu, & tendentiâ exerceri solet. Quippe omnis *sensus* est *passio* quædam, in quâ Anima, aut quædam portio ejus exteriùs perculsa, nutare, atque spirituum undulatione introrsum factâ, versùs ἐνέφαλον respicere cogitur; è contra autem *motus* omnis quædam *actio* est, in quâ anima se totam, aut sui partem exercere, atque spirituum ποσὴ seu fluctuatione extrorsum factâ, sistasin educere, & quoddam quasi membrum suum extendere videtur: Porro dum anima se, aut quandam sui partem ita exerit, ut designata tunc opera exequatur, spirituum animalium aggeries, ubique in partibus motivis dispositas, nunc unam, interdum plures exsuscitat, qui proinde cum impetu quodam expansi, ac velut explosi corpora continentia inflant, adcoque eadem quoad crassitiem aucta, & quoad longitudinem decurrata, membra appensa attrahere, & motu locali ciere faciunt.

I. In omni motu hæc tria considerari debent; scilicet *primò actionis origo*, sive prima motus obeundi designatio; quæ semper fit in *cerebro*, aut *cerebello*: *Secundò*, ejus *instinctus*, sive incepti ad partes motivas transmissio, quæ spirituum intra *nervos* scatentium commeatu perficitur: ac *Tertiò*, ipse *impetus motivus*, seu spirituum partibus motricibus inistorum in vim sive contractivam, sive elasticam exertio: Ex hoc triplici fonte, nimirum prout in singulis istorum res vario modo geruntur, plures motuum species, ac differentiæ deducuntur.

1. Quoad *motus originem*, seu principium, annotamus, quod iste qui à *cerebro*, appetitu conscio, ac auspice, procedit, *spontaneus* appellatur; qui autem à *cerebello*, ubi *lex natura* præsidet, excitari solet, cujusmodi sunt, *pulsus*, *respiratio*, cum multis aliis, mere *naturalis*, seu *involuntarius* vocatur: uterque horum vel est *directus*, qui ab hoc, aut illo principio, per se, & primariò ciatur, uti nimirum quoties appetitus ex propria

quadam, & ut ita dicam, *intestina deliberatione* hoc aut illud expetit, ac motus respectivos elicit; pariter item quando juxta solennem *naturæ ritum* functionis naturalis, ac vitalis munia ordinaria perficiuntur, vel motus utriusque generis est reflexus, qui scilicet à sensatione prævia, tanquam causâ evidenti, aut occasione immediatiùs dependens, illicò retorquetur; ita blanda cutis titillatio, ejus fricationem ciet, & præcordiorum æstus, pulsus, & respirationem intensiores accersit.

2. Quoad *instinctus vehiculum*, quod omnino per nervos fieri supponimus, quatenus illud per nervum singularem, aut simul per plures perficitur, dicitur *motus* aut *simplex*, aut *complicatus*; dein quatenus nervi alii aliis plus, aut minus, prius, aut posterius ciendo motui operam conferunt; dicitur hoc, aut illud membrum *primum*, aut *per se*, atque aliud *per consensum* moveri: quinimo & consensus iste cum partibus vicinis, aut remotis, idque cum diversimodo respectu peragi solet: Sed varias hujusmodi *motuum sympatheticorum* instantias, necnon singularium causas, & fiendi modos alibi fuscè ostendimus.

3. Subest altera, eaque insignis motuum distinctio, à *varia partium motricium constitutione* desumpta: nimirum partes fibris nerveis præditæ, ac in quibus spiritus motivi scatent; aut sunt *musculi*, qui *motus locales* exequuntur; aut *corpora membranacea*, quorum motus in seipsis terminantur, quos ideo *intestinos* dicimus: Quod spectat ad *motum localem*, de quo solummodò in præsentī agimus, licet apud omnes in confesso sit, actioni huic *cerebrum*, aut *cerebellum*, atque *nervos*, simulque *musculos*, unum, aut plures, junctis quasi viribus contribuere; quanquam etiam satis intelligatur, motûs obeundi inceptionem in *cerebro* aut *cerebello* designari, ejusque *instinctum* omnino per *nervos* convehi; attamen qua ratione *musculi* longè supra virtutem quamvis mechanicam illud opus peragunt, explicatu difficillimum videtur.

Motum localem tractione perfici, ac à *musculi contractione* pendere, non tantum vulgaris opinio est, sed etiam *αὐτοψία* patet; attamen de *contractionis modo*, & *causa efficiente*, plurimùm ambigitur, & inter Authores variè controvertitur; nonnulli satis dixisse arbitrantur, ipsam *animam præsentia* suâ musculum actuare, & fibras ejus tanquam retia protensa, huc illuc contrahere, aut deducere: Verum enimverò hoc esset *animæ sensitivæ* virtutem supernaturalem, & quasi divinam attribuere: Nempe quòd eadem mero afflatu suo corpora gravia ac mole prægrandia, quò libitum erit, deflectere, aut cogere posset: Porro quem ob finem *organa motiva* tam miro artificio, & multiplici discrimine fabricantur, nisi ut machinarum ritu, concinnâ partium structurâ, & apparatu quasi mechanico operationes suas perficiant? Profectò, non difficile erit *musculi*, immò totius *functionis ultionis* exercitia ad mechanicæ leges revocare, & juxta regulas, & canones ejus explicare; quod priusquam aggredior, non abs re fore arbitror, de ipsius *musculi fabrica*, *conformatione*, ac *usu*, in genere quædam præmittere. Veteres Anatomici, uno fere omnes consensu, *musculi corpora* in *caput*, *ventrem*, & *caudam* diviserunt; accipientes pro *capite*, musculi extremitatem parti ad quam fit contractio, connexam;

connexam; pro *canda*, musculi finem seu portionem, parti movendæ insertam; pro *ventre* denique partem musculi intermediam, quæ carniū mole tumidior conspicitur; dein pro motu obeundo, supponebant musculum circa caput, & ventrem intumescere; & proinde quoad longitudinem decurtatum, partem appensam sibi propius attrahere: attamen quo ritu, & quam ob causam musculi venter intumescit, nullus adhuc clarè explicavit.

Porro licet *myologia*, ab *Anatomicis* cujusque ævi exercitatissimis in tantum excoleretur, ut musculis omnibus totius corporis (uti creditum fuit) exactè recensitis, & officia assignarentur, & nomina iisdem exprimendis planè monstrosa adaptarentur; attamen vera musculi fabrica aliis nondum perspecta, nuper ab ingeniosissimo D.D. *Stenone* primò tradi cœpit: hic in *omni musculo duos tendines oppositos*, in quos fibræ utrinque abeunt, comperiit, quin easdem omnino fibras, quæ arctè invicem connexæ *tendinem* componunt, laxiùs junctas *carnem* constituere edocuit; ita tamen, ut aliæ aliis sumperimpositæ, *musculi crassitiem*, sive *profunditatem*, aliæque aliis juxta impositæ, ejus *latitudinem* componant: priores fibras *ordines*, alteras autem *versus* appellat; dein musculi partibus, & compositione ad hunc modum detectis, *figuram* ejus ad *matheseos* regulas aptè reducit; & juxta canonas inde desumptas actionem explicandam innuit: Quippe animadvertens ille, in musculo simplici rectilineo, *fibras carnosas* omnes, inter se *parallelas*, & plerumque æquales, ab uno tendine obliquè in alterum deferri; ipsosque tendines in oppositis carniū finibus, aut angulis conseri; perquam ingeniosè describit musculum esse *fibrarum motricium collectionem, ita conformatam, ut media carnes parallelo-pipedum obliquangulum constituent; tendines verò oppositi, duo prismata tetragona componant*: Hujus figuram in plano delineatam, accommodè repræsentat instrumentum, quo pictores, in describendis simul pluribus ejusdem rei exemplaribus, utuntur: Quippe styli angulis oppositis affixi, *tendinum* insertiones; ipsūque *parallelogrammum*, musculi partem carneam, exprimunt: Quando enim angulis oppositis, ab invicem ad maximam distantiam diductis, & acutioribus factis, duo latera propius accedunt, arcamque longiorem, sed angustiore reddunt, *musculus non contractus* denotatur: Sin verò iisdem angulis propius adductis, & obtusioribus factis, duo latera longiùs abscedant, proindeque musculi aream breviorē, sed & latiorē efficiunt, *musculus contractus* repræsentari videtur; interim in utroque prædicti *parallelogrammi* situ, laterum quantitas, sive longitudo non mutatur; sed tantum eorum positio, & *angulorum amplitudines* variantur: Utrum ita in musculo etiam habeat, inferius patebit. Interim ex ejusdem Doctissimi *Stenonis* observatione annotamus, *musculum* esse vel *simplicem*, qui *unico ventre*, & *binis tendinibus* constat, cujusmodi plures in brachio, & crure, qui sunt digitorum motores, quin & ferè ubique passim in aliis partibus corporis prostant; vel *compositum*, qui plures habet ventres, quorum singulis duo tendines oppositi appenduntur; ita tamen ut cum ipsi tendines compositi, scil. duo simul cōjuncti fuerint, unus *tendo cōpositus* *medias carnes ingrediatur, ac alter medias*

utrinque amplectatur carnes: Hoc in musculo *Massetere*, *Deltoides*, & quibusvis aliis evidentissimè cernitur, in quibus omnibus, pariter ac in musculo simplici, dum fibræ carneæ (ad quas solas potentia motiva spectat) contrahuntur, anguli oppositi, juxta tendinum insertiones ampliantur, proindeque ventres breviores, simulque crassiores facti, intumescunt.

In musculo simplici, juxta quod tendo unicus, vel simul uterque, vel alteruter vicissim attrahi debent; porro juxta quod pars attrahenda tenuis, aut lata, etiam propè, vel procùl confita fuerit, & propter alios quosdam respectus, *venter carneus* diversimodè conformatur; cumque figura ejus maximè regularis sit *Romboïdes*, illa tamen præterea, modò *triangularis*, modò *trapezialis*, *pyramidalis*, *spinalis*, *femilunaris*, aut aliis speciei irregularis existit: Verùm in ejusmodi musculis quibuscunque fibræ carneæ juxta positæ omnes, dum simul contrahuntur, intumescunt, & ab utroque fine versus medium corrugantur, licet in musculis omnibus, non pari semper modo, & dimensione; nam si uterque tendo simul attrahendus sit, contractio ab utroque fine carneo plerumque æqualis est; sin eodem tempore unicus attrahitur, ab altero immobili contractio fit minor, ac interdum, scil. ubi caro sine tendine notabili offi immediate cohæret, ferè nulla.

Musculi compositi varietate longè majori distinguuntur; nam præter diversimodas illorum figuras, quas singulas enumerare operis immensi esset; insuper juxta quod magis, aut minùs compositi sunt, atque ventres plures, aut pauciores serie multiplici, cum fibris modò ejusdem, modò diversi ordinis, huc illuc protensos habent, plurimùm discriminantur.

Musculus tenuior, ac minùs compositus, cum ventres forsan duos aut tres, in eodem plano dispositos sortitur, fibrarum carnearum series, plerumque diversè spectantes, tendines quosdam exteriores musculi finem unam amplexantes, aliòsque intermedios, circa finem alterum immer-
 sos habet; aded ut singulæ cujusque ventris fibræ carneæ, tendinem unum extremum, aliòsque intermedium parallelæ interjaceant: *musculus* crassior, & magis compositus, ut motus pernices, simulque arduos, ac diuturnos perficiat, ventres plures, in planis diversis confitos, atque fibrarum carnearum (quæ omnes brevissimæ sunt,) series multifariam spectantes obtinet: Horum compages, etsi valde intricata fuerit, ut ventres omnes vix enumerare, multò minùs eorum ad se invicem habitudines, mutuas dependentias, & connixuum rationes observare liceat; attamen ad hanc normam plerisque communem quodammodo reduci possunt; nimirum in magnis *musculis compositis*, quales sunt torosi illi, qui mediis brachiis, & cruribus robur ingens, & vires elasticas contribunt, advertere licebit in uno fine duos vastos tendines exteriores, totam ferè musculi superficiem obtegentes, qui statim in plures fissuras divisi, intra latum unguem ad musculi extremitatem alteram protenduntur; dein ex opposito, circa hunc finem alterum, tendo ingens medias ingreditur carnes, qui etiam mox in plures laminas, per totum musculi ventrem interiorem distributas, finditur: Cumque hæ laminæ interiores exterioribus occurrentes, & ferè ad finem oppositum

oppositum protensæ, multifariam spectant, atque superficies quaqua-
versus obversantes habent, aliæ ubique aliis oppositis destinantur, ac
per intervenientes fibrarum carnearum series committuntur: Talem
musculum, cujus plurimi ventres, in diversis planis consiti, multifa-
riam spectant, nullo modo, quin aliquæ fibrarum carnearum series in
medio disrumpantur, findere, aut divellere licebit: *Musculi* ita valde
compositi ventres, etsi multiplices, attamen prætenues existunt; utpote
quorum fibræ carneæ brevissimæ, cum laminis tendineis angulos sem-
per æquales, sed obliquos habent, proindeque attractionem validissi-
mam efficiunt: Quippe numerosæ fibrarum carnearum series, videntur
quasi totidem distincti *vestes*, ad pondus quoddam movendum simul adhi-
biti; seu potius, in quantum uterque magnus *Tendo*, mox in plurimas
laminas ita scinditur, pariter habet, ac si *funis* ingens *ductarius* corpo-
ri adducendo appensus, statim in plures funiculos, quibus multi homi-
nes simul attrahant, dirimatur: Namque dum singulæ carniū series si-
mul corrugantur, laminarum tendinearum simul omnium angulos op-
positos ampliant, proindeque totius musculi ventre intumefacto, fi-
nem utrumque, aut eum qui mobilis est, versus medium fortiter ad-
ducunt.

Unicuique *musculo*, & *simplici* & *composito*, integumentum membra-
naceum quaquaversus obtenditur; porro cujusque *fibris* carneis *directis*
motricibus, *fibrillæ* aliæ *transversæ*, scil. *membranacæ* intertexuntur, quæ
illas singulas investiunt, ac unâ compingunt, quinimo (uti probabile
videtur) tum fibris omnibus carneis eundem motûs obeundi instinctum
communicant, tum spirituum influorum copias à nervo exceptas, ad
tendines deferunt.

Arteria, & *vena* cujusque musculi medio insertæ, surculos quaqua-
versus, fibras motrices obliquè secantes emittunt, è quibus propagines
minores, per carniū interstitia dispersæ, eas omnes sanguinis affluxu,
& refluxu ubique irrigant: *Nervus* autem cujusque ventrem carneum
subiens, surculos quosdam minores tantum in viciniâ distribuit, quasi
tantum actionis imperatæ symbolum deferens, illius executionem infe-
riori fibrarum carnearum, fibrillarumque membranacearum satellitio
mandaret.

Musculorum cujusque fere generis *Iconas*, juxta naturales ipsorum *phases*
exarandas destinaram: Sed cum, Typographo festinante, cadaveris hu-
mani disseccandi copia non statim daretur, musculos tantum pauciores
quosdam, crure bovino exemptos ad vivum delineatos, infra exhibe-
bimus: Quamvis & hoc pensum *Clarissimus Stenon* jamjam satis accurate
perfecit: Cujus figuras, si quis ad matheseos regulas nimium defle-
xas suspicatur, facili negotio, eandem musculi, qualem Ille de-
scripsit, conformationem in ipsis carnibus intueri possit: Nam si
musculus simplex, regularis, è quocunque animali exsectus, ita
collecetur, ut tendinibus hîc illic ad latera conspectis, fibræ carneæ in-
ter ipsos, angulis obliquis & æqualibus interceptæ, ad planum horizon-
tale deprimantur, carnes parallelopipedum Rhomboïdes exactissimè refe-
rent.

rent : Dein si ejusdem musculi situ mutato , atque tendinibus sub & supra positis , tendinem inferiorem per longum secabis , partésque ab invicem divellens , totum musculum lacerando in binas portiones divides , videbis statim elegantissimo spectaculo , fibras omnes carneas unicâ serie dispositas , quin & inter se parallelas , ac ejusdem longitudinis , ab uno tendine in alterum procedere , & utrinque angulos semper obliquos , & æquales facere ; etsi musculos compositos , quorum ventres multiplices diversa obtinent plana , hoc modo diffindere haud licet , tamen eos , aut crudos aut coctos curiosè dissecanti , facile constabit , singulis carniū parallelogrammis binos adaptari tendines.

Quod spectat ad *musculi actionem* , in vivisectionibus (quæ solummodo hanc detegunt ,) planè cernimus , eam *trahi* , non ita tamen prout vetus opinio ferebat , nempe ut fibris à fine versus principium contractis , una musculi extremitas versus alteram ducatur ; verùm *fibra tantum carnea* , earumque fines versus medium contrahi videntur , *tendinibus* usque immutatis , & nec quoad longitudinem , aut crassitiem alteratis : Quod etiam Doctissimus *Stenon* jamdudum primus observavit. Hoc in *Diaphragmate* , & musculis respirationi dicatis , qui sc. vice constanti moventur , clarè percipitur : Quoties enim musculus contrahitur , fibras omnes carneas in utraque extremitate simul convelli , & quasi semetipsas utrinque subierint , propiùs adigi , proindeque breviores , ac unà crassiores evadere , dein à constrictione ista solutas , ad solitam longitudinem , & tenuitatem redire intueberis : Dum hæc ita fieri conspicias , facile opinaris aliquid , sc. *spiritum* , aut *materiem subtilem* è *tendinibus* in *carnes* profluere , quæ ipsas utrinque subiens inflat , simulque in sese propiùs compellat , propterea statim ut fibræ singulæ decurrentur ac intumescant , dein cum materies ista è *carnibus* in *tendines* recedit , fibræ depletæ & à corrugatione laxatæ ad pristinam longitudinem restituuntur , ac ita vicissim. Utrùm ità revera fiat , necne infra disquiretur.

Interim ut ad alia *motus muscularis* phænomena pergamus , si membranâ musculi detractâ fibras quasdam carneas , fibrillis quibus connectuntur dissectis , ab aliis separabis , & prorsus solutas reddes , in omni motu illas ita singulares , ac liberas , pariter ac alias simul compactas corrugari videbis.

Porro adverti , ex his fibris ita solutis , ac liberis , quasdam in uno extremo abscissas , ac à tendine separatas , adhuc ad musculi motum unà cum cæteris fibris , circa finem alterum , integrum se contraxisse , sine abscisso interim flaccescente : Post hæc *musculi* tenuioris portionem quandam carneam cum forcipe , tribus aut quatuor scissuris transversis , ad latitudinem pollicis divisi. Quo facto , portiones in utroque fine abscissæ , corrugationes quasdam leves , & inordinatas , brevi tantum spatio inibant , mox immobiles factæ : Alteræ musculi ita discissi portiones extremæ tendinibus cohærentes , multò vegetiùs ac diutius contrahi , sed irregulariter & convulsivè , sc. cum fibrarum intortione quadam , pergebant : Profectò in fibris ita abscissis contractionis vestigia quædam parum permanebant , partim ob motûs instinctum per fibrillas membrana-

ceas, quibus adhuc cum carnibus integris cohærebant, traditum, & partim quatenus spiritus animales fibris carneis insiti, jam à reliquis divisi, & sine influxu derelicti, nixus suos ultimos solito more contractivos exerebant: Propter hanc rationem nonnunquam in corde exempto, inque mucrone ejus abscisso, etiam in aliis musculis post nervos & vasa sanguifera resecta, contractio & relaxatio aliquandiu perstant. *Fibræ* alteræ tantum *discissæ*, ob spirituum è tendinibus accessus, & recessus, adhuc aliquatenus contrahi, & relaxari poterant.

Cùm in *diaphragmate* fibras plures singulares ab aliarum nexibus liberaveram, quid ligaturæ variis illarum locis injectæ efficerent, tentavi. Nonnullæ igitur circa medium ligatæ, pariter ac fibræ integræ contrahebantur, sed cum aliquali circa ligaturam intumescentiâ: Cùm alias circa fines, ubi tendinibus cohærent, modò unum, modò alterum, filo constrinxeram, motus præcipuè ac ferè tantum, circa finem liberum peragebatur: Porro in fibris circa utramque simul extremitatem ligatis contractio prorsus cessabat.

Contractio, & *relaxatio*, non tantum in corde, verum in *septo* aliisque musculis respirationi dicatis contingit: & quidem probabile videtur, quòd in omnibus juxta naturæ instinctus agentibus vicissim, ac ut plurimum æqualiter) licet non paria sint in omnibus motuum intervalla) peragi solent: Quin & musculi functioni voluntariæ inservientes, sæpe contractiones spontaneas ineunt, nisi ab Antagonistis suis inhibentur, uti constat in quantum *spasmus* unius musculi, alterius *paralyssi* supervenit. Contractio, & relaxatio celerius in *corde*, quàm in respirationis musculis, ac ita forsitan in his, quàm in quibusdam aliis iterantur: In moribundis illarum vices *panniculus carnosus*, subsultibus innumeris ubique tremulus, clarissime exhibet.

Quod spectat ad *humores*, quibus musculi fibræ omnes, sc. carneæ, tendineæ & membranose, illarumque intercapedines, aut irrigari, aut impleri, aut inflari videntur, eos revera saltem binos (nempe *sanguinem*, & *liquorem nervosum*) si non plures assignare licebit: Et primò *sanguinem* fibras omnes carneas, & quæ his intertextuntur, membranaceas perlucere, sensu indice manifestò liquet: Quippe si arteriæ ad musculum quemvis pertinenti spiritus vini atramento tinctus injicitur, vena interim constricta, fibrarum omnium carnearum, fibrillarumque transversarum superficies atredine inficientur, tendinibus interim vix omnino in colore mutatis; hinc ut constet sanguinem carnes omnes, easque fere solas ubique exterius irrigare: Utrum verò sanguis fibras carneas penitus subeat, aut liquorem subtilem à se deciduum ipsis instillet, etsi posterius hoc maximè probabile videatur, nullo adhuc certo indicio comperimus; at verò fibras omnes, sc. *carneas*, *tendineas*, & *membranosas*, in quantum à spiritibus, aut insitis, aut influis perpetim & copiose actuantur, eas itidem liquore nervoso, qui spiritibus vehiculo est, constanter imbui statuimus: Quatenus verò, aut quantum, prædicti humores ad facultatum animalium exercitia conducunt, haud faciliè constat; & quoniam absque liquore nervoso spiritus animales consistere nequeunt, & à crassi ejus plurimum.

rimum dependent, ipsum potentiae motivae actuandae nonnihil inservire concludamus; idpropter etiam perennem sanguinis affluxum nihilominus requisitum esse, experimentum ab Ingeniosissimo Stenone citatum, & nuper ab aliis probatum, planè confirmat. *Observavit Ille quòd in cane vivo, ligatâ Aorta descendente, sine pravia sectione, posteriorum omnium motus voluntarius cessaret quoties vinculum stringebat, iterumque tot vicibus rediret quoties nodum laxaret.*

Hæc sunt præcipua Phænomena circa musculi Fabricam, & Actionem in Zootomiis tum viventium, tum etiam mortuorum, aut moribundorum factis observanda: E quibus tamen juxtâ positis, ac inter se collatis, quàm difficile sit functionis motivae Animalis Ætiologiam constituere, vel hinc constet, quòd Ingeniosissimus Stenon, postquam myologiae suae elementa à se primò inventa perquam accuratè tradiderat, ab hypothesei tamen ex iis condenda prorsus abstinuit; utpote qui etiamnum dubitat utrùm musculi *per rectangulum explicatio in omnibus natura conveniat*; quare cùm multi *contractionis muscularis modum à fibrarum repletionem*; & nonnulli ab *inanitione*, aliique *ad utrumque confugiunt*, de hujus causis veris *ip si non liquere* ingenuè profitetur.

Et quidem de materia hac abstrusa, etsi me quicquam certiùs quàm alios indagere aut proferre posse minimè confidam: Attamen sicut in mechanicis, cùm Automatis cujuscumque motus observare, ipsamque machinam in partes dirimere, & singularum artificium perpendere licebit, de phænomenon ejus causis & modis, si non omnium, saltem præcipuorum eruendis, haud dubitare solemus: Pariter cùm musculi structuram & partes, fibrarum motricium conformationes, dumque in motu sunt gestus, & alterationes oculis intueri ac animadvertere datur; quid est cur de functionis motivae rationibus, aut veris, aut quæ veris proximæ sunt, extricandis desperemus? Quamobrem liceat mihi super hac re conceptus & notiones meas, haud temerè quidem, nec quòd priori nostræ *κοινὴ δὲ δειλὴν*, aut alienam quamvis oppugnare vellem, assumptas hic in medium proferre; quæ si non omnibus satisfaciant, saltem aliquos ad meliora invenienda excitabunt.

Hic verò imprimis repetendum erit, quod superiùs innueram, scil. potentiam, sive virtutem, qua musculus movetur, à *cerebro* proficisci, per *nervos* convchi, ac à *fibris carneis* contractis, proindeque abbreviatis perfici: posterius hoc *αὐτοψία* comprobatur, quinimo, vim motivam, etiam à prioribus istis pendere, ac ita longo ductu transferri ex eo patet, quòd spirituum influxu, in origine suppresso, aut in via intercepto, propterea motus designari exercitium inhibeat: Porro advertimus impetum motivum longè majorem esse in musculo, sive termino, quàm in principio, aut medio: Quippe cerebrum, ac nervi appensi, cùm tenera, & fragili substantia constet, nihil fortiter convellere, aut atrahere possunt: musculus autem vim contractivam valide exerens, fere vectis, aut trochleæ vires adæquare videtur: Quandoquidem igitur *motus localis*, sit *actio composita*, à pluribus organis, quæ in diversis locis consistent peragenda, cumque *virtus ejus longè robustior sit in fine, quàm in principio, aut*

via;

via; inquirendum erit qua ratione velut mechanica, impetus motivus ita in progressu augeri, seu multiplicari possit, dein quid à singulis organis, ad motum conferatur.

Quoad prius, in Artificialibus, cum ad motum facilitandum, atque vires motrices augendas, plurima excogitata sint instrumenta, cuncta, illorum, aut saltem præcipua, ad duo hæc capita reduci possunt, sc. *primò*, aut eadem vis, sive impressio, sine cujusvis novi impetus additione, ab uno termino ad alterum, sive à primo motore, ad mobile continuatur; quæ tamen in via plurimum augetur, prout *gravitatis centra* aut *elogantur*, aut *multiplicantur*; etenim quò longius à primo gravitatis centro motus incipitur, eò fortius procedit, uti cernitur in vecte, aliisque ad vectem reducibilibus: Dein si ultra primum gravitatis centrum alia successivè ante motus terminum disponuntur, sicut in *peritrochio*, eadem vis motiva plurimum augeri solet: Attamen ad hoc requiritur, ut motus instrumenta, toto ipsorum tractu, satis robusta, ac tenacia fuerint; nam secus impetus motivus adauctus eadem dirumpens intercidit, priusquam actio designata perficitur. *Secundò*, subest alter impetus motivi in immensum, etiam ad magnam distantiam multiplicandi modus, qui cum virium novarum, sive copiarum recentium additione peragitur: Nempe cum particula elastica, sive impetum facientes, in privatis locis, ac velut cellulis dispositæ, & conclusæ, postea pro data occasione, per levem agentis remoti contactum, aut afflatum, in libertatem motus, quem impigrè perficiunt, mittuntur: Hac ratione aer compactus, & conclusus, cum dato exitu foras se proripit, glandem plumbeam, aliudve objectum impetuose adigens, longè propellit: Satis notum est quàm ingentes & sæpe horrendos impetus pulvis pyrius circa finem explosus edit, cum in primo succendiculo, vis per funem igniarium transmissa, admodum imbellis, levi manus pressione restingui poterat: Sunt & alia varii generis corpuscula explosiva, quæ in thecis idoneis recondita, cum à fomite, vel irritamento in motum suscitantur, vim sæpe incredibilem exerunt. Proinde hic demum inquiremus oportet, utro ex his modis evenit, vim motivam in musculis tam longè excedere impetum à cerebro per nervos transmissum; sive utrùm motus muscularis sit actio contractiva, an potius elastica, aut quadantenus *explosiva*?

Super his imprimis manifestò liquet, *musculos attrahere*, sc. abbreviatos, tendinem cum parte appensa versus se ducere; porro in quantum opus est, tractionis munera nunc fortius, interdum debilius, ab ipsis perfici; gravitatis centra, modò proprius, modò longius à principio motus habere consita; hinc muscoli qui femur extendunt, aut flectunt, præsertim psoæ, ac glutæi, fibras carneas motrices altius intra corporis truncum recondunt: Qui verò circumagunt femur, juxta ossis Tibiæ aut foramen, aut tuberculum, aut alicubi in vicinia constituuntur; pariter observare est, in cæteris quibusque membris muscoli ventrem, ab articulo, seu motus cardine, pro ratione motus fortioris aut debioris obeundi, situm remotiorem, aut propinquiorem obtinere: At verò hoc mi-

nimè tenet, quoad reliquas partes motrices, nempe *cerebrum*, & *nervos*, quæ cum *musculis* in actu motivo cooperantur: Quippe licet vis motiva longo ductu per cuncta hæc organa feratur; tamen impossibile videtur, *contractionem* ita fortiter à *musculo* peractam, à *cerebro* tenero, ac immobili inchoari, pèrque *nervos* exiles, & fragiles continuari; quin necessariò supponendum erit, particulas quasdam motivas in *musculo* recondi, quæ pro data occasione, juxta instinctum à *cerebro* per *nervos* traditum, velut *explosione* quadam in motum concitantur: Quales verò illæ particulae fuerint, quo ritu in motum instigantur, & quomodo musculi contractionem inducant, explicatu difficillimum videtur.

Profectò in *musculis*, particulas elasticas, & se movere aptas contineri, ac ubique intra fibras recondi, ab effectu concludere licebit: quia sc. viventium Anatome, non rarò motum in musculo separato, quinimò in fibris ejus ab invicem divisis detegit: Animalium quorundam corda avulsa diu pullant, musculi interdum abscissi contractionum motus obtinent: In jumentis mactatis aut moribundis, corde, ac cerebro licet exemptis, *panniculus carnosus* plurimas contractionum & relaxationum vires aliquandiu peragit. Ex his manifestò liquet, intra musculum particulas quasdam agiles, & *ελαστικές* congeri, quæ licet æconomia animali valde perturbata aut eversa, sua sponte motum ineunt, in statu tamen tranquillo nullas actiones, nisi à cerebro aut cerebello imperatas, & per nervos traditas perficiunt.

Dum musculus contrahitur, vivisectio ostendit *fibras tantum carneas* per se totum inire, scil. tumidiores, asperiores, simulque breviores factas, musculi ventrem ampliare, ac interea *tendines*, ex se quasi immobiles, scil. nec quoad longitudinem, aut crassitiem alteratos, solummodò quatenus à fibris carneis convelluntur, moveri, partemque movendam secum adducere; unde constare videtur, spiritus animales, sive particulas elasticas, qualescunque fuerint, dum motum muscularem perficiunt, intra fibras carneas solummodò aut potissimum agitari: Porro hinc quispiam fortè putarit, tales particulas in fibris tendinosas aut non omnino contineri, aut prorsus otiari; nam siquidem advertimus *tendinem* in actu motivo non immutari, suspicari fas sit, eum instar *unci* tantum habere, quo mediante, fibræ carneæ contractæ, membrum movendum ab ipsis diffitum versus se ducant.

Verùm enimverò, spiritus animales, sive particulas elasticas, intra *fibras tendinosas*, & quidem longè uberius, quàm intra *carneas* hospitari, indiciis satis luculentis constat; hoc imprimis sensus, nimirum tactus, qui multò acutior, & longè præstantior est, in *tendine* quàm in *carne*, manifestò indicat. Quinimò irritatio quævis, aut solutio continui in ista parte contingens, non modò sensum molestissimum, scil. dolorem valde atrocem infert, verùm insuper in carnibus vicinis tumorem, & non rarò convulsiones gravissimas excitare solet; unde necessariò concludimus, spiritus animales copiâ ingenti fibras tendinosas incolere; quid verò illic agunt, & quo ritu functioni motivæ inserviunt, jam proximè disquiramus.

Quoties muscoli viventis motum intuitus, quo ritu fibræ omnes carneæ vicissim contrahuntur, ac relaxantur, adverterem, ac mente perenderem, nihil hinc colligere aliud, aut animo concipere potui, quàm in singulis contractionibus spiritus, sive particulas quasdam elasticas, ab utroque tendines in fibras carneas irruere, easque intumescere, ac in se propius adigere; dein iisdem mox particulis è carne in tendines recedentibus, muscoli relaxationem contingere: In musculo nudato, cum modò fibræ carneam singularem, modò istarum manipulum toto ductu ab aliis separatim, microscopio adhibito, & tumorem utrinque à carnis finibus inceptum, velut à spiritu hic illic simul ingresso, versus medium deferri, apertissimè deprehendi; porro (quod superius innui) fibra singularis circa medium ligata, adhuc quasi libera, & cum aliis compacta, contrahebatur; sed ligatura pariter fini alterutri injecta, supra locum constrictum flacciditas constanter accidebat. Verùm super hac re ne ampliùs dubitare possem, circa eundem fibrarum carnearum fasciculum, ligaturas binas à medio, & extremis æquidistantes adhibui; quo factò, utrinque ab extremo carneo ad loca constricta contractio, & intumescencia statim assurgens, non ultra pergebat; parte interim intermedia immota prorsus & flaccida manente; unde concludere liceat, in omni contractione musculari, spiritus animales, sive particulas è fibris tendineis in carneas proflire, & vicissim in relaxatione, ab his in illas recedere.

Attamen, hoc licet probato atque concessò, plurimæ adhuc circa motum muscularem difficultates restant: primò enim inquirendum quomodo spiritus animales qui tacitè, ac sine ulla incitatione, aut tumore fibras tendineas subeunt, carneas adeò inflare simulque in spatia breviora impellere queant.

Ad hunc effectum producendum, spirituum è fibris tendineis infilientium copiarum non videntur per se solæ sufficere; verùm insuper alijsmodi particulas quasdam fibrarum carneis insitas supponere debemus, quibus cum alteræ è tendinibus affluxu occurrentes, illicò luctantur, unde mutua ipsarum rarefactio, & turgescencia, corporum autem continentium subita inflatio, simul & abbreviatio oritur; haud prorsus dissimili ratione, ac cum ignis corpuscula corrigiam subeuntia, ejusque insitas particulas (quibus mox irretiuntur) variè huc illuc impellentia, ipsam adeò infarciunt & corrugari faciunt; pariter etiam spiritus animales, etsi tendines, ubi solitarij sunt, immotos (sicut caloris effluvia intra metalla, & corpora sicciora) pertranseunt; in carnes verò delati, quatenus ibidem cum particulis alijsmodi elasticis congressæ expanduntur, fibrarum continentium subitas inflationes, & corrugationes inferunt. Tales autem particulas, spirituum indole prorsus diversas, atque heterogeneas, satis copiosè ac facilè musculis suggeri posse, alibi ostendimus: Enim verò *αυτοψία* patet, sanguinem fibras omnes carneas ubique perluere, & exterius irrigare, quas insuper, siquidem non modò nutrire, sed & circa functionis animalis munera actuare deprehenditur; ecquid minùs suspicari possumus, quàm eum in illarum tubos, liquorem quen-

dam subtilem instillare, cujus particulæ à spiritibus subinde influis agitæ, & simul rarefactæ, fibras (sicut modò innuimus) infarciunt, easque propter insultum utrinque factum intumefactas, in spatia breviora compellunt?

Quòd autem *musculi* venter carneus, dum contrahitur, *intumescat*, non est ut quispiam omnino dubitet, quoniam in vivisectionibus hoc visu, & tactu evidentissimè percipitur; scil. fibræ omnes carneæ simul corrugatæ, tumidiore, & asperiores fiunt, proindeque muscolum brevior, sed & crassior, latiorinque reddunt. In certiorum hujus fide, cum è fibris carneis, à reliquarum nixu separatis, quasdam ligarem, aliasque iis proximas solutas relinquerem, in omni musculi contractione, inter illas flaccidas, atque has intumefactas, notabilis differentia apparebat.

Sin verò inquiratur cujus naturæ, scil. an *spirituo-salina* (prout opinari fas sit) aut cujusnam alterius indolis sint *spiritus animales* à cerebro in musculos derivati, & dein utrùm latex alter iis immediatius à sanguine suggestus, *sulphureus*, aut *nitrosus* existat? Super his, quia sensui non constat, nihil temerè aut positivè pronunciamus: Quandoquidem autem in aliis naturalibus, particulæ activæ varii generis, quæ inter se dissimiles, aut mutuò effervescent, aut ab invicem elidi, aut alias rarefieri, aut expandi aptæ sunt, reperiuntur; cumque solummodò à talium congressibus, *motus* corporum *intestini*, ac præsertim *elastici*, quales sunt musculorum contractiones, procedere possunt; certè præsumere liceat, has omnino à tali causa pendere.

Circa *motum* igitur *muscularem* in genere, conjectura satis probabili ad hunc modum concludimus, scil. spiritus Animales ab *ἐγκεφάλῳ* nervorum ductu ad unumquemque muscolum advectos, ac (uti verisimile est) à fibrillis membranaceis exceptos, harum com meatu in fibras tendineas deferri, ibidemque velut in promptuariis idoneis ubertim recondi; qui spiritus, cum naturæ agillimæ, ac elasticæ fuerint, quousque valent, ac permittuntur, sese expandentes, *fibras carneas* insiliunt; dein impetu peracto, mox subsidentes, in *tendines* relabuntur, ac ita vicissim: Dum verò iidem spiritus animales ad datum motus obeundi instinctum, è *fibris tendineis* in *carneas* profiliunt, illic particulis aliis indolis activis è sanguine suppeditatis occurrunt, statim mutuò effervescent, ita ut ex ambarum lucta, agitatione, fibræ carneæ, utpote laxæ & porosæ, infarciantur & in corrugationes agantur, à quibus omnibus utrinque simul corrugatis, totius *musculi contractio* procedit; contractione finita, spiritus sinceri qui residet, iterum maxima ex parte in *fibras tendinosas* recedunt, particulis alteris intra *carnes* relictis; harum impendia sanguis, sicut illorum *nervi* refarciunt: Quo *instinctu* contractio muscularis incipit, ac desinit, mox disquiretur.

Ut spiritus animales è *fibris tendinosas* effluentes, *carneas* omnes æqualiter subeant, in omni simplici musculo *bini* habentur *tendines*, qui juxta oppositos angulos ita constituuntur, ut spiritus à duplici meta accurrentes, e vestigiò totum musculi ventrem impleant, atque motu subinde per-

acto.

acto, mox citissimè recedant: Si contractio versus medias *carnes* indifferenter peragi debet, *tendines* ut plurimum sunt æquales; sin motus versus unam aliquam *carnis* regionem magis inclinatur, *tendo* alter (qui scil. majores spirituum copias suppeditat) alterum magnitudine excedit: Si musculus quo sit robustior, magnus & mole ampla præditus existat, in plures quasi lobos, sive ventres dividitur, iisque singulis duo ordinantur tendines; in eum nempe finem, ut spiritus animales ubique per ductus brevissimos, è *tendinibus* in *fibras carneas* ferantur, resiliantque? Quippe musculus compositus non semper plures fibrarum motricium series idèò continet, ut motus unà plures & diversimodos, quin ut eundem sæpe motum cum majori robore perficiat: Nam, prout suprà innuimus, cùm *simplex musculus* sit quasi *veclis singularis*, *compositus* videtur, quasi plures vectes eidem corpori movendo conjunctim intervenientes.

Porrò hinc observare est in quibusdam musculis, qui simplices & regulares habentur, uti *fibra* omnes *carnea* sunt æquales, ita & *tendinosas* unius extremi omnes simul sumptas, etiam omnibus alterius simul sumptis æquales esse; attamen eas singulas quo breviores sunt in uno tendine, esse longiores in altero, atque ita disponi, ut *fibra tendinosa* utrinque summa, & infima quoad longitudines suas, excessus rationes habeant inversas, simulque æquales; nempe ut hic longissima brevissimæ, atque illic vice versa, brevissima longissimæ superimponatur; in eum sc. finem, ut sicubi in hoc aut isto musculi latere, aut sine motus robustior edi debeat, in eas partes è longioribus fibris tendinosis spiritus uberiores confluant, & è contrà: Quare in nonnullis musculis minùs necessariis, ubi *carnium* pars ossi accrescens, aut immobilis evadit, aut vacuis tantùm spatiis implendis inservit, *tendo* unus brevior aut minor existit, & non raro in duritiem cartilagineam, aut osseam degenerat: Porrò quoad alios musculos robustos, & maximè motivos, observare est illorum tendines non ita disponi, quasi essent fibrarum carnearum stabilimenta tantùm, aut anfulæ, uncive appensi; ita namque solummodò in externis finibus constituerentur: Attamen *fibræ tendinosæ*, quo fiant aptiora spirituum Animalium promptuaria, ferè in omnes musculi partes exporrectæ, utroque carnearum fines ubique excipiunt; quod equidem in musculis compositis adhuc manifestiùs apparet, in quantum scil. *unus tendo compositus*, *extremas amplectitur carnes*, atque *alter medias ingreditur carnes*, prout suprà ostensum erat.

At verò spiritus animales, dum è *fibris tendinosis* in *carneas* profiliunt, ipsis corrugandis per se haud sufficere, sed copulam alteram è sanguine elasticam requirere, multis rationibus arguere licebit. Hoc imprimis ex eo constare videtur, quòd iidem spiritus solitarii intra *tendines*, densissimè licet confiti, dum in iis moventur, nihil aut tumoris, aut contractionis cient; quare intra *fibras carneas* in minori copia delati, & spatium amplius nacti, nisi aliis particulis congressi expanderentur, multò minùs impetum contractivum ederent: Porrò cùm *tendini* solutio continui, aut molestia gravis infertur, musculi venter, seu pars *carnea* *tumore* aut *spasmo* po-

rissimùm afficitur ; nam spiritus irritati non tamen inter se , sed ubi in particulas heterogeneas impinguntur , maximos tumultus , ac inordinationes concitant : Verùm insuper cum fibræ carneæ humore sanguineo supra alias partes , & plus quàm iis nutriendis sufficiat , continuò perfundantur , ecquis alius assignabitur , nisi ut functioni motivæ contribuat ? Præsertim cum advertamus in corporibus macilentis , quæ parciùs enutrientur , musculos sanguine uberiori perfusos , motuum nixus robustissimos edere : Porro non constat quâ præterea viâ , spirituum in musculo continuis motibus aut laboribus arduis absumptorum impendia resarciantur , ni præter exigua per *nervos* supplementa , alia satis copiosa è *massa sanguinea* suppeditentur : His accedit , quòd membra solito cruoris affluxa destituta , in debilitatem , aut paralyfin facillè incidunt , quodque ex observatione D. *Stenonis* in cane vivo , Aortæ trunco descendente ligato , membra omnia posteriora derepente motu privabantur : Et quamvis mihi modum satis constet , utrùm sanguinis à *spinali medulla* , an ab ipsis *musculis* , vel simul ab utrisque exclusio , in causa sit ; verùm utcunque in idem ferè recidit , quatenus nimirum spiritus animales intra *ἐγκεφάλον* procreati , atque per appendices medullarem ac nervosum in membra quæque exporrecti , absque sanguinis concursu potentiam loco motivam exequi potuerint.

Explicato hæcenus quo ritu *musculus* in parte carnea quoad fibras simul omnes contractus , functionem motivam exequitur ; jam proximè quæ sit ratio *instinctus* , quo motus omnis tum regularis , tum irregularis obiri solet , inquirendum erit : Super hoc in genere imprimis constat , motus omnis regularis , immò & quorundam irregularium impulsus , intra *cerebrum* aut *cerebellum* conceptos , illinc per *nervos* ad unumquemque *musculum* transmitti : Hoc ab effectis , & consequentiis , prout alibi ostendimus , evidentissimè declaratur. Attamen magnæ hic difficultates subsunt , quomodo nimirum per eosdem ductus , à capite ad unumquemque *musculum* spirituum animalium *copia recentes* , simulque pro veteribus exercendis , *anima imperia* convehuntur ; quo insuper discrimine , & spirituum influorum gestu diversimodo utrumque hoc munus *nervi* exequuntur.

Super his ut conjectare pergam , videtur quòd spiritus animales , qui jugiter ab *ἐγκεφάλῳ* afflui , pro reficiendis *insitorum* copiis , per *nervos* ad *musculum* feruntur , eum facillè & pacatim adpellunt , ibidemque protinus à *fibris membranaceis* excepti , in *tendines* secedunt : Cujusmodi vectigal , etsi mole perexiguum fuerit , quia tamen ritu constanti dies , noctesque infertur , ad penum pro *tendinibus* continuò implendis sufficientem facillè assurgat : Quod autem spiritus , ita perpetim musculo allatos , *fibras membranaceas* , & non per *carneas* , ad tendines transferri supponimus ; ratio est , quoniam si has primò subirent , copulæ elasticæ statim occurrentes , musculum in motus continuos accirent : Porro siquidem in corde , & respirationis musculis , *fibræ carneæ* exercitio perpetuo agitantur , illæ insuper pro spirituum recentium ad *tendines* commeatu minimè vacarent.

Quod

Quod spectat verò ad *motus muscularis*, sive *obeundi*, *sistendi*, aut quovis modo *alterandi instinctus* per nervos ab *ἐγκεφάλῳ* traditos; super his imprimis considerare oportet, spiritus animales motores, quorum ageries *anima corporea* Hypostasim constituunt, duas hasce proprietates ipsorum naturæ quasi insitas habere; nimirum ut donec vegeti, copiosi, ac liberi fuerint, sese, exerere sive expandere affectent, dein impetu peracto, illi paululum diminuti, se sponte recipiant, & quiescant; postea autem refectioni, denuò exsiliant, ac ita vicissim: Hoc satis manifestò declarant *vigilia*, ac *somni*, operis, ac otii altercationes cunctis animalibus ingentæ. Quapropter ad quorundam musculorum (qui sc. vice perpetua contrahi, & relaxari solent) *impulsus*, sive *instinctus*, vix quidquam amplius requiritur, nisi ut illorum tendines constanti spirituum animalium per nervos influxu suppleantur, ipsi autem spiritus, ex propria indole, siquidem uberes, & expediti, sua sponte in fibras motrices profiliunt, dein nisu peracto, post leve impendium mox recedunt, & subinde statim recreati, rursus expanduntur, ac ita vicissim: Porro illorum actiones (quæ imprimis sunt *pulsus*, & *respiratio*) juxta caloris gradus, aut affectuum immutationes variè immutantur, inquantum spiritus per nervos advecti, modo remissius, modo uberius, aut incitatus à cerebello mittuntur.

Porro in quibuscvis aliis musculis *appetitus* imperio subjectis, cum spiritus animales *expansionum*, & *recessuum* vices naturaliter affectent, tantum opus erit, motus imperati sive obeundi, sive sistendi *signum* dari, quorum utrumque spiritus *influi*, vario ipsorum ad muscolum appulsu, *insitos* in varios aspectus, sive tendencias ordinando, facile perficiunt. Quando musculus contrahitur, *spiritus insiti* ab utroque *fine* versus *medium*; dumque relaxatur, acie mutata, à *medio* versus utrumque *finem* aspiciunt, tenduntque. Dum itaque *spiritus insiti* contractionis obeundæ symbolum ferunt, illi intra nervum *ἀσπῶς* incitati, finem ejus musculo insertum (ubi densius agglomerantur) plenius inflant, & proinde ibidem contrahi, & abbreviari faciunt; quo fit, ut iidem *spiritus insiti* muscolum ingressuri, tunc temporis mero aggestu sistantur, seu potius versus nervum intumefactum revocantur; quapropter mox tota *spirituum insitorum* series (hinc *ποτὴν* ipsorum mutata) etiam eò spectat, proindeque tendinum incolæ, è cellulis suis in fibras carneas profilientes, contractionem motivam efficiunt: Dein motus abruptitur, aut cessat quamprimum spiritus versus nervum prius revocati, denuò in muscolum tendunt, adeoque exercitus facie rursus mutata, insitorum copiarum illicò in tendines coguntur. Rem ita quadantenus habere, non mera *Hypotheses* concinnitate, verum ex *observatione Anatomica* mihi persuasum est: Quippe olim catulum vivum dissecans, cum fortè cervicis musculos quosdam divisos, & sepositos intuerer, eodem instanti quo *fibra carnea*, etiam *nervi* illis inserti, simul contrahi, ac intumefacti abbreviari videbantur.

Ad promovendos, dum musculus contrahitur, spirituum è *fibris carneis* in tendines recessus, *fibrilla membranacea*, quæ ubique *carneas* transversum secant, & densissimè intercussant, conducere videntur: Harum

textura nunquam satis admiranda in musculo fibris amplis prædito, sc. Bovino, ad teneritudinem cocto, melius percipitur: In tali etenim, si *fibras carneas* leniter aperiens, eas in tota serie ab invicem diduces, singulis harum tubis fibrillas, velut capillares, confertissimè superextensas videbis, quæ sc. priores non modò investiant, & connectunt, quin & singulis illarum seriebus superstratæ, & obliquis angulis secantes, ipsæ etiam omnes parallelæ, situ ad carneas opposito, à tendine in tendinem feruntur: Dum itaque musculo contracto, *fibræ carneæ* intumescunt, *fibrillæ* eas amplexantes, ut locum cedant, nonnihil distenduntur, dein quamprimum intumescencia remittit, hæ ad solitam strictionem redeunt, carnes ubique comprimunt, easque spiritibus utrinque expulis, ad pristinam longitudinem reducunt. Huc facit, quod dum musculus contrahitur, spiritus per nervos influi à fibrillis membranaceis desistunt: quare hæ depletæ, & laxiores facilius distendi poterunt; dum verò musculus relaxatur, spiritus fibrillas denuo subeunt, eas implent, & quo melius carnes stringant, breviores reddunt.

Motuum à musculis obeundorum *instinctus*, ita per nervos traditi, aut à *Cerebro*, appetitu jubente, aut conscio, vel à *Cerebello* missi, juxta naturæ leges, nobis plerunque insciis, peraguntur: Verùm insuper, musculi nonnunquam præter, vel contra *appetitus* aut *naturæ* placita in motus anormales, sc. violentos, & *convulsivos* aguntur, idque variis modis, & propter diversas causas accidit. Super his olim fusiùs differentes, ostendimus plures *motuum convulsivorum* species, & differentias ex eo oriri, quòd materies spasmodica, vel alicubi *defixa*, circa nervorum *principia*, *medietates*, aut *fines* subsisteret; vel quòd eadem *vaga* & *soluta*, per totos nervorum ductus, huc illuc discurreret, adeoque affectiones spasmodicas è loco in locum variè transferret. Verùm præter istas diversimodas *convulsionum* species, quæ propter vitium ipsis *nervis* alicubi inhærens excitantur, *myologia* hæc nostra quosdam alius generis spasmos, à *musculis* præcipuè affectis oriundos detegit.

Enimverò advertere licet spiritus animales, intra ipsos *musculos* dispositos, propter labem aut à *cerebro*, aut à *sanguine*, & forsan non rarò sumus ab utrisque derivatam, particulis quibusdam heterogeneis infici, propter quas in oculis suis subsidere, & requiescere nequeunt, quin irrequieti semper, & agitabundi, è *fibris tendinosi* in *carneas* sua sponte profiliunt, proindèque spasmos crebros, & non rarò immanes producant: Hoc autem duplici modo fieri observamus, sc. *primò*, in quantum spiritus copula elastica onusti, intra tendines haud diu maneat, quin subinde in fibras carneas profilientes musculi spasmos frequentes, sed & breves, seu quasi subsultus inducunt: vel *secundò*, quod spiritus animales, etiamsi intra tendines satis placidè interdum quiescunt, ex ipsis tamen in carnes inordinatè correpti, ibidemque immanius explosi, haud statim reprimi, in ordinem cogi, aut in tendines reduci possunt; quin nobis utut invitis diu expansi persistunt, proindèque musculi contractionem diuturnam, & valde dolorificam pariunt. Cujusmodi *spasmus* satis vulgo notus, nostro idiomate (*Cramp*) appellari solet.

Prior affectio, *subfultus spasmodicus* dicta, tum in febribus malignis, tum in *scorbuto* familiaris existit. Quoad istas, passim advertimus, quando crisis aut nulla, aut mala obtigerit, demùm à sanguine, & succo nervoso plurimùm vitiatis, particulas heterogenas non tantùm in visceribus (quorum crases, & functiones pervertunt) sed ubique fere in musculis deponi; ibidemque spiritibus accrescentes, eos velut œstro quodam afficere, proinde ut simul pacatè consistere, aut intra tendines requiescere nequeant, quin divisi, & ab invicem distracti, manipulatim subinde in carnes profiliant, ibidemque spasmos minores, sed & creberrimos cieant: Pariter ob spiritus musculorum incolas, *copula elastica* ipsis ibidem accrescente onustos, nonnulli *scorbuto* inveterato laborantes membra in eodem situ haud diu continere valent, quin necesse habent manus, aut pedes modò extendere, modò huc illuc agitare, variè transferre, ac interdum illorum œstra cursu, saltu, aliisve duris laboribus subigere.

Olim de motibus convulsivis ex professo agentes, *spasmi permanentis*, sive *Tetani* Aetiologiam fere in totum omisimus, utpotè quæ à musculorum doctrina postea tradenda penderet: Tunc ferè tantum innuimus, ejusmodi contractionem exoriri in uno musculo, quoniam alter Antagonista ejus resolvitur; quod equidem in facie, & quibusdam membris sæpenuerò accidit, in quibus dum partes unius lateris *Paralysi* afficiuntur, oppositæ alterius, velut frænis solutæ, nimis contrahuntur. Attamen hujusmodi spasmus ut plurimum sine dolore est: porrò hic non statim aut facilè, sicuti nec etiam *paralysis*, quæ illius causa est, pertransit, vel curatur.

Quod itaque ad spasmi (apud nostrates *Cramp* dicti) rationem formalem pertinet, unusquisque hoc affectu laborans, in seipso *musculum* unum aut plures involuntariè, ac validissime contrahi, eosque aliquandiu ita summè distentos & quasi rigidos manere persentit; ac interea, in quantum *fibra carnea* immanius contractæ, *tendinem* utrumque, eum sc. qui parti immotæ forsan haud minus, quàm alterum qui parti movendæ affigitur, violenter convellunt, dolorem molestissimum inferri. Quandoquidem autem hic spasmus, propter spiritus animales sese in *fibras carneas* impetuosè proripientes, excitatus minimè cessat, donec iidem spiritus in *tendines* regressi, *carnes* relaxari sanant; idcirco proxime ejus causæ erunt, spirituum animalium intra *fibras carneas* major impetuositas, quâ illuc injussi profiliunt, tum diuturnior mora, in quantum tardius, ac difficilior in *tendines* recedunt. Pro causis secundariis, tum mala spirituum animalium dispositio, tum prava *tendinum* conformatio, sc. modò hæc, modò ista, non rarò simul haberi debent.

Quoad prius, hic affectus, prout cæteri spasmodici, exoriri videtur, in quantum spiritus animales particulis heterogeneis, sive *copula elastica* onusti, demùm irritati, ad ipsam elidendam incitantur; quæ tamen si quidem crassa, & viscosa, proindeque tenacior fuerit, non cito, nec facile discutitur, quin spiritus eadem usque irretiti, atque intra *fibras carneas* conclusi, diutius in expansione detinentur: Quod quidem non ab simili ritu forsan contingat, ac cum aqua & aër conjuncta bullam

constituunt; quæ si ab aqua in qua aliquantulum saponis dissolutum sit, excitetur, tenacior illa, multo amplior, & permanentior evadit, quàm quæ ex meris aquis producitur. Proinde observamus eos qui humoribus crassis, & tartareis abundant, hujusmodi spasms maximè obnoxios fieri; ipsosque insuper à potu aut cibis crassioribus, post crapulam, ac imprimis si lautiori cœnæ mox superdormiunt, atrociores istius morbi insultus pati; verùm aliquando & ipsi *tendines* in culpa esse reperiuntur, quatenus *constricti* nimis aut obstructi, spiritus à fibris carneis redituros non facile admittunt. *Tendinum obstructio* in causa est quòd *Arthritici* & *Scorbutici* quorum nempe tendines, humores salsi, & tartarei facillè incurrunt, & obstruunt, hujusmodi spasms dolorificis immaniùs tentari soleant: *Constrictionem* autem *Tendinum* quandoque hunc morbum parere, ex eo patet, quod fœminæ quædam gravidæ, (uti sæpius advertimus) ultimis gestationis mensibus, propter Abdominis musculos nimis extensos, cerebri spasms tantummodò in ventre excitatis, molestari soleant. Ad *pathologiam* hanc illustrandam libet hic casum sequentem adjicere.

Fœmina Illustris, juvenis, ac venusta, olim *affectibus hystericis*, & jam supra biennium, *convulsivis*, & quodammodò *epilepticis* obnoxia, nuper ob crebriores, atrocioresque morbi insultus, etiam cachectica & paralytica evasit, ut tandem Abdomen Ascite, & crura tumore œdematoso afficerentur, & denique partes omnes inferiores infra coxendicam motu privarentur; hinc quoties paroxysmi convulsivi infestant, non jam corpus aut membra efferre, & huc illuc agitare solet, sed partes modò hæ, modò istæ Tetano correptæ, variæ flectuntur aut intorquentur, interim ut ipsa in cathedra aut lecto insidens, rigida ac ferè immobilis perstet. Haud pridem est, quòd paroxysmi unius Typum integrum videns, diversimodas spasmodum subinde alteratorum vices, & mutationes, non sine summa admiratione observarim. A primo insultu, oculis paululum huc illuc celeriter obvolutis, statim *ἀνακλινόμενα* corripiebatur; deinde mox *capite* versus partem aliquam inclinato, & contracto, simul *brachii*, & *cruris*, modò lateris unius, modò utriusque, artus omnes *inflexi*, aut *extenti*, statim rigidi fiebant: Post 4. aut 5. forsan horæ minuta, his spasms tum in *capite*, tum in *membris* remittentibus, e vestigiò alii plerunque oppositi succedebant; quibus pari sæpe spatio finitis, alii longe diversi oriebantur, adeoque per duas vel tres horas, *spasmi longiores*, cujusque ferè generis, & moris, in toto corpore excitati, se vicissim excipiebant, adeo ut *capite* ad dextram, & lævam, atque *ἐν ὀρθῷ* & *ὀπίσθεν* per vices convulso, quin & *membris* omnibus, huc illuc introrsum *deflexis* aut extrorsum *distentis*, unius paroxysmi cursus gestus quoscumque spasmodicos exhibuerit. Si quando spasmi unius generis in *capite*, & *membris* solito diutiùs durabant, ministrorum astantium mos erat, Nicotianæ fumum, magno cum impetu, Egrotantis Dominæ naribus insufflare; quo facto, cum spiritus intrò revocarentur, spasmi præsentis illico remittebant, aliis quibusdam novi generis e vestigiò succedentibus. Nuper hujus crura à resolutione ita debilitantur, ut stare,

ac incedere nequeat, quin & tendines sub utroque poplite tumidiore brevioresque facti, adeò contrahuntur, ut crura in rectum non possint extendi.

Circa hunc *Nobilissima Egrotantis Casum* inquiri potest, quamobrem paroxysmo convulsivo ingruente, nullæ, uti in plerisque *spasmodicis* aut *epilepticis* assolet, *corporis*, aut membrorum *jactationes*, sed *spasmi* tantum permanentes, à partibus aliis ad alias variè translati oriebantur? Pro cuius solutione referri debet, materiem *spasmodicam* non tantum in *cerebro*, & *nervis*, verum in ipsis etiam *musculis* congeri, atque spiritibus *tendinum* incolis accrescere: Cùmque materia tenax, spiritus autem debiles fuerint, & tali copulæ citò, aut facilè elidendæ impares, idcirco hi quoties irritati è tendinibus in carnes profiliunt, musculis primò occupatis contractiones fortes, & diuturnas inferunt; *musculis* interim aliis, præsertim antagonistis à motu impeditis & obstrictis, donec priorum *spasmi* remittuntur. Hinc membra utut convulsa, loco moveri nequeunt. Quippe totius corporis, & membrorum quorumvis *opera* sive lationes non nisi multorum musculorum auxilio aut obsequio perficiuntur, dum ipsorum alii aliis aut ritè cooperantur, aut saltem obsequuntur; ita nimirum ut muscoli quidam respectivi debitam *συμπράξιν* observantes, simul contrahantur, dein illis relaxatis, contractio mox aliorum succedat. Sin verò qui dispares & *ἀσύμβολοι* fuerint, simul contrahantur, illique fortiter convulsi ita diu persistent, proinde ut alii interim muscoli contrahi nequeant, necesse erit membra huc illuc deflexa, aut extenta, secundum se tota rigida manere. Quòd autem *spasmi* præsentès à *Nicotianæ* fumo naribus insufflato semper remitterent, ratio est, quia animæ corporeæ regione, sive parte aliqua vehementius affecta, si fortè passio nova æquè violenta parti alteri inferatur, prior statim aboletur, aut cessat: Enimverò constanti observatione apparet, ubicunque major, aut recentior molestia est, illuc majores spirituum copias illicò se proripere, & tumultum facere: Quocirca in *cerebro*, aut ejus *meningibus*, nova aliqua irritatione concitata, inter *musculos* alia quæcunque exterius incepta protinus evanescit aut obscuratur; dein quamprimùm recentior illa pertransiit, denuò statim exterius, sed in aliis partibus, ubi plures materiæ *spasmodicæ* nondum absumptæ aggeries prostant, convulsionés oriuntur. Quòd autem *spasmi* diuturni, aut ob *spiritus* copula tenaciori onustos, aut propter *tendines* materia viscosa vel Tartarea obstructos, aut simul ob utrumque oriuntur, hinc constat, quoniam hoc morbo ingravescente (prout in *Dominæ* hujus *Illustrissima* casu, & passim in multis aliis contingere advertimus) tendines à materia morbifica uberius aggesta ita demùm infarciuntur, ut breviores, ac rigidi evadant, proindeque spiritibus pro functionis motivæ actibus constanter obeundis, vix ac ne vix spatia concedant.

Hæc de motu musculari, tum naturali, tum convulsivo, quorum utriusque rationes, summa qua licuit diligentia eruas, experimentis Anatomicis comprobavimus; si quis verò objiciat, ex eo minus firmas esse, quoniam in vivisectionibus advertimus, *cor* & *respirationis musculos*, at-

quæ *panniculum carnosum* aliquandiu , postquam *nervi* , & *arteria* resecantur , contractionum , & relaxationum vices continuare ; unde contra hypothese[m] nostram arguitur , illorum motus non à constant[i] sanguinis & spirituum animalium influxu pendere. Huic obvium est referre , quòd in moribundis ita interdum contingat , quia anima tunc distracta , & dissolutioni appropinquante , spiritus simul omnes insiti ab influorum commerciis præcisi , sese sponte exserunt , & solitos (quousque valent) motus suos perficiunt , quibus aliquanto spatio perennandis , non opus est recentium copiarum subsidiis , quia *veterani* , donec penitus atterantur , pensa assueta obeunt ; quin & vetus copula sanguinea , donec tota absumatur , illorum amplexus constanti vice excipit , & dimittit : Hoc verò in aliis musculis appetitus imperio subiectis , & pro data occasione tantum exerceri solitis , rariùs succedit .

Porro cùm motuum obeundorum *instinctus* ab ἐκπεράτω ad muscolum omnino per *nervos* deferri statuimus , cūque ejusdem nervi singularis truncus , sæpe in plures surculos diremptus , eos variè distribuens , ad plures musculos destinatos mittit , jure ambigitur quomodo spiritus animales , motus obeundi symbolum vehentes , cum delectu quodam hos , aut illos tantum surculos , seorsim ab aliis ejusdem ramis actuent , & non indifferenter omnes ejusdem propagines subeant ; nempe , ut sanguis arteriæ truncum , ejusque ramificationes ex æquo singulas pervadit. Doctissimus Regius , ut hanc nodum solveret , supponit in *nervis valvulas* quasdam , persimiles iis , quæ in organis musicis reperiuntur , quarum apertura spiritus ad partes has aut illas speciatim admittat , cæteris occlusis : Attamen ostendere debuisset , si non ipsas valvulas , saltem quo instinctu , & quali directione , modò hæ , modò illæ referantur , aliis obstrictis : Verùm enimverò hic dicendum erit potius quod nervorum surculi omnes , ac minores propagines à partibus quibus inferuntur usque ad origines suas inter se distinctæ & singulares perstant ; ita nimirum ut à cerebro ejusque medullari appendice , ad unumquemque muscolum , partemque nervosam , peculiaris spirituum orbita , sive com-meatus via pateat : revera nervi , licet juxta principia sua truncis majoribus exoriri videntur ; si tamen truncum & ramos istos aperias , facile constabit quòd in illis plures tantum nervuli , capillamentorum instar , melioris conductus gratiâ , in eundem fasciculum colligantur ; quinimo involucris separatis sæpe nervulos quosque singulos ad partes & membra respectiva , quibus destinantur , prosequi licebit .

Interim verò , licet plerique nervi sint spirituum animalium ductus singulares , sive canales inter se distincti ; tamen alii cum aliis per surculos , & propagines invicem emissas variè communicant ; quod quidem ita fieri oportuit , ut cum plures simul nervi æquè ac muscoli ad motum aliquem requiruntur , isti omnes propter commercia inter se mutuò habita , in eadem actione conspirent. Hinc in quibusdam membrorum motibus , uti imprimis in citharæ pulsatione , aliisque actionibus valde complicatis , muscoli plures admiranda celeritate cooperantur ; ita ut , plurimis licet simul occupatis , absque ulla tamen confusione singuli

Fig. I.





Fig. II.



penſa ſua abſolvant : Porro nervos inter ſe mutuò communicare opus erat, propter membrorum, & partium quarundam motus ſympatheticos ; neque enim aliam ob cauſam diaphragmatis nervus ramis brachialibus inoſculatur, quàm ut animalium exercitia, præſertim in curſu, ac volatu, juxta reſpirationis tenorem proportionentur : Hinc item procedit quòd in paſſione quavis, præcordiis conſtrictis, aut dilatatis, vultus & faciei aſpectus, immò manuum & membrorum geſtus patheticè configurantur : Hujusmodi inſtantias in particulari nervorum hiſtoria ſatis multas propoſuimus, ut non opus ſit hic plures adjicere.

Quod ſuperest, ad *Myologiam* noſtram illuſtrandam, *quatuor* hic *figuras*, quæ *musculi ſimplicis*, & *compoſiti* quævis utraſque, ſcil. tum *exteriores*, tum *interiores*, veras & naturales ad vivum repræſentant, addendas curavi.

FIGURA I.

Exhibet musculum ſimplicem regularem, juxta φάσιν naturalem deſcriptum, in cujus ventre fibræ carneæ apertæ ab invicem diducuntur, ut fibrillæ membranacæ melius conſpiciantur.

- A. Tendo dexter.
- B. Tendo oppoſitus ſiniſter.
- C. Venter carneus, cujus omnes fibræ carneæ æquales, & parallele, utrumque Tendinem angulis obliquis, ſed paribus interjacent.
- D. Apertura fibrarum carnearum, quibus diductis, fibrilla membranacæ eas conſitiſſimè decuſſantes, apparent.

FIGURA II.

Exhibet musculum ſimplicem, poſt Tendinem diſciſſum, ejusque portiones divulſas, in medio fiſſum, ut interior fibrarum carnearum ſeries, earumque cum Tendinibus commiſſuræ appareant.

- A. A. Tendo dexter ſuprà collocatus, cujus divulſi utraque portiones aliquatenus apparent.
- B. B. Tendo oppoſitus ſiniſter ſubter conſitus, cujus divulſi utraque portiones, quoad margines ſolum conſpicue, maximâ ex parte ſub carnibus latent.
- C. D. Ventris carnei portiones diviſæ, & ſepoſitæ, quæ priùs (hac illi impoſitæ) cohærebant ; in quibus utriſque fibræ omnes carneæ æquales pariter obliquè ab uno Tendine in alterum procedunt.
- E. Fibrilla quadam membranacæ carneas denſiſſimè decuſſantes repræſentantur.

FIGURA III.

Exhibet musculum quendam minùs compositum, cujus binis ventribus carneis, etiam bini Tendines compositi (quatuor simplicibus æquales) destinantur.

- A. *Tendo exterior compositus utrasque carnes complectens, qui marginibus ferè tantum conspicuis, maxima ex parte sub carnibus latet.*
- B. *Tendo interior compositus medias ingrediens carnes, qui fibras carneas ab utroque Tendinis exterioris latere missas utrinque excipit.*
- C. *Fibrarum carnearum venter primus, cujus fibra omnes æquales, & parallela, Tendinum latera opposita angulis obliquis, & paribus interjacent.*
- D. *Carnium venter secundus, cujus fibra omnes pariter conformata eodem ac ista alterius ventris spectant.*
- E. E. *Tendinis compositi exterioris utraque extremitas.*
- F. *Tendinis compositi interioris extremitas, pariter ac altera opposita, à musculi fine aequè distans.*

FIGURA IV.

Exhibet musculum regularem compositum, in medio divisum, & apertum, ita ut utriusque ventris facies interior appareat.

- A. *Tendo compositus exterior quadripartitò fissus.*
- B. B. *Lateris unius Tendinei divisi portiones ab invicem semotæ.*
- C. *Lateris alterius Tendines pariter divisi portiones juxta posita, quæ maxima ex parte sub carnibus latent.*
- D. D. *Ventris unius carnes divisa, & procul ab invicem seposita.*
- E. E. *Ventris alterius carnes etiam divisa, & juxta posita.*
- F. *Tendo compositus interior medias carnes ingrediens.*
- G. G. *Ejusdem Tendinis divisi portiones ab invicem cum portionibus ventrium quos excipiunt, seposita.*

Fig. III






Fig. IV.





INDEX

ALPHABETICUS

Rerum Notabilium.

A



ACETVM, & ejus conficiendi ratio, & fermentationis methodus. p. 30

Acetosi liquores ad condienda esculentia. ibid. & seq.

in Aceto quandoque vermes generantur, & quare. p. 33

ex Aceto quomodo liquor ardens exstillari possit. p. 26

Aciditas unde inducatur. p. 34

Aciditas omnis à principii salini fluore, id est sale sui juris facto, & supra alias particulas elementares evector, & ab iis separato provenit. p. 657

Aër austrius insignem fermentationis motum plerisque rebus imprimit. p. 22

Aër insalubris qua ratione scorbutum parit. p. 574

Amuleta adversus pestilentiam. p. 152

Anima sensitivæ hypostasis consistit in spirituum animalium diatxi. p. 342

Anima corporea sanguini inhæret; haud tamen huic adæquata, & limitata est. p. 692

Animæ corporeæ facultates duæ primariæ, & earum potentia interior & exteriores. p. 673

Anthrax quid, & ejus generatio. p. 149

Aqua idoneum spiritus & sulphuris vehiculum. p. 7

Aqua è re qualibet destillatione facillimè prolicitur. p. 8

Aquæ interjectio in liquidis spatiola inania à cæteris principiis relictareplet. ibid.

Aqua & ignis duo magna solventia. p. 37

Aquæ acumina ad dissolvenda corpora. ibid.

Aquæ insigni dissolvendi corpora facultate præditæ. p. 38

Aquæ vestium lotionibus inutiles. ibid.

Aquæ menstruum spirituosum. ibid.

Aqua stygia, sales fixi, & eorum effectus. p. 53

Aquæ distillatæ scorbuto laboranti utiles. p. 606

Arteriarum in variis animalibus cranium pertranseuntium discrimina traduntur. p. 284. & seqq.

Arteria vertebralis. p. 287

Arteriæ carotidis ascensum & situm intra cranium humanum, priusquam versùs cerebrum efferatur, figura prima exhibet. p. 287. & seq.

Arteriæ carotidis ascensus & situs intra cranium equinum. p. 288

Arteriæ vertebralis ramificationes, utrinque in superiorem medullæ spinæ partem, inque posteriorem medullæ

Index Alphabeticus,

medullæ oblongatæ regionem ex-
porrectæ recensentur. p. 413. & seq.

Arteria spinalis quæ intra specum
osseam, juxta interiorem medullæ
superficiem, ab occipite ad os sa-
crum, ad formam institutæ reticula-
ris producitur. p. 414

Arteria & vena cujusque muscoli
medio insertæ, sulculos quaque-
versus fibras motrices obliquè se-
cantes emittunt. p. 677

Arthritis scorbutica, ut plurimum va-
ga, à duplici seminio pendere vide-
tur. p. 593

Arthritis vaga scorbutica quo expe-
rimento dignoscatur, & quibus re-
mediis curetur. p. 627

Asthma convulsivum quid sit, & un-
de procedat. p. 562. 563

Asthmatis convulsivi observationes
variæ cum ætiologiis. ibid.

Asthma interdum propter bronchia
spasmodicè affecta excitatur. p. 564

Asthmatis periodici observationes
anatomicæ. ibid. & seq.

Asthmatis convulsivi curatio. p. 565

Atrophia febris cuidam epidemicæ su-
pervenientis ratio disquiritur. pa-
gina 501

Atrophia scorbutica familiaris à qui-
bus causis procedat. p. 593

Atrophia scorbutica familiaris à qui-
bus causis producat, & quibus
remediis curetur. p. 618

Atrophia scorbutica febrem errati-
cam adjunctam habens cum sudo-
ribus nocturnis, quomodo cu-
randa. p. 619

Aurum fulminans quid sit, quomodo
& quare ab igne incalescens cum
tanto strepitu & impetu edatur.
p. 60

B

Boreas catarrhis producendis aptis-
simus. p. 202

Bubo pestilens quid sit, & in quibus
partibus potissimum appareat. pa-
gina 150

Buryi conficiendi methodus à rusti-
cis usitata. p. 55

C

Calor quomodo tactu percipiatur.
p. 45

Caloris nobilissimus usus in destilla-
tionibus habetur. p. 46

Calor vehemens, & in gradu valde
intenso in quibusdam subjectis si-
ne igne actualiter accenso produ-
citur. p. 51

Calculi in vesica potius à coagulatio-
ne, quàm ex calefactione, vel ex-
siccatione proveniunt. p. 235

Calefactio quibus modis tum in liqui-
dis, tum in crassioribus & solidis
inducatur. p. 662

Calvaria sepositæ partes & contenta
quædam explicantur. pag. 267.
& seqq.

Calvaria vitulina basin figura sexta
exhibet. p. 271

Calx viva unde conficiatur, & quare
aquâ affusâ in tantum effervescat.
p. 52

Capitis dolor, vigiliæ, delirium, &
alii affectus quare in febribus su-
perveniant. p. 119

Cardialgia quando in febribus con-
tingat. p. 120

Carnes variis modis à putredine præ-
servantur. p. 33

Causus quid sit, ejus periodi, sive pa-
roxysmi, & eorum variatio. pa-
gina 127

Cephalalgia propter Piæ matris labem
quomodo

Rerum Notabilium.

- quomodo eveniant. p. 292
- Cerebelli*, ejusque processuum descriptio. p. 262. 263
- Cerebellum* in quibusvis animalibus ejusdem figuræ & proportionis, & eisdem lamellis conflatum reperitur: ubi de medulla oblongata posticæ regionis. p. 263. 264
- Cerebelli* situs & munus. p. 317. 318
- Cerebelli* conformatio & figura in omnibus animalibus, aut ferè eadem, aut valde similis existit. p. 319
- Cerebelli* partes & accidentia referuntur. p. 319. & seq.
- à *Cerebello* aliò ritu ac à *cerebro* spiritus animales dimanant. p. 321
- Cerebelli* munus esse spiritus animales pro functionibus involuntariis requisitos progignere, & dispensare p. 324
- Cerebrum* defuncti à nativitate fatui, in quo differat à *cerebro* cordati viri, anatomicâ observatione dignoscitur. p. 381
- Cerebri* cercopithecii anatomes, & descriptio. ibid.
- Cerebrum* pars est humani corporis, quâ nulla faciliùs & meliùs disquisitione anatomicâ cognosci posse proponitur; & nulla minùs ac imperfectiùs scitur: p. 248
- Cerebri* notitia requiri debet ex hominum & aliorum animalium capitum dissectione. p. 249
- Cerebri* dissecandi methodus. ibid. & seqq.
- Cerebri* partes variæ. p. 252. & seq.
- Cerebri* anatome quomodo ritè celebranda. p. 254
- Cerebri* præsertim humani figura. ibid. & seq.
- Cerebri* humani cranio exempti basin figura prima explicat. ibid.
- Cerebri* ovini cranio exempti basis per figuram secundam explicata. p. 257
- Cerebri* partes posteriores ordine recensentur, & earum dissectio exponitur. p. 258. ad 262
- Cerebri* humani cranio exempti superficiem extimam, & alias partes figuras tertia explicat. p. 265. 266
- Cerebri* humani cujusdam adolescentis ab ipsa nativitate fatui descriptio per figuram quartam. pagina 266
- Cerebra* volucrum & piscium describuntur. p. 272
- Cerebra* volucrum quantum differant à *cerebris* hominum & quadrupedum. ibid. & seq.
- Cerebra* piscium describuntur: ubi de eorum similitudine cum *cerebris* avium. p. 275. & seq.
- Cerebri*, partiumque ejus usus & munia. p. 276
- Cerebri* propriè dicti descriptio, ejusque partium explicatio & usus traditur. p. 292. & seq.
- Cerebri* gyri & convolutiones quid præstent. p. 294
- Cerebri* partes medullares spirituum animalium exercitio & dispensationi, minimè verò illorum generationi inserviunt. p. 295
- Cerebri* fornix, & ejus duplex usus. p. 296.
- Cerebrum* ovinum reclinatum, & in cohæsionum locis juxta corpora striata aliquatenus discissum exhibetur. p. 297
- Cerebri* ventriculi quales, & eorum usus. p. 300
- Cerebri* infundibulum. p. 302
- Cerebri* mala dispositio, alia hæreditaria, alia acquisita, motus convulsivos & spasmodicos ciet. pagina 444
- Cerevisia* unde paratur, & quomodo conficiatur. p. 24. 25
- Cerevisia* à fermentatione magnam perfectio

Index Alphabeticus,

- perfectionem acquirit. p. 26
- Cerevisia* medicata scorbuticis pro potu ordinario exhibenda, quomodo juxta patientis temperamentum paranda. p. 607
- Chalybis* limatura sanguini calcaria & frena simul injicit. p. 558
- Chalybis* præparationes. ibidem, & seq.
- Chorea* Sancti viri descriptio, & ejus æthiologia. p. 494
- Coagulatio* corporum à principiis chymicis unicè dependet. p. 58
- Coagulationis* acceptio varia. p. 59
- Coctio* ollarum fictilium, & laterum vitrificationi affinis. p. 61
- Colica* & ventris tormina scorbutica citam medicinæ opem exquirentia, quomodo curanda. p. 612. 613
- Colicus* dolor ad plexus nerveos abdominis, & præcipuè ad mesentericum pertinet. p. 390
- Colorum* differentia hepatis, lieni, & pulmonibus unde proveniant. p. 653
- Color* pulmonum quare tam subito mutatur in recens natis. p. 668
- Congelatio* corporum à principiis chymicis unicè dependet. p. 58
- Congelatio* quid sit. p. 59
- Congelatio* diversorum salium. pagina. 61. 62
- Congelationis* artificialis exempla & instantia. p. 62
- Convulsio* in febribus propter varias causas contingit. p. 119
- Convulsio* an idem significet ac spasmus. p. 437
- Convulsio* alia continua, alia intermittens. p. 450
- Convulsivi* morbi *Hæmiæ* quondam epidemici descriptio, & symptomatum ejus æthiologia. p. 496
- Convulsionis* intercissæ natura traditur, cum historia ejus & symptomatum præcipuè urgentium rationibus. p. 510. & seqq.
- Convulsionis* intercissæ causæ, & quare effectus hic thermarum usu ingravescat. p. 513. & seq.
- Cadavere* ægrotantis aperto, quæ notatu digna reperta fuerint. p. 514. 515
- Convulsivæ* affectionis continuæ natura, fiendi modus, observatio, & æthiologia traditur. p. 516. 517
- Curatio*, & alia observatio cum casus descriptione, natura, & causa. p. 518. 519. & seqq.
- Convulsivæ* affectionis casus varii cum eorum æthiologiis, & methodo therapeutica referuntur. pagina. 522. & seqq.
- Convulsivi* affectus scorbuto supervenientes quomodo curandi. pagina 618
- Copula explosiva* spasmodica immediate à cerebro advenit: interdum verò à nervorum finibus. p. 442. & 443
- Cor* & cerebrum duplicem humorem pro aliarum partium sensitivarum accretione & nutritione distribuunt. p. 340
- Cor* motu perpetuo agitaturn sanguinem duplici circuitu per pulmones, & totum corpus impellit. p. 637
- Cordis* pulsus an à spirituum animalium per nervos influxu ita dependeat, ut eo prohibito Cordis actio omnino cesseret. p. 368
- Cor* sanguinis circulatorum inservit, & ad moderandam ejus accensionem & incendium multum confert. p. 669
- Corpora* humida quàm putredini, & corruptioni maximè idonea. p. 4
- Corporum* naturalium, sive vegetabilium, sive animatorum accretio & duratio. p. 31. 32
- Corpora*

Rerum Notabilium.

Corpora resinosa rarò putredinem concipiunt. p. 34
Corpora quorum conjunctio est sulphurea, quomodo recludenda. p. 43
Corpora striata in cerebro hominis & quadrupedum omnium semper reperiuntur, & simili ritu configurantur: in volucris verò & piscibus res paulò aliter se habet. p. 308
Corruptio in quibus corporibus magis, vel minùs contingat. p. 34
Corruptio cum fœtore, unde. p. 35
Cortex Peruvianus, qui cum fructu ad febris quartanæ & aliarum curationem exhibetur. p. 99
Corticis prædicti operandi modus, & aliæ qualitates. p. 100. 101
Cranii humani basin internam figuram quintam exhibet. p. 271
Cranium durum ac osseum in perfectis quibusve animalibus obtigit, & quare. p. 276
Cranii humani & quadrupedum figura. p. 277
Crisis febrium, num bona futura sit, necne, unde prognosticum sumendum. p. 112. 113
à Crisi bona, vel mala quomodo se habeant spiritus, & sanguis. pagina 114
Crocus martis astringens quomodo parandus, & in quibus casibus sit egregii usus. p. 560
Crystallizatio salium quomodo perficiatur. p. 59
Crystallizationes diversorum salium. p. 60

D

D *larrhœa* febribus superveniens frequens symptoma. p. 121
Dolores varii scorbutico supervenientes. p. 588

Dolor ventris ferè continuus scorbutico familiaris. ibid. & seq.
Dolores scorbuticorum quasi colici, & eorum causæ. p. 589
Dolores scorbutici in variis abdominis, & aliis humani corporis partibus. p. 590
Dolores scorbutici in crura vel aliis artus noctu potissimum infestare soliti, quomodo curandi. pagina 616
Dysenteria in febribus continuis frequens symptoma quibusdam annis epidemius, & peste non mitior evadit. p. 121
Dyspnœa & præfocatio non sunt passionis hysterici morbi ita propriæ, ut aliquando altera, vel utraq; simul deesse non possint. p. 638
Dyspnœa & cordis oppressio à diaphragmatis & pulmonum ascensu induci possunt. p. 644

E

E *Cho* communis & extrinseca, in quo consistat. p. 326
Emplastra cephalica quare in phthisi opem adeo insignem conferant. pagina 346
Empyreumatis & mucoris similitudo? p. 36
Empyreumata in materiis diu calcinatis hærent. p. 52
Epilepsia varia nomina apud antiquos. p. 451
Ejus descriptio & historia. ibid.
Epileptici paroxysmi quibus temporibus certius redire soleant; quandoque vagi, leviores, vel graviores. p. 452
Epilepsiæ subjectum & sedes inquiruntur. p. 452. 453
Epilepsia secundariò plurimas systematis nervosi partes afficit. p. 455

T t t 2 Epilep

Index Alphabeticus,

Epilepsia per consensum excitata
quid. ibid.
Epilepsiæ causa conjuncta in cerebro
tantum consistit. ibid.
Epilepsiæ differentia & symptomata
varia. p. 456. 457
Epilepsia difficillimæ curationis est.
p. 457
Epilepsia in alios morbos commuta-
tur. p. 458
Epilepsiæ therapeutica. p. 459
ad *Epilepsiam* curandam specifica re-
feruntur; & in quo eorum virtus
consistat. p. 460. & 463
Historia & methodus therapeutica.
p. 461. 462
ad *Epilepsiæ* curationem varia reme-
dia præscribuntur. p. 464. 465
Explosionis vocabulo motuum in cor-
pore animato regulariter vel *ανωμαλως*
peractorum ratio aptissimè
explicatur. p. 439
Explosiones in spiritibus quomodo
contingant. p. 446

F

F*acultatum* animalium exercitia in-
tra cerebri confinia quomodo
peragantur. p. 298. & seqq.
Facultates interiores & immanen-
tes per spiritus perfectos, &
summè elaboratos peraguntur.
p. 200
Febris quid sit, & unde ita dicta.
p. 63
Febris descriptio. p. 76
Febris intermittens quid sit, & quæ-
nam in ea sanguinis effervescencia.
ibid. & seq.
Februm intermittentium ratio & ea-
rum periodi. p. 77
Februm intermittentium periodi di-
versæ unde. p. 80
Febris intermissio, & statarum pe-
riodorum ratio traditur. p. 79

Febrilis paroxysmi præludia & sym-
ptomata quænam. p. 82
Febres intermittentes duplici modo
terminantur, dupliciterque earum
cura instituitur. p. 83
Remedia empirica. ibid.
Febris intermittens curatio dogma-
tica. p. 89
Februm intermittentium anomalæ
quædam. p. 85
Febris tertiana & quartana duplex.
p. 86
Februm potissima divisio in tertia-
nam, quotidianam & quartanam.
p. 87
Febris tertiana quid, & ejus distin-
ctio in exquisitam & notham.
ibid.
Febris tertianæ essentia. ibid.
Febris tertiana vere est frequentior,
& non raro typum commutat.
p. 88
Febris tertianæ crisi indicant quæ-
dam symptomata. p. 89
Febrim tertianam solvit icterus. ibid.
Febris tertiana phlegnone superve-
niente judicatur. p. 90
Febris tertiana difficilè curatur, si
post 10. vel 12. paroxysmos ægro-
tantes graviter affligat. ibid.
Febris tertianæ curatio quoad tres
præcipuas intentiones. pagin. 90.
91.
Historia, & quid faciendum, si
propter malam ægrotantis con-
stitutionem, vel propter errata
in diætâ altius radices egerit. pa-
gina 92. 93
Febris tertiana non est quotidiana
duplex, & quare contingat, &
quomodo curanda. p. 93. 94
Historia refertur, & curatio. pa-
gina 95
Febris quartana quid, & ejus causæ.
ibid. & seq.
Febris tertianæ quare longiores pe-
riodi.

Rerum Notabilium.

- riodi , & difficilis curatio. p.96
 Quare in Autumno potissimum
 oriatur. p.97
 Febris quartanæ ingravescentis hi-
 storia , in qua varii curationum
 modi tentati. ibid. & seq.
 Febris continua , & varii efferves-
 centiæ gradus in ea. p.102. 103
 Febris ephemera qualis , à quibus
 causis dependeat , & quid circa
 ejus solutionem & crisin requi-
 ratur. p.104. 105
 Historia ejus. p.106
 Febris putrida , ejus decursus. ibid.
 & p.107
 Ejus causæ procatacticæ & evi-
 dentes. p.108
 Febris putridæ quatuor tempora , &
 eorum computatio. ibid. & seq.
 Febris putridæ status. p.110
 Febrium crises unde dependeant.
 ibid. & p.111
 Prognostica num bona futura sit,
 necne. p.112. 113
 Febris putridæ symptomata , & sig-
 na præcipuè notabilia. pag. 115.
 & seqq.
 Febris producta , angina , pleuritis,
 & *Sciendū p. viā.* p.125
 Febris putrida quid sit , ejus descrip-
 tio & causæ. p.126
 Febrium putridarum therapeia per
 quatuor intentiones generales :
 ubi de remediis. p.128. 129
 Febrium variarum historiæ descri-
 buntur. p.130. ad 140
 Febres pestilentes , malignæ , & aliæ
 epidemicæ. p.155. & seqq.
 Febris pestilentis signa , & causæ.
 p.156. 157
 Febrium pestilentium , & malignarum
 curatio. p.158
 Febres epidemicæ , & aliæ privatae
 nullius contagii participes. p.159
 Febris pestilentis anno 1643. graf-
 santis descriptio. p.160
 Febris ab initio tantum castrensis,
 demum pestilentialis exortus , pro-
 gressus & exitus. p.161
 Febris malignæ typus ab observatio-
 ne , & historiis ad vivum depingi-
 tur. p.162. 163
 Febres puerperarum valde periculo-
 sæ , quare eis post puerperium acci-
 dunt. p.175
 Febris lacteæ descriptio , & ejus ra-
 tio formalis. p.179
 Febris lacteæ curatio naturæ commit-
 titur. p.180
 Febris putridæ puerperarum descri-
 ptio & causæ. p.180. & seqq.
 Febres puerperarum difficilis cura-
 tionis. p.183
 Febris puerperium subsequens the-
 rapeia. p.184. 185
 Febres puerperarum symptomaticæ.
 p.186. 187
 Febris epidemicæ circa Autumnum
 anni 1657. descriptio. p.194. & seqq.
 Febris catarrhalis , anno 1658. epi-
 demicæ descriptio. p.201
 Ejus ratio formalis , prognosis , &
 therapeia. p.203. 204
 Febris epidemicæ sub initium Au-
 tumni anni 1658. exortæ descrip-
 tio , frigidioris temperamenti , &
 provectioris ætatis homines corri-
 piens , & quare. p.206. & seqq.
 Ejus natura & ratio formalis , typus,
 paroxysmi , prognosticon & in-
 tentiones curativæ. p.208. ad 213
 Febris epidemicæ cerebro & nervoso
 generi potissimum infestæ , anno
 1661. grassantis descriptio , causæ
 procatacticæ , symptomata & eo-
 rum ætiologia. p.497. & seqq.
 Febris prædicta cur pueros , fœmi-
 nas , & viros phlegmaticos potis-
 simum invasit : & cur difficilè so-
 lubilis. p.501
 Observationes variæ cum earum
 ætiologiis. p.502. 503

Index Alphabeticus,

- Febris prædictæ diagnosi è dissecto
cadavere investigata, & ejus patho-
logia. p.504.505
- Ejus curatio per varia remedia, &
quibus methodus therapeutica in-
stituenda in stupore & insania.
p.506.507
- Febris erratica cum sudoribus no-
cturnis atrophie scorbuticæ adjun-
cta quomodo curanda. p.619
- Fermentationis* vocabulo in vulgari
Philosophia nihil rarius, inter sa-
niores verò nullum usitatus. p.1
- Fermentatio unde dicta. ibid.
- Fermentationis motus unde. ibid.
- ad Fermentescendum corpora apta,
aut inepta. ibid. & seq.
- Fermentationis definitio traditur.
p.11
- Fermentationis varia distinctio quoad
subjecta in quibus reperitur. p.12
- Fermentatio in vegetabilibus. p.13
- Fermentationis modus in animalium
corporibus. p.16
- Fermentationis apparatus varius &
multiplex in artis operibus. pa-
gina 20.21
- Fermentatio variis modis promove-
tur, vel sistitur. p.21
- Fermentatio in corporum exaltatio-
ne, & tendentia ad perfectionem
spectata. p.23
- Fermentationis motus in corporum
interitu, putrefactione & corrup-
tione. p.31
- Fermentationis motus in corporum
dissolutione. p.37
- Fermentationis motus in corporum
præcipitatione. p.54
- Fermentationis motus in corporum
coagulatione & congelatione. pa-
gin.58. & seq.
- Fermentatio non contingit rebus ha-
bentibus similes omninò particu-
las. p.72
- Fermentatio sanguinis diversa à fer-
mentatione vini. ibid.
- Fermentum* in cordis foco ad sanguinis
motum & effervescentiam, & in
ventriculo ad chyli coctionem.
p.16.17
- Fermentum in ventriculo variis mo-
dis se habet. p.17
- Fermentorum ratione nascimur, nu-
trimur & morimur. p.19
- Fermenta varii generis. p.14
- Fermenta ad sanguificationem requi-
runtur, & unde fermentur. p.72
- Ferri* limatura quomodo paranda.
p.558
- Ferri* rubigo, quæ corporis metalli-
ci extractum, sive quinta essentia
esse videtur. p.559
- ad *Flammam* perennandam tria præ-
cipua, & maximè essentialia requi-
runtur. p.664
- Flamma duobus modis produci po-
test. p.667
- Flamma vitalis quomodo & quando
in sanguine primò accenditur. pa-
gin.668
- Flamma vitalis cur omninò non ap-
pareat, probabilis ratio assignatur.
p.671
- Fibræ* nervosæ motus & sensus orga-
na sunt, & undenam originem
suam ducant. p.339
- Fibrarum genus & natalitia. ibid.
- de Fibris tendinosi tria summope-
rè notanda traduntur. p.423
- Fibræ statim se contrahunt ac muscu-
lus tumere incipit. p.434
- Fibrarum usus & officia designantur
ex harum in membranis apparatu.
p.646
- Fibræ ordines & versus dictæ, mus-
culi crassitiem, profunditatem &
latitudinem componentes. p.675
- Fibris carneis directis motricibus fi-
brillæ aliæ transversæ membrana-
cæ intertexuntur. p.677
- de Fibrarum actione ad motum mus-
cularem

Rerum Notabilium.

cularem experimenta quædam. pagina 678

Fibræ omnes musculares quibus humoribus irrigentur, impleantur, inflentur. p.679

Fibrarum carnearum, & fibrillarum membranacearum textura admiranda in musculo fibris amplis prædita. p.688

G

Glandula pinealis in cerebro humano, quadrupedum, piscium & volucrum reperitur; tamen non est animæ sedes. p.311

Glandulæ pinealis usus. ibid.

Globi in hystericarum abdomine ascensus unde proveniat. p.638.639. 642. & 643

H

Hæmorrhagia in affectione scorbutica ingens periculum minantes quomodo sistendæ. p.614

Humores præcipuè in febræ peccantes quinam. p.63. & 64

Humores serosi intra cerebri vacuitates congesti, an per glandulam pituitariam, vel os cribriforme foras amendantur. p.301

Humores serosi in glandula pituitaria depositi quo excretionis modo foras amendantur. p.303

Humor sanguineus an sit nutritius. p.343

Et an sit magis nutritius quam succus nervosus. p.349

Hydrops duplex scorbuto superveniens, quibus remediis curandus. p.620

Hypochondriaci morbi descriptio & symptomata multiplicia, & diversimodæ indolis. p.546

Hypochondriaci affectus ad morbo-

sum genus spectant. p.547

Ejus causæ inquiruntur. ibid. & seq.

Hypochondriacorum symptomatum rationes explicantur. p.550

Hypochondriacæ affectionis casus refertur, & medendi methodus præscribitur. p.553.554

Hypochondriacis varia remedia exhibenda præscribuntur. p.556

Hypochondriacam passionem ventriculo haud minùs iniquè imputari ostenditur. p.652

Hypochondriacus morbus cum toto symptomatum ejus apparatu omninò ab aciditate non provenit. p.656

Hystericæ passionis natura, causæ & sedes primaria, juxta D. Higmori hypothesein, quam improbabilem & impossibilem esse ostenditur. p.635. & seq.

Hystericæ quasi affectionis virum torquentis casus, & ejus æthiologia referuntur. p.481

Hystericæ passionis descriptio, & symptomatum causæ disquiruntur. p.529.530

Hystericæ affectio ad cerebrum & nervosum genus præcipuè spectat. p.531

Hystericæ morbi causa sæpissimè circa nervorum principia incipit, deinde per totos nervorum ductus disponitur. p.532

Hystericorum symptomatum rationes explicantur, & eorum diversitas inquiritur. p.533

Hystericæ morbi causæ procatacticae in quibus partibus subsistant. pagina 534.535

Hystericæ passiones non semper ab utero, sed plerumque à cerebri, aliarumque nervosi generis partium vitio pendet. p.536.537

de Hystericæ passione observatio singularis, & curatio. p.538.539

Hystericæ

Index Alphabeticus,

Hysterici morbi ætiologia ex observationibus anatomicis desumpta.
p. 540. & seq.

Hystericas affectiones medendi methodus curatoria & præservatoria.
p. 542. 543

Hystericæ affectionis indicatio præservatoria in triplici intentione consistit.
p. 543. & seqq.

ad Hystericum morbum curandum remedia præscribuntur.
p. 544

Hysterica passio ab uteri ascensu induci non potest.
p. 545

Hystericarum historiæ quædam & observationes pathologicæ referuntur?
p. 649. & seqq.

I

I *Cterus febris tertianæ superveniens eam solvit, & quare.*
p. 89

Idea variæ, & penè infinitæ in anima quiescentes materiales sunt.
p. 426

Ideæ diversas in cerebro sedes obtinent.
ibid. & seq.

Ignis potentialiter ubique, & in omnibus est; actu in nullis.
p. 43

In quibus subjectis facilius producat, & sustineatur.
ibid.

Ignis quorundam corporum propriâ effervescentiâ producitur.
p. 44

Ignis forma à quo pendeat.
ibid.

Ignis accensio pluribus modis contingit.
ibid. & seq.

Ignis effectus præcipui, calor & lux.
p. 45

Ignis corporibus mediâtè vel immediâtè ad varios effectus applicatur.
p. 46

Ignis & flamma duobus modis produci possunt.
p. 667

L

L *Actis cum sanguine analogia describitur.*
p. 69. 70

Leipothymia, alii que affectus scorbu-

to adjungi soliti, quomodo curandi.
p. 613

Lienis usus qualis.
p. 18. 19

Lienis compages tota fibrarum texturâ quasi retiformi constat, & quare.
p. 386

de Lienis usu ex variorum placitis inquiritur.
p. 548. 549

Lienis vasa triplicis generis, & singulorum usus referuntur.
p. 550

Lienis influenza in producendis symptomatis hypochondriacis explicatur.
p. 551

à Liene multa mala exoriuntur.
ibid. & seq.

Lienis vitia quomodo emendanda.
p. 555

Liquor nervosus quid sit, & an sit nutritius, & unde proveniat.
p. 343. & seq.

Ad quid inserviat per totum corpus diffusus.
p. 345

Liquor quidam spirituosus & vivificus in qualibet animantis parte reperitur.
p. 428

Lux proprio & peculiari modo sensum afficit.
p. 46

Lux alia ætherea, alia elementaris.
p. 47

Lucis pernecitas, reflexio, & alii effectus.
ibid.

Lux illustrat medium, & propria visus objecta creat.
p. 48

M

M *Achina ad vires motrices augendas adinventæ ad duo capita reduci possunt.*
p. 681

Medicamentorum chalybeatorum præparationes, & effectus explicantur.
p. 557. & seqq.

Medicamenta digestiva, quæ ventriculi fermentum restituant, ejusque ac aliorum viscerum chylosi intervientium functiones juvant.
p. 601

Medica

Rerum Notabilium.

Medicamenta chalybeata specifica antiscorbutica p.602.603
Medicamenta liquida scorbuticis exhibenda. p.604.605
Medicamenta contra scorbutum in constitutione calidiori, & sanguinis dyscrasia sulphureo-salina excitatum præscribuntur sub variis formulis exhibenda. p.607. & seqq.
Medici pro tuenda aut recuperanda hominis sanitate idem officium ferè ac ænopolæ. p.19. 20
Medicus perquam in praxi felix multos à peste curavit, quâ ipse correptus interiit. p.155
Medulla oblongatæ ejusque partium quarundam figura, & earum actiones & usus explicantur. p.305. & seq.
Medullæ oblongatæ diverticula ac compita pertractantur. pag. 306. & 307
Medullam oblongatam, capite ovino exemptam, cerebro abscisso, & amoto, cum cerebello & corpore uno striato per medium dissectis, ac alia præcipuè ad caudicem medullarem pertinentia figura quarta exhibet. p.310
Medullæ spinalis nervi & vasa sanguifera. p.400.401
Medullam spinalem specu osseâ exemptam, & membrana investiente dissecta semi-exemptam tabula duodecima exhibet, ut nervorum vertebraliū origines & productiones melius conspiciantur. p.413
Medullæ oblongatæ & spinalis compages, & quæ in eis consideratione digna occurrant. p.333.334
Membranas omnes corporis sensiles à cerebri tunicis oriri, ipsa ætologia comprobant. p.421
Membranae dum tensionem suam & debitum tonum obtinent, instar

campanæ & vitri purissimi sunt. ibid.
Membranarum contractiones, corrugationes, & distensiones violentes quomodo à spiritibus perturbatis contingant. p.646
Duræ Meningis descriptio. p.277
Duræ Meningis vasa, & eorum usus. p.278
Duræ Meningis motus & textura. p.279
Meningis interioris descriptio traditur. p.280.281
Meningis interioris munus, & vasa eam variè intertextentia, & quæ in eis observatu digna. pag.281. & seqq.
Meninges primariò non afficiuntur in paroxysmo epileptico. p.453
Menstruum aquæ spirituosum quomodo efficiatur. ibid.
Menstrua sulphurea & salina diversi generis. p.39
Menstruum sulphureum quæ corpora dissolvat. ibid.
Menstrua margaritas, corallia, conchylia, testacea, & corpora mineralia dissolventia. p.40
Menstrua salina fortissima, & mineralia solventia. ibid.
Menstruum universale, & quædam alia famosa. p.42
Menstrua spiritiosa aut sulphurea dissoluti particulis sulphureis imprægnata sarcinam suam faciliè deponunt. p.56
Menstrua salina lapidum & metallorum solutionibus imprægnata, à particulis salinis facillimè, & vix ab aliis præcipitantur. p.57
Metallorum dissolutio quomodo peragatur. p.41
Metalla nonnulla à quolibet liquore acetoso corroduntur; alia à solvente peculiari dissolvuntur. ibid.

Index Alphabeticus,

- Meteora* constant ex iisdem, quibus mineralia principiis, ac eodem ferè utero conceptis. p. 13.
- Mineralium* duriorum generatio congelationem potius quàm fermentationem inducit. p. 12.
- Mineralia rarò putredinem concipiunt. p. 33. 34.
- Mineralium solutio à menstuis fortissimis varia quomodo perficiatur. p. 40. 41.
- Mineralia à menstuis acetosis corrosa non semper in partes elementares resolvuntur. p. 41.
- Mineralium & vegetabilium solutiones invicem commixtæ varios colores edunt: & horum ratio. p. 57. 58.
- Morbilorum* essentia, & curatio. p. 172.
- Historiæ. ibid.
- Morborum* curationes fermentationis ope. p. 19.
- Morbi pestilentes in tenebris grassantur, & ignotam ducunt originem. p. 140.
- Morbi scorbuti supervenientes quomodo differant ab iisdem per se invadentibus. p. 594. & seq.
- Motuum* convulsivorum pueros instantium causæ referuntur. pagina 466. 467.
- Materies* eorum morbifica qualis. ibid. & seq.
- Motus* convulsivi infantibus propter varias causas, & aliis quàm statim à partu, aut dentitionis temporibus accidunt: ubi de hoc historia notabilis. p. 469. 470.
- Eorum curatio traditur, & remedia præscribuntur. p. 470. 471.
- Motus regularis in corpore animato quomodo peragatur, & quod ejus instrumentum proximum. p. 437.
- Motus regularis duplex principium, & duplex subjectum. p. 438.
- in Motu cordis, fibrarum, & membranarum, non est semper pars alia mobilis, alia immobilis. p. 644. & seq.
- Motuum duas tantum differentias in fibris omnibus esse, minùs verè asseritur. p. 647.
- Motiva facultas quomodo exerceatur, & quænam actio sit motus. p. 673.
- Motuum variæ species & differentiæ deducuntur ex eo, quod in omni motu tria considerari debent. ibid.
- Motus spontaneus & involuntarius. ibid.
- Motus simplex & complicatus. p. 674.
- Motus localis quomodo perficiatur. ibid.
- Motus muscularis phenomena varia traduntur experimento in fibris facto. p. 679.
- Motivæ facultatis animalis ætiologia quàm difficilè constituatur. p. 680.
- Motiva virtus quâ musculus movetur, à cerebro proficiscitur, per nervos convehitur, & à fibris carneis contractis perficitur. p. 680.
- Motus omnis regularis, vel irregularis instinctus quisnam sit. pagina 686.
- Motus muscularis obeundi, sistendi, aut quovis modo alterandi instinctus quisnam. p. 687.
- de Motibus, hoc præ alio, elective obeundis difficilis quæstio proponitur. p. 692.
- Mucor* absque putredine quomodo in vasis vacuis & corporibus humidioribus inducatur. p. 35. & 36.
- Mucorem inter & empyreuma similitudo quædam refertur. p. 36.
- Musculi* totius corporis quoad motum suum analogiam quandam cum cordis motu habent. p. 348.

Rerum Notabilium.

de Musculorum motu duæ sententiæ referuntur. p.417
 Musculorum motûs causa qualis sit. p.418.& seq.
 Musculorum intumescencia, & inflatio unde. p.420
 Musculorum motum efficit materia quædam summè mobilis ad ipsos deducta. p.422
 Musculi constructio. ibid.
 Musculorum motûs ratio explicatur. p.423
 Musculorum intumescencia quantum valeat, etsi exilis fingatur. p.431
 Musculosæ carnis motus à nervis & sanguine copiosius illato inchoatur. p.433
 Musculi motus spirituum explosio quædam est. p.438
 Musculi caput, cauda, & venter. p.674
 Musculi fabrica aliis nondum perspecta, nuper ab ingeniosissimo D. D. Stenone primò tradita. pagina 675
 Musculi figura ad matheos regulam redacta. ibid.
 Musculus simplex & compositus, ibid.
 Musculi simplicis, compositi, minùs compositi, & valde compositi fabrica & constructio. p.676.& seq.
 Musculo cuilibet simplici vel composito integumentum membrana-ceum quaquaversus obtenditur. pagina 677
 Musculi quomodo attrahunt. p.681
 in Musculis particulæ elasticæ, & se movere aptæ continentur. p.682
 Musculi contractio & relaxatio quomodo perficiantur. ibid. & seq.
 Musculi venter carneus dum contrahitur intumescit. p.684
 Musculi simplices & regulares an habeant fibras carneas & tendinosas æquales. p.685
 Musculi nonnunquam præter appe-

titus & naturæ placita in motus anomalos & violentos aguntur. p.688

Musculus simplex regularis juxta φάσιν naturalem exhibetur. pagina 693

Musculorum aliorum figuræ traduntur. ibid. & seq.

Melodia & Musica quare à quibusdam facillimè addiscatur, à nonnullis verò difficillimè. p.327

Musica phantasiâ delectatione afficit, & passiones qualvis turbulenta sedat. p.328

Musicæ virtus ad sedanda symptomata demorsorum à Tarantula. p.493

N

Nephritici sanguinem vel pus cum lotio sæpe excernunt. p.235

Nervi olfactorii in homine, quadrupedibus, volucris & piscibus. p.309

Nervi quintæ & sextæ conjugationis unde oriantur, & quæ illorum ramificationes. p.324

Nervus intercostalis quoad originem suam omninò à cerebello dependet. p.325

Nervus sextæ conjugationis oculorum motibus quibusdam patheticis inservit. ibid. & seq.

Nervi auditorii quinam, & eorum usus in homine & quadrupedibus. p.326

Nervi auditorii non eodem modo in homine & quadrupedibus se habent. p.328

Nervi paris vagi & octavi, qui cerebelli munia exequi videntur. pagina 329

Nervi paris quarti, & nervuli oculorum pathetici. ibid.

Nervi aliqui functioni involuntariæ
 V u u u 2 designa

Index Alphabeticus,

- designati, à cerebello oriundi, cerebri imperio obsequi conguntur. p. 329
- Nervosi systematis nomine quæ partes comprehendantur. p. 336
- Nervi omnes unde producantur. p. 337
- Nervorum ductus & corpora qualia. p. 338
- Nervorum quatuor paria intra cranium oriunda describuntur. p. 350. & seq.
- Nervi intra cranium oriundi quare cavitate aperta per totum insigniuntur. p. 351
- Nervi olfactorii, optici & visorii quales. p. 352. & seq.
- Nervi oculorum motorii. p. 353
- Nervi tertii paris paulò aliter se habent in bove, quàm in homine, cane, & aliis quibusdam animalibus. p. 354
- Nervorum quarta conjugatio, & ejus origo. ibid.
- Nervorum par ab antiquis quintum, nunc tertium dictum, & ejus surculi. p. 355. & 356
- Aliæ ejus propagines. p. 356. & 357
- Nervi quintæ & sextæ conjugationis, & eorum processus. p. 358
- Nervorum paris quinti & sexti ramificationes per figuram exhibitæ. p. 359
- Nervi tertii, quarti, quinti, & sexti paris, qui oculi musculis, aliisque partibus impenduntur. p. 360
- Nervorum octava conjugatio, juxta antiquos sexta, par vagum dicta, describitur. p. 361
- Nervi longè plures & majores in Cor & appendicem ejus à paris vagi trunco in brutis animalibus quàm in homine feruntur. p. 363
- Nervorum octavi paris actiones & usus explicantur. p. 364. & seqq.
- Nervi arterias & venas per totas pulmonum compages assequuti earum truncos densa propaginum serie investiunt, & variè circumligant, & quare. p. 372
- Nervorum paris vagi surculi plures in pulmones ac multi in œsophagi tunicas distribuuntur. p. 373
- Nervus uterque paris vagi in ventriculo terminatur. p. 374
- Nervus intercostalis qualis, & ejus propagines. ibid. & seq.
- Nervi intercostalis par. p. 375. & 377
- Nervorum paris intercostalis ramificatio superior expenditur. p. 378. & seq.
- Nervi intercostalis plexus major homini proprius. p. 380
- Nervorum rami cardiaci à plexu cervicali prodeuntes homini proprii. p. 382
- Nervi intercostalis ramificatio inferior, ad partes & viscera imi ventris pertinens explicatur. pagina 383
- Nervi mesenterici, & plexus in quos terminatur, spirituum animalium canales, condi, & emissaria existunt. p. 384
- Nervorum mesentericorum, ac propaginum & fibrarum nervearum ab iisdem prodeuntium officium & communicatio. p. 385
- Nervus amplius inter plexum hepaticum & renalem. p. 389
- Nervi in sphincterem ani & penem dispersiti unde procedant, & quale eorum officium. p. 393
- Nervi ad testes spectantes, quales, ibid.
- Nervi spinalis origo & usus describitur. p. 394. & seq.
- Nervi diaphragmatis origo & surculi. p. 395. 396
- Nervi paris vagi & intercostalis in homine & brutis animalibus discrimina

Rerum Notabilium.

discrimina traduntur. pag. 398.
& seqq.

Nervi intra cranium oriundi, & spinales. p. 399. & seq.

Nervorum paris quinti, sexti, intercostalis, vagi, septimi, noni, decimi, & diaphragmatis origines & distributiones, & cum aliis communicationes. p. 405. & seqq.

Nervorum prædictorum origines & ramificationes, prout earum aliquæ secus in brutis animalibus ac in homine reperiuntur. pagina 409

Nervorum paris vagi & intercostalis ramificationes inferiores, & vertebraliū origines, quorum configuratio similis in homine & brutis. p. 410. & seq.

Nervi principem locum in motu musculi inchoando obtinent. p. 432

Nutritio an ab humore sanguineo, an à succo nervoso dependeat. p. 343. 347. & seq.

O

Oris vitia à labe scorbutica oriunda, quomodo curanda. pagina 615. 616

Os cribriforme in diversis animalibus pro multiplici odoratus exigentia & discrimine variè perforatur. p. 304

Ossium crepitus symptoma scorbuto, licet rarius superveniens, à quibus causis oriatur, & quàm difficilis sit ejus curatio, casu singulari ostenditur. p. 621. & seq.

P

Panificium, & effectus fermentationis in eo. p. 23

Panis absque ullo fermento nimis effervescebat. p. 24

Paralysis scorbuto ingravescenti crebro superveniens ob tria causarum genera. p. 587

Paralysis scorbutica potiore cura- tionis partem quandoque sibi ven- dicat. p. 618

Pestis natura, & quomodo afficiat corpora. p. 143. & seq.

Pestis ortus, & duplex ejus causa. p. 144. & 145

Ejus divulgatio, & propagatio. p. 145 & seq.

Pestis certissima prodit contagii sui signa. p. 147

Pestis descriptio. ibid.

Pestis unicum morbi genus, ano- malia quædam: ubi de ejus signis. p. 148. 149

Pestis curatio. p. 150. 151. 153

Pharmaca ad curandum scordum e- quorum morbum, & strumas. p. 346

Phthisis febris maximè symptomatica digi meretur, & ejus causæ. p. 126

Pia mater: vide *Meninx interior*.

Plantarum facilis resolutio in princi- pia chymica. p. 13

Plantarum germinatio quomodo per- ficiatur. p. 14

Plexus choroeides glandulæ pineali adjungitur. p. 311

Plexus choroeidei munus duplex, & quare semper intra cerebri ventri- culos, seu cavitatem à plicatura ejus factam reperitur. p. 312

Plexus ganglioformes bini lapides ter- minales in dissectione nervorum qui præcordiis & visceribus distri- buuntur. p. 362

Eorum descriptio. ibid. & seq.

Plexus plures nervei cum fibris & propaginibus innumeris, ob quem finem circa mesenterium & abdo- minis viscera distribuuntur. p. 383

Plexus nerveus lienem respiciens, & plexus renalis. p. 387

V u u u 3 Plexus

Index Alphabeticus,

- Plexus hepaticus cum lienari per fibras utrique conjunctas communicat.* p. 388
- Plexus mesenterii maximus in medio cæterorum positus, Solis instar, quasi radios, fibras nerveas in orbem dispergit.* p. 389
- Plexus abdominis plerique in passionibus hystericis afficiuntur.* ibid.
- Plexus abdominis minimus, ut spirituum intestina quædam actuantium influxus inferius derivetur.* p. 391
- Precipitatio in naturalibus & artificialibus adhibetur.* p. 54
- Præcipitationis vulgares & triti modi duo.* ibid.
- Præcipitatio sanguinis.* p. 55
- Præcipitatio in artificialibus majoris notæ ac usus.* ibid.
- de Principiis rerum naturalium variæ Philosophorum sententiæ.* p. 2. & 3
- Principiorum nomine quid intelligendum.* p. 3
- Principiorum chymicorum descriptio, eorumque proprietates, & affectiones.* ibid.
- Principia chymica propter diversas combinationes, varias appellationes naturæ eorum minimè congruas sortiuntur.* p. 10. Corpori cui libet in substantia inesse demonstratur. ibid.
- Principia salina & sulphurea an ab igne producantur in mixtis* ibid. & p. 11
- Prominentia quædam orbiculares, vulgò nates & testes dictæ, quæ in cerebro reperiuntur: & quis earum usus.* p. 313
- Prominentiarum prædictarum usus circa spiritus animales, & instinctuum naturalium impressiones ad cerebrum convehendas.* p. 314. 315
- Prominentiæ posteriores priorum sunt epiphyfes.* p. 315
- Prominentiarum prædictarum partes & processus à medullæ oblongatæ caudice distinguuntur.* p. 316
- Prominentiæ natiformes maximæ in quibusdam brutis.* p. 332
- Prominentiarum orbicularium, & protuberantiæ annularis relatio & mutuus respectus.* p. 340
- Prominentiæ orbiculares via & instrumentum sunt, quibus præcordiorum & viscerum instinctus ac necessitates à cerebello cerebro communicantur.* p. 331
- Protuberantiæ annularis munia, quæ spirituum præcipuum organum & arca videtur.* ibid.
- Protuberantia quædam utrique medullæ oblongatæ lateri adnascens, quæ in homine, non in brutis reperitur.* p. 333
- Pueri & infantes circa duo potissimum tempora convulsionibus obnoxii sunt.* p. 466
- Pueri circa dentitionis tempora in febrem, & sæpè in motus convulsivos incidunt, & quare.* p. 468. & seq.
- Pueri quomodo à spasmodis præservandi.* p. 470. 471
- Puerorum spasmodis laborantium curatio traditur, & remedia præscribuntur.* p. 471
- Puerorum morbi & mortes sæpè dentitioni & lumbricis imputantur, qui à polypo cordis procedunt.* p. 640
- Puerperæ quare febribus obnoxie.* p. 175. & seq.
- Puerperarum febris putrida, & ejus descriptio.* p. 180. & 181
- Ejus causa procatactica, evidens, & conjuncta.* p. 182
- Puerperarum febres nunquam periculo vacant: ubi de earum curatione.* p. 183. & seq.
- Puerperæ omnes indigenam habent virulentie mineram.* p. 184
- Puerpe

Rerum Notabilium.

Puerperarum febres symptomaticæ.

p. 186

Puerperarum Angina, Pleuritis, Peripneumonia, Dysenteria, quomodo curandæ.

p. 187. 188

de Puerperis febricitantibus historiæ. ibid. & seqq.

Pulsus ingruente febris paroxysmo admodum rarus est, & depressus.

p. 81

Pulsus constitutum à natura *δεσμός* pro febrium statu & ægrorum viribus dignoscendis.

p. 121. 122

à Pulsu variæ indicationes sumuntur, etiam in exhibendis medicamentis, tum diaphoreticis, tum cardiacis, tum etiam narcoticis.

p. 122. 123

Pulsus inæqualis & intermittens pessimè audit.

p. 123

Pulveris pyrii natura explicatur, ubi de accensione & explosione ejus.

p. 49. & seq.

Pulvis qui certo modo paratus, auri fulminantis naturam imitatur.

p. 51

R

Ranciditas in quibus corporibus contingat.

p. 34

Rete mirabile in plerisque quadrupedibus, secus ac in homine, reperitur, & quid ejus usus.

p. 286

Rete mirabile cum glandula pituitaria in cranio vitulino exhibetur.

p. 288

Rheumatismus scorbuto inveterato crebro superveniens, in quo differat ab arthritide vaga.

p. 594

Rheumatismus scorbuticus à quibus causis oriatur, & quibus remediis curetur.

p. 619. 620

S

Sal principium chymicum fixioris naturæ, à quo individui duratio, & speciei propagatio plurimum dependet.

p. 6

Sal intra mixti compagem aut omnino fixus, aut à fixatione solutus.

ibid.

Salis status fixationis, volatilisationis & floris.

ibid.

Sal inflammabilitati resistit, excepto sale nitri.

p. 7

Sal affinis cum sulphure, terræ etiam strictissime unitur.

p. 10

Salis & terræ unio strictissima in vitro.

ibid.

Sal fixus idem præcipitat quod sal fluidus dissolvit.

p. 57

Sal martis quomodo parandum, & cujus sit utilitatis intus sumptum.

p. 559

Salis non unicum elementum, sed plura à D. Hgimoro statuuntur.

p. 658

à *Salium* destillatione experimentum annotatum.

p. 659

Sal nitrum per se non accenditur; sulphureis verò quibuscumque admixtum, cum impetu & explosione quadam in flammam prorumpit.

p. 49

Sanguinis pars terrestris & limosa in liene, pars adusta & ignea in hepate secretæ in fermentum evadunt.

p. 19

Sanguinis præcipitatio præcipua intra corpus animale.

p. 55

Sanguis in febre immaniter ebullit & impetum facit.

p. 63

Sanguinis particulae heterogeneæ quænam.

p. 64. 65

Sanguis putrefactione resolutus particulas exhibet distinctas & separatas, ex quibus componitur.

p. 65

Sanguinis

Index Alphabeticus,

- Sanguinis portio maximè subtilis & volatilis, spiritus.* ibid.
- Sanguini sulphur & sal inest.* p.66
- Sanguinis particulæ terrestres.* p.67
- Sanguinis fluiditas ab aquosa ejus parte dependet.* ibid.
- Sanguinis analogia cum lacte & vino.* ibid. & seq.
- Sanguinis cum vino collatio.* p.68
- Sanguinis cruditas, coctio, defectio, tum in sanis, tum in ægrotantibus.* p.69
- Sanguinis cum lacte similitudo.* ibid. & p.70
- Sanguinis fermentatio quomodo contingat.* p.71
- Varia est à fermentatione vini.* p.72
- Sanguini vigor insignis accidit ab utero, & partibus genitalibus.* ibid.
- Sanguinis motus & calor à duobus præcipuè dependent.* p.73
- Sanguinis in corde rarefactio & accensio.* p.74
- Sanguinis fermentatio nimia, & præternaturalis, quæ.* ibid. & seq.
- Ob duas præcipuè causas concitatur.* p.75
- Sanguinis effervescencia præternaturalis, quæ minimè in vino, sæpissimè autem in lacte contingit.* p.76
- Sanguinis effervescencia periodica quâ ratione in febre intermittente contingat.* p.77
- Sanguinis constitutio in febre continua qualis.* p.103
- Sanguinis & spirituum animalium distributiones diversæ.* p.341
- Sanguinis arteriosi insignis opera requiritur in musculis movendis.* p.430
- Sanguis in paroxysmo convulsivo eductus quare citò congelatur.* p.483
- Sanguinis & vinorum dyscrasiæ comparantur.* p.569
- Sanguinis dyscrasia scorbutica instar vinorum dum fiunt rancida, vel pendula.* p.570
- Sanguine miasmate scorbutico affecto, ob tres potissimùm rationes mala symptomata oriuntur.* p.579 & seq.
- Sanguinis interdictio lata in lege Mosaïca, & quare.* p.660
- Sanguine lienis culpâ depravato, etiam regimini animali labes sæpe numero infertur.* p.551
- Sanguini calcaria & frena simul adjicit chalybis limatura.* p.558
- Sanguinis missio hystericis non semper levamen affert, & instante paroxysmo rarò indicatur.* p.648
- Sanguinis animatio.* p.660
- Sanguinis effervescentis anima & vita ab ejus incendio pendet.* p.661
- Sanguis in cunctis animalibus perpetim movetur; in perfectioribus verò æstuat, & actu incalescit.* ibid.
- Sanguis ob rei calidæ admotionem incalescit, non verò à salinis corrosivis, aut oleosis commistis.* p.663
- Sanguinem accendi probatur.* p.664
- ad Sanguinis æquè ac flammæ vitam sustinendam par est aëris hauriendi necessitas.* p.665
- Sanguis omnium calidorum animalium pabulum sulphureum constans & copiosum exigit.* p.666
- Sanguinis vita continuam eventilationem exigit.* p.667
- Sanguinis color inter circulandum ab atro-purpureo in coccineum mutatur, & è contra, & quare.* p.668
- Sanguinis incendium, & vitalis ac flammæ animæ corporeæ pars, non eodem modo, vel mensurâ in omnibus viget.* p.669
- Sanguis quantumvis intra ductus apertos effervescens, an eos ita infercien*

Rerum Notabilium.

- ferciendo possit obstruere, ut sibi
aditum præcludat. p.636
- Sanguis subtilis & flatulentus intra
vasa coërcitus, nullo modo in va-
sis pneumonicis constipari, aut
præcordia ad rigiditatem infarcire
potest. p.638
- Sanguis *χλωρός* affectarum qualis.
p.641
- Sanguis ad efflagrandum quo ritu
disponatur. p.670
- in Sanguine ignis & flammæ pro-
prietates & affectiones absque eo-
rum forma, & specie manifesta re-
periuntur. p.671
- Sanguis fibras omnes carneas &
membranaceas perluit, carnesque
omnes, ac eas ferè solas ubique
exteriùs irrigat. p.679
- Scorbuti* præcipuorum symptomatum
recensio. p.567
- Scorbuti* causæ evidentes. p.568
- Scorbuti* causa per totum corpus dif-
fusa, sanguini, vel succo nervoso,
vel utrique inhæret. p.569
- Scorbuto* à sanguine rancido, vel
vini penduli instar crasso & mucil-
laginoso quæ remedia conveniant.
p.571
- Scorbutica* labes quo ritu nervoso li-
quori imprimitur. ibid.
- Scorbuti* causæ remotiores, à qui-
bus massæ sanguineæ & nervoso
liquori labes affigitur. pagina 572.
& seq.
- Scorbutus* non semper lienis aut pri-
marum viarum vitiis oritur. p.574
- Scorbutus* ab aëre insalubri produci-
tur. ibid. & seq.
- Scorbutus* febribus diuturnis super-
venit. p.575
- Scorbutus* quandoque hæreditaria la-
be, & aliquando per contagium,
quandoque primarum viarum cul-
pâ contrahitur. p.576
- Scorbutus* à tristitia, & studiis im-
modicis inducitur. p.577
- Scorbutica* labes à sanguine in cere-
brum & genus nervosum derivatur.
p.578
- Scorbuti* differentiæ variæ traduntur.
ibid. & seq.
- Scorbuti* signa & symptomata. p.579.
& seq.
- Scorbuticorum* symptomatum ratio-
nes explicantur. pagina 580. &
seq.
- Scorbutici* quibus affectionibus ob-
noxii. p.582. & seqq.
- Scorbuti* diagnosi ex urinarum in-
spectione certius quàm in aliis af-
fectibus eruitur. p.584
- Scorbuto* ingravescente sputatio co-
piosa, & oris affectiones ulcerosæ
superveniunt. p.584
- Scorbuti* signum pathognomonicum
maculæ & exanthemata in cru-
ribus & aliis corporis partibus
erumpentia. p.585
- Scorbuto* superveniunt alvi fluxus,
vomitus & nausea, dysenteria &
hæmorrhagia. p.586
- Scorbuto* ingravescente pusillani-
mitas, totius corporis languor,
& melancholia contingunt. pa-
gina 587
- Scorbutici* quandoque somnolentiâ &
torpore, aliquando verò vigiliâ
ferè constanti laborant. p.592
- Scorbuti* prognosis cauta, nec teme-
raria sit. p.595
- Scorbutus* statim affectos non jugulat,
aut versus statum insanabilem præ-
cipitat; nec faciliè curatur. p.596
- Scorbuti* curatio & præservatio. pa-
gina 597
- Scorbuticorum* curatio à catharticis
incipiat. p.598
- Scorbuto* calidiori quæ remedia adhi-
benda. p.599
- Scorbuti* frigidioris cathartica reme-
dia. p.600

Index Alphabeticus,

- Scorbuti indicatio curatoria*, quâ ip-
si morbo & symptomatibus præci-
pue urgentibus occurritur. p. 611.
& seqq.
- Scorbuti indicatio vitalis* quibus re-
mediis perficiatur. p. 622. & seqq.
- Scorbuticorum historiarum* quædam &
casus rariores referuntur cum eo-
rum ætiologiis. p. 625. ad 632
- Seminis* magna dispendia quare cere-
bro & Nervis citò magnam debili-
tatem & enervationem inducant.
p. 393
- Seminalis materia* quid sit. p. 428
- Sensio* in quo consistat, & quomodo
perficiatur explicatur. p. 421
- Sinus* lateralis in venam jugularem
cum diverticulo appenso cedens.
p. 288
- Sinuum vertebraliū* figura & usus
varii. p. 403. & seqq.
- Sinus vertebralis superior* portio ac
communicationes cum sinubus la-
teralibus capitis, & venis jugula-
ribus exponuntur. p. 414
- Sinus spinalis* divaricationes per to-
tum ejus ductum figura quarta ex-
hibet. p. 415
- Sinus spinalis* in cane figurâ quartâ
expositus. ibid.
- Sonorum* idæ in qua parte τὸ ἰγχερὰ λυ
relinquuntur. p. 327
- Sonus* quâ viâ in cerebrum, vel cere-
bellum feratur. p. 328
- Spasmi* & Convulsionis vocabula quid
significant. p. 435
- Spasmodicorum causa conjuncta* quid sit,
& unde dependeat. p. 440. 441
- Spasmodicorum duplex causa* ac duæ spe-
cies. p. 441
- Spasmodicorum causæ remotiores* recen-
sentur. p. 443. & seqq.
- Spasmodica materia* intra cerebrum
admissa quomodo disponitur, aut
caducum infert. p. 444. 445
- In nervosum genus* delapsa pueros
aliter ac adultos afficit p. 445. Quo-
modo spiritus afficit. ibid.
- Spasmodica materies convulsionem*
aut continuas, aut periodicas in-
fert. p. 446
- Spasmodicorum causæ evidentes* recen-
sentur. p. 447. & seqq.
- Spasmodicorum causa irritans* quomodo
nervorum origines, extremitates,
medios processus, vel plexus af-
ficiat. p. 448
- Spasmodicorum differentiarum* variarum. p. 449
- Spasmi in pueris* propter dentitio-
nem, vel alias causas excitantur.
p. 472
- Spasmodicorum adultioribus acciden-
tium* tres species recensentur.
p. 473
- Spasmodica materies* quo ritu in ner-
vos influit. p. 474
- Historiarum & observationum* variarum, cum
earum ætiologiis referuntur de
hoc morbo. p. 475. & seqq.
- Spasmi à nervorum extremitatibus*
incipiunt, & quare. p. 482
- Spasmodicorum curatio* per remedia va-
riis temperamentis appropriata tra-
ditur. p. 483. & seqq.
- Spasmi à nervorum extremitatibus*
incipiunt propter irritationem &
copulam explosivam. p. 486
- Observationes* cum earum ætiologiis.
p. 487. & seqq.
- Spasmodicæ materiæ sedem esse ple-
xus nerveos*, probabilius apparet.
p. 490
- Spasmodicorum universalium tria causa-
rum genera* referuntur. p. 491
- Spasmi universales à veneficio vulgò*,
sed falsò habiti, eorum ætiologia.
p. 494
- Spasmi veneficium arguentes.* pagi-
na 495
- Spasmi universales febribus acciden-
tes*, & symptomatum ætiologia.
ibid.

Rerum Notabilium.

de Spasmodica affectione observatio
oppidè rara , & ejus ætiologia.
p. 508. & seq.

Spasmodorum universalium propter dia-
thesin scorbuticam excitatorum spe-
cies. p. 509

Spasmi in variis hysteriarum parti-
bus excitati , aut in toto corpore,
unde proveniant. p. 639

Spasmi *σπασμωδικοί*, immensis hæmor-
rhagiis , & non rarè moribundis
accidunt , & quare. ibid.

Spasmus permanens, Tetanus dictus,
quomodo contingat , & cesset.
p. 689

Spasmi prædicti historia , & ejus æ-
tiologia. p. 690. & seq.

Spiritus quid sint ; & qui effectus na-
turales ab horum motu procedant.
p. 3.

Spiritus plures , vel paciores pro di-
versitate subjectorum quibus in-
sunt , requiruntur. p. 4

Spirituum conditio , vel status tri-
plex. ibid.

Spirituosus latex quare in strias diui-
datur quando destillatione proli-
citur. ibid.

Spiritus & sulphur principia valde
cognata , non tamen idem sunt.
p. 8.

Spiritus sali non statim conjungitur :
intimè verò sulphuri ac aquæ co-
hæret. p. 9

Spiritus animalis elaboratio in cere-
bro. p. 17

Spirituum animalium generatio è
sanguine , in quibus *ἐν κεφαλῇ* lo-
cis , & quo apparatu perficiatur.
p. 288. 289

Spiritus animales jam perfecti quo-
modo systema nervosum irradiant.
p. 290

Spiritus animales non eodem ritu à
cerebello ac à cerebro , emanant.
p. 321

Quando placidè in cerebello quies-
cant , & quo ordine vel serie ab
eodem oriundi moveantur. pa-
gina 322

Spirituum cerebelli incolarum mo-
tus variis & anomali. p. 323

Spiritus animales quomodo systema-
tis nervosi partes tum primarias,
tum secundarias citissimè traji-
ciant. p. 337

Spiritus animales fibrarum loculos
implentes illuc per nervorum du-
ctus subeunt. p. 340

Spiritus animales intra singulos juxta
fibrarum series dispositi quasi mili-
tum turmæ. p. 341

Spirituum animalium *σπράξις* qualis
in toto corpore. ibid.

Eorum distributio diversa à distribu-
tione sanguinis. ibid.

Spiritus animales cordis motum pe-
rennantes , unde præcluso utrin-
que paris vagi ductu suppediten-
tur. p. 369

Spiritus animales ad viscera imi
ventris destinati , quo ritu exer-
centur. p. 384

Spirituum explosio quomodo con-
tingat. p. 446

Spiritus animales intra cerebri me-
ditullium consiti sunt primum
epileptici morbi subjectum. p. 453.
454

Sulphur principium chymicum maxi-
mè activum. p. 4

Sulphuris substantia qualis , & ejus
è corporibus varii eruptionis modi.
p. 5

Sulphur & *spiritus* non idem sunt
principium. p. 8

Sulphur terræ & sali intimè cohæret.
p. 9

Sulphur inter spiritum & salem quasi
distrahitur , & simul utrisque
adhæret. ibid.

Sulphur non facilè destillationi obse-
qui

Index Alphabeticus,

- quitur. ibid. & seq.
 in Sulphure communi quænam ob-
 servatu digniora. p. 48
 Sulphur copiosè inest nitro. p. 49
 Succus nutritius quid sit, & unde sup-
 peditetur. p. 71
 Succus nutritius cruori confusus,
 sanguinis culpâ non assimilatur.
 p. 78
 à Succo nervosi defectu & deprava-
 tione spirituum animalium inor-
 dinationes, & nervosi generis &
 cerebri horrendi affectus oriun-
 tur. p. 338
 Sudores nocturni, præsertim copiosi,
 scorbuticis quibusdam perquam
 molesti esse solent. p. 583
 Syncope pluribus modis solet in fe-
 bribus concitari. p. 120
 Synochus putrida, ejus species & cu-
 ratio. p. 124 & seq.
 Synochi putridæ essentialis quadri-
 membris divisio. p. 126
 Systole & diastole nec ad diaphragma,
 nec propriè ad cor pertinent: &
 quid sit diaphragmatis systole. pa-
 gina 643
- T
- T**arantula morsus quale vene-
 num, & quâ ratione spasmos
 dolorificos & indefessam saltationem
 inducat. p. 492
 Ariologia symptomatum à Taran-
 tula demorforum, & quare per
 virtutem melodiæ sedantur. p. 493
 Terra in solidis spatiola omnia, & va-
 cuitates à cæteris principiis reli-
 ctas replet. p. 8
 Terra vix ac ne vix quidem in de-
 stillationibus alembicum ascendit.
 ibid.
 Tetanus alius universalis, cujus tres
 sunt species; alius particularis.
 p. 59
- Thermarum usus convulsivis, & spas-
 modicis affectionibus obnoxios
 minimè juvat. p. 513. 514
 Tristitia & immodica studia quando-
 que scorbutum gignunt, & quare.
 p. 577
 Tussis mere convulsivæ exemplum.
 p. 561
 Tussis convulsiva in pueris affectus
 satis frequens. ibid.
 Tussis convulsivæ curatio p. 565
- V
- V**apores sulphurei, salini, & alii
 diversi generis. p. 13
 Variolarum causæ recensentur. p. 166.
 167.
 Variolarum diagnosi & prognosis.
 p. 168. & 169
 Variolarum phænomena rem suspe-
 ctam & periculi plenam indican-
 tia: ubi de curandi methodo.
 p. 170. & 171
 in Variolarum eruptione an conve-
 niat sanguinis missio. p. 174
 Variolæ puerperis febricitantibus su-
 pervenientes quomodo curandæ
 p. 188
 Vasa seminalia & partes genitales
 particulis maximè fermentativis
 turgent. p. 18
 Vasa vacua & corpora humidiora
 quomodo ex diutino situ foetorem
 quendam absque putredine, qui
 mucoris vocabulo designari solet,
 contrahant. p. 35. & 36
 Vasa sanguifera ad medullam spina-
 lem spectantia, eorumque origines
 & propagines referuntur. p. 401.
 & seq.
 Vegetabilium germinatio ad quam anni
 tempora multum conducunt. p. 14.
 15. 22
 Vegetabilium & mineralium solu-
 tiones invicem commixtæ varios
 colores

Rerum Notabilium.

- colores edunt. p. 57
- Horum ratio traditur. p. 58
- Vena* vertebrales arteriis vertebralibus pares describuntur. p. 414
- Veneri* nomine quid comprehendatur. p. 140
- Venena varia, & eorum varii lædendi modi. ibid. & seq.
- Venena sanguinem potissimum afficiunt. p. 141. 142
- Venena periculosiora sanguinem congelantia. p. 143
- Venena quædam in liquorem nervosum potius quàm in sanguinem agentia affectiones spasmodicas ineunt. p. 492
- Vertigo* scorbuto inveterato laboranti superveniens unde oriatur. pagina 591
- Vertigo affectioni scorbuticæ superveniens quibus remediis curanda. p. 613
- Vinorum* fermentatio & defæcatio. p. 27
- Vinorum nimia effervescentia unde contrahatur. ibid.
- Vinorum vitia à nimia effervescentia contracta; & quomodo eis occurratur. p. 28
- Vinorum depauperatio & ejus remedia. ibid. & seq.
- Vinum pomaceum, & ejus confectio. p. 29
- Vini cum sanguine analogia explicatur. p. 67. 68
- Vini tertia collatio cum sanguine. p. 68
- Vini fermentatio differt à fermentatione sanguinis. p. 72
- Vinorum & sanguinis discrasia quoad res non miscibiles utrique confusas. p. 569
- Vinorum dyscrasia dum fiunt rancida, aut pendula. p. 570
- Vinum antiscorbuticum simplex, & alias vina medicata scorbuticis utilia, quomodo paranda. p. 606. 607. & 610.
- Viscus* quasi crusta linguam, palatum, gingivas, & totius oris & gutturis cavitatem oblinens in febribus, unde proveniat. p. 118
- Vitrificatio* à sale fusco, & materiæ terrestri secundum minimas particulas unito dependet. p. 60
- Vitrificationis varii modi & diversi apparatus. p. 61
- Vitriolum* martis quomodo conficiendum. p. 559
- Vomitus* & nausea in febribus contingentes unde excitentur. pag. 120. 121
- Urina* qualis in febribus, præcipue tertiana. p. 81
- Sæpe malè se habet, quando cum ægrotis bene est, & è contrà. p. 81
- Urinarum inspectio maximi usus est in febribus, & majorem habet certitudinem quàm in aliis morbis. p. 123
- Urinæ rubescences & minùs coloratæ. ibid.
- Urinarum consistentia, contenta, & subsidentia, simul dependent à materia adusta & recrementitia; ubi de prognosticis, & indicationibus quoad directiones pharmaceuticas desumendis ab inspectione urinæ. p. 124
- Urinæ præcipua elementa, & partes, in quas resolvitur analysi spagyricæ exposita. p. 216. 217
- Urinæ sanorum quales esse debeant quoad colorem & quantitatem; & unde earum colores varii. p. 218. 219
- Urinæ sanorum quæ post pleniorum potum minguntur, pallidæ & aquosæ existunt; nequaquam tinctæ, & quare. p. 220
- Urinæ sanorum nihil præter hypostasin

Index Alphabeticus, &c.

- statim inesse debet, & quid ea sit. p.221
- Urinæ consistentia. p.222
- Urinæ paucitas aut uberior copia in ægris unde proveniat. pag. 223. & 224
- Urina propter varios affectus corporis varios colores induit, & quid significant. p.224.& 225
- Urina qualem sæpe pueri excernere solent. p.226
- Urinæ color citrino intensior unde, ibid.
- Urina crocea, flammea, & rubicunda. p.227
- Urina rubicunda propter ejus contenta, & quare talis excernatur in febribus, scorbuto, arthritide & phthisi confirmata, præsertim si hæctica adjungatur. pag. 228. & 229.
- Urina viridis & nigra, & colorum ejus variæ immutationes. p.230. 231
- Urinæ ægrotantium contenta duplicia. p.231
- Urinæ contenta. naturalia, vel præternaturalia vario modo immutantur. p.232.& seq.
- Urinæ contenta particularia multiplicia, & à variis partibus provenire possunt. p.234.235
- Urinæ Nephriticorum. p.235
- Urinæ sedimentum farinaceum. pagina 236
- Urinæ materia singulas corporis partes perluit; haud tamen omnium statum & morbos patefacit. p.237
- Urinæ ægrotantium quomodo sanorum urinis dissimiles fiant: & quale judicium ex eis desumi possit. p.238.239
- Uusus *ὑποπίσεως* præcipuus est in observandis morbi cujusvis statu, progressu, necnon alterationibus versus salutem vel mortem. p.240
- Urinarum examen, & circa *ὑποπνοίας* circumstantiæ quædam observandæ. p.240.& 241
- Urinæ sanorum odor qualis esse debeat. p.242
- Urinarum evaporatio, destillatio, præcipitatio, & putrefactio cum utilitate multoties instituuntur. p.243
- Urina intensè rubicunda, & quasi lixivialis, absque febre, vel ictero scorbuti signum indubitatum est. p.584
- Uterus* quomodo à puerperio afficiatur, & qualem in alias corporis partes influentiam habeat. p.177. 178.
- Uteri ascensus passionem hystericam inducens omnino commentitius. p.545
- Uteri vitia puerperis & aliis fœminis obtingentia dislocatio & ejus reductio. ibid.

F I N I S.

